

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.


About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Alle Cal. a

Per 1933 e. 429



i de Maria **- Mari**a de Filo M

•

۳.

The state of the s . * 5 ,

1141

.

-

•

	•	
•		
•	•	

. .

JOURNAL

FÜR

PRAKTISCHE

C H E M I E

HERAUSGEGEBEN

VON

OTTO LINNÉ ERDMANN

ORD. PROF. D. TECHN. CHEMIE A. D. UNIVERSITÆT ZU LEIPZIG

UND

RICHARD FELIX MARCHAND

PRIVATDOCENT A. D. UNIVERSITÆT U. LEHRER D. CHEMIE A. D. K. PR. ARTIL-LERIE- U. INGENIEURSCHULE Z. BERLIN.

JAHRGANG 1841.

ZWEITER BAND.

MIT EINER KUPFÉRTAFEL.

LEIPZIG 1841.

VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH.

JOURNAL

F Ü R

PRAKTISCHE

C H E M I E

HERAUSGEGEBEN

VON

OTTO LINNÉ ERDMANN

ORD. PROF. D. TECHN. CHEMIE A. D. UNIVERSITÆT ZU LEIPZIG

UND

RICHARD FELIX MARCHAND

PRIVATOCENT A. D. UNIVERSITÆT U. LEHRER D. CHEMIR A. D. K. PR. ARTIL-LERIE- U. INGENIEURSCHULE Z. BERLIN.

DREI UND ZWANZIGSTER BAND.

MIT RINER KUPFERTAFEL.

UNTER MITWIRKUNG

DER HERREN

BERZELIUS, BIEWEND, W. u. R. BRANDES, ELSNER, FRANKEN-HEIM, FRITZSCHE, v. GLOCKER, HERMANN, LOEWIG, OSANN, PETZHOLDT, SCHROEDER, SCHUBERT, SCHWEIZER, SOND-HAUSS, VOGEL, WACKENRODER, WOEHLER.

LEIPZIG 1841.

VERLAG VON JOHANN AMBROSIUS BARTH.



Inhalt des drei und zwanzigsten Bandes des Journals für praktische Chemie.

Erstes und zweites Heft.

I. Ueberblick der chemischen Verhältnisse des geistigen Produc-

tes der trocknen Destillation des Holzes. Von Dr. Eduard	
Schweizer	1
II. Ueber die Umwandlung der Weinstein-, Citronen-, Schleim-	
und Gallussäure durch die Superoxyde des Bleies und Mangans.	
Von J. Persoz.	54
III. Ueber die Zusammensetzung der krystallisirten Citronen-	
säure. Von R. F. Marchand.	60
IV. Ueber die Producte der Einwirkung des Kali auf das Indig-	
blau. Von J. Fritzsche.	67
	88
VI. Untersuchungen über die durch salpetrige Säure (acide ni-	
treux) und salpetrige Salpetersäure (acide hyponitrique) ge-	
bildeten Bleisalze. Von Péligot	24
VII. Künstliche Färbung der Cocons. (Brief des Hrn. Bonafous.) 1	
	126
Literatur.	
Ditting at ul.	
Drittes Heft.	
IX. Untersuchungen über das Refractionsvermögen der Flüssig-	
keiten. Von Edmund Becquerel und August Cahours. 1	29
X. Ueber die Bestimmung des Refractionsindex einiger zur orga-	
nischen Chemie gehöriger Körper. Von H. Deville 1	34
XI. Einige Versuche über das Leidenfrost'sche Phänomen. Von	
B. F. Marchand	187
XII. Ein paar neue Experimente der Galvano-Plastik. Von Ma-	
•	13

	Seite
XIII. Ueber die Methoden der Vergoldung auf nassem Wege.	
Von Dr. L. Elsner	
XIV. Ueber das Atomgewicht des Kohlenstoffes. Von O.L. Erd-	
mann und R. F. Marchand.	159
Nachschrift	179
XV. Praktische Beiträge zur Galvanoplastik. Von Dr. Schubert.	190
XVI. Literarische Nachweisungen	
Viertes Heft.	
XVII. Ueber die Nothwendigkeit einer genügenden Beachtung der	
Krystallographie in der Chemie. Von Heinrich Wa-	
ckenroder	
XVIII. Neue Bestimmungen der Krystallformen der Wichtigeren	
stickstofffreien organischen Säuren. Von Heinrich Wa-	
ckenroder	
XIX. Ueber die Metamorphose des mellithsauren Ammoniaks in	
höherer Temperatur. Von F. Wöhler	
XX. Ueber verschiedene Gegenstände der neueren Chemie. Von	
Berzelius.	
XXI. Einwirkung des Ammoniakgases auf brennende Kohlen;	
Bildung von cyanwasserstoffsaurem Ammoniak und Entwi-	
	232
XXII. Untersuchungen über die Luft, welche in den Poren des	
Schnees enthalten ist. Von Boussingault	
XXIII. Quantität der für das Athmen eines Pferdes nothwendi-	
	244
XXIV. Ueber die Verbindung von Cyanquecksilber mit Chlorka-	
·	247
XXV. Chemische Notizen. Von Eduard Biewend	248
1. Schweissbarkeit des Palladiums	
2. Chlorhydrat-Krystalle	249
8. Ueber geschmolzenes Bleioxyd	250
4. Verhalten der Titansäure gegen einige Reagentien bei	
verschiedener Verdünnung	251
5. Ueber Braunkohlenasche und alkalische Reaction des	
Gipses	252
6. Legirung von Eisen mit Blei	_
7. Ueber Vergoldung des Kupfers auf hydro-elektrischem	
Wege	_
XXVI. Wirkung des Jeds auf chlorsaures Kali. Von Millon.	253
Literatur.	
Fünftes Heft.	
•	
XXVII. Chemische Untersuchung des Mineralwassers zu Kreuz-	
nach Von C. L. Swrige	OKE

XXVIII. Ueber Ural-Orthit und Irit, zwei neue Mineralien	Seite
Von R. Hermann.	
XXIX. Notiz über das Mangansilicat von Tinzen. Von Di	
XXX. Beschreibung des Greenovits. Von Dufresnoy	
XXXI. Ueber das Muttergestein des Goldes in der Provinz Mina	
•	
XXXII. Meteorsteinfall in Schlesien. Von E. F. v. Glocker.	. 285
XXXIII. Ueber die Anwendbarkeit des Wasserglases als ein Mit	
tel, das Entbrennen feuerfangender Gegenstände zu verhüten	. 287
XXXIV. Untersuchungen über die Sauerstoffverbindungen de	8
Chlors. Von Millon	
XXXV. Ueber die Wirkung von Salpetersäure auf chlor-, jod-	
und bromsaures Kali und Natron. Von F. Penny.	
XXXVI. Neue Verbindung von arseniger Säure und Schwefel-	
säure. Von Dr. Schafhaeutl	•
XXXVII. Bereitung der wasserfreien Phosphorsäure. Von	
	. 300
XXXVIII. Beobachtungen in Betreff des Atomgewichtes der Kohle und der Anwendung der Schwefelsäure zur Bestimmung der	
	. 302
XXXIX. Ueber Erhaltung der Fleischspeisen. Von Gannal.	
XL. Ueber das Effloresciren der Mauern und ähnliche Erschei-	
	. 308
	. 311
XLII. Steinölquelle	. 312
XLIII. Neue galvanische Säule.	. 318
XLIV. Ueber eine Vervollkommnung des galvanoplastischen Ver-	-
	316
XLV. Analyse des Wassers aus dem artesischen Brunnen von	ì .
- ,	318
XLVI. Literarische Nachweisungen	320
Sechstes Heft.	
XLVII. Ueber die ätherischen Oele. Von Gerhard tund Cahours.	321
XLVIII. Ueber die Pikrinsalpetersäure. Von R. F. Marchand.	
XLIX. Untersuchungen über den Moder. Von R. Hermann.	
L. Ueber die Einwirkung des Kali's auf Campher. Von Delalande.	
LI. Ueber die Gährungsfähigkeit der Zuckerarten. Von H. Rose.	998
LII. Ueber das Theobromin. Von A. Woskressensky	
LIII. Ueber das Sarcocollaharz. Von Johnston	397
•	898
LV. Analyse des Chylne und der Lamphe. Von C. O. Bace	900

	Seite
LVI. Ueber die Capillarität der flüssigen Körper bei verschiede-	
nen Temperaturen. Von Frankenheim und Sondhauss.	401
LVII. Rechtfertigung der Volumentheorie gegen Löwig's Be-	
merkungen. Von H. Schröder	43 6
LVIII. Entwickelung einer sehr einfachen Formel, besonders zum	
Gebrauch für Anfänger des krystallographischen Studiums	
geeignet, nach welcher, schon aus jeder krystallographischen	
Grundform, die grösstmöglichste Anzahl gleichartiger Flä-	
chen sich bestimmen lässt, die in den respectiven Systemen	
vorkommen können. Von Dr. L. Elsner	442
LIX. Ueber die Lichterscheinung bei der Krystallbildung. Von H.	
	447
LX. Ueber die Verdampfung ungleich flüchtiger gemischter Flüs-	
	454
LXI. Ueber die Entstehung der Abstnmpfungsflächen bei den Kry-	
	46 0
	466
LXIII. Auszug aus der "Oversigt over det Kongelige danske	
Videnskabernes Selskab's Forhandlinger og dets Medlemmers	
	467
1) Jacobson, über die Chromsäure	
2) Jerichau, über eine besondere Art von Schwingungen.	469
	470
	472
	474
LXIV. Ueber die bei der Verbrennung des Diamants zurück-	
	475
LXV. Beiträge zur mineralogischen Kenntniss des Teutoburger	
Waldes und des Wesergebirges. Von Rudolph Brandes	
	479
	491
LXVII. Ueber das Atomgewicht des Urans. Von Eugen Péligot.	
LXVIII. Bemerkungen über die Zersetzung des Ammoniaks durch	
die Verbindungen von Stickstoff mit Sauerstoff. Von J.	
	499
LXIX. Untersuchungen über die salpetrige Salpetersäure und die	
salpetrige Säure (l'acide hypoazotique et l'acide azoteux).	
	504
LXX. Chemische Notizen. Von Dr. Vogel jun. in München	
1) Ueber die Unterscheidung der salpetersauren Verbindun-	
gen von chlorsauren in verdünnten Auflösungen.	
	510
3) Ueber das Verhalten der wasserfreien Schwefelsäure zu	_ • • •
·	511
·	512

Ueberblick der chemischen Verhältnisse des geistigen Productes der trocknen Destillation des Holzes.

Von

Dr. EDUARD SCHWEIZER.

Seit einer Reihe von Jahren ist der Holzgeist Gegenstand chemischer Forschung gewesen und es haben sich mit dieser interessanten Substanz eine Menge von Chemikern beschäftigt. Die verschiedenen Untersuchungen zeigten aber in ihren Resultaten wesentliche Abweichungen, und erst durch die Arbeiten der neuern
Zeit war man im Stande, sich die scheinbaren Widersprüche
in den Angaben zu erklären.

Dumas und Péligot *) waren die ersten, welche uns gründlichere Kenntnisse von dem Holzgeiste verschafften. Sie wiesen die Eigenthümlichkeit desselben nach und bestimmten seinen eigenthümlichen chemischen Charakter. Sie legten die Analogie dieses Körpers mit dem Weingeiste dar und führten die Belege dafür auf eine wahrhaft musterhafte Weise durch. Ihre Untersuchungen und Ansichten wurden von anderen Chemikern, wie von Kane **), Gregory ***) etc. vollkommen bestätigt und erweitert.

^{*)} Poggend. Annal. Bd. XXXVI. S. 88.

^{**)} Annal. der Pharm. Bd. XIX. S. 164.

^{***)} Ebend. Bd. XX. S. 239.

2 Schweizer, üb. die chem. Verhältnisse des geistigen

So bestimmt sich aber auch durch diese Arbeiten die Eigenthümlichkeit der Substanz herausstellte, mit der Dum as und Péligot operirten, so wenig gaben sie einen Außehluss über die Natur der Stoffe, mit denen die früheren Untersuchungen gemacht wurden und woher die Verschiedenheiten in den Angaben rührten. Liebig *) analysirte früher einen Holzgeist, der sowohl in seiner Zusammensetzung als seinen Eigenschaften wesentlich verschieden von demjenigen war, dessen sich die französischen Chemiker bedienten. Gmeliu **) zeigte endlich, dass der Holzgeist ein Gemenge von verschiedenen Stoffen sein könne, und beinahe zu gleicher Zeit erschien die erste Arbeit **), die Weid mann in Verbindung mit mir unternahm, welche schon die Methode bezeichnete, diese verschiedenen Körper zu trennen, und die letzteren näher charakterisirte.

Sie zeigte, dass der Holzgeist von Dumas und Péligot oft mit einer veränderlichen Menge einer eigenthümlichen Substanz gemengt vorkommt, welcher wir den Namen Xylit gaben. Wir setzten unsere Arbeiten über diesen Gegenstand längere Zeit fort. Wir entdeckten noch einen eigenthümlichen Körper in dem rohen Holzgeist; wir studirten die Reactionen verschiedener Substanzen auf den eigentlichen Holzgeist und stellten eine Menge von Untersuchungen an, um über die chemische Natur des Xylits und Mesits und die Zersetzungsproducte dieser Körper in's Klare zu kommen. Das Ziel unserer Untersuchungen war, die Masse der gewonnenen Thatsachen durch ein wissenschaftliches Band zu verknüpfen. Es war uns endlich gelungen, die Resultate sömmtlicher Untersuchungen über den Holzgeist in Einklang zu bringen.

Unsere Untersuchungen wurden in verschiedenen Perioden ihrer Entwickelung in vier grossen Abhandlungen †) bekannt gemacht. Die Resultate wurden dargelegt, wie sie gleichsam geschichtlich auf einander folgten; dadurch wurde der Ueberblick über einen Gegenstand, der eine so grosse Ausdehnung

^{*)} Poggend. Annal. Bd. XXVII. S. 613.

^{**)} Annal. der Pharm. XXV. S. 47.

^{***)} Poggend. Annal. Bd. XLIII. S. 596.

^{†)} Poggend. Annal. Bd. XLIII. S. 596; Bd. LXIX. S. 135 und S. 323; Bd. L. S. 265.

Productes der trocknen Destillation des Holzes. 3

gewonnen hatte, natürlich etwas erschwert, und ich halte es deshalb nicht für unzweckmässig, eine übersichtliche Darstellung der Resultate dieser Untersuchungen zu geben.

Der Holzspiritus.

Wird die bei der trocknen Destillation von Holz und anderen sauerstoffhaltigen organischen Substanzen erhaltene saure Flüssigkeit, die unreine Holzsäure, der Destillation unterworfen, so geht im Anfange eine spirituöse Flüssigkeit fiber, welche, je nach der Temperatur und anderen Umständen, unter denen die Zersetzung der ursprünglichen Substanz stattfand, aus verschiedenen eigenthümlichen Verbindungen in verschiedenen Verhältnissen besteht. Dieses rohe Product, welches ich mit Berzelius *) Holzspiritus nennen will, kann ein Gemenge von Wasser, Holzgeist, essigsaurem Holzäther (Mesit von Reich enbach), Xylit, Mesit und brenzlichen Oelen sein. Oft herrschen der Holzgeist und der essigsaure Holzäther vor, oft ist die Menge des Xylits überwiegend, oder es kann im Gegentheile der Fall eintreten, dass letzterer gar nicht oder nur in sehr kleinen Quantitäten vorhanden ist.

Bei der Destillation von Holzspiritus mit Kalk zerlegt sich nach den Angaben von Berzelius **) der essigsaure Holzäther und es bildet sich essigsaurer Kalk und Holzgeist. Auf diese Weise kann man durch wiederholte Destillationen über gebranntem Kalk den essigsauren Holzäther vollständig in Holzgeist überführen. Zugleich bleiben mit dem Kalke die brenzlichen Oele und Wasser zurück; das Destillat ist farblos und färbt sich an der Luft nicht mehr. Wenn dasselbe beim Vermischen mit Wasser keine Trübung mehr giebt, so sind die Rectificationen mit Kalk hinreichend wiederholt worden. Von den Substanzen, die mit dem Kalke zurückblieben, ist das Pyroxanthin von Scanlan isolirt worden, ein gelber krystallinischer Körper, der nach Gregory ***) die Zusammensezzung C21H18O4 hat.

^{*)} Berzelius's Lehrbuch, Bd. VIII. S. 518. 4. Aufl.

^{**)} Ebend. S. 516.

^{***)} Ann. der Pharm. Bd. XXI. S. 143.

4 Schweizer, üb. die chem. Verhältnisse des geistigen

Die so erhaltene Flüssigkeit ist nun entweder reiner Holzgeist (Dumas u. Péligot) oder ein Gemenge von Holzgeist,
Xylit und Mesit (Weidmann und S.) in verschiedenen Verhältnissen. Ausserdem enthält sie immer noch eine kleine Menge
von dem Oele des Holzgeistes von Kane; auch scheint cs, dass
bisweilen noch kleine Quantitäten anderer Stoffe beigemengt sind.

Der Holzgeist.

Darstellung. Um den Holzgeist aus einem Holzspiritus darzustellen, in welchem er mit Xylit und Mesit gemengt vorkommt, wird sein Verhalten zu Chlorcalcium benutzt. Er hat nämlich die Eigenschaft, mit letzterem eine bestimmte Verbindung einzugehen, welche bei 100° nur wenig zersetzt wird. Zwar bildet auch Xylit mit Chlorcalcium eine Verbindung, und bei der Destillation von Xylit mit Chlorcalcium ist es kaum möglich, bei 100° allen Xylit zu entfernen, obgleich sich die Verbindung schon bei weit niedrigerer Temperatur zu zersetzen beginnt; aber die Verwandtschaft des Holzgeistes zu dem Chlorcalcium ist bedeutend grösser als die des Xylits zu diesem Körper. Wenn man daher ein Gemenge von Holzgeist und Xylit mit so viel Chlorcalcium bei 100° destillirt, als nur hinreichend ist, um den Holzgeist zu binden, so kann man durch die Destillation durchaus allen Xylit entfernen.

Der auf die oben angegebene Weise gereinigte Holzspiritus wird mit geschmolzenem Chlorcalcium gesättigt und das Gemisch nach einiger Zeit im Wasserbade bei 100° der Destillation unterworfen. Xylit und Mesit destilliren über, während der Holzgeist und die kleine Menge des oben erwähnten Oeles mit dem Chlorcalcium zurückbleiben. Die Destillation wird so lange fortgesetzt, bis nichts mehr übergeht. Das Destillat kann immer noch Holzgeist enthalten, den man durch wiederholte Destillationen über Chlorcalcium abscheiden kann. Da jedoch, wenn die grösste Menge von Holzgeist durch Chlorcalcium entfernt ist, bei einer folgenden Rectification das Chlorcalcium auch etwas Xylit zurückhält, so können die Rückstände von den letzten Rectificationen nicht mehr zur Darstellung eines reinen Holzgeistes benutzt werden.

Die Verbindung von Chlorcalcium mit Holzgeist wird nun mit Wasser behandelt, welches den letztern ausscheidet, da es

eine grössere Verwandtschaft zum Chlorcalcium hat. Wird nun das Ganze auf dem Wasserbade der Destillation unterworfen, so geht zuerst ganz reiner Holzgeist über, die späteren Portionen enthalten schon Spuren von dem flüchtigen Oele und das zuletzt Uebergehende enthält oft von demselben so viel, dass nach einiger Zeit grosse Tropfen davon auf dem Destillate schwimmen. Der wässrige reine Holzgeist wird durch mehrmalige Rectification über gebranntem Kalk entwässert. — Das flüchtige Oel hat nach Kane*) die Zusammensetzung C20H30O. Weiter unten wird noch einmal davon die Rede sein.

Die Analogie des Holzgeistes mit dem Weingeiste.

Es giebt wohl wenige Körper in der organischen Chemie, die eine so grosse Analogie in allen ihren Verhältnissen zeigen wie der Weingeist und der Holzgeist, eine Analogie, deren Aufdeckung von der grössten Wichtigkeit für die organische Chemie in einer Zeit war, als die Kenntnisse und die Ansichten von der Constitution der meisten organischen Körper noch vereinzelt da standen. — Es entstand unter den Chemikern ein grosser Eifer, mehr solche Analogien aufzufinden, welche zeigen, wie sehr die organische Chemie mit der unorganischen im Zusammenhange steht; aber es war Einigen beinahe zu sehr zur Leidenschaft geworden, blos die schöne Classe der Alkohole weiter auszudehnen.

Der Holzgeist steht in ganz gleichem Verhältnisse zu dem Weingeiste wie das Natronhydrat zu dem Kalihydrat, und eben so wie man im voraus von dem letztern auf ersteres schliessen kann, so kann man die Verhältnisse des Holzgeistes voraussagen, wenn man diejenigen des Weingeistes kennt. Jede der verschiedenen Theorien über die Constitution des Weingeistes und seiner Aetherarten passt auch für den Holzgeist, und wenn eine dieser Theorien für den Weingeist die wahre ist, so ist sie es auch für den Holzgeist. Alles, was über die Constitution des Weingeistes und des Aethers gesprochen worden ist, hat auch Bezug auf den Holzgeist und den Holzäther. Die Ansicht, die sich am meisten geltend macht, ist die, nach der

^{*)} Annal. der Pharm. Bd. XIX S 168.

man den Weingeist wie den Holzgeist als Hydrate der organischen Oxyde betrachtet, die sich aus ihnen durch Säuren etc. abscheiden lassen, sich mit Säuren verbinden und aus diesen Verbindungen wieder in dem einen Falle als Weingeist, in dem andern als Holzgeist abgeschieden werden können.

Eine Hauptstütze für die Ansicht, dass der Holzgeist, analog dem Weingeiste, ein Hydrat ist, bildet sein Verhalten zu Kalium. Er entwickelt nämlich mit letzterem, eben so wie der Weingeist, Wasserstoffgas, und es bildet sich eine Verbindung von Holzätherkali mit Holzgeist $= (C_2H_6O + KO) + C_2H_8O_2$.

Zwar hatte Löwig *) früher gefunden, dass bei der Einwirkung von Kalium auf Holzgeist kein Wasserstoffgas entwickelt wird, überhaupt dabei ganz andere Zersetzungserscheinungen eintreten wie beim Weingeist; allein Löwig stellte seine Versuche zu einer Zeit an, als es noch nicht bekannt war, dass der Holzspiritus neben Holzgeist noch Xylit und Mesit enthalten kann, und es ergab sich aus den späteren Untersuchungen dann, dass Löwig keinen Holzgeist, sondern Xylit zu seinen Versuchen angewandt hatte. Nach der ausgesprochenen Ansicht ist der Holzäther das Oxyd des Radicals Methyl, also Methyloxyd $C_2 H_6 + 0$. Zu den Säuren verhält er sich wie eine Basis; mit starken Basen geht er Verbindungen ein, in denen er gleichsam die Rolle des Hydratwassers übernimmt. Wird er aus seinen Verbindungen durch stärkere Verwandtschaft abgeschieden, so vereinigt er sich im Moment seiner Abscheidung mit 1 At. Wasser zu Holzgeist. Durch blosse Berührung mit Wasser verwandelt er sich nicht in sein Hydrat, in Holzgeist, gleichwie die Hydrate gewisser unorganischer Oxyde auf diese Weise nicht hervorgebracht werden können, sondern nur in dem Momente entstehen, in welchem die Oxyde aus ihren Verbindungen ausgeschieden werden.

In unserer ersten Arbeit über den Holzgeist bestritten Weidmann und ich die von Dumas und Péligot ausgesprochene Ansicht, dass der Holzäther C₂H₆O im den verschiedenen Methylenverbindungen wirklich enthalten sei und dass derselbe in gleicher Beziehung stehe zu dem Holzgeiste wie

^{*)} Poggend. Annal. Bd. XLII. S. 399.

der Aether zum Weingeiste. Wir stützten unsere Behauptungen darauf, dass wir nicht im Stande waren, bei der Zersezzung verschiedener Aetherarten des Holzgeistes durch Kali die Bildung von Holzgeist nachzuweisen. Hingegen erhielten wir dabei einen öligen Körper von der Zusammensetzung C₂₀H₄₂O welcher uns zu der Ansicht verleitete, dass das Radical, welches den Verbindungen aus dem Holzgeiste zu Grunde liegt, nicht schon in letzterem existire, sondern erst durch den Einfluss der Säuren auf denselben gebildet werde. In den Verbindungen sei dann z. B. das Hydrat des Methylens von Dumas und Péligot C2H4+Aq enthalten; bei der Zersetzung dieser Verbindungen verwandle sich das Methylen C2H4 in einen polymeren Kohlenwasserstoff C20H40, der sich im Augenblicke seines Abscheidens mit 1 At. Wasser zu C20 H42O (Paramethylenhydrat) verbinde.

Als wir aber später bei Versuchen über die Einwirkung des Kali's auf Holzgeist fanden, dass letzterer durch Kali sehr schnell und bedeutend verändert wird, wodurch er sich vom Weingeiste unterscheidet, dass bei dieser Zersetzung eine ölige Substanz entsteht, gelangten wir zu der Vermuthung, dass der ölige Körper, den wir früher bei der Zersetzung der Holzätherverbindungen durch Kali erhielten, nur ein weiteres Zersezzungsproduct des Holzgeistes, also nur ein secundäres Product der Zersetzung sei. Wir stellten natürlich über diesen Gegenstand neue Untersuchungen an und fanden durch dieselben unsere Vermuthung vollkommen bestätigt. Wir wählten zu diesen Versuchen den kleesauren Holzäther, der uns hauptsächlich auch zu unseren früheren Versuchen gedient hatte, und stellten uns denselben in möglichster Reinheit durch blosse Destillation von Holzgeist mit Schwefelsäure dar, ganz auf analoge Weise, wie man nach Bauhof den gewöhnlichen Kleeäther erhält. Die reine Verbindung wurde mit grosser Vorsicht durch verdünnte Kalilösung zersetzt, und es gelang uns in der That, die Bildung des Holzgeistes bei dieser Zersetzung nachzuweisen, indem wir denselben aus der zersetzten Masse mit allen seinen von bekannter Zusammensetzung isoliren Eigenschaften und Zugleich zeigten wir, wie schnell eine Veränderung des ausgeschiedenen Holzgeistes durch das vorhandene Kali bewirkt wird.

Bei der Zersetzung des essigsauren Holzäthers durch Kalium, auf die ich weiter unten zu sprechen komme, bewiesen wir ebenfalls durch die Analyse die Bildung von Holzgeist.

Ueber die Einwirkung der Schwefelsäure auf den Holzgeist in höherer Temperatur.

Die Bildung des Holzäthers aus dem Holzgeiste durch Schweselsäure gelingt nach Dumas und Péligot am besten, wenn ein Gemisch von 1 Th. wasserfreiem Holzgeist mit 4 Th. höchst concentrirter Schweselsäure der Destillation unterworsen wird. Dasselbe geräth bald in's Sieden, wobei eine grosse Menge Holzäthergas entwickelt wird. Nach und nach färbt sich die Masse unter Entwickelung von Kohlensäure und schwesliger Säure braun und zuletzt schwarz, ohne dass sie sich jedoch verdickt, wie es beim Weingeiste, wenn er in gleichen Verhältnissen mit Schweselsäure behandelt wird, der Fall ist. — Bei der Destillation von 8—10 Th. Schweselsäure mit 1 Th. Holzgeist tritt als Hauptproduct schweselsaurer Holzäther aus.

Weidmann und ich gaben in unserer ersten Abhandlung an, dass bei der Destillation von gleichen Theilen Schwefelsäure und Holzgeist unter Entwickelung von schwefliger Säure Methol gebildet werde. In unserer dritten Arbeit wiederholten wir den Versuch mit Holzgeist, von dessen Reinheit wir uns durch die Analyse überzeugt hatten, und fanden, dass derselbe hierbei durchaus zu keiner Bildung von Methol Veranlassung giebt. Im Anfange geht etwas unzersetzter Holzgeist über, es entwickelt sich viel Gas, ohne Zweifel Holzäther, und am Ende erscheint etwas schwefelsaurer Holzäther.

Der Grund, warum wir früher aus dem Holzgeiste Methol erhielten, liegt darin, dass wir einen Holzgeist anwandten, der noch nicht frei von Xylit war. Wir kannten nämlich damals die Schwierigkeiten noch nicht vollständig, die mit der Darstellung von reinem Holzgeist aus einem Holzspiritus verbunden sind, welcher eine bedeutende Menge von Xylit enthält.

In der Folge wird gezeigt werden, dass nur Xylit, Mesit etc. bei der Destillation mit Schwefelsäure Methol liefern können.

Der Umstand, dass wir zu unseren Versuchen über das Verhalten der Schwefelsäure zu Holzgeist xylithaltigen Holzgeist anwandten, erklärt auch die Verschiedenheit zwischen den Angaben von Dumas und Péligot und den unsrigen, die sich auf diesen Gegenstand beziehen. Wir erhielten nämlich beim Vermischen von 4 Th. Schwefelsäure mit 1 Th. Holzgeist eine dunkelbraune Masse, die eine dickfiüssige Consistenz annahm. Bei der Destillation dieser Mischung fand starkes Aufblähen statt, es wurde eine grosse Menge schwefligsaures Gas entwickelt und man erhielt ein Destillat, das sich in 2 Schichten schied, von denen die obere wässrige eine bedeutende Menge Essigsäure enthielt, während die untere ölige ein Gemenge von essigsaurem und von schwefelsaurem Holzäther war, in welchem die Menge des erstern über die des letztern bedeutend vorherrschte. - Bei der Destillation von 1 Theil Holzgeist mit 10 Th. Schwefelsäure erhielten wir die gleichen Producte, es hatte sich aber dabei eine weit beträchtlichere Menge von der schwefelsauren Verbindung gebildet. Am Ende blieb bei diesen Destillationen stets eine schwarze kohlige Masse zurück.

Der Xylit zeigt unter denselben Verhältnissen beinahe dasselbe Verhalten zur Schwefelsäure, wie wir es hier beim Holzgeiste gefunden hatten. Beim Vermischen von Xylit mit Schwefelsäure findet sogleich eine schwarzbraune Färbung statt und es bildet sich eine bedeutende Menge eines braunen Harzes, welche die Masse dickflüssig macht. Die Bildung dieses Harzes rührt, wie ich später zeigen werde, von einer schnell erfolgenden weitern Zersetzung des Xylits her. Ferner werden wir sehen, wie leicht bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Xylit dieser in essigsauren Holzäther übergeführt werden kann, wie leicht sich dabei eine bedeutende Quantität Essigsäuré erzeugt. Der Holzgeist zeigt in seinem Verhalten zu Schwefelsäure in höherer Temperatur wesentliche Verschiedenheiten von dem Weingeiste.

Bei der Destillation von 1 Th. Weingeist mit 4 Th. Schwefelsäure bildet sich zuerst Aether und Weinöl; wenn die Temperatur auf 200° gestiegen ist, so entwickelt sich viel ölbildendes Gas. In einem dritten Stadium der Zersetzung bildet
sich unter Entwickelung von schwefliger Säure die von Erdmann **) untersuchte schwarze Substanz.

^{*)} Dies. Journ. Bd. XXI. S. 291.

10 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen

Unter denselben Verhältnissen liefert der Holzgeist keine dem Weinöl und dem ölbildenden Gase analogen Körper, es wird hauptsächlich blos Holzäthergas gebildet; zuletzt entstehen jedoch unter Entwickelung von Kohlensäure und schwefliger Säure ebenfalls nicht flüchtige schwarzgefärbte Zersetzungsproducte. Selbst bei der Destillation einer grossen Menge Schwefelsäure mit Holzgeist wird kein Kohlenwasserstoff abgeschieden, sondern es bildet sich dabei in grosser Menge die neutrale Verbindung der Schwefelsäure mit Holzäther.

Warum bei der Einwirkung der Schweselsäure auf Holzgeist in dem einen Falle hauptsächlich Holzäthergas, in dem
andern grösstentheils schweselsaurer Holzäther gebildet wird,
ist schwierig mit Bestimmtheit zu erklären, so lange man keine
Beobachtungen über die Temperatur und andere Verhältnisse
besitzt, bei denen die Bildung dieser Körper besonders vor
sich geht.

Es ist wahrscheinlich, dass eine höhere Temperatur Katstehung des schwefelsauren Holzäthers erforderlich ist, als die ist, bei welcher die Bildung des Holzäthers stattfindet. Das Bestreben des letztern, als Gas zu entweichen, überwiegt bei niedrigerer Temperatur seine Neigung, sich mit Schwefelsäure zu einem ziemlich schwersüchtigen Körper zu verbinden. Dumas und Péligot zeigten, dass die Gemenge von Holzgeist und Schwefelsäure in den Verhältnissen, welche sie als die vortheilhaftesten zur Darstellung des Holzäthers und des schwefelsauren Holzäthers vorschlagen, vorzüglich den einen oder andern dieser Körper liefern, wenn das Sieden der Flüssigkeit beginnt. Ein Gemisch von 4 Th. Schwefelsäure mit 1 Theil Holzgeist geräth jedenfalls bei einer niedrigern Temperatur in's Sieden als das Gemenge von 1 Th. Holzgeist mit 10 Theilen Schwefelsäufe. Der Siedepunct des erstern scheint die zur Hervorbringung des Holzathers geeignete Temperatur zu sein. Ohne Zweifel könnte man durch Fixirung dieser Temperatur auf ähnliche Weise wie bei der Darstellung des gewöhnlichen Aethers eine grosse Menge von Holzgeist in Holzäther überführen, ohne dass dabei schwefelsaurer Holzäther gebildet würde.

Erhöht sich aber die Temperatur bis ungefähr zu dem Puncte, bei welchem ein Gemenge von 1 Th. Holzgeist mit 10 Th. Schwefelsäure siedet, so tritt nun die Neigung des Holz-

Productes der trocknen Destillation des Holzes. 11 äthers hervor, mit Schwefelsäure den schwefelsauren Holzäther zu erzeugen.

Die Temperatur, bei welcher die Bildung dieses Körpets beginnt, ist wohl in gewisser Beziehung mit derjenigen zu vergleichen, bei der die Entwickelung des ölbildenden Gases aus dem Weingeiste ihren Anfang nimmt. Dass aus dem Holzgeiste durch den Einfluss der Schwefelsäure kein dem ölbildenden Gase analoger Körper entsteht, hat seine Hauptursache darin, dass unter den Umständen, unter denen die Bildung eines solchen Kohlen wasserstoffes möglich wäre, das Vermögen des Holzäthers auftritt, sich mit der Schwefelsäure zu schwefelsaurem Holzäther zu verbinden.

Ueber die Einwirkung des Chlors auf Holzgeist.

Kane *) studirte zuerst das Verhalten des Holzgeistes zu Chlor etwas näher. Nach seinen Angaben ist die gegenseitige Einwirkung dieser Körper mit sehr grosser Heftigkeit verbunden; es entstehen im Anfange oft Explosionen, welche durch gleichzeitige Mitwirkung von Licht begünstigt werden. Das Endproduct der Zersetzung, die mit Entwickelung einer grossen Menge Salzsäure begleitet ist, ist ein ölartiger schwerer Körper, über dem eine stark saure wässrige Flüssigkeit schwimmt. Diese ölartige Substanz ist das Chloral des Holzgeistes, das nach Kane die Zusammensetzung C6H4O2Cl6 hat. Mit Kali behandelt, soll dasselbe ameisensaures Kali bilden und einen ölartigen Körper, der einigermaassen Aehnlichkeit mit Chloroform hat, jedoch von Kane nicht näher untersucht worden ist. Berzelius **) spricht es als eine Hypothese aus, dass man das Holzgeistchloral, analog dem Weingeistchloral, als eine Verbindung von 1 At. Succinyl - Chlorid C4H4Cl2 mit 2 Atomen Chlorkohlenoxyd $C_2 Cl_4 O_2 = C_6 H_4 Cl_6 O_2$ betrachten könne.

Weidmann und ich kündeten in unserer letzten Abhandlung eine Untersuchung an, die wir über die Einwirkung von Chlor auf Holzgeist und Xylit vorgenommen haben. Die Publi-

^{*)} Annal. der Pharm. Bd. XIX. S. 174.

^{**)} Berzelius's Lehrbuch, Bd. VIII. S. 552.

Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen cation dieser Arbeit ist bis jetzt wegen Krankheit meines Freundes unterblieben; dennoch will ich hier die Resultate, die wir gefunden haben, in der Kürze andeuten.

Unsere Erfahrungen über die Einwirkung des Chlors auf Holzgeist widersprechen einigermaassen den Angaben von Kane über diesen Gegenstand. Wir sind jedoch nicht im Stande, mit Gewissheit die Verschiedenheiten in den Resultaten zu erklären.

Wir leiteten vollkommen trocknes Chlorgas im Schatten durch wasserfreien Holzgeist, von dessen Reinheit wir uns durch die Analyse vorher überzeugt hatten. Das Chlor wurde im Anfange lebhaft absorbirt, es entwickelte sich Wärme, allein Entzündung oder kleine Explosionen fanden nicht statt. Wir konnten sogar ohne Gefahr die Einwirkung durch mässige Wärme unterstüzzen. Als bei einem Versuche aber zufältig einmal die directen Sonnenstrahlen auf den Apparat flelen, entstand eine Explosion

Diese Beobachtungen über die erste Einwirkung stehen. gleichsam in der Mitte zwischen denen von Kane und denen von Dumas und Péligot, nach welchen letzteren das Chlornur langsam und schwer auf Holzgeist einwirkt. Beiläufig will ich bemerken, dass wir unsere Versuche im Winter anstellten.

Gegen das Ende der Reaction erbitzten wir die Flüssigkeit, die sich in 2 Schichten getrennt hatte, fortwährend und fuhren mit dem Durchleiten des Chlors so lange fort, bis wir durchaus überzeugt waren, dass nichts mehr absorbirt wurde.

Die obere wässrige Schicht war nichts als eine concentrirte Auflösung von Salzsäure und Chlor in Wasser. Die untere ölige, welche ungefähr ½ des angewandten Holzgeistes betrug, wurde durch Waschen mit Wasser von anhängendem Chlor und von Salzsäure gereinigt und durch Chlorcalcium vollständig entwässert.

Das so erhaltene Chloral zeigte einen stechenden, zu Thränen reizenden Geruch und einen beissenden Geschmack. Es hatte eine schwach gelbliche Farbe und war bedeutend schwerer als Wasser. Seine Zusammensetzung fanden wir in 100 Theilen = C24,16, H2,71, O 13,69, Cl59,44.

Durch Waschen mit einer Lösung von kohlensaurem Kali veränderte es sich nicht in seiner Zusammensetzung. Bei der Destillation mit Wasser ging die grösste Menge des Chlorals farblos über. Das zuletzt Uebergegangene war etwas gelblich gefärbt und zurück blieb nur eine sehr geringe Menge eines gelben harzigen Körpers. Die erste farblose Portion der De-

stillation zeigte ganz die gleiche Zusammensetzung wie die zur Destillation angewandte Substanz; die Analyse der letzten Portion gab ein davon nur unbedeutend abweichendes Resultat. Wir wiederholten die Darstellung des Holzgeistchlorals, erhielten dieses wieder von der angegebenen Zusammensetzung und sanden überhaupt unsere ersten Beobachtungen bestätigt.

Bei Behandlung des Holzgeistchlorals mit Kalilösung bitdeten sich Chlorkalium, essigsaures und ameisensaures Kali und ein ölartiger Körper, der einige Aehnlichkeit mit Chloroform hatte und dessen Zusammensetzung wir, in Atomen ausgedrückt, = C₄ H₄ Cl₃ fanden. Es wäre hiernach das Formylsesquichlorid = $2(C_2H_2)+Cl_3$. Es würde hier zu weit führen, wenn ich den Gang der Untersuchung beschreiben wollte, den wir einschlagen mussten, um zu entscheiden, ob sowohl Essigsäure als Ameisensäure bei der Einwirkung des Kali's auf Holzgeistchloral gebildet werden.

Die Analyse des Holzgeistchlorals und seine Zersetzung durch Kali bestimmen uns, für dasselbe die Formet C12H16O5Ci5 $= 2(C_6 H_8 O_{2^{\frac{1}{4}}} \mathbb{C} I_{2^{\frac{1}{4}}} \text{ anzunehmen:}$

bilden:

6 At.	Essigsäure	$C_{24}H_{36}U_{18}$	3
2 -	Ameisensäure	$C_4 B_4 O_6$	
2 -	Formylsesquichlorid	C_8 H_8	€l ₆
9 -	Chlorkalium		Cl ₉ K ₉
	•	$C_{36}H_{49}O_{24}$	Cl ₁₅ K ₉ .

Man kann das Holzgeistchloral hiernach betrachten als eine Doppelverbindung einer Acetyl- mit einer Formylverbindung

$$C_6H_8O_{2\frac{1}{4}}Cl_{2\frac{1}{4}}=C_4H_6$$
 $\begin{cases} O_{1\frac{1}{4}} + C_2H_2 \\ Cl_{1\frac{1}{4}} \end{cases}$

Enthält der Holzgeist nur eine geringe Quantität von Wasser, so verhält er sich zu Chlor auf eine ganz andere Weise

14 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen

als in seinem wasserfreien Zustande. — Wir leiteten Chlorgas durch Holzgeist, der einige Procente Wasser enthielt. Die erste Rinwirkung war weniger heftig, als diess bei Anwendung von wasserfreiem Holzgeist der Fall ist. Die Reaction wurde bald durch Wärme unterstützt. Als kein Chlor mehr absorbirt wurde, hatte sich aber die Flüssigkeit noch nicht in 2 Schichten getrennt; selbst als wir sie unter beständigem Durchleiten von Chlor destillirten, schied sich durchaus kein Chloral aus. Sie wurde alsdann mit Wasser vermischt, wobei sich im Verhältnisse zum angewandten Holzgeist nur eine geringe Menge eines öligen Productes abschied. Dieses hatte aber nicht die Zusammensetzung des Holzgeistchlorals, sondern ganz diejenige der Substanz, die man durch Einwirkung von Chlor auf Xylit erhält (des Xylitchlorals), mit dem es auch in seinen übrigen Eigenschaften übereinstimmte. Seine Analyse gab in 100 Th. C29,19, H3,09, Cl57,79, O 9,93, was der Formel C₁₂H₁₆O₃Cl₄ entspricht. Auf das Xylitchloral werde ich in der Folge etwas näher zu sprechen kommen.

Der Xylit.

Darstellung. Die Trennung des Holzgeistes von Xylit durch Chlorcalcium ist bereits angegeben worden. Da die Verbindung von Chlorcalcium mit Holzgeist besonders bei Gegenwart von Xylit bei 100° immer ein wenig Holzgeist verliert, so muss die Rectification der Flüssigkeit über Chlorcalcium oft wiederholt werden. Oft glaubt man, die Trennung sei beendigt, und man hat einen Xylit, der noch eine merkliche Quantität Holzgeist enthält.

Der von dem Holzgeiste auf diese Weise vollkommen gereinigte wasserfreie Xylit enthält nun gewöhnlich noch etwas
Mesit, ausserdem ist er bisweilen noch mit geringen Mengen
anderer Stoffe verunreinigt. Er wird nun, um den grössten
Theil des allfällig vorhandenen Mesits zu entfernen, für sich
der Destillation unterworfen. Sobald das Destillat bei Vermischung mit Wasser getrübt wird, unterbricht man die Destillation.
Man bringt alsdann das bis zu diesem Puncte Uebergegangene
mit einer bedeutenden Menge fein geriebenen Chlorcalciums in
Berührung. Ein Theil des Xylits verbindet sich mit dem Chlorcalcium zu einer aufgequollenen Masse und in dem unverbundenen
Xylit bleiben die eingemengten Stoffe aufgelöst. Nach einigen

Tagen bringt man die Masse auf einen Trichter und hässt die Flüssigkeit vollständig ablaufen. Durch Destillation der Chlorcal-ciumverbindung im Wasserbade kann der gereinigte Xylit gewonnen werden. Diese Reinigungsmethode muss bei der Darstellung von reinem Xylit nie versäumt werden, obgleich damit nicht gesagt ist, dass man nach derselben immer einen vollkommen reinen Xylit erhalte, da die Substanzen, die den Xylit verunreinigen können, nicht immer von gleicher Natur zu sein scheinen.

Das beste und sicherste Mittel, um den Xylit auf seine Reinheit zu prüfen, ist sein Verhalten zu Kalihydrat. Aus reinnem Xylit scheidet sich nämlich beim Zusammenbringen mit letzterem augenblicklich ein Kalisalz in weissen silberglänzenden Blättchen aus. Enthält der Xylit noch Holzgeist, so wird dieses Salz nicht sogleich abgeschieden, da dasselbe in Holzgeist leicht löslich ist. Es erscheint erst bei fernerem Zusatze von Kalihydrat, wenn schon eine weitere Zersetzung des Xylits begonnen hat. Ist der Xylit mit Mesit oder anderen Substanzen (wie vielleicht Aldehyd) verunreinigt, so wird er durch Kalihydrat sogleich gebräunt, schon während sich das Salz ausscheidet, wenn auch noch so geringe Mengen der fremdartigen Stoffe vorhanden sind.

Eigenschaften. Im reinen Zustande hat der Xylit einen angenehmen ätherischen Geruch und einen brennenden Geschmack. Er brennt mit hellleuchtender Flamme. Sein spec. Gewicht ist 0,816. Sein Siedepunct liegt bei 61,5°. Mit Wasser, Weingeist, Aether und Holzgeist lässt er sich in allen Verhältnissen mischen. Er löst nur eine unbedeutende Menge von Chlorcalcium auf.

Ziusammen.	setzung.	per Ayın	Destem	aus :
		Gef.	Ber.	
	Cs	58,50	58,58	
	H ₁₉	10,04	9,56	
	À	94 46	94 96	

100,00 100,00.

Das spec. Gew. des Dampfes wurde zu 2,177 gefunden; die Rechnung giebt 2,15972, die Bestandtheile sind also zu 4 Vol. verdichtet.

Der Xylit ist unteracetyligsaures Methyloxyd = (C_2H_6+0) + $(C_4H_6+1\frac{1}{2}0)$. Dass der Xylit wirklich diese Zusammen-

16 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen

setzung hat, wurde von Weidmann und mir durch eine grosse Anzahl von Analysen dieses Körpers von verschiedenen Bereitungen, durch ein genaues Studium der eigenthümlichen Zersezzung, die er durch Kali, Kalium und Schwefelsäure erleidet, bestimmt nachgewiesen.

Der von Weidmann und mir in unserer ersten Abhandiung beschriebene Xylit war noch keine ganz reine Substanz; er enthielt neben kleinen Mengen von anderen Stoffen ohne Zweifel noch etwas Holzgeist. Seine Analyse gab C53,17, H 10,74, O36,09. — Der Holzgeist, den Liebig früher analysirte und aus C54,75, H 10,75, O 33,85 zusammengesetzt fand, wonach er für denselben die Formel $C_4H_5O_2$ aufstellte, war ebenfalls Xylit, der aber noch eine kleine Menge von Holzgeist etc. enthielt.

Gmelin unterwarf die Flüssigkeit, die er nach wiederholter Rectification seines Holzgeistes über Chlorcalcium erhielt,
der fractionirten Destillation. Er schied dabei Portionen aus,
die um mehrere Procente Kohlenstoff in ihrer Zusammensetzung
verschieden waren. So gab die Analyse einer Portion C54,77,
H10,12, 035,11; die einer andern C57,71, H10,33, 031,99. Die
letztere war demnach ein beinahe ganz reiner Xylit.

Verhalten des Xylits zu Kalihydrat.

Bei der Einwirkung von Kalibydrat auf Xylit finden zwei Hauptstadien der Zersetzung statt. Im ersten wird das weisse Kalisalz ausgeschieden, im zweiten bräunt sich die Masse, das Salz löst sich fast ganz wieder auf und es entstehen mehrere neue Producte.

Aylitsaures Kali. Dieses Salz, das seinen Namen von der eigenthümlichen Säure, die es enthält, von der Xylitsäure, erhalten hat, wird auf die Weise dargestellt, dass man wasserfreien Xylit, vor Zutritt der Luft geschützt, mit Kalihydrat in kleinen Portionen zusammenbringt. Bei jedem Zusatze von Kali wird die Masse heftig umgeschüttelt, um die Einwirkung des Kali's zu begünstigen. Das Salz scheidet sich in wenigen Augenblicken aus, es erfüllt in weissen silberglänzenden Blättchen die ganze Flüssigkeit. Sobald die Masse an einigen Stellen braun zu werden anfängt, wird der Zusatz von Kalihydrat unterbrochen. Das Ganze lässt man nun einige Zeit ruhig stehen, wobei sich das überschüssig zugesetzte Kali zu Boden setzt,

während sich das leichte Salz darüber sammelt. Dieses wird nun mit der Flüssigkeit sorgfältig abgeschlämmt und, vor Zutritt der Luft geschützt, auf ein Filter gebracht. Ist die Flüssigkeit vollständig abgelaufen, so wird es mit reinem Xylit ausgewaschen, bis es vollkommen weiss erscheint, und dann schnell unter die Luftpumpe neben Schwefelsäure gebracht, welche ihm den anhängenden Xylit entzieht. Wenn man die Einwirkung des Kalihydrates durchaus nicht in das zweite Stadium übergehen lässt, so enthält die von dem Salze abfiltrirte Flüssigkeit ausser unzersetztem Xylit nichts als Holzgeist.

Das xylitsaure Kali stellt im reinsten Zustande ein Aggregat von silberglänzenden Blättchen dar, welches sich settig ansühlen lässt. An der Lust ist es ausserordentlich zersliesslich, so dass man es eigentlich immer unter der Lustpumpe ausbewahren muss. In Wasser löst es sich sehr leicht aus, die Lösung wird aber bei Zutritt der Lust sehr leicht zersetzt, unter Bildung von essigsaurem Kali. Eben so ist es in wassersreiem Holzgeist leicht löslich, hingegen in wassersreiem Xylit sast unlöslich. Es besteht aus:

	Gef.	Ber.
C ₁₈	33,87	34,14
$\mathbf{H_{30}}$	4,92	4,64
0,	18,21	17,35
K ₁	43,00	43,87.

Das xylitsaure Kali ist eine Doppelverbindung von unteracetyligsaurem Kali mit unteracetyligsaurem Holzäther oder Xylit in folgenden Verhältnissen: $3(C_4 H_6 O_1 \frac{1}{2} + KO) + (C_6 H_{12} O_3 \frac{1}{2})$. Bei Behandlung dieser Doppelverbindung mit Wasser bei Zutritt der Luft scheidet sich der Xylit aus und das unteracetyligsaure oder das eigentliche xylitsaure Kali verwandelt sich sogleich in essigsaures Kali, indem die Xylitsäure aus der Luft Sauerstoff aufoimmt.

Die Xylitsäure ist also $C_4 H_6 O_{1\frac{1}{2}}$ oder unteracetylige Säure. Man kann sie aus ihren Verbindungen nicht isoliren, indem sie so ausserordentlich leicht durch Sauerstoffaufnahme in Essigsäure übergeht.

Der Xylit verhält sich zu Kalibydrat im ersten Stadium durchaus wie eine Aetherart. Das Kali verbindet sich mit der unteracetyligen Säure (oder Xylitsäure). Der Holzäther verei-

18 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen

nigt sich im Momente seiner Ausscheidung mit dem Hydratwasser des Kali's zu Holzgeist. Das unteracetyligsaure Kali bildet mit unzersetztem Xylit eine Doppelverbindung.



Auf analoge Weise vereinigt sich, wie wir später sehen werden, bei Zersetzung des essigsauren Holzäthers durch Kalibydrat das gebildete essigsaure Kali mit unzersetztem essigsaure rem Holzäther in bestimmten Atomenverhältnissen.

Zweites Stadium der Zerselzung des Xylits durch Kalihydrak,

Bei der Einwirkung des Kalihydrates auf Xylit beginnt, wie schon bemerkt, mit der Färbung der Masse eine zweite Reaction. Seizt man zu wasserfreiem Xylit mehr Kalibydrat, als zur Bildung des reinen xylitsauren Kali's nöthig ist, so bräunt sich die Masse und das abgeschiedene Salz löst sich allmählig in der Flüssigkeit wieder auf. Je mehr Kali und je länger man dasselbe auf den Xylit einwirken lässt, desto dunkler färbt sich das Gemenge und desto weiter geht die Zersetzung vor Vermischt man die Flüssigkeit nach einiger Zeit mit Wasser, so scheidet sich eine beträchtliche Menge eines dunkelbraunen Oeles aus, welches aus Mesit, Xylitnaphta, Xylitöl und braunem Xylitharze besteht. Diese Körper werden aber nicht gleichzeitig in bestimmten relativen Verhältnissen gebildet, denn je nach der angewandten Menge von Kalihydrat und der Zeit der Einwirkung entsteht eins dieser Producte in grösserer Menge, während die anderen zum Theil oder ganz zurücktreten. - Zuerst wird der Mesit gebildet; dann tritt die Xylitnaphta auf, in dem Maasse, als der Mesit wieder verschwindet; zuleizt entstehen Xylitöl und Xylitharz, während die Menge der Xylitnaphta wieder abnimmt. Die Bildung dieser Substanzen aus dem Xylit geschieht auf folgende Weise:

Durch die Bildung des xylitsauren Kali's aus dem Xylit vermittelst Kalihydrat wird die Flüssigkeit an Holzgeist immer reicher, so dass sie bald im Stande ist, vermöge ihres Holzgeistgehaltes einen grossen Theil des gebildeten Salzes wieder

aufzulösen. In dem aufgelösten Zustande übt nun dasselbe unter gleichzeitigem Einslusse von freiem Kali eine zersetzende Wirkung auf noch unzersetzten Xylit aus. Das xylitsaure Kali entzieht nämlich der unteracetyligen Säure des Xylits Sauerstoff und verwandelt sich dadurch in essigsaures Kali, während die reducirte unteracetylige Säure, das Acetyloxyd, mit dem Holzäther zu Mesit verbunden bleibt. 1 At. xylitsaures Kali entzieht 3 At. Xylit 11/2 At. Sauerstoff; dadurch entstehen 3 At. Mesit und 1 At. essigsaures Kali. Die Zusammensetzung des Mesits ist $= C_6 H_{12} O_2$, er enthält also $\frac{1}{2}$ At. Sauerstoff weniger als der Xylit. Auf die gleiche Weise wie der Mesit aus dem Xylit, entsteht auch die Xylitnaphta aus dem Mesit. 1 At. xylitsaures Kali entzieht 3 At. Mesit 11/2 At. Sauerstoff; dadurch entstehen 3 At. Xylitnaphta und 1 At. essigsaures Kali. Die Xylitnaphta ist Mesit - $\frac{1}{2}$ At. Sauerstoff = $C_6 H_{12} O_{1\frac{1}{2}}$ -Wie aus der Xylitnaphta durch weitere Zersetzung Xylitöl und Xylitharz entstehen, wird in der Folge gezeigt werden.

Destillirt man Xylit mit einer wässrigen Lösung von Kali, so geht mit unzersetztem Xylit Holzgeist über, während essigsaures Kali gebildet wird. Es entstehen nebenbei nur geringe Mengen von Harz und Oel, welche wohl grösstentheils von der bekannten Zersetzung des Holzgeistes durch Kali herrühren.

Verhalten des Xylits zu Kallum.

Das Kalium wirkt sehr lebhaft auf Xylit ein. Es wird eine bedeutende Menge Wärme entwickelt, so dass man das Gefäss, worin die Reaction vor sich geht, abkühlen muss, um Entzündung der Masse zu verhindern. Es scheidet sich sogleich, wie bei der Einwirkung von Kalihydrat auf Xylit, ein Salz aus; allein sehr bald beginnt eine weitere Zersetzung, indem die Flüssigkeit schnell braun wird. Von Ansang bis zu Ende der Reaction findet nicht die geringste Gasentwickelung statt. Zuletzt hat man eine dicke schwarzbraune Masse, aus sich beim Vermischen mit Wasser eine bedeutende Menge eines dunkelbraunen Oeles abscheidet. Dieses Oel ist ein Gemenge von Mesit, Xylitnaphta, Xylitöl und Xylitharz. Die von demselben getrennte, etwas braune Flüssigkeit enthält eine grosse Menge Essigsäure nebst höchst unbedeutenden Quantitäten eines durch Säuren aus der alkalischen Lösung fällbaren Harzes und 20 Schweizer, üb. die chem. Verhältnisse d. geistigen eines sauren, in Wasser löslichen Körpers, der mit Bleisalzen und Quecksilberoxydsalzen Niederschläge hervorbringt.

Ohne Zweisel besindet sich in der alkalischen Lösung auch etwas Holzgeist, den man aber aus derselben kaum isoliren kann, besonders da noch die Trennung von unzersetztem Xylithinzukommt.

Die Einwirkung des Kaliums auf Xylit erklärt sich folgendermaassen: Im Anfange entzieht das Kalium mehreren Atomen Xylit Sauerstoff, dadurch wird Mesit gebildet; das gebildete Kali zersetzt ein anderes Atom Xylit, es entsteht xylitsaures Kali, während der Holzäther, der kein Wasser vorsindet, um mit demselben Holzgeist zu bilden, sich mit Kali zu Holzätherkali vereinigt.

	5 At.	Xylit	$C_{30}H_{60}O_{12}$
		Kalium	K ₂
zerfallen i	in:		~
•	4 At.	Mesit	$\mathbf{C_{24}H_{48}O_8}$
	1 -	xylitsaures Kali	$\mathbf{C_4}$ $\mathbf{H_6}$ $\mathbf{O_2}^{1/2}$ \mathbf{K}
	1 -	Holzätherkali	C_2 H_6 O_2 K
•		J.	$C_{30}H_{60}O_{12}\frac{1}{2}K_{2}$.

Kommt das Holzätherkali mit Wasser in Berührung, so zersetzt es sich, sowohl das Kali als der Holzäther nehmen Wasser auf, wodurch Holzgeist und Kalihydrat gebildet werden. - Bei fortgesetzter Einwirkung des Kaliums entzieht dasselbe auch dem Mesit Sauerstoff, dieser wird in Xylitnaphta verwandelt, aus letzterer entstehen Xylitöl und braunes Xylit-Bei der Einwirkung von Kalium auf Xylit tritt derselbe barz. Reductionsprocess ein wie bei der Einwirkung von Kalihydrat, nur ist in ersterem Falle hauptsächlich das Kalium der reducirende Körper, in dem letztern das im Anfange gebildete xylitsaure Kali. Löwig stellte seine schon erwähnten Versuche über die Einwirkung des Kaliums auf Holzgeist mit Xylit an denn das zu denselben verwandte Material war so lange über Chlorcalcium rectificirt worden, bis es mit Kalium keinen Wasserstoff mehr entwickelte. Ferner fand Löwig ebenfalls unter den Zersetzungsproducten Xylitnaphta und Xylitöl.

Verhalten des Xylits zu Schwefelsäurehydrat.

A. In gewöhnlicher Temperatur.

Beim Vermischen von Xylit mit Schwefelsäurehydrat findet bedeutende Wärmeentwickelung statt. Das Gemenge färbt sich sogleich dunkelbraun und wird nach und nach ganz dickslüssig. Behandelt man die Masse, nachdem die Einwirkung einige Zeit fortgedauert hat, mit Wasser, so scheidet sich in bedeutender Menge ein schwarzbraunes Oel aus, das aus Mesit, Xylitnaphta, Xylitöl und braunem und gelbem Xylitharz besteht. Die von dem Dele getrennte saure Flüssigkeit enthält eine beträchtliche Menge von Essigsäure und von Holzätherschwefelsäure. - Eben so wie bei der Einwirkung von Kalihydrat auf Xylit treten auch die verschiedenen Zersetzungsproducte bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Xylit nicht in demselben Momente auf. Beim Vermischen eines Gemenges von 1 Theil Schwefelsäure mit ? Th. Xylit mit Wasser scheidet sich nur wenig Oel au, das sber grösstentheils aus Mesit und Xylitnaphta besteht. Bei Anwendung von 3 Th. Schwefelsäure auf 1 Th. Xylit entstehen nauptsächlich Harz und Xylitöl. Lässt man 1 Th. Schwefeläure auf 1 Th. Xylit einwirken, so werden die Producte in gleichmässigerem Verhältnisse gebildet.

Schweselsäurehydrat zersetzt auf eine ganz ähnliche Weise Ien Xylit wie Kalihydrat. Die Schweselsäure verbindet sic nit dem Holzäther des Xylits zu Holzätherschweselsäure, die Kylitsäure wird abgeschieden, reducirt noch unzersetzten Xylit zu Mesit und diesen zu Xylitnaphta. Aus der Xylitnaphta entstehen Xylitöl und Xylitharz, und zwar ebenfalls auf ähnliche Weise, wie sie bei der Einwirkung des Kalihydrates auf Xylit aus der Xylitnaphta gebildet werden. Das gelbe Xylitharz, welches die gleiche Zusammensetzung wie das braune hat, scheint lurch einen katalytischen Einsluss der Schweselsäure auf das etztere zu entstehen.

B. In höherer Temperatur.

Bei der Destillation von gleichen Theilen Schweselsäure ind Xylit geht gleich im Ansange unter Bildung von schwesiger Säure ein Gemenge von Mesiten und unzersetztem Xylit iher. Bald vermehrt sich die Entwickelung von schwesliger Bäure und das Uebergehende trennt sich in zwei Schichten, von denen die obere hauptsächlich aus Mesit und Methol, die untere aus Essigsäure und Wasser besteht. Gegen das Ende der Destillation erscheint gewöhnlich auch etwas schweselsaurer Holzsäther. Wird ein Gemenge von 4 Th. Schweselsäure und 1 Th. Holzgeist destillirt, so wird nur sehr wenig Mesiten und gar kein Methol gebildet. Es entwickelt sich eine grosse Menge von schwesliger Säure; es entstehen bedeutende Quantitäten von essigsaurem und schweselsaurem Holzäther und von Essigsäure. Die Masse bläht sich während der ganzen Destillation stark auf und droht jeden Augenblick überzusteigen.

Bei der Destillation von 16 Th. Schwefelsäure mit 1 Th. Xylit, welche ruhig von Statten geht, entwickelt sich sehr viel schweflige Säure, es wird viel schwefelsaurer, aber nur sehr wenig essigsaurer Holzäther gebildet. Methol entsteht ebenfalls nicht, hingegen eine grosse Menge von Essigsäure.

Bei allen diesen Destillationen bleibt eine schwarze kohlige Masse zurück.

Das Mesiten und der essigsaure Holzäther entstehen bei der Destillation des Xylits mit Schwefelsäure durch blosse Oxydation des Xylits durch dieselbe. 2 At. Xylit $= 2(C_6H_{12}O_{2\frac{1}{4}})$ und 1 At. Schwefelsäure geben 2 At. Mesiten $= 2(C_6H_{12}O_3)$ und 1 At. schweflige Säure, und 2 At. Xylit $= 2(C_6H_{12}O_2\frac{1}{4})$ und 3 At. Schwefelsäure geben 2 At. essigsauren Holzäther $= 2(C_6H_{12}O_4)$ und 3 At. schweflige Säure.

Bei Anwendung einer grössern Menge von Schweselsäure tritt die Bildung des Mesitens zurück, indem genug Sauerstoss zu Gebote steht, um den sauerstossreichern essigsauren Holz-äther aus dem Xylit zu bilden. Ein Ueberschuss von Schweselsäure und eine erhöhte Temperatur bedingt die Bildung von schwesselsaurem Holzäther, es entsteht nur sehr wenig essigsaurer Holzäther, indem der Xylit grösstentheils auf die Weise zersetzt wird, dass sich die Schweselsäure zu gleicher Zeit mit dem Holzäther zu schweselsaurem Holzäther verbindet, in welchem die Xylitsäure durch einen andern Antheil Schweselsäure zu Essigsäure oxydirt wird.

Die erste Einwirkung der Schweselsäure auf den Xylit besteht, wie wir gesehen haben, darin, dass sich die Schweselsäure mit dem Holzäther zu Holzätherschweselsäure vereinigt, während Xylitsäure abgeschieden wird. Die reducirende Krast der

letztern vermehrt sich mit der Temperaturerhöhung. Die Reductionen folgen schnell auf einander, gleichsam in einem Momente, ja sie gehen noch weiter, indem unter Mitwirkung von Schwefelsäure dem Xylitöl C₁₂ H₁₈ + O noch Sauerstoff entzogen wird und dadurch Methol entsteht. Dieses wird nicht gebildet, wenn Xylit mit einer grossen Menge von Schwefelsäure destillirt wird, indem letztere die im Anfange gebildete Xylitsäure sogleich zu Essigsäure oxydirt.

Verhalten des Xylits bei der Destillation mit Kleesalz und Schwefelsäure.

Destillirt man ein Gemenge von 2 Th. Schwefelsäure, 1 Th. Xylit und 1 Th. Kleesalz, so geht im Anfange mit unzersetztem Xylit Mesiten über, später erscheint kleesaurer Holzäther, Essigsäure, Methol und zuletzt etwas schwefelsaurer Holzäther; dabei wird schweflige Säure entwickelt. Zuerst entsteht durch blosse Oxydation von Xylit durch Schwefelsäure Mesiten; alsdann verbindet sich die aus dem Kleesalz durch die Schwefelsäure abgeschiedene Kleesäure mit dem Holzäther, während die Xylitsäure die Entstehung von Essigsäure und Methol veranlasst.

Verhalten des Xylits zu Braunstein und Schwefelsäure.

Bei der Destillation von 2 Th. Xylit, 2 Th. Braunstein und 3 Th. Schwefelsäure, welche mit gleichen Theilen Wasser verdünnt ist, beginnt schon bei gelinder Erwärmung die gegenseitige Einwirkung der Substanzen. Es destillirt dabei mit unzersetztem Xylit eine bedeutende Menge von Aldehyd über. Hat die erste Einwirkung aufgehört und steigert man die Hitze, so geht bis zu Ende der Destillation ein saures Wasser über, welches Ameisensäure enthält. Während der ganzen Operation bildet sich keine Spur von schwefliger Säure, wenn auch die Destillation bis zum Eintrocknen der rückständigen Masse fortgesetzt wird.

2 At. Xylit =
$$C_{12}H_{24}O_5$$

1 - Sauerstoff = O
3 At. Aldebyd = $C_{14}H_{34}O_6$

34 Schweizer, üb. die chem. Verhältnisse d. geistigen

Verhalten des Xylits zu Chlor.

Trocknes Chlorgas wirkt auf wasserfreien Xylit ziemlich lebhaft ein. Es findet starke Entwickelung von Salzsäure statt. Nach einiger Zeit trennt sich die Flüssigkeit in zwei Schichten, von denen die untere ölige sich nach und nach immer vergrössert. Die Beaction wird dann durch Wärme unterstützt. Als Endproduct hat man eine sehr bedeutende Quantität eines öligen Körpers. Derselbe wird durch oft wiederholtes Waschen mit Wasser und mit verdünnten Lösungen von kohlensaurem Kali gereinigt und hernach durch Chlorcalcium, welches darin unlöslich ist, entwässert.

Dieses Xylitchloral, wenn man es so nennen will, hat abnliche Eigenschaften wie das Holzgeistchloral, jedoch ist sein Gerüch viel stechender als der des letztern. Seine Zusammensetzung ist $= C_{12}H_{16}O_3Cl_4$.

	Gef.	Ber,
C ₁₃	29,25	29,43
H ₁₆	3,51	3,23
03	8,92	10,01
Cl ₄	58,32 — 57	57,33
	100,00	100,00.

Bei der Destillation des Xylitchlorals mit Wasser geht im Anfange ein Theil unzersetzt über, nach und nach verwandelt es sich aber unter Salzsäureentwickelung in eine Verbindung von anderer Zusammensetzung. — Für sich der Destillation unterworfen, zerfällt es unter fortwährender Entwickelung von Salzsäure nach der Reihe in verschiedene flüchtige Verbindungen. Zuletzt bleibt eine nicht flüchtige schwarze feste Masse zurück.

Hossentlich werden Weidmann und ich bald nähere Mit-

Productes der trocknen Destillation des Holzes. 25 theilungen über das Xylitchloral und seine Zersetzungsproducte geben können.

Ueber die Constitution des Xylits.

Der Xylit ist eine Holzätherverbindung.

Sprechende Beweise hierfür sind die Eigenschaften des Xylits, 1) je nach der Behandlung mit Schwefelsäure Holzätherschwefelsäure oder schwefelsauren Holzäther zu erzeugen; 2) bei der Destillation mit Kleesalz und Schwefelsäure kleesauren Holzäther zu liefern; 3) durch Kali in ein Kalisalz und in Holzgeist zu zerfallen.

Der Xylit ist eine Verbindung von Holzäther mit einer Säure, welche die Zusammensetzung $C_4 H_6 O_{1\frac{1}{2}}$ hat.

Die Elementaranalyse und das spec. Gew. des Dampfes des Xylits stellen für denselben die empirische Formel $C_6H_{12}O_{2\frac{1}{2}}$ fest. Wird hiervon 1 At. Holzäther C_2H_6O abgezogen, so bleibt $C_4H_6O_{1\frac{1}{2}}$. Bei der Behandlung von Xylit mit Kalihydrat bildet sich bei der Einwirkung blos Holzgeist und eine Doppelverbindung von 1 At. Xylit und 3 At. eines Kalisalzes, dessen Säure, die Xylitsäure, die Zusammensetzung $C_4H_6O_{1\frac{1}{2}}$ hat. An die Stelle des Holzäthers im Xylit ist also blos 1 At. Kali getreten und die Doppelverbindung ist daher als ein Doppelsalz von xylitsaurem Kali mit xylitsaurem Holzäther zu betrachten. Zur Annahme dieses Doppelsalzes wird man vollkommen gerechtfertigt durch die Existenz eines solchen Doppelsalzes von essigsaurem Kali und essigsaurem Holzäther, das unter denselben Umständen entsteht.

Der Xylit ist unteracetyligsaures Methyloxyd.

Für die Ansicht, die Xylitsäure wirklich als eine Oxydationsstuse des Acetyls, als (C₄ H₆)O_{1½}, zu betrachten, spricht ihre Eigenschaft, so äusscrst leicht durch Sauerstoffausnahme in Essigsäure überzugehen. Bringt man das Doppelsalz von xylitsaurem Kali mit Xylit mit Wasser unter Zutritt von Lust zusammen, so scheidet sich der Xylit aus, während das xylitsaure Kali durch Ausnahme von Sauerstoff sogleich in essigsaures Kali übergeführt wird. Auch erhält man durch Destillation des Doppelsalzes mit verdünnten Säuren Essigsäure. Eben so wie das xylitsaure Kali durch Sauerstoffausnahme in essigsaurcs Kali übergeht, verwandelt sich auch der xylitsaure Holz-

äther in essigsauren Holzäther, wie bei der Einwirkung der Schweselsäure auf Xylit gezeigt worden ist. Die Oxydation findet aber in letzterem Falle viel schwieriger statt als im erstern, was seinen Grund darin hat, dass der schwach basische Holzäther nicht eine so grosse Neigung hat, sich mit einer stärkern Säure zu vereinigen, wie die starke Basis Kali.

Der Mesit.

Reichenbach *) entdeckte in dem rohen Holzspiritus eine ätherische, mit Wasser nicht in allen Verhältnissen mischbare Substanz, die er Mesit nannte, ohne ihre Zusammensetzung bestimmt zu haben. Berzelius giebt aber später an, dass diese Verbindung nichts anderes als essigsaurer Holzäther gewesen sei.

Weidmann und ich fanden im Holzspiritus, in welchem durch Destillation über gebranntem Kalk aller essigsaurer Holzäther zerlegt worden war, einen eigenthümlichen Körper, der in seinen äusseren Eigenschaften einige Aehnlichkeit mit dem von Reichenbach beschriebenen Mesit hat und auf den wir deshalb den Namen Mesit übertrugen, ohne damit sagen zu wollen, dass Reichenbach dieselbe Substanz gehabt habe.

In unserer ersten Abhandlung nannten wir Mesit den ätherischen Körper, der bei der Destillation von gleichen Theilen Xylit und Schwefelsäure durch Oxydation des Xylits gebildet wird, und zwar aus dem Grunde, weil wir denselben mit dem Mesit Reichenbach's wegen Uebereinstimmung der physikalischen Eigenschaften für identisch hielten. Da jedoch Berzelius es wahrscheinlich gemacht hat, dass der Reichenbach'sche Mesit nichts als essigsaurer Holzäther ist, mit welchem unsere Substanz durchaus nicht übereinkommt, so wählten wir für letztere einen andern Namen, nämlich Mesiten.

Diess musste ich vorausschicken, um Verwechselungen vorzubeugen. Der vorliegende Fall zeigt übrigens deutlich, wie wenig man sich an Untersuchungen halten muss, denen die analytischen Resultate fehlen, um nicht Verwirrungen zu verursachen.

^{*)} Neues Jahrbuch der Chemie u. Physik. VIII. 1.

Vorkommen und Bildung. Der Mesit scheint gewöhnlich nur in geringer Menge in dem Holzspiritus enthalten zu sein. Er bildet sich, wie schon gezeigt wurde, bei der Einwirkung von Kalihydrat, Kalium und Schwefelsäure auf Xylit, ferner bei der Einwirkung von Kali und Schwefelsäure auf Mesiten.

Darstellung. 1) Nach der Trennung des Holzgeistes vom Xylit ist der Mesit in letzterm aufgelöst und kann durch Wasser nicht ausgeschieden werden, da ein Gemenge von viel Xylit mit wenig Mesit sich in allen Verhältnissen mit Wasser mischen lässt. Wird ein solches Gemenge aber fractionirt destillirt, wie beim Xylit angegeben wurde, und die Destillation so lange fortgesetzt, bis das Uebergehende sich mit Wasser trübt, so bleibt in der Retorte der grösste Theil des Mesits zurück. Aus dem übergegangenen Xylit kann man bisweilen noch etwas Mesit abscheiden, wenn man die bei der bekannten Reinigung des Xylits von der Chlorcalciumverbindung getrennte Flüssigkeit auf gleiche Weise der fractionirten Destillation unterwirft. Der so erhaltene Mesit wird nun wiederholt mit Wasser geschüttelt, um noch vorhandenen Xylit zu entsernen, und dann für sich auf dem Wasserbade destillirt. Die ersten Antheile, welche übergehen, sammelt man dabei für sich auf, da sie noch etwas Xylit enthalten können. Zuletzt bleibt gewöhnlich eine kleine Quantität eines höchst unangenehm riechenden, bitter und zusammenziehend schmeckenden schwerslüchtigen Körpers in der Retorte zurück. Durch Destillation über Chlorcalcium wird der Mesit hierauf entwässert.

2) Es wird Xylit auf die bekannte Weise mit einer nicht zu grossen Quantität von Kalihydrat zusammengebracht. Nach einiger Zeit vermischt man die Masse mit Wasser und destillirt die abgeschiedene ölige Flüssigkeit mit Wasser, wobei das Xy-litharz zurückbleibt. Das überdestillirte Oel, ein Gemenge von Mesit, Xylitnaphta und Xylitöl, wird hierauf mit dem Thermometer der Destillation unterworfen. Der Mesit geht bis 80° über. Steigt die Temperatur über 80°, so wird die Destillation unterbrochen, indem nun Xylitnaphta, gemengt mit Xylitöl, kommt. Der auf diese Weise erhaltene Mesit wird noch ein paar Male für sich auf dem Wasserbade destillirt, wobei die letzten Portionen immer auf die Seite gethan werden.

28 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen

Eigenschaften. Der Mesit ist farblos und leichtslüssig. Er hat einen sehr angenehmen ätherischen Geruch und einen brennenden Geschmack. Er brennt mit einer hellleuchtenden russenden Flamme. Sein Siedepunct liegt etwas über 70°. Er ist leichter als Wasser und löst sich in ungefähr 3 Theilen desselben.

Zusammensetzung. Der Mesit hat folgende Zusammensetzung:

Gef.			Ber.	
	a.	b.	c.	
$\mathbf{C}_{\mathbf{G}_{\mathbf{c}}}$	62,31	62,42	62,09	62,55
H ₁₂	10,57	10,79	10,52	10,20
0,	27,12	26,79	27,39	27,25
~_	100,00	100,00	100,00	100,00.

Die Analyse a bezieht sich auf Mesit, der aus Holzspiritus dargestellt wurde. Zu den Analysen b und c wandte man Mesit an, der bei der Einwirkung von Kalihydrat und Kalium auf Xylit erhalten wurde. — Das specifische Gewicht des Dampfes wurde zu 2,833 und 2,850 gefunden; die Rechnung nach der Formel $C_8H_{12}O_2$ giebt 2,69585 bei dreifacher Verdichtung der Bestandtheile. Der Mesit ist Acetyloxyd – Methyloxyd — $(C_2H_6O) + (C_4H_6O)$.

Zersetzungen. 1) Beim Zusammenbringen von Mesit mit Kalihydrat scheidet sich sogleich ein Kalisalz aus, das bei der Destillation mit verdünnten Säuren Essigsäure liefert. Bald aber beginnt eine weitere Zersetzung, indem Xylitnaphta etc. und aus dieser Xylitöl und Xylitharz entstehen.

2) Vermischt man Mesit mit Schwefelsäurehydrat, so fadet bedeutende Wärmeentwickelung statt, die Flüssigkeit fark sich dunkelbraun. Behandelt man das Gemenge nach einige Zeit mit Wasser, so scheidet sich ein dickes braunes Oel au, welches aus unzersetztem Mesit, Xylitnaphta, Xylitöl, brausen und gelbem Xylitharze besteht. In der von dem Oele getrenntes Flüssigkeit ist Holzätherschwefelsäure und Essigsäure enthalten.

Bei der Destillation von gleichen Theilen Schweselsäure und Mesit zeigen sich die gleichen Erscheinungen wie bein Xylit. Zuerst geht Mesiten über, nachher Methol und Essigsäure, und zurück bleibt eine schwarze kohlige Substanz. Von Productes der trocknen Destillation des Holzes. 29 nfang bis zu Ende der Operation wird schweflige Säure entickelt.

Ueber die Constitution des Mesits.

Aus dem Verhalten des Mesits zu Kalihydrat und Schwelsäure geht hervor, dass der Mesit, gleich wie der Xylit, eine
erbindung von Holzäther mit einer Oxydationsstufe des Accls ist. Bei der Einwirkung des Kali's zerfällt er zuerst in
cetyloxyd, welches sich mit dem Kali verbindet, und in Holzeist. Das Acetyloxyd-Kali entzieht noch unzersetztem Mesit
auerstoff und verwandelt sich dadurch in essigsaures Kali,
ährend Xylitnaphta gebildet wird.

$$\{C_{2}H_{6}O+C_{4}H_{6}O\}$$

$$\{Wasser Kali\}$$

$$\{At. Mesit$$

$$\{O_{2}+O_{6}C_{6}H_{12}$$

$$\{At. Xylitnaphta,$$

Die Schweselsäure zerlegt den Mesit auf die Weise, dass e sich mit dem Holzäther desselben zu Holzätherschweselsäure erbindet, während Acetyloxyd abgeschieden wird, welches ch durch Reduction von unzersetztem Mesit in Xylitnaphta und ssigsäure verwandelt.

Das Mesiten entsteht aus dem Mesit wie aus dem Xylit irch blosse Oxydation: $C_6H_{12}O_2+O=C_6H_{12}O_3$. Eben so wird as Methol aus dem Mesit durch dieselben Reductionen gebilet, welche dasselbe aus dem Xylit eutstehen lassen.

Löwig und Weidmann*) fanden, dass das Aceton, relches die gleiche Zusammensetzung wie der Mesit $C_6H_{12}O_2$ at, durch Kali und Kalium in Holzgeist, Essigsäure, Xylitölnd Xylitharz zerlegt wird. Da nun das Aceton und der Mesit urchaus verschiedene Körper sind, wie schon eine Vergleihung ihrer physikalischen Eigenschaften zeigt, so ist es ewiss, dass eine dieser beiden Verbindungen durch die Einrickung von Kalihydrat oder Kalium eine Umsetzung ihrer Beandtheile erleidet. Das Aceton wird nach den Untersuchunen von Kane**) durch Schwefelsäure in der Kälte in Was-

^{*)} D. Journ. XXI. 54.

^{**)} D. Journ. XV. 129.

30 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen

ser und Mesityloxyd C₆H₁₀O zerlegt, welches letztere sich mit der Schweselsäure vereinigt. Es entsteht dabei also kein Holzätherverbindung, wie diess bei der Einwirkung von Kalhydrat aus Aceton der Fall ist. Hingegen entsprechen die Producte, die der Mesit bei der Behandlung mit Schweselsäurehydrat liesert, ganz denselben, welche bei der Einwirkung von Kalihydrat aus Mesit entstehen.

Der Mesit sowohl als der Xylit verhalten sich zu Kali und Schwefelsäure gerade so wie essigsaurer Holzäther. liefert mit Schwefelsäure Holzätherschwefelsäure und Essigsäure, mit Kali essigsaures Kali und Holzgeist, auf Weise wie bei der Zersetzung von essigsaurem durch Schwefelsäure schwefelsaures Bleioxyd und Essigsäure, durch Kali essigsaures Kali und Bleioxydhydrat entstehen. Dieses den unorganischen Salzen analoge Verhalten de essigsauren Holzäthers berechtigt aber eben, denselben als eine Verbindung von Essigsäure mit Holzäther zu betrachten. aber der essigsaure Holzäther eine solche Verbindung ist, s sind auch der Xylit und der Mesit aus demselben Grunde Holzätherverbindungen. Daraus geht hervor, dass das Aceton keine Holzätherverbindung ist, sondern dass eine Umsetzung der Bestandtheile bei seiner Zersetzung durch Kali und Kalium stattfindet. Das Mesiten.

Bildung. Das Mesiten entsteht bei der Destillation von Xylit, Mesit und Xylitnaphta mit gleichen Theilen Schwefelsäure.

Man erhält das Mesiten nur in geringe Darstellung. Quantitäten, wenn man zu seiner Darstellung wasserfreien Xylit nimmt. Wendet man hingegen Xylit an, der eine gewisst Quantität Wasser enthält, oder eine etwas wasserhaltige Schwefelsäure, so wird das Mesiten in ziemlich beträchtlicher Menge gebildet. Beim Vermischen von wasserfreiem Xylit mit Schwefelsäurehydrat wird ziemlich gleich im 'Anfange der grösste Theil des erstern in Holzätherschwefelsäure verwandelt entgeht dadurch der Oxydation in Mesiten. Wird hingegen wasserhaltiger Xylit mit Schwefelsäure zusammengebracht, so geht die Bildung der Holzätherschwefelsäure nicht so leicht von Statten und die Schwefelsäure kann eine desto größere Menge von Xylit zu Mesiten oxydiren.

Es werden also gleiche Theile Schweselsäure und Xylit, der etwas Wasser enthält, der Destillation unterworfen. Sobald das Uebergehende in zwei Schichten erscheint, wird die Vorlage gewechselt, indem dann nur wenig Mesiten mehr, hingegen viel Methol und Essigsäure überdestillirt. Das bis dahin erhaltene Destillat ist ein Gemenge von Mesiten mit noch unzersetztem Xylit. Dasselbe wird nun mit Chlorcalcium zusammengebracht, welches sich in dem vorhandenen Xylit löst, wäbrend das Mesiten, in welchem das Chlorcalcium unlöslich ist, sich abscheidet und auf der schwerern Lösung von Chlorcalcium in Xylit schwimmt. Das auf diese Weise ausgeschiedene Mesiten wird nun abgenommen, mehrmals mit Wasser geschüttelt, um noch kleine Quantitäten von anhängendem Xylit zu entfernen, und dann durch Destillation über Chlorcalcium und hernach über gebranntem Kalk entwässert. Es ist rathsam, bei diesen Rectificationen die zuletzt übergehenden Antheile zu sondern, da sie eine kleine Menge von Methol enthalten können.

Eigenschaften. Das Mesiten ist eine farblose, sehr leichtflüssige, angenehm ätherisch riechende Substanz. Sein spec. G.
ist 0,805. Es siedet constant bei 63°. Zur Auflösung bedarf
es ungefähr 3 Th. Wasser. Es brennt mit einer hellleuchtenden russenden Flamme.

Zusammensetzung. Das Mesiten besteht aus:

	Gef.	Ber.
\mathbf{C}_{6}	54 ,8 7	55,03
H ₁₂	9,14	9,00
$\mathbf{0_3}$	35,99	35,97
	100,00	100,00.

Es ist zu betrachten als acetyligsaures Methyloxyd = $(C_2 H_6 O) + (C_4 H_6 O_2)$. Das spec. Gew. des Dampfes wurde zu 2,873 gefunden. Die Rechnung giebt 3,0654; es findet hiernach 3fache Verdichtung der Volumina statt.

Zersetzungen. 1) Wird Kalihydrat mit Mesiten zusammengebracht, so entsteht eine gallertartige Masse, die sich
nach einiger Zeit bei Ueberschuss von Kali braun färbt. Vermischt man dieselbe nach längerer Einwirkung mit Wasser, so
scheidet sich ein Gemenge von Mesit, Xylitnaphta, Xylitöl und
Xylitharz aus, während die wässrige alkalische Flüssigkeit bei

32 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen der Destillation mit verdünnter Schweselsäure eine bedeutende Menge von Essigsäure liesert.

- 2) Kalium wirkt sehr lebhaft unter bedeutender Wärmeentwickelung auf Mesiten ein, ohne dass dabei ein Gas entwickelt wird. Es scheidet sich sogleich ein weisses Salz aus,
 das bis zu Endé der Reaction, selbst wenn man diese durch
 Wärme unterstützt, nicht im mindesten gefärbt wird. Hat die
 Einwirkung aufgehört und vermischt man dann die Masse mit
 Wasser, so löst sich das Salz auf, während sich eine ölartige
 farblose Flüssigkeit ausscheidet. Destillirt man dieselbe auf den
 Wasserbade, so geht eine geistige Flüssigkeit, ohne Zweife
 blos unzersetztes Mesiten, über und zurück bleibt Xylitnaphta, die
 nicht die geringste Menge von Xylitöl und Xylitharz enthält.
 Die Lösung des Salzes liefert, mit verdünnter Schwefelsäure destillirt, Essigsäure.
- 3) Beim Vermischen von Schweselsäurehydrat mit Mesiter findet eine bedeutende Wärmeentwickelung statt; das Gemenge färbt sich ansangs nur schwach braun, nach und nach aber vermehrt sich diese Färbung. Hat die Einwirkung einige Tage fortgedauert und vermischt man dann die Masse mit Wasse, so scheidet sich ein Oel aus, welches aus unzersetztem Mesiten, Mesit, Xylitnaphta, Xylitharz und Xylitöl besteht. Die von dem Oele getrennte Flüssigkeit enthält Essigsäure und Holz-ätherschweselsäure.

Bei der Destillation von gleichen Theilen Mesiten und Schweselsäure bilden sich unter Entwickelung von schwestiger Säure Essigsäure und Methol; im Ansange geht blos unzersetztes Mesiten über. Destillirt man Mesiten mit einem Ueberschusse von Schweselsäure, so entsteht nur sehr wenig Methol und kein schweselsaurer Holzäther; es wird sast blos Essigsäure und schweslige Säure gebildet.

Bei der Destillation von Mesiten mit Kleesalz und Schwefelsäure entsteht kein kleesaurer Holzäther.

Ueber die Constitution des Mesitens.

Das Mesiten verhält sich zu Schweselsäurehydrat in de Kälte und zu Kalihydrat ganz auf analoge Weise, wie sich de Xylit zu diesen Körpern verhält. Bei der Kinwirkung ver Schweselsäurehydrat auf Mesiten entsteht Holzätherschwesel-

säure, während unter Bildung von Essigsäure dieselben Reductionsproducte gebildet werden wie beim Xylit. scheidet sich beim Zusammenbringen von Mesiten mit Kalihydrat ein Salz aus, das, dem xylitsauren Kali entsprechend, die mämlichen Reductionen hervorzubringen im Stande ist.

Hieraus folgt, dass das Mesiten, analog dem Xylit, als eine Verbindung von Holzäther mit einer Oxydationsstufe des Acetyls betrachtet werden muss. Wird der Formel des Mesitens C₆H₁₂O₃ ein Atom Holzäther C₂H₆O abgezogen, so bleibt $\mathbb{C}_4H_6O_2$. Das Mesiten ist daher acetyligsaures Methyloxyd = $(C_2H_6)0+(C_4H_6)0_2$. — Für diese Betrachtungsweise des Mesitens spricht auch, dass der acetylsaure (essigsaure) Holzäther ganz auf die gleiche Weise durch Oxydation des unteracetyligsauren Holzäthers oder des Xylits gebildet werden kann, wie das Mesiten. Es wäre wohl auch möglich, unter gewissen Umständen das Mesiten durch Oxydation in essigsauren Holzäther überzuführen, so z. B. wenn man Mesiten, das eine gewisse Quantität Wasser enthält, mit Schwefelsäure destilliren würde.

Die Schwefelsäure zerlegt also das Mesiten, indem sich Holzätherschwefelsäure bildet und die acetylige Säure abgeschieden wird. Diese reducirt unzersetztes Mesiten zu Mesit (vielleicht auch vorher zu Xylit) und diesen dann zu Xylitnaphta, während sie selbst sich in Essigsäure umwandelt. Aus der Xylitnaphta entstehen dann durch weitere Zersetzung Xylitöl und Xylitharz.

Kalibydrat zersetzt auf die Weise das Mesiten, dass sich das Kali mit der acetyligen Säure verbindet, während sich der Holzäther mit dem Hydratwasser zu Holzgeist vereinigt; weiteren Zersetzungsproducte erklären sich von selbst.

In seinem Verhalten zu Kalium weicht das Mesiten einigermaassen vom Xylit ab, indem bei seiner Zersetzung durch Kalium weder Xylitöl noch Xylitharz entstehen. Diese Zersezzung lässt sich folgendermaassen erklären:

2 At. Kalium entziehen 2 At. Mesiten 2 At. Sauerstoff, dadurch werden 2 At. Kali und 2 At. Mesit gebildet. Das gebildete Kali zerlegt aber augenblicklich 1 At. Mesit, indem Acetyloxyd-Kali und Holzätherkali entstehen. Das Acetyloxyd-Kali reducirt in seinem Entstehungsmomente das andere Atom 34 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigu

Mesit zu Xylitnaphta, während es sich in xylitsaures Kali verwandelt, mit dem sich die Xylitnaphta sogleich verbindet und so der weitern Einwirkung des Kaliums entgeht.

> 2 At. Mesiten $C_{12}H_{24}O_6$ 2 - Kalium K_3

serfallen in:

1 At. xylits. Kali $C_4H_8 O_2^{1/2}K$ 1 - Xylitnaphta $C_6H_{12}O_1^{1/2}$ 1 - Holzátherkali $C_2H_6 O_2 K$ $C_{12}H_{24}O_6 K_2$.

Die Producte der Einwirkung des Kaliums auf Mesite eutstehen gleichsam in demselben Momente; es können eigestlich keine verschiedenen Stadien der Zersetzung unterschieden werden. Das Kali, das durch Desoxydation des Mesitens eststeht, reicht immer gerade hin, um das ganze Product der Desoxydation, den Mesit, sogleich in eine Verbindung von xylitsaurem Kali mit Xylitnaphta und in Holzätherkali zu zerlegen. Bei der Einwirkung von Kalihydrat auf Mesiten herrschi im Anfange blos die Neigung des erstern vor, sich mit der acetyligen Säure zu verbinden und den Holzäther als Holzgeist abzuscheiden; hiervon unabhängig sind die Reductionen, wel. che das gebildete xylitsaure Kali allmählig hervorbringt.

Warum weder bei der Destillation von kleesaurem Kali und Schwefelsäure mit Mesiten kleesaurer Holzäther, noch bei der Destillation einer grossen Menge von Schwefelsäure mit Mesiten schwefelsaurer Holzäther entstehen, wodurch sich des Mesiten von dem Xylit unterscheidet, hat wohl seinen Grund darin, dass die acetylige Säure viel schwieriger aus ihrer Verbindung mit Holzäther durch andere Säuren auszuscheiden ist, als die Xylitsäure, welche schwächer saure Eigenschaften zeigt und überhaupt leichter zerstörbar ist. Noch beständiger als das Mesiten verhält sich natürlich in dieser Beziehung der acetylsaure Holkäther. Es fragt sich nun abet, warum das Mesites und der essigsaure Hotzäther durch Schwefelsäurehydrat in niedriger Temperatur zerlegt werden, während bei der Temperatur, die zur Bildung von schweselsaurem Holzäther ersorderlich ist, die acetylige Säure und die Acetylsäure aus ihren Verbindangen mit Holzäther nicht ausgeschieden werden. Diess ethlärt sich dadurch, dass im erstern Falle zu der Verwandt-

schaft der Schwefelsäure zum Holzäther noch die Neigung von Schwefelsäurehydrat kommt, sich mit dem schwefelsauren Holzäther zu verbinden. Durch diese Aedsserung der prädisponirenden Verwandtschaft des Schweselsäurehydrats wird die Verwandtschaft der Oxydationsstufe des Acetyls zum Holzäther überwunden. Im zweiten Falle kann sich die prädisponirende Verwandtschaft der Schwefelsäure nicht mehr äussern. Der essigsaure Holzather z. B. ist aber eine viel neutralere Verbindung als der schwefelsaure Holzäther. Die Verwandtschaften des sauren und des basischen Körpers sind in dem erstern mehr befriedigt als in dem letztern, was schon das verschiedene Verhalten beider Verbindungen zu Wasser zeigt, indem sich der schweselsaure Holzäther sehr bald bei Berührung mit Wasser in Holzgeist und in Holzätherschweselsäure zerlegt, während der essigsaure Holzäther durch Wasser keine Veränderung erleidet. Die Schwefelsäure wird daher nicht geeignet sein, die Essigsäure aus dem essigsauren Holzäther abzuscheiden und an die Stelle derselben zu treten, da ausserdem Essigsäure eine ziemlich beständige Säure ist. Dasselbe gilt auch von dem Mesiten und der acetyligen Säure.

Die Xylitnaphta.

Bildung. Die Xylitnaphta entsteht bei der Einwirkung von Kali, Kalium und Schwefelsäure auf Xylit, Mesit und Mesiten.

Es ist schon gezeigt worden, dass der Bildung der Xylitnaphta immer die Bildung von Mesit vorausgeht und dass erstere nur durch theilweise Reduction des letztern entsteht.

Darstellung. Man lässt nicht sehr viel Kalihydrat einige Zeit auf Xylit einwirken. Die beim Vermischen der zersetzten Masse mit Wasser erhaltene ölige Flüssigkeit, die, wenn die Menge des angewändten Kali's nicht zu gross war, grösstentheils aus Xylitnaphta und aus Mesit besteht, wird, nach Enfernung des Xylitnaphta und aus Mesit besteht, wird, nach Enfernung des Xylitharzes durch Destillation mit Wasser, für sich mit dem Thermometer destillirt. Was zwischen 100 und 120° übergeht, ist hauptsächlich Xylitnaphta. Um diese von kleinen Mengen Mesit und Xylitöl zu befreien, wird sie mehrmals umdestillirt, wobei die ersten und die letzfen Portionen immer auf die Seite gethan werden. Liegt der Stedepunct der Flüssigkeit ziemlich constant bei 110°, so ist die Xylitnaphta beinahe ganz

36 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen

rein, und die Analysen der verschiedenen Portionen, welche bei einer nochmaligen Destillation gesammelt werden, zeigen nur sehr unbedeutende Abweichungen in ihren Resultaten.

Eigenschaften. In reinem Zustande ist die Xylitnaphta eine farblose leichtslüssige Substanz, welche einen dem Pfessermünzöl ziemlich ähnlichen Geruch und einen brennenden Geschmack besitzt. Ihr Siedepunct liegt bei 110°. Sie lässt sich unverändert überdestilliren. Sie ist leichter als Wasser und in letzterem nur sehr wenig löslich. Hingegen löst sie sich sehr leicht in Weingeist, Aether, Holzgeist und Xylit. Sie brennt mit hellleuchtender russender Flamme.

Zusammensetzung. Die Xylitnaphta besteht aus:

	Gef.	Ber.
$\mathbf{C_6}$	66,82	67,12
H ₁₂	11,08	10,95
$0_{1\frac{1}{2}}$	22,1 0	21,93
	100,00	100,00.

Löwig hatte bei der erwähnten Untersuchung über die Einwirkung von Kalium auf Holzgeist, zu welcher er aber, wie oben gezeigt worden, Xylit anwandte, schon die Xylitnaphta aufgefunden und analysirt. Das Material, welches er zur Analyse anwandte, enthielt noch eine kleine Menge von Mesit, indem er in 100 Th. C 66,64, H 10,23, O 23,13 fand.

Zersetzungen. 1) Bei der Behandlung von Xylitnaphta mit einem Ueberschusse von Kalihydrat entsteht eine schwarzbraune Masse, aus welcher Wasser ein dickes harziges Oel abscheidet, das ein Gemenge von Xylitöl und Xylitharz ist. Die wässrige Lösung liefert bei der Destillation mit verdünnter Schwefelsäure Essigsäure; ausserdem enthält sie etwas Holzgeist.

- 2) Kalium wirkt sehr lebhaft auf Xylitnaphta ein, ohne dass dabei ein Gas entwickelt wird. Die Masse wird nach und nach ganz schwarzbraun und dick. Es werden hierbei ganz dieselben Producte gebildet, welche bei der Einwirkung von Kalihydrat auf Xylitnaphta entstehen.
- 3) Xylitnaphta färbt sich beim Vermischen mit Schwestlsäure sogleich dunkelbraun; nach einiger Zeit hat das Gemenge
 eine dicke Consistenz angenommen. Verdünnt man hierauf dasselbe mit Wasser, so scheidet sich ein Oel ab, das aus unzer-

tzter Xylitnaphta, Xylitöl, braunem und gelbem Xylitharze steht. In der von diesem Oel getrennten Flüssigkeit ist Holzherschwefelsäure und Essigsäure enthalten, nebst einer Spur on Harz.

Destillirt man ein Gemenge von gleichen Theilen Xylitiphta und Schwefelsäure, so bildet sich unter Entwickelung von
ihwefliger Säure Mesiten, Essigsäure und Methol; zurück
eibt eine schwarze kohlige Masse.

Ueber die Constitution der Xylitnaphta.

Die Eigenschaft der Xylitnaphta, mit Schwefelsäurehydrat olzätherschwefelsäure, mit Kalihydrat Holzgeist zu liefern, rechtigt uns, die Xylitnaphta als eine Holzätherverbindung zu etrachten. Zieht man von ihrer Formel C₆H₁₂O₁ 1 Atom olzäther C_2H_6O ab, so bleibt $C_4H_6O_2$. Der Mesit $C_6H_{12}O_2$ nd das Mesiten CaH12O3 unterscheiden sich in ihrer Zusamensetzung von der Xylitnaphta blos durch einen grössern auerstoffgebalt. Da nun der Mesit oder das Acetyloxyd - Meyloxyd wirklich durch Reduction in Xylitnaphta übergeht 1d diese bei der Destillation mit Schwefelsäure durch blosse xydation in acetyligsaures Methyloxyd C6H12O3 verwanelt wird, da ferner bei der Einwirkung von Kali, Kaum und Schwefelsäure auf Xylitnaphta Essigsäure entsteht, ist anzunehmen, dass der Körper C₄H₆O₂, der in der ylitnaphta mit Methyloxyd verbunden ist, eine wirkliche xydationsstufe des Acetyls ist. Die Xylitnaphta wäre hiersch Acetyloxydul-Methyloxyd = $(C_2H_6)O + (C_4H_6)O_{\frac{1}{2}}$ oder $(C_2H_6)O + 2(C_4H_6) + O$. Die Erklärung für die Zersezıng derselben durch Kalihydrat kann dann folgendermaassen egeben werden: das Acetyloxydul kann aus seiner Verbindung it Holzäther nicht als solches abgeschieden werden, sondern setzt sich im Momente seiner Ausscheidung in Xylithatz (C12H18)+30 um. Nimmt man nun an, dass diese Verbining sich mit 1 At. Kali verbindet, so findet nur ein kleiner heil des bei der Zersetzung der Xylitnaphta durch Kalihydrat igeschiedenen Holzäthers Wasser vor, um sich in Holzgeist 1 verwandeln; der überschüssige Holzäther wird mit Kalibyat die Verbindung von Holzätherkali und Holzgeist erzeugen.

28 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen

liefern:

2 At. Xylitharzkali C₄₈H₇₂ O₈ K₂

2 - Holzgeist C_4 H_{16} O_4

55 - Holzätherkali C₁₀H₃₀ O₁₀K₅

 $\begin{array}{c|cccc} \textbf{(5 - Holzgeist} & & C_{10}H_{40} & O_{10} \\ \hline & & C_{72}H_{158}O_{32}K_{7}. \end{array}$

Das Xylitharz wirkt nun wieder reducirend auf unzersetzte Xylitnaphta ein. Die Neigung des Kali's, sich mit einer stärkern Säure zu vereinigen, bestimmt das Radical des Xylitharzes C₁₂H₁₈, sich unter Sauerstoffaufnahme wieder in Acetyl umzusetzen; es bildet sich Essigsäure. Der Sauerstoff, der hierzu erforderlich ist, wird dem Acetyloxydul der Naphta entzogen, es entsteht dadurch ein neues Oxyd des mit dem Acetyl polymerischen Kohlenwasserstoffes C₁₂H₁₈, das Xylitöl C₁₁H₁₈O, während der Holzäther abgeschieden wird und mit Kallihydrat die Verbindung von Holzätherkali mit Holzgeist hervorbringt.

Hieraus entstehen:

verlieren:

2 At. Xylitöl $C_{24}H_{36}O_{2}$ 3 - Holzätherkali $C_{6}H_{18}O_{6}K_{3}$ 3 - Holzgeist $C_{6}H_{24}O_{6}$ $C_{36}H_{78}O_{14}K_{3}$

Behandelt man die bei der Einwirkung von Kalihydrat and Kylitnaphta erhaltene Masse mit Wasser, so wird das Kylitham abgeschieden, indem das damit verbundene Kali sich mit Wasser vereinigt; eben so zerlegt sich das Holzätherkali in Holzgeist und Kalihydrat. Dass bei der Zersetzung von Kylit durch Kalihydrat besonders das kylitsaure Kali reducirend auf die gebildete Kylitnaphta wirkt, versteht sich wohl von selbste

Die Einwirkung von Kalium auf Xylitnaphta lässt sich folgendermaassen erklären: das Kalium entzieht dem Acetyloxydul mehrerer Atome Xylitnaphta Sauerstoff und verwandelt sich

Kali, während aus dem Acetyloxydul Xylitöl entsteht. Das bildete Kali zerlegt sogleich noch unzersetzte Xylitnaphta, bildet sich Xylitharz, mit dem sich das Kali vereinigt. Der wohl bei der Bildung des Xylitöles als auch bei der Bildung s Xylitharzes frei gewordene Holzäther findet nun aber kein eies Kali vor, um sich mit demselben zu verbinden, er vernigt sich daher theils mit dem Xylitharzesli.

erner:

6 At. Xylitnaphta
$$C_{36}H_{72}O_9$$

1 - Kali $O_{36}H_{72}O_{10}K$

∍ben:

Bei Behandlung dieser Verbindungen mit Wasser wird Xylitöl id Xylitharz abgeschieden, während sich Holzgeist und Kali-/drat bilden.

Schweselsäurehydrat zersetzt die Xylitnaphta in Holzherschweselsäure und Acetyloxydul, welches letztere im Meente seiner Ausscheidung sich in Xylitharz umwandelt. Diesentzieht noch unzersetzter Naphta Sauerstoff, das Acetyltydul derselben geht in Xylitöl über, während der Holzäther
ch ebensalls mit Schweselsäure verbindet; es bildet sich hiersi durch Oxydation des Xylitharzes Essigsäure.

erhalten des essigsauren Holzäthers zu Kali, Kalium und Schwefelsäure.

Eine Hauptstütze für die Ansicht, den Xylit, das Mesiten, m Mesit, die Xylitnaphta als Verbindungen von verschiede40 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen

nen Oxydationsstufen des Acetyls mit Methyloxyd zu betrachten, ist das analoge Verhalten des acetylsauren Methyloxyds zu Kali, Kalium und Schwefelsäure, wie bereits schon mehrmals angedeutet worden ist. Bringt man wasserfreien essigsauren Holzäther mit Kalihydrat zusammen, so erhitzt sich das Gemenge und es scheidet sich sogleich ein flockiges schneeweisses Salz aus. Eine weitere Zersetzung wie beim Xylk findet nicht statt; man kann einen Ueberschuss von Kalihydra zusetzen und das Gemenge mehrere Tage stehen lassen, dasselbe bleibt beinahe ganz weiss. Das Salz, das sich gebildet hat, wird auf ähnliche Weise in reinem Zustande dargestelk wie das xylitsaure Kali, nur hat man bei der Reinigung des erstern auf keine Einmengung von andern Zersetzungsproducten Rücksicht zu nehmen. Es ist eben so zersliesslich wie das xylitsaure Kali und muss deshalb auch unter der Luftpumpe getrocknet werden. Es stellt ein feines mehlartiges Pulver dat. Seine Zusammensetzung ist der des xylitsauren Kali's analog. Es besteht nämlich aus 6 At. essigsaurem Kali und 1 At. essigsaurem Holzäther $=6(C_4H_6O_3+KO)+(C_4H_6O_3+C_2H_6O)$.

	Gef.	Ber.
C_{30}	29,57	27,54
H ₄₈	4,97	3,59
023	31 ,66	26,39
Ř _β	43,80	42,48
	100,00	100,00.

Behandelt man es mit wenig Wasser und trocknet es bei gelinder Hitze wieder ein, so entweicht essigsaurer Holzäther und es bleibt essigsaures Kali. Ausser diesem Doppelsalze bildet sich bei der Einwirkung von Kalihydrat auf essigsauren Holzäther nichts als Holzgeist. Dass das Salz nicht reducirend auf noch unzersetzten essigsauren Holzäther wirken kann, versteht sich von selbst.

Kalium wirkt ziemlich lebhaft unter Wärmeentwickelung auf essigsauren Holzäther ein, ohne dass dabei ein Gas entwikkelt wird. Es scheidet sich sogleich ein weisses Salz in Flokken aus. Gegen das Ende der Reaction färbt sich die Masse ein wenig braun. Destillirt man dann das Ganze auf dem Wasserbade, so geht blos unzersetzter essigsaurer Holzäther über. Wird die zurückbleibende Salzmasse mit Wasser übergossen

und abermals der Destillation unterworfen, so erhält man ein Destillat, das aus Holzgeist und noch et vas unzersetztem essigsaurem Holzäther besteht. Die rückständige alkalische Lösung enthält das Kalisalz einer Säure, welche reducirende Eisgenschaften zeigt und die durch Sauerstoffaufnahme sehr leicht in Essigsäure übergeht. Die braune Farbe der zersetzten Masse rührt von einer höchst geringen Menge von denselben unwesentlichen Zersetzungsproducten her, welche bei der Einwirkung von Kalium auf Xylit entstehen und einer allzuheftigen Einwirkung des Reagens zuzuschreiben sind.

Das Kalium entzieht der Essigsäure des essigsauren Holzäthers Sauerstoff; dadurch wird Kali gebildet, welches sich mit der niedrigern Oxydationsstufe des Acetyls und vielleicht auch mit dem Holzäther verbindet. Acetyloxyd kann sich durch diese Reduction nicht bilden, indem sonst bei Zersetzung des Gemenges von Acetyloxyd-Kali und Holzätherkali Aldehyd entstehen müsste. Die Essigsäure wird also entweder zu acetyliger oder zu unteracetyliger Säure reducirt. Welche von diesen beiden Oxydationsstufen des Acetyls entsteht, ist nach den vorhandenen Thatsachen nicht zu entscheiden, da die Zersetzung sich gleich gut erklären lässt, ob man die Bildung von acetyliger oder von unteracetyliger Säure annimmt.

Bei der ersten Annahme reicht der Sauerstoff der Essigsäure gerade hin, um acetyligsaures Kali zu bilden; der Holzäther vereinigt sich mit diesem Salze. Die Verbindung kann als $(KO+C_4H_6O_2)+(C_2H_6O)$ oder als ein basisches Salz betrachtet werden, in welchem der Holzäther 1 At. Kali vertritt KO C_2H_6O C_2H_6O . Sie zerflele dann durch Wasser in Holzgeist und in neutrales acetyligsaures Kali. Der Holzäther kann sich nicht mit Kali verbinden, indem sonst ein zweites Atom Kalium einem zweiten Atom cssigsaurem Holzäther Sauerstoff entziehen müsste. Dadurch wären aber die Bedingungen zur Bildung von Mesiten oder Xylit und der daraus durch weitere Reduction entstehenden Producte gegeben, allein wir haben gesehen, dass keine dieser Substanzen entsteht.

Nach der zweiten Annahme entsteht Holzätherkali, das aber auf 1 At. Kali 2 At. Holzäther enthält. Die Sauerstoffmenge, welche die Essigsäure des essigsauren Holzäthers ab-

42 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen

giebt, um sich in unteracetylige Säure zu verwandeln, oxydirt gerade so viel Kalium, als Kali nothwendig ist, die unteracetylige Säure und den Holzäther zu binden. Dass das unteracetyligsaure Kali nicht reducirend auf essigsauren Holzäther wirken kann, versteht sich von selbst.

2 At. essigsaurer Holzäther $C_{12}H_{24}O_{8}$

3 - Kalium

K₃

zerfallen in:

2 At. unteracetyligs. Kali $C_8 H_{12}O_5K_2$ 1 - Holzätherkali $C_4 H_{12}O_3K$ $C_{12}H_{24}O_8K_3$.

Schweschsäurehydrat mischt sich mit essigsaurem Holzäther unter schwacher Wärmeentwickelung. Gleich ansangs beginnt schon die Zersetzung des letztern. Dieselbe ist nach einigen Tagen vollständig vollendet, Wasser scheidet aus dem Gemenge nichts mehr aus, der Geruch des Aethers ist verschwunden, die Flüssigkeit hat hingegen den Geruch einer starken Essigsäure; sie ist kaum gelblich gefärbt und enthält ausser überschüssiger Schweselsäure, Holzätherschweselsäure und Essigsäure keine andern Substanzen. Die Einwirkung von Schweselsäurehydrat auf essigsauren Holzäther besteht also ganz einsach in der Bildung von Holzätherschweselsäure und Essigsäurehydrat.

Bei der Destillation von essigsaurem Holzäther mit Schwefelsähre erhält man ein wässriges Destillat, das nichts als Essigsäure und schweflige Säure enthält; als Rückstand bleibt eine schwarze kohlige Masse.

Das Xylitöl.

Bildung. Das Xylitöl wird bei der Einwirkung von Kali, Kalium und Schwefelsäure auf Xylit, Mesit und Xylitaaphta und von Kali und Schwefelsäure auf Mesiten gebildet. Seiner Entstehung aus dem Xylit, Mesit und Mesiten geht immer die Bildung von Xylitaaphta vorher, wie eben gezeigt wurde.

Darstellung. Man lässt eine sehr grosse Menge von Kalibydrat auf Xylit längere Zeit einwirken. Das beim Verdüsten der zersetzten Masse mit Wasser abgeschiedene Oel, das fast blos aus Xylitöl und Xylitharz besteht, wird mit Wasser einer Destillation unterworfen, webei das Xylitharz zurückbleibt. Das übergegangene Oel wird alsdann mehrmals für sich umdestillirt, wobei das his zu 200° Uebergehende immer auf die

ite gethan wird. Dadurch wird bezweckt, allfällig noch vorudene Xylitnaphta, welche sehr bartnäckig von dem Xylitöi
rückgehalten wird, vollständig zu entfernen.

Eigenschaften. Das vollkommen reine Xylitäl ist eine farhse Flüssigkeit. Es ist leichter als Wasser und in demselben
inahe unlöslich; hingegen löst es sich sehr leicht in Weinist, Holzgeist, Xylit und Acther. Ka besitzt einen bittern
ennenden Geschmack und einen eigenthümtichen Geruch. Sein
edepunct liegt weit über 200°, wobei es ohne Zersetzung
erdestillirt werden kapp. Es brennt mit einer hellleuchtenden
ssenden Flamma.

Zusammensetzung. Des Xylitöl besteht aus:

	6	Gef.		
C ₁₃	a. 80,47	b. 81,38	· 81,92	
H ₁₈	10,42	10,36	9,94	
0	9,11	8,26	8,84	
	100,00	100,00	100,00.	

Die Analyse a bezieht sich auf Xylitöl, das durch Einirkung von Kalihydrat auf Xylit erhalten wurde; das zur
nalyse b angewandte Xylitöl wurde bei der Einwirkung von
hwefelsäure auf Xylit erhalten.

Auch diese Substanz hat Löwig schon bei seinen Verzichen über die Einwirkung des Kaliums auf Holzgeist (Xylit) halten und analysirt. Die Resultate seiner Analysen stimmen ilkommen mit denen von Weidmann und mir überein, (Lözig fand in 100: C80,94, H10,27, O8,79.)

Das Xylitöl ist wahrscheinlich ein Oxyd des mit dem Acel polymerischen Radicals $C_{12}H_{18} \cdot C_{12}H_{18} + 0 = 3(C_4H_6)$ O.

Zersetzungen. 1) Setzt man das Xylitöl längere Zeit bei ner Temperatur von $50-80^{\circ}$ der Luft aus, so verwandelt es ch vollständig in braunes Xylitharz. $C_{12}H_{18}O$ oxydirt sich $2(C_{12}H_{18})+3O$.

3) Kalium wirkt nur sehr langsam auf Xylitöl ein; es wert sehr lange, bis nur eine kleine Menge von Kalium verhwunden ist, selbst wenn man die Einwirkung durch Wärme sterstützt. Das Oel färbt sich braun und verdickt sich; es sidet keine Gasentwickelung statt. Das bei Behandlung der westzten Masse mit Wasser abgeschiedene braune Oel ist ein

44 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen

Gemenge von unverändertem Xylitöl mit einem Harze, das in seinen äusseren Eigenschaften fast ganz mit dem Xylitharz übereinkommt, nur schwieriger schmelzbar als dieses ist. In seiner Zusammensetzung weicht es aber von dem Xylitharze bedeutend ab. Es besteht aus:

In derselben Flüssigkeit ist essigsaures Kali enthalten.

4 At. Xylitöl $C_{48}H_{72}O_4$ — 1 – Sauerstoff O

= 1 At. des Harzes $C_{48}H_{72}O_3 = 2(C_{24}H_{36}) + 3O$.

Der Sauerstoff, den viele Atome Xylitöl verlieren, inden dieses Harz entsteht, wird dazu verwandt, Kalium in Kali und durch den Einfluss des gebildeten Kali's Xylitöl zu Essigsäure zu oxydiren, welche sich dann mit dem Kali vereinigt.

- 3) Wird Xylitöl mit Kalihydrat zusammengebracht, so wird die Mischung unter Erwärmung braun und zuletzt schwarz, und nach einiger Zeit erstarrt das Ganze zu einer steinharten Masse. Es bildet sich hierbei ebenfalls essigsaures Kali und ein Harz, das ohne Zweifel dasselbe ist, das bei der Einwirkung des Kaliums auf Xylitöl entsteht. Das Kali bestimmt 1 At. Xylitöl, mehreren anderen Atomen Xylitöl Sauerstoff zu entziehen und sich dadurch in Essigsäure umzuwandeln, während das theilweise reducirte Xylitöl in das Harz übergeht.
- 4) Xylitöl mischt sich mit Schwefelsäure in allen Verhältnissen; es wird dabei dunkelbraun und dickflüssig, während sich zugleich etwas schweflige Säure entwickelt. Vermischt man nach einiger Zeit das Gemenge mit Wasser, so wird ein dickes dunkelbraunes Oel abgeschieden, das aus unverändertem Xylitöl und Xylitharz besteht. Die wässrige Flüssigkeit enthält Schwefelsäure, schweflige Säure und Spuren von Essigsäure und dem Harze. Die Einwirkung der Schwefelsäure auf Xylitöl ist also blos eine oxydirende: $(C_{12}H_{18})$ O verwandelt sich in $(C_{12}H_{18})$ $O_{1\frac{1}{2}}$ = 2 $(C_{12}H_{18})$ + 30.

Die geringe Menge von Essigsäure, welche nebenbei entsteht, bildet sich durch einen weiter fortgeschrittenen Oxyda-

tionsprocess, bei welchem das Radical $C_{12}\,H_{18}$ in das Radical $C_4\,H_6$ zerfällt. Diese Zersetzung geht aber höchst langsam von Statten. Bei der Destillation von Xylitöl mit Schwefelsäure entwickelt sich schweflige Säure, es geht Methol und Essigsäure über und zurück bleibt eine schwarze Masse. Auf die Bildung des Methols werde ich weiter unten zurückkommen.

Das braune Xylitharz.

Bildung. Das braune Xylitharz entsteht bei der Einwirkung von Kali, Kalium und Schwefelsäure auf Xylit, Mesit und Xylitnaphta, von Kali und Schwefelsäure auf Mesiten. Seiner Entstehung aus Xylit, Mesit und Mesiten muss jedoch immer die Bildung der Xylitnaphta vorangehen. Ferner bildet es sich durch Oxydation des Xylitöles an der Luft und durch Schwefelsäure.

Darstellung. Am leichtesten gewinnt man das braune Xylitharz, wenn man eine grössere Menge von Kalihydrat einige
Zeit auf Xylit einwirken lässt. Die Reaction wird, nachdem
sich eine ziemliche Quantität von dem Harze gebildet hat, was
an der braunen Farbe zu sehen ist, unterbrochen, damit nicht
das Kali auf das gleichzeitig gebildete Xylitöl einwirken kann,
wobei sich, wie gezeigt wurde, ebenfalls ein Harz bildet, welches sich schwer von dem Xylitharze trennen liesse. Zu dem
Ende vermischt man die Masse mit Wasser. Das dabei abgeschiedene Oel wird alsdann mit Wasser destillirt, wobei dasXylitharz zurückbleibt. Die Destillation wird so lange fortgesetzt, bis nicht die geringste Menge von Oel mehr übergeht:
Das Harz wird nun in Weingeist gelöst, die Lösung auf dem
Wasserbade eingedunstet und der geschmolzene Rückstand noch
längere Zeit auf demselben behandelt.

Eigenschaften. Das braune Xylitharz hat im reinen Zustande eine rothbraune Farbe, ist bei 15 — 20° weich und zäh, bei niedrigerer Temperatur aber spröde. Es schmilzt unter dem Siedepuncte des Wassers. In böherer Temperatur (ungefähr bei 140°) wird es zersetzt. Es ist schwerer als Wasser und darin vollkommen unlöslich, hingegen sehr leicht löslich in Weingeist, Xylit und Aether. Die weingeistige Lösung reagirt nicht sauer; eine weingeistige Lösung von essigsaurem Bleioxyd bringt

46 Schweizer, üb. d. chem. Verhältnisse d. geistigen in derselben keinen Niederschlag hervor. In wässriger Källlösung ist es unlöslich.

Zusammensetzung. Das braune Xylitharz besteht aus!

	Gef.	Ber.
C_{24}	78,85	79,22
H ₃₆	9,53	9,52
0_3	11,62	11,96
_	100,00	100,00.

Es ist polymer mit dem Acetyloxydul. Seine Bildung au Xylitöl durch blosse Oxydation des letztern an der Luft macht es sehr wahrscheinlich, dass es ein höheres Oxyd desselben Radicals ist, welches im Xylitöle vorkommt, also $= 2(C_{1.2} H_{1.8}) + 30$.

Zersetzungen. Das braune Xylitharz löst sich in Schwefelsäurchydrat beinahe in allen Verhältnissen, es findet schwacht Erwärmung statt, es entwickelt sich schweflige Säure und met erhält eine schwarze sekmierige Masse. Behandelt man diese nach längerer Zeit mit Wasser, so scheidet sich ein Harz aus; in der etwas braun gefärbten Flüssigkeit sind ausser Schwefelsäure, schwefliger Säure und Spuren von Kasigsäure und Marz keine anderen Stoffe enthalten. Digerirt man das ausgeschiedene Harz mlt 70ghaltigem Weingeist, so löst sich in denselben unverändertes braunes Xylitharz, während ein brauss Polver zurückbleibt, das selbst in wasserfreiem Alkohol höchst schwierig löslich ist. Gelbes Xylitharz wird bei der Einwir! kung von Schwefelsäurehydrat auf braunes Xylitharz nicht gebildet. Das braune Pulver ist ein eigenthümlicher harzartigd. Körper, der bei 100° noch nicht weich wird, sondern erst is einer viel höberen Temperatur zu einer schwarzen Masse zu sammenschmilzt. In Wasser ist er unlöslich, in wasserfreiet Holzgeist und Weingeist sehr schwierig löslich; hingugen lich er sich leicht in Aether und Xylit. Von Kaillauge wird er nicht angegriffen. Er besteht aus:

С ₄₈ Н _{а4}	Gef.	Ber.
	83,27	84,00
	9,38	9,14
H ₆₄ O ₃	7,35	6,86
استمهاسيف	100,00 -	100,00.

 $C_{48}H_{64}O_3 = 2(C_{24}H_{32}) + 30.$

Er enthält also 8 At. Wasserstoff und 3 At. Sauerstoff weniger als das Xylitharz. Seine Bildung aus dem letztern beProductes der trecknen Destillation des Holzes. 47

steht demnach in einer Erzeugung von Wasser aus den Elementen der Verbindung, bedingt durch die Verwandtschaft der Schwefelsäure zum Wasser, und in einer Oxydation von Wasserstoff durch Schwefelsäure zu Wasser.

	2	At.	Xylitharz	$C_{48}H_{72}O_{6}$
zerfallen i	in:			
	1	Al.	schwer schmelzbares Harz	$C_{48}H_{64}O_3$
	8	3 -	Wasser	$\mathbf{H_6} \mathbf{O_3}$
	- 8	-	Wasserstoff	H ₂
				C48H72Og.

Bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Xylit, Mesit und Xylitnaphta bildet sich das schwer schmelzbare Harz nicht, das bei der Zersetzung des braunen Xylitharzes durch Schwefelsäure entsteht. Diess hat seinen Grund darin, dass die Schwefelsäure bei der Einwirkung auf Xyllt u. s. w. durch die Bildung von Holzätherschwefelsäure etwas verdünnt wird und dann ihre wasserbildende Kraft nicht mehr auf das braune Xylitharz ausüben kann. Hingegen kann die Schwefelsäure auf das letztere immer noch katalytisch einwirken und einen Theif desselben in gelbes Xylitharz umwandeln.

Dass bei der Einwirkung von Schwefelsäurehydrat auf braunes Xylitharz allein kein gelbes Xylitharz gebildet wird, findet wohl die Erklärung darin, dass, sobald die Schwefelsäure eine Wirkung ausübt, dieselbe in diesem Falle gleich so stark ist, dass das schwer schmelzbare Harz entsteht. Man könnte auch annehmen, das braune Xylitharz werde zuerst in das gelbe umgesetzt, welches aber im gleichen Momente die weitere Zersetzung erleide.

Bei der Destillation von braunem Xylitharz mit Schwefelsäure bildet sich Essigsäure, schweflige Säure und Methol, letzteres aber nur in geringer Menge. Als Rückstand bleibt eine schwarze Masse.

Das getby Xylithat%.

Bildung. Bei der Einwirkung von Schweselsäurehydrat auf Xylit, Mesit und Xylitnaphta, ohne Zweisel durch kataly-tischen Einfluss der Schweselsäure auf das vorher entstandene braune Xylitharz.

Darstellung. Das nach der Zerselzung des Xylits durch

Schweselsäure bei Zusatz von Wasser abgeschiedene Oel wirt mit Wasser destillirt. Es bleibt ein Gemenge von braunem und von gelbem Xylitharz zurück. Dasselbe wird in wassersreien Alkohol gelöst und die Lösung mit 70% haltigem vermischt, wedurch das gelbe Xylitharz niedergeschlagen wird, während das braune gelöst bleibt. Das auf diese Weise ausgeschiedene gelbe Harz wird wiederholt in starkem Weingeist gelöst und wieder durch schwächern gefällt, um es von noch anhängendem braunem Xylitharz vollständig zu reinigen, und dann längere Zeit auf dem Wasserbade geschmolzen.

Eigenschaften. Das gelbe Xylitharz stellt eine rothgelte spröde Masse dar. Es wird beim Reiben nicht weich wie das braune. Sein Schmelzpunct liegt weit über dem Siedepuncte des Wassers. In starkem Weingeist und Aether ist es mit gelber Farbe löslich, in schwachem Weingeist ist es beinabe unlöslich. Durch Kalilauge wird es nicht verändert. Seine weingeistige Lösung giebt mit einer weingeistigen Lösung von essigsaurem Bleioxyd nur unter Zusatz von Ammoniak einen gelben flockigen Niederschlag.

Zusammensetzung. Das gelbe Xylitharz ist gleich zusammengesetzt wie das braune. In 100 Theilen wurden C 80,12, H 10,04,09,66 gefunden. Wahrscheinlich sind die beiden Harze isomere Verbindungen, und während das braune Xylitharz $2(C_{12}H_{18})+30$ ist, kann man das gelbe als $C_{24}H_{36}+30$ betrachten.

Durch Schwefelsäurehydrat erleidet das gelbe Xylitharz dieselbe Zersetzung wie das braune.

Das Methol.

Bildung. Das Methol bildet sich bei der Destillation von Schwefelsäure mit Xylit, Mesit, Mesiten, Xylitnaphta, Xylitland Xylitharz.

Darstellung. Man erhält das Methol am besten durch Destillation von gleichen Theilen Xylit und Schweselsäure aus die schon früher angegebene Weise. Die obere Schicht des Destillates, welche grösstentheils aus Methol besteht, aber auch schweslige Säure, Mesiten und schweselsauren Holzäther enthält, wird mit Wasser und hernach mit verdünnter Kalilösung geschüttelt und dann destillirt, wobei die ersten und die letzten

ortionen auf die Seite gethan werden. Da die letzten Antheile lesiten und schwefelsaurer Holzäther dem Methol sehr stark nhängen, so muss diese fractionirte Destillation mehrmals wierholt werden, so lange, bis der Geruch der Flüssigkeit nicht ehr an schwefelsauren Holzäther erinnert. Hierauf wird das lethol durch Chlorcalcium entwässert und zuletzt über geranntem Kalke rectificirt.

Eigenschaften. Im reinen Zustande ist das Methol vollommen farblos. Es ist leichtslüssig und leichter als Wasser, welchem es fast unlöslich ist. Sein Siedepunct liegt ungehr bei 175°, wobei es unverändert überdestillirt werden kann. s hat einen dem des Terpentinöles ähnlichen Geruch und einen brennenden Geschmack. Dem Einflusse der Lust ausgeztzt, verändert es sich selbst in der Wärme nicht.

Zusammensetzung. Das Methol ist polymer mit dem Ace-1. Es besteht aus:

Wir werden sogleich eine Verbindung des Methols mit chwefelsäure kennen lernen, welche berechtigt, für das Metol die Formel C_{12} H_{18} festzustellen.

In unserer ersten Arbeit haben Weidmann und ich die usammensetzung des Methols zu C₂₀ H₃₀ O gefunden. Diese erschiedenheit der Resultate rührt ohne Zweisel daher, dass ir zu unseren früheren Analysen Methol anwandten, das och nicht vollständig frei von Mesiten und schweselsauem Holzäther war. Damals verleitete uns auch das Resultat er Analyse, das Methol für identisch mit dem Oele des Holzeistes von Kane zu halten, mit dem es, besonders wenn es och durch eine geringe Quantität der genannten Stosse verunzinigt ist, in seinen äusseren Eigenschaften Aehnlichkeit hat.

Verhalten des Methols zu Schwefelsäurehydrat.

Das Methol lässt sich nicht mit Schweselsäure mischen. im die beiden Stosse daher in nähere Berührung zu bringen, nuss man das Gemenge beständig umschütteln. Nach und nach erändert sich das Methol und in dem Maasse schwärzt sich die Journ. s. prakt. Chemie. XXIII. 1.

Schwefelsäure; dabei entwickelt sich viel schweslige Säure, n dass man das Gefäss, worin die Reaction vorgeht, bisweile öffnen muss. Es sind viele Tage erforderlich, bis das Methol ganz verschwunden ist. Je öfter aber das Umschütteln der Masse wiederholt wird, desto schneller geht die Zersetzung vor sich. Setzt man alsdann Wasser hinzu, so trennt sich das Ganz in 3 Schichten, eine untere wässrige, beinahe sarblose, eine milllere schwarze dickflüssige und eine obere, gelblich gefärbte Die beiden letzteren lassen sich wegen der Dickslüssigkeit nicht von einander scheiden. Die davon getrennte wässrige Schicht enthält Schwefelsäure, schweflige Säure und eine saure Verbindung von Schwefelsäure mit Methol. Um das Kalksalz dieser neuen Säure darzustellen, wird die Flüssigkeit mit Kalt gesättigt, die Lösung filtrirt und abgedampft. Bei der Behandlung des Rückstandes mit Weingeist bleibt noch etwas Gips zurück; nach dem Verdunsten des Weingeistes erhält man das reine Kalksalz der Metholschwefelsäure, welches folgende Eigenschaften besitzt:

Es ist weiss und krystallinisch, löst sich leicht in Wasser, beim Kochen der Lösung wird es nicht zersetzt. In Weingeist ist es ziemlich leicht löslich. In höherer Temperatur wird es zersetzt; es entweicht im Anfange ein öliger Körper, der ganz die Eigenschaften des Methols besitzt, später schwärzt sich die Masse und entwickelt schweflige Säure. Der metholschwefelsaure Kalk besteht aus:

	Gef.	Ber.
$\mathbf{C_{12}}$	38,45	38,44
H ₁₈	4,90	4,70
$\ddot{\mathbf{S}}_{2}$	41,52	41,96
Ċa ₁	16,02	14,90
_	100,89	100,00.

Das Salz kann hiernach als $\ddot{C}a\ddot{S}+(C_{12}H_{18})\ddot{S}$ oder als $\ddot{C}a+C_{12}H_{16}\ddot{S}+\dot{H}$ betrachtet werden. Nach der ersten Formel, welcher wohl der Vorzug gegeben werden kann, hat es eine dem schwefelsauren Aethyloxyd-Aetherol $\dot{A}e\ddot{S}+(C_4H_8)\ddot{S}$ analoge Zusammensetzung. Das Methol ist also ohne Zweifel $C_{12}H_{18}$; es verbindet sich mit-Schwefelsäure zu Metholschwe-

Productes der trocknen Destillation des Holzes. 51 felsäure, welche wahrscheinlich im freien Zustande die Zusammensetzung C_{12} H_{18} $\ddot{S}+\dot{H}$ \ddot{S} hat.

Das erwähnte Gemenge der öligen Schichten besteht aus unzersetztem Methol und einem neuen Harze, dem Metholharze. Um letzteres darzustellen, wird die Masse mit Wasser destillirt, mit welchem das Methol übergeht, während das Harz zurückbleibt. Durch Behandeln mit Weingeist kann man diesem ohne Verlust den kleinsten Gehalt an Methol noch entziehen, da sich letzteres leicht in Weingeist löst, das Metholharz hingegen darin unlöslich ist. Es wird hierauf in Aether gelöst und die ätherische Lösung auf dem Wasserbade verdunstet.

Das Metholharz stellt bei der gewöhnlichen Temperatur eine weiche schwarze Masse dar, die bei gelinder Wärme schon vollkommen flüssig wird. Es ist schwerer als Wasser und in diesem sowohl als in Weingeist und Holzgeist unlöslich. Hingegen löst es sich leicht in Aether und Xylit. Es besteht aus $C_{24}H_{32}O \Longrightarrow (C_{24}H_{32})O$.

Gef. Ber.
$$C_{24}$$
 86,00 85,96 H_{32} 9,57 9,35 O_1 4,43 4,69 $100,00$ 100,00.

Das Metholharz entsteht aus dem Methol, indem in 2 At. des letztern durch die Schwefelsäure 4 At. Wasserstoff oxydirt werden und mit $C_{24}H_{32}$ 1 At. Sauerstoff in Verbindung geht.

3 At. Methol
$$C_{24}H_{36}$$

3 - Sauerstoff $C_{24}H_{36}O_3$

liefern

1 At. Metholharz $C_{24}H_{32}O$ 2 - Wasser $H_4 O_2$ $C_{24}H_{36}O_3$.

Das Methol kann als das Radical des Xylitharzes und des Xylitöles betrachtet werden:

Methol $C_{12}H_{18}$ Xylitöl $C_{12}H_{18} + 0$ Xylitharz $2(C_{12}H_{18}) + 30$.

Hiergegen scheint zwar zu sprechen, dass keiner der letzteren Körper bei der Einwirkung von Schwefelsäure auf Methol gebildet wird; allein es fragt sich doch, ob dieselben vielleicht nicht durch Behandlung des Methols mit solchen oxydirenden Mitteln entstehen können, welche weniger wasserbildend einwirken würden als die Schwefelsäure. Bei der Destillation von Methol mit Schwefelsäure bildet sich nur sehr wenig Essigsäure, ein Theil des Methols geht unverändert über, es entwickelt sich schweflige Säure und zurück bleibt eine kohlige Masse.

Nach dem Vorhergehenden wird man sich nun leicht eine Erklärung von der Bildung des Methols verschaffen können.

Bei der Zersetzung der Verbindungen des Holzäthers mit den niedrigeren Oxydationsstufen des Acetyls finden durch das abgeschiedene Oxyd in höherer Temperatur die gleichen Reductionen statt wie bei der gewöhnlichen Temperatur, nur dass dieselben im erstern Falle momentan auf einander folgen und nicht mit der Bildung des Xylitöles enden. Die Neigung der Schwefelsäure, sich mit einem basischen Körper, wie das Mezu verbinden, und die höhere Temperatur bestimmen einen Theil des Xylitöles, seinen Sauerstoff an einen andern Theil abzugeben, welcher zugleich auch von Schwefelsäure Sauerstoff aufnimmt und sich in Essigsäure verwandelt. Resultat hiervon ist die Bildung von Metholschweselsäure, welche durch höhere Temperatur und durch Mitwirkung von Wasser, das durch die Bildung von schwefliger Säure aus Schwefelsäurehydrat frei wird, sich in Methol und Schweselsäure zerlegt. Durch allzustarke Einwirkung der Schwefelsäure wird auch ein Theil der vorhandenen Körper in Kohlensäure, Wasser und die schwarze Masse zerlegt.

Dass durch die Einwirkung von Kalium auf Xylitöl blos wieder ein anderes Oxyd und kein Methol entsteht, hat wohl seinen Grund darin, dass das Kalium einen Körper zu bilden strebt, der gegen das Kali noch elektro – negative Eigenschaften besitzt, während die Schwefelsäure eine Substanz von entgegengesetzten Eigenschaften zu bilden sucht.

In dem Vorliegenden haben wir eine Reihe von Körpern betrachtet, welche für die Theorie der organischen Radicale von besonderem Interesse sind. Wir haben 5 Verbindungen kennen

gelernt, in welchen das basische Methyloxyd mit verschiedenen Oxydationsstufen des Radicals der Essigsäure, des Acetyls, verbunden ist. Dieselben werden durch Kali und Schwefelsäure ganz auf analoge Weise zerlegt, wie die Verbindungen von unorganischen Oxyden. Sie können durch Oxydation und Desoxydation in einander übergeführt werden; die Oxydation und Desoxydation erstreckt sich aber hierbei immer nur auf das Oxyd des Acetyls, das Methyloxyd bleibt unverändert. Die unteracetylige Säure dés Xylits kann durch Sauerstoffaufnahme in acetylige Säure, in Acetylsäure - durch Sauerstoffabgabe in Acetyloxyd und Acetyloxydul übergeführt werden. Die Acetylsäure, die unteracetylige Säure, die acetylige Säure, das Acetyloxyd können von dem Holzäther an andere Basen, z. B. an Kali, übergetragen, sie können aus ihren Verbindungen durch Säuren abgeschieden werden; die niedrigeren Oxydationsstufen werden aber in diesem Falle durch Sauerstoffaufnahme sogleich zu der höchsten, zu Acetylsäure, oxydirt. — Das Acetyloxydul existirt hingegen nur in seiner Verbindung mit Holzäther. Versucht man es abzuscheiden, so erhält man zwar ein Oxyd von seiner Zusammensetzung, allein das Acetyl ist offenbar nicht mehr in demselben enthalten, es hat sich in den polymeren Kohlenwasserstoff C₁₂ H₁₈ umgesetzt. Das Xylitharz 2C₁₂H₁₈+O₃ verändert sich an der Luft nicht und es geht durch oxydirende Mittel nur schwierig in Essigsäure über. Eben so kann auch aus dem Acetyloxydul durch Reduction nicht noch eine niedrigere Oxydationsstufe des Acetyls entstehen, es wird anstatt einer solchen Xylitöl gebildet, in welchem wieder das Radical C₁₂H₁₈ und nicht C₄H₆ enthalten ist. Entzieht man dem Xylitöl noch seinen Sauerstoff, so erhält man das Methol, den mit dem Acetyl polymeren Kohlenwasserstoff, der nur höchst schwierig unter Sauerstoffaufnahme in Acetyl umgesetzt werden kann.

Das Acetyl lässt sich also durch Reduction seiner Sauerstoffverbindungen nicht isoliren. Ist diess aber ein Grund, die
Existenz desselben als Radical in der Essigsäure, in der Xylitsäure etc. zu läugnen? Ist es überhaupt ein Grund, die Ansicht von organischen Radicalen deswegen zu verwerfen, weil
man noch nicht im Stande war, solche Radicale zu isoliren?
Wenn ich eine organische Substanz habe, welche sich mit basischen Körpern unter gleichen Gesetzen verbindet, wie sich

z. B. die Schweselsäure mit Basen vereinigt, so schliesse ich, dass diese Substanz, analog der Schweselsäure, eine Säure sei. Ich entziehe ihr einen Theil Sauerstoff und erhalte dadurch eine schwächere Säure, welche sich unter gewissen Umständen durch Sauerstoffausnahme wieder in die stärkere Säure umwandeln kann, gerade so, wie ich Schweselsäure zu schwesliger Säure reduciren und diese wieder zu Schweselsäure oxydiren kann.

Die Reduction der stärkern organischen Säure in die schwächere und die Oxydation der schwächern in die stärkere kann ich durch verschiedene Mittel bewerkstelligen. Ich finde mich hierdurch berechtigt, die beiden Verbindungen als Oxydationsstufen eines und desselben Radicals zu betrachten, gerade wie die Schwefelsäure und die schweflige Säure Oxyde desselben Radicals, des Schwefels, sind. Kann ich auch dieses organische Radical aus seinen Verbindungen nicht wie den Schwefel isoliren, so sehe ich es doch deutlich in seinen Verbindungen die Rolle eines einfachen Körpers spielen.

In den Fluorverbindungen erkannte man schon lange aus der Analogie derselben mit den Chlor- und Sauerstoffverbindungen einen einfachen Körper, ohne ihn jedoch isolirt zu haben.

Die hypothetische Annahme des Fluors scheint sich durch die Versuche von Knox in neuerer Zeit zu bestätigen.

Hypothesen, welche durch die Analogie der organischen Verbindungen mit den unorganischen hervorgerufen werden, fördern gegenwärtig die Wissenschaft wahrlich mehr als Theorien, welche die jüngere organische Chemie zur Mutter von der unorganischen werden lassen.

II.

Ueber die Umwandlung der Weinstein-, Citronen-, Schleim- und Gallussäure durch die Superoxyde des Bleies und Mangans.

Von

J. PERSOZ.

(Comptes rendus 1840. T. XI. p. 522.)

Döbereiner war der erste, der die merkwürdige Umwandlung der Weinsteinsäure in Ameisensäure bei der Einwirkung der Schwefelsäure und des Mangansuperoxyds bekannt Schleim- und Gallussäure durch die Superoxyde etc. 55

machte. Man hat diese Einwirkung durch die Annahme erklären wollen, dass die Schwefelsäure die Zersetzung des Superoxyds zu Manganoxydul bewirkt, um mit demselben ein Salz
zu bilden, so dass 1 Aeq. Sauerstoff, frei geworden, sich zu
den Elementen der Weinsteinsäure begebe, um dieselbe nach
der folgenden Gleichung in Kohlensäure und Ameisensäure umzuwandeln:

$$3\operatorname{Mn} O_{2} + 3\ddot{S} + C_{4}H_{4} O_{5} = \begin{cases} C_{2}H_{2}O_{3} + aq. \\ C_{2}O_{4} \\ H_{2}O \\ 3\ddot{S} \dot{M}n. \end{cases}$$

Mich haben rein physikalische Betrachtungen, die ich später in einem Berichte darlegen werde, diese Ansicht verwersen lassen und zu dem Schlusse gebracht, dass die Weinsteinsäure an sich selbst mittelst eines Superoxyds ohne Zutritt der Schwefelsäure müsse verändert werden können.

In der Absicht, diese Meinung zu rechtfertigen, setzte ich 1 Th. Weinsteinsäure mit 5 Th. Bleisuperoxyd und 10 Tht Wasser in innigste Berührung. Schon bei gewöhnlicher Temperatur fand die Einwirkung statt und that sich durch reichliche Entwickelung von Kohlensäure kund; das aufgefangene Gas verlöschte eine Wachskerze, trübte das Kalkwasser und wurde von Alkalien vollkommen absorbirt. Nachdem die Flüssigkeit einige Minuten dem Aufwallen überlassen worden war, wurde sie zur Abscheidung des unlöslichen Theiles filtrirt, abgedampf und so concentrirt, dass sie bei der Abkühlung Krystalle absetzte, die bald durchscheinend und prismatisch, bald undurchsichtig und rhomboëdrisch waren, aber in beiden Fällen nur Ameisensäure und Bleioxyd enthielten.

Was den unlöslichen Theil betrifft, so war er verschiedener Natur, je nachdem der Versuch mehr oder weniger lange dauerte und je nachdem man eine mehr oder weniger grosse Quantität Superoxyd angewandt hatte.

Bei den verschiedenen Versuchen, die ich anstellte, um die Einwirkung der Weinsteinsäure auf die Superoxyde kennen zu lernen, fand sich der unlösliche Theil gebildet bald aus Bleisuperoxyd und einer gewissen Quantität weinsteinsauren Bleioxyds, bald aus Bleisuperoxyd und einer gleichen Menge kohlensauren und weinsteinsauren Bleioxyds, bald aus Super-

56 Persoz, üb. die Umwandl. der Weinstein-, Citronen-,

oxyd und einer gewissen Menge kohlensauren Bleisalzes, bald endlich aus kohlensaurem und weinsteinsaurem Salze, wenn das Superoxyd in unzureichender Menge angewandt worden war. In folgender Weise prüfte ich die Natur dieses Rückstandes:

Nachdem ich ihn vollständig ausgewaschen hatte, um ihn vom ameisensauren Salze zu befreien, womit er noch getränkt war, hehandelte ich ihn in der Wärme zu verschiedenen Malen mit Salpetersäure, die durch Wasser verdünnt war. Wenn der Rückstand in dieser Salpetersäure unlöslich war, so bestand er nur aus vollkommen reinem Bleisuperoxyd. 1 Gr. dieses Rückstandes, geglüht und zu schwefelsaurem Salze umgewandelt, lieferte 1,26 Gr. schwefelsaures Bleioxyd. Die Flüssigkeit, sorgfältig mit Ammoniak neutralisirt, lieferte einen Niederschlag, der, wohl gewaschen und mit Schwefelwasserstoff behandelt, eine Quantität Weinsteinsäure enthielt, die dem gebildeten weinsteinsauren Blei vollständig entsprechend war. Die so gewonnene Säure besass alle Eigenschaften der Weinsteinsäure und hatte keine Modification erlitten.

In dem Falle, wo das weinsteinsaure Bleioxyd ganz allein den Niederschlag bildete, enthielt die neutralisirte Flüssigkeit nur salpetersaures Ammoniak und salpetersaures Bleioxyd, während bei der Einwirkung der Weinsteinsäure auf Bleisuperoxyd eine Bildung von kohlensaurem Bleioxyd stattgehabt hatte. Dieser letzte Versuch, welcher deutlich darthut, dass die Weinsteinsäure mit Hülfe des Bleisuperoxyds sich in Ameisensäure umwandeln kann, ohne dass Schwefelsäure gegenwärtig ist, ist nichts desto weniger ungenügend für die Rechtsertigung der Ansicht, die ich aufzustellen wünsche, nämlich, dass die Umwandlung der Weinsteinsäure durch die Superoxyde in Folge einer Einwirkung stattfindet, die mit den so interessanten Erscheinungen des Wasserstoffsuperoxyds übereinkommt, und dass sie unabhängig von der angenommenen Austreibung eines Aequivalentes Sauerstoff ist; denn man könnte mir entgegnen, dass ein Theil der Weinsteinsäure dieselbe Rolle spiele wie die Schwefelsäure, das heisst, dass dieser Theil die Zersetzung des Superoxyds bewirke, indem er sich des Bleioxyds bemächtige, und dass das von der Weinsteinsäure aus dem Superoxyd verdrängte Aequivalent Sauerstoff dann dieselbe Rolle spiele wie das von der Schwefelsäure verdrängte Sauerstoffäquivalent.

Dieser Einwurf scheint um so besser begründet zu sein, da bisweilen unter der Zahl der durch diese Reaction erhaltenen Producte das weinsteinsaure Bleioxyd auftritt. Betrachtet man jedoch aufmerksamer die Erscheinungen bei dieser Einwirkung, so findet man eben in der Bildung des weinsteinsauren Bleisalzes einen Beweis zu Gunsten der Meinung, welcher ich Geltung zu verschaffen suchen will. Wäre nämlich wirklich die Umwandlung der Weinsteinsäure durch Bleisuperoxyd von der vorgängigen Ausscheidung eines Sauerstoffäquivalentes und mithin von der Bildung eines Aequivalentes von weinsteinsaurem Blei abhängig, so hätte nothwendig immer und in unwandelbarer Quantität dieses Salz unter der Zahl der Producte auftreten müssen, die ihre Entstehung der Einwirkung, welche diese beiden Verbindungen auf einander ausüben, verdanken. Das aber fand nicht statt, da, wie ich oben sagte, es Fälle giebt, wo man keine Spur von weinsaurem Salze findet. Wenn ich auch durch diese Erörterung den Einwurf, den man mir machen könnte, zurückgewiesen habe, so ist doch die Thatsache einer Bildung von weinsaurem Blei entschieden und muss gleichfalls ihre Erklärung finden.

Es genügt schon die Erinnerung, dass 1 Aeq. Weinsteinsäure 3 Aeq. Bleisuperoxyd erfordert, um in Ameisensäure überzugehen, und dass in diesem Falle 3 Aeq. Bleioxyd frei werden, wovon nur 1 Aeq. sich mit der Ameisensäure verbindet, indess die beiden anderen frei oder in Verbindung mit Kohlensäure Jetzt ist die Weinsteinsäure in genauer Bezurückbleiben. rührung mit ameisensaurem und kohlensaurem Blei und zersetzt diese Salze, um das unlösliche weinsteinsaure Bleioxyd zu bilden, wobei es die Ameisensäure und Kohlensäure frei macht. So also muss man, um nicht zuzugeben, was nicht sein kann, nämlich dass die Einwirkung des Bleisuperoxyds auf Weinsteinsäure an allen Puncten zugleich stattfinde, so, sage ich, muss man sich die Wechselwirkung der Weinsteinsäure und des Superoxyds vorstellen, als bewirke sie zu Anfang die Bildung einer gewissen Menge basisch-ameisensauren Salzes, welches nun in Berührung mit der Weinsteinsäure bald zersetzt wird, um sich theilweise in neutrales lösliches ameisensaures und unlösliches weinsaures Salz zu zerlegen. Füge ich noch hinzu, dass, wenn sich letzteres Salz nicht immer unter der

Zahl der Zersetzungsproducte findet, nothwendig folgt (wenn anders meine Weise der Betrachtung die rechte ist), dass das weinsteinsaure Bleioxyd selbst eine directe Zersetzung von Seiten des Superoxyds erleide, und diess zu behaupten, gestattet mir der nachfolgende Versuch.

Ich brachte gleiche Theile weinsteinsaures Salz und Superoxyd zum Sieden; eine Reaction trat ein, die durch die Umänderung des Sättigungszustandes der Flüssigkeit deutlich wurde, da letztere sehr bald alkalisch wurde und sich schleunigst an der Lust trübte, indem sie einen Niederschlag von Carbonat absetzte. Filtrirt und abgedampst, lieserte sie vollkommen weisse Krystalle, die nur Bleioxyd und Ameisensäure enthielten, im Verhältniss von 2 Aeq. Basis auf 1 Aeq. Säure. Dieser letzte Versuch erklärt doch deutlich, wie es zugeht, dass man durch eine mehr oder weniger verlängerte Einwirkung oder durch genügende und nicht genügende Mengen von Bleisuperoxyd aus der letztern Verbindung und Weinsteinsäure bald weinsteinsaures und ameisensaures Bleioxyd, bald basisch-ameisensaures und kohlensaures Bleioxyd, bald ein Gemenge aller dieser Salze, und in stets veränderlichen Verhältnissen, erhalten kann. genommen, man bediente sich eines Ueberschusses von Bleioxyd, z. B. 4 Aeq. auf 1 Aeq. Weinsteinsäure, und hemmte dann die Einwirkung in dem Augenblicke, wo die Flüssigkeit neutral zu sein aufhört, d. h. wenn sie eine alkalische Reaction zu geben anfängt, so würde man in der Flüssigkeit neutrales ameisensaures Bleioxyd und in dem unlöslichen Niederschlage weinsteinsaures Salz und Superoxyd antreffen, Verbindungen, welche man leicht mit Hülfe von Salpetersäure von einander Wenn man, statt so die Reaction zu unterbrechen, dieselbe ruhig gehen lässt, so tritt bald ein Augenblick ein, wo das weinsteinsaure Salz verschwindet, um durch kohlensaures ersetzt zu werden; die Flüssigkeit hält dann nur noch basischameisensaures Bleioxyd aufgelöst und der unlösliche Rückstand wird dann nur von kohlensaurem Salz und Bleisuperoxyd gebildet.

Nachdem so die Wirkung des Bleisuperoxyds auf Weinsteinsäure untersucht war, habe ich die des Mangansuperoxyds auf dieselbe Säure studirt, und zwar indem ich künstliches und natürliches Superoxyd anwandte. In beiden Fällen wurde die Weinsteinsäure in Kohlen- und Ameisensäure umgewandelt, wie

es bei dem Bleisuperoxyd stattgefunden hatte. Indess will ich aufmerksam darauf machen, dass die mit Hülfe des natürlichen Mangansuperoxyds hervorgebrachte Ameisensäure stets von einem färbenden Stoffe begleitet ist, der bemerkbar wird, wenn man dieselbe an Bleioxyd bindet; denn das so erhaltene ameisensaure Salz hat eine isabellgelbe Färbung, von der es schwer zu befreien und die dem reinen Salz nicht eigenthümlich ist.

Um mich endlich noch zu versichern, ob die Analogie zwischen Blei- und Mangansuperoxyd sich längere Zeit erhielte und ob das letztere im Stande wäre, die Weinsteinsäure in weinsteinsaures Bleioxyd umzuändern, liess ich einen Theil weinsteinsaures Bleioxyd mit einem Theile Mangansuperoxyd sieden. Alsbald wurde die Flüssigkeit alkalisch, und es war leicht, durch gelindes Abdampfen das ameisensaure Blei- und Manganoxyd daraus zu erhalten.

Aus den in dieser Mittheilung angedeuteten Experimenten kann man mit dem Verfasser schliessen:

- 1) dass die Weinstein-, Trauben- und Schleimsäure, seien sie frei oder an Bleioxyd gebunden, in Kohlen- und Ameisensäure durch die Superoxyde von Blei und Mangan ohne Dazwischenkunst einer Säure umgewandelt werden;
- 2) dass die Citronen- und Gallussäure von den Superoxyden auf gleiche Weise, aber ohne Bildung der Ameisensäure, zersetzt werden.

Nach Vorlesung dieses Berichtes nimmt Herr Biot das Wort, um die Bemerkung zu machen, wie wünschenswerth es sei, dass die Zersetzungsphänomene, die ihren Gegenstand ausmachen, mittelst löslicher, in durchsichtigen Auflösungen enthaltener Substanzen ausgeführt werden könnten. Denn da die Weinsteinsäure das rotatorische Vermögen besitze und mit besonderen Modificationen allen Körpern, mit denen sie in Verbindung trete, mittheile, so würde man die Weise und den Vorgang ihrer Zersetzung so betrachten und in allen ihren Phasen verfolgen können, als wenn sie den Augen sichtbar würden.

III.

Ueber die Zusammensetzung der krystallisirten Citronensäure.

Von

R. F. MARCHAND.

Vor einiger Zeit hat Wackenroder eine Untersuchung über den Wassergehalt der krystallisirten Citronensäure bekannt gemacht, durch welche er sich nachzuweisen bemüht, dass die frühere Annahme, es gebe mehr als Ein Hydrat der Citronensäure, falsch sei *). Das Resultat, zu dem er durch eine Reihe von Versuchen, die er durch eine Verbrennung der Citronensäure unterstützte, gelangt ist, besteht darin, dass die krystallisirte Säure unter allen Umständen aus C₁₂H₁₆O₁₄ bestände, also dieselbe Zusammensetzung habe wie die bei 100° getrocknete, dass 7,8% Wasser, welche die käufliche Säure beim Erhitzen abgab, nur hygroskopisch seien, dass endlich die käufliche Säure, deren Krystallform von Brooke und Gmelin beschrieben ist, die einzige sei, in welcher die Säure erhalten werden könne.

Diese Angaben widersprechen den Erfahrungen von I.. Gmelin, Berzelius, Prout u. A., sie widersprechen meinen eigenen Erfahrungen, welche ich bei einer sorgfältigen Untersuchung über die Constitution der Säure gemacht habe. Ich theile diese daher hier mit, indem ich bemerke, dass ich sie nach dem Erscheinen der Wackenroder'schen Abhandlung noch einer genauen Revision unterworfen habe.

Käufliche Citronensäure, welche aus grossen Krystallen bestand, wurde zerrieben, zwischen Fliesspapier stark gepresst und ohne weitere Trocknung der Analyse unterworfen.

0,4825 Gr. gaben 0,600 C und 0,211 H oder 34,43% C und 4,86% H.

Da zu vermuthen war, dass diese Säure wohl noch etwas mechanisch anhängendes Wasser einschloss, so wurde eine grosse Menge, gegen 500 Gr., in Wasser aufgelöst, ohne diess damit vollständig zu sättigen, und die Flüssigkeit bei einer Temperatur, welche nicht 50° C. erreichte, abgedampft.

^{*)} Archiv der Pharmacie, Bd. XXIII. S. 267.

Die Säure krystallisirte in grossen wasserklaren Krystaln heraus, welche mit der Form, die Brooke beschrieben
nt **), vollständig übereinstimmten. Es sind kurze Säulen,
elche dem 1- und 1axigen Systeme angehören.

Kleine Krystalle wurden ausgewählt, zerrieben und, obeich sie vollständig trocken erschienen, zwischen Fliesspapier ! Stunden sehr stark ausgepresst und analysirt.

0,4905 Gr. gaben 0,612 C und 0,2065 H oder 34,55% C und 4,67% H.

Man sieht, diese Analyse stimmt mit der der käuflichen fure in so weit überein, dass man in der käuflichen noch eine zinge Menge von hygroskopischem Wasser annehmen darf. e Säure wurde jetzt noch einmal aufgelöst, wiederum unter nselben Umständen zur Krystallisation gebracht und analysirt.

0,480 Gr. gaben 0,604 C und 0,201 H oder 34,79% C und 4,65% H.

Es wurden nun 1,947 Gr. dieser krystallisirten Säure in n luftleeren Raum über Schwefelsäure gebracht, sie verloren rin 0,163 Gr. Wasser oder 8,38%.

Durch Erhitzen lässt sich der Wassergehalt der Säure cht so leicht genau bestimmen, da sie schon beim beginnenn Schmelzen eine wesentliche Veränderung erleidet, sogar t schon vor dem Schmelzen Dämpfe von Aceton entwickelt. eberhaupt kann ich die Methode, Krystallwasser zu bestimmen, mentlich bei leicht zersetzbaren organischen Verbindungen, inm man sie in das Vacuum über Schwefelsäure bringt, nicht nug empfehlen; sie ist sicher, leicht ausführbar und nicht itraubend, jedoch nicht immer anwendbar, da viele Substanndas Wasser unter diesen Umständen nicht verlieren.

Aus diesen angeführten Analysen ergiebt sich für die Zummensetzung dieser Säure die Formel $C_{12}H_{20}O_{16}$.

			1.	2.	3.
12C	917,22 =	34,77	34,43	34,55	34,79
20H	124,75 ==	4,56	4,86	4,77	4,65
160	1600,00 ==	60,67	60,71	60,68	60,56
	2641,97	100,00	100,00	100,00	100,00.

^{*)} Annals of Philosophy; new ser. by Phillips. T. VI. p. 119.

62 Marchand, über die Zusammensetzung der

Diese Zusammensetzung stimmt genau mit der überein, welche Prout vor langer Zeit schon gefunden hat. Dieser geschickte Chemiker, dessen Analysen mit so bewunderungswürdiger Genauigkeit ausgeführt zu sein pflegen, fand die Säure bestehend aus:

Prout giebt dabei nicht an, wie er die Säure bereitet habe, doch ist es wahrscheinlich, dass er sie auf dieselbe Weise erhalten hat wie ich, und wie auch die käufliche Säure dargestellt wird.

Wenn diese Säure mit Basen verbunden wird, so verliert sie 4 At. Wasser oder $17,03\frac{0}{0}$. Im Vacuum giebt sie die Hälfte davon ab, $8,51\frac{0}{0}$. Ich fand den Verlust zu $8,38\frac{0}{0}$.

Die Säure, welche im Vacuum getrocknet worden war, wurde jetzt der Analyse unterworfen; es war zu vermuthen, dass sie dieselbe Zusammensetzung zeigen würde wie die bei 100° getrocknete.

0,4525 Gr. gaben 0,617 Gr. C und 0,175 Gr. H oder 37,87% C und 4,30% H.

Daraus ergiebt sich die Formel $C_{12}H_{16}O_{14}$. Diese verlangt:

$$\begin{array}{r}
 12C \quad 917,22 = 37,94 \\
 16H \quad 99,84 = 4,13 \\
 140 \quad 1400,00 = 57,93 \\
 \hline
 2417,06 \quad 100,00.$$

Kohlenstoff 34,28 Sauerstoff 22,87 Wasser 42,85.

Es entsprechen nun 42,85 Wasser aber 4,76 Wasserstoff.

^{*)} In Poggend. Ann. B. XXVII. S. 299, wo Berzelius diese Analyse von Prout citirt, befindet sich vermuthlich ein Druckfehler im Wasserstoff, welcher dort zu 8,76 angegeben ist. Die Analyse, welche Berzelius hier erwähnt, befindet sich in den Ann. de Chim. et de Phys. T. XXXVI. p. 376, wo angegeben ist, die Säure bestände aus:

Es bat also die Säure in der That zwei Atome Wasser verloren. Sie kann bekanntlich noch zwei und unter gewissen Umständen drei Atome Wasser verlieren und würde sodann in den Salzen die Verbindung C₁₂H₁₂O₁₂ oder C₁₂H₁₀O₁₁ darstellen. Diese Versuche, glaube ich, beweisen hinreichend die Existenz der krystallisirten Verbindung C₁₂H₂₀O₁₆, welche von Wackenroder in Zweisel gezogen ist; sie zeigen zugleich, dass die Brooke'sche Form eben diese Zusammensetzung besitzt. Ich habe diese Versuche, um jedem möglichen Irrthume zu begegnen, noch einige Male wiederholt und sie durch andere Personen wiederholen lassen. Die Zahlen, welche dabei erhalten sind, brauche ich nicht anzuführen, da sie vollständig mit denen übereinstimmen, welche ich mitgetheilt habe. Ich bemerke noch, dass Berzelius gleichfalls angiebt, dass die käufliche lufttrockne Säure bei 100° C. 8,5% Wasser verlor und durch Bleioxyd gleichfalls noch 8,5% Wasser abgab *), dass es also überflüssig war, diesen Versuch zu wiederholen.

Berzelius führt dabei an, dass er eine anders krystallisirte Säure erhalten habe, die auch anders zusammengesetzt sei, als er die gewöhnliche Säure in Wasser von 100° bis zur Sättigung auflöste und die Flüssigkeit nun erkalten liess. schreibt dieser Säure die Zusammensetzung C4H4O4+H2O zu, jedoch ohne sie analysirt zu haben, sondern nur in Folge einer Bestimmung der Wassermenge, welche sie, mit Bleioxyd zusammengebracht, abgeben kann. Er fand, dass 100 Theile dieser Säure dabei 148 Wasser abgeben könnten. Da damals noch nicht bekannt war, dass die Citronensäure leicht aus der Zusammensetzung $C_4H_4O_4$ in die $C_{12}H_{10}O_{11}$ übergehen kann, so nahm Berzelius damals natürlich an, die krystallisirte Saure sei C4H4O4+H2O, und dieses Atom Wasser werde durch die Basis ausgetrieben. Der Wassergehalt würde 13,340 bealso ungefähr mit dem gefundenen Verluste übereinstimmen.

Wackenroder bezweiselt die Existenz dieser zweiten Krystallform, da er sie niemals bei der käuslichen Säure ange-

^{*)} Poggend. Ann. B. XXVII. S. 300.

troffen und sie auch nicht darzustellen vermochte. Man erhält sie ohne alle Schwierigkeit und ganz sicher, wenn man die gewöhnliche käufliche Säure in siedendem Wasser auflöst, so lange in der Siedehitze abdampst, bis sich eine Krystallhaut zeigt, und sie bei gewöhnlicher Temperatur, oder auch bei + 2° bis +10°C. erkalten lässt. Ueber Nacht hat sich eine grosse Menge von Krystallen ausgeschieden, welche sich augenblicklich durch ihre Formenverschiedenheit vor der gewöhnlichen Säure auszeichnen. Die Mutterlauge wurde gleichfalls zur Krystallisation ruhig hingestellt, es krystallisirten die gewöhnlichen Krystalle heraus, wie es schon von Berzelius beobachtet worden war.

Obwohl die äussere Form schon die Identität dieser Krystalle mit den zuerst analysirten feststellte, so analysirte ich diese dennoch und zwar mit folgendem Resultat:

0,501 Gr. gaben 0,630 Gr. C und 0,208 H oder 34,75% C und 4,61% H.

Es ist diess genau die oben gefundene Zusammensetzung. Die zuerst herauskrystallisirte Säure wurde jetzt gepresst und sogleich analysirt:

0,490 Gr. gaben 0,647 C und 0,189 H oder 36,518 C und 4,308 H.

Eine zweite Portion, welche etwas länger an der Luft gelegen hatte, gab fast dasselbe Resultat:

0,4825 Gr. gaben 0,638 C und 0,190 H oder .36,568 C und 4,378 H.

Diess entspricht genau der Berzelius'schen Formel C_4 H_4O_4+aq .

Ich glaubte hierdurch die völlige Gewissheit erreicht zu haben, dass wirklich diese Säure so zusammengesetzt sei. Als ich jedoch 1,822 Gr. derselben in das Vacuum über Schwefelsäure brachte, bemerkte ich zu meinem Erstaunen eine Gewichtsabnahme von 0,042 Gr. oder 2,2%. Bei einem zweiten Versuche fand ich 2,3% aq. 1,539 Gr. wurden mit Bleioxyd und Was-

r digerirt, bei 100° getrocknet, dieser Temperatur aber nicht nge ausgesetzt; ich fand einen Gewichtsverlust von 0,035 Gr. er 2,2%. Diess war um so überraschender, da nach Gme-n's Erfahrung die Säure selbst bei 100° kein Wasser abebt, nach Berzelius indessen mit Bleioxyd 14% verliert. In iden Fällen fand ich nur 2,2% Verlust.

Ich verbrannte daher jetzt die Säure, welche ich im Vaum getrocknet hatte:

0,4998 Gr. gaben 0,678 Gr. C und 0,192 Gr. H oder 37,710 C und 4,270 H.

Die Säure hatte ihre Zusammensetzung also wesentlich rändert; sie war jetzt ganz nach der Formel $C_{12}H_{16}O_{14}$ zummengesetzt. Wollte man annehmen, dass die 2,2% Wasser der That zur Zusammensetzung gehörten, so würden sie für se Formel $\frac{1}{2}$ Atom ausmachen, und die krystallisirte Säure isste dann nach der Formel $C_{12}H_{17}O_{14\frac{1}{2}}$ zusammengesetzt in. Diese würde freilich 37,08% C und 4,36% H und in m halben At. Wasser 2,3% aq. enthalten, indessen leuchtet ungereimtheit dieser Formel von selbst ein.

Bei dem Aufenthalt im Vacuum wurden die Krystalle trotz res Verlustes nicht trübe, sie blieben durchsichtig und hienen in der That nur hygroskopisches Wasser abzugeben. e Richtigkeit dieser Annahme ergab sich aus den folgenden alysen, welche mit der krystallisirten Säure angestellt waren, zum Theil in verschlossenen Gefässen eine Zeitlang aufbeihrt, theils an der Luft getrocknet worden war; beide hatten! Ansehen nicht verändert.

0,325 Gr. gaben 0,441 Gr. C und 0,121 Gr. H oder 37,518 C und 4,136 H.

0,4755 Gr. gaben 0,649 Gr. \ddot{C} und 0,187 Gr. \ddot{H} oder $37,74\frac{0}{0}$ C und 4,36 $\frac{0}{0}$ H.

0,509 Gr. gaben 0,696 Gr. \ddot{C} und 0,194 Gr. \ddot{H} oder 37,80 $\frac{9}{6}$ C und 4,23 $\frac{9}{6}$ H.

Es ergiebt sich aus diesen Analysen nun in der That, dass Verbindung gleichfalls durch die Formel dargestellt wird, elche der bei 100° getrockneten Säure zukommt, wie auch st zu vermuthen war, da diese Verbindung aus der siedenn Auslösung beraus krystallisirt, und dass jener Verlust im hlenstoff bei der Analyse, so wie der der 2,2° Wasser im Journ. f. prakt. Chemie. XXIII. 2.

Vacuum eben nur auf mechanisch anhängendes Wasser zu schieben sei. Dass diese Form im Handel nicht vorkommt, ist sehr natürlich, da sie schwieriger darzustellen ist und die Fabricanten schon ihres Vortheils halber die wasserhaltigere Form hervorzubringen suchen.

Es bleibt nun noch übrig, den Wasserverlust zu erklären, welchen Berzelius bei seiner Säure gefunden hat, als er sie mit Bleioxyd zusammenbrachte. Wir müssen annehmen, dass er das Gemisch ausserordentlich lange und vielleicht auch etwas über 100° erhitzte; letzteres ist jedoch nicht nöthig; dann kann sehr wohl die Säure $C_{12}H_{16}O_{14}$ in die Verbindung $C_{12}H_{10}O_{11}$ übergegangen sein, welche sich ja bekanntlich bei der Erbitzung der citronensauren Salze leicht bildet. Dabei würden 2417 Th. Säure 3 At. Wasser oder 337,44 Th. Wasser verlieren, oder $13,9\frac{\circ}{0}$, was genau mit der von Berzelius angegebenen Menge übereinstimmt.

Die Krystallformen *) der beiden Säuren sind ebenfalls von einander verschieden; wenn sie auch beide zu dem 1und 1axigen Systeme gehören, so ist ihr Habitus doch ganz wesentlich von einander verschieden. Obgleich die Flächen der Krystalle keine scharfe Winkelbestimmung zuliessen, so ergab sich doch mit grosser Wahrscheinlichkeit für die Säure C₁₃
H₁₆O₁₄ eine andere Form, als für die gewöhnliche Säure.

Bei dieser Untersuchung bin ich auf eine neue Modification der Citronensäure aufmerksam geworden, welche sich wesentlich von den schon bekannten, der Aconitsäure u. s. w., unterscheidet. Mit der Untersuchung derselben in diesem Augenblick beschäftigt, hoffe ich in Kurzem im Stande zu sein, ausführliche Rechenschaft von derselben abzulegen.

^{*)} Herr Prof. G. Rose hatte die Güte, die Bestimmung der Krystalle mit der bekannten zuvorkommenden Gefälligkeit auszuführen.

IV.

Ueber die Producte der Einwirkung des Kali auf das Indigblau.

Von

J. FRITZSCHE.

(Aus dem Bulletin scientifique, Tom. VIII.)

In meiner Abhandlung über das Anilin *) habe ich bereits erwähnt, dass sich bei der ersten Einwirkung des Kali
auf den Indigo eine eigenthümliche Säure bilde, deren Untersuchung ich mir deshalb vorbehielt, weil die dabei gleich im
Beginne sich mir darbietenden Schwierigkeiten keine baldige
Beendigung derselben hoffen liessen. Es war nun zwar meine
Absicht, nicht früher auf diesen Gegenstand zurückzukommen,
als bis es mir möglich sein würde, den ganzen Zersetzungsprocess mit allen seinen Erscheinungen und Producten vollständig darzulegen; da ich jedoch von diesem Ziele noch immer
weit entfernt bin, so halte ich es für besser, diesem Vorsatze
untreu zu werden, und will daher jetzt eine Uebersicht meiner
bisherigen Untersuchungen in der Hoffnung geben, dass es mir
in der Folge gelingen wird, alles darin noch Dunkle aufzuklären.

Wenn man Indigblau **) mit einer wässrigen Lösung

^{*)} Leider hatte ich damals das von Unverdorben entdeckte Krystallin übersehen, sonst würde ein Blick auf die Eigenschaften desselben hingereicht haben, es ohne weiteres für identisch mit dem von mir auf anderem Wege erhaltenen Körper zu erklären. Das Anilin ist in der That nichts anderes als Unverdorben's Krystallin; wenn ich aber dennoch für dasselbe den neuen Namen beibehalte, so geschieht es, weil dieser unstreitig geeigneter ist, zum Ausgangspuncte für die Nomenclatur der ihm verwandten Körper zu dienen, als der alte, den schon Berzelius (Jahresber. VII. 8.346) nicht gut gewählt nennt.

^{**)} Bei der Darstellung des Anilin hatte ich mich des rohen käuflichen Indigo's bedient, weil wegen der Flüchtigkeit des zu er haltenden Productes die darin ausser dem Indigblau enthaltenen Substanzen von keinem Nachtheile waren; sie mussten jedoch hinderlich sein, als es sich darum handelte, die erste Einwirkung des Kali auf das Indigblau zu studiren, wobei kein flüchtiges Product sich erzeugt, und ich habe mich daher bei den vorliegenden Untersuchungen stets des durch Reduction gewonnenen Indigblau's bedient.

68 Fritzsche, üb. die Producte der Einwirkung des

von Aetzkali kocht, so findet nur eine geringe Einwirkung statt, so lange die Kalilösung nicht sehr concentrirt ist; Flüssigkeit nimmt zwar eine gelbe Farbe an, allein bei weitem der grösste Theil des Indigblau's bleibt unzersetzt, und erst wenn bei fortgesetztem Kochen der Siedepunct der Flüssigkeit bis auf + 150° C. ungefähr gestiegen ist, wird die Einwirkung energisch und die Zersetzung vollständig. Die Farbe des Indigblau's wird nun vollkommen zerstört und es bildet sich eine gelbrothe Flüssigkeit, in welcher, je nach der Menge des angewandten Indigblau's und je nach gewissen Abanderungen im Verfahren mehr oder weniger von einer fein vertheilten dunkelsarbigen Substanz herumschwimmt. Bei fortgesetztem Eintragen von Indigblau in diese auf 150° erhaltene Flüssigkeit tritt nun bald auch eine Ausscheidung kleiner Krystalle ein, und obgleich dann noch immer ein grosser Ueberschuss von Kali vorhanden ist, thut man doch besser, die Operation zu unterbrechen und die Flüssigkeit erkalten zu lassen. Beim Erkalten erstarrt nun gewöhnlich die ganze Flüssigkeit zu einer krystallinischen Masse, theils durch Ausscheidung eines gelben Kalisalzes, theils durch Krystallisation des überschüssigen Aetzund je nachdem mehr oder weniger Wasser verdampft war, hat man entweder eine trockne Salzmasse erhalten, oder sie ist noch von einer gelbgefärbten Kalilauge durchdrungen.

Bei dieser Zersetzugn hat sich kein flüchtiges Product gebildet. Nimmt man sie in einer Retorie vor, so erhält man als Destillat eine wässrige Flüssigkeit, welche kaum Spuren von Ammoniak enthält, und der geringe Geruch nach Anilin, welcher sich gewöhnlich zeigt, rührt von dem stärkeren Erhitzen einer kleinen Menge der Flüssigkeit oberhalb ihres Randes her. Mit einer durch Wasser gesperrten Glocke in Verbindung gebracht, wobei man das Rohr der Retorte über das Wasser münden lässt, findet man nach vollendeter Operation und vollständigem Erkalten keine Vermehrung des Gasvolumens, sondern eher eine durch Absorbiren von Sauerstoff hervorgebrachte Verminderung desselben, und es findet also auch keine Gasentwickelung statt.

Das Hauptproduct der Zersetzung ist das gelbe Kalisalz, in welches die grösste Menge des Indigblau's umgewandelt worden ist, und in ihm ist die bereits im Eingange erwähnte Säure

enthalten. Die dunkelsarbige Substanz scheint nur ein Nebenproduct zu sein; es giebt dieselbe jedoch Veranlassung zu interessanten Erscheinungen beim Behandeln der erhaltenen Salzmasse mit Auflösungsmitteln, und ich will daher zuerst das
Wenige mittheilen, was mir über sie auszumitteln gelungen ist.

Was zuerst die Menge der dunkelsarbigen Substanz betrifft, so richtet sich diese nach der Art des Verfahrens; meisten erhält man davon, wenn man Indigblau mit Wasser zu einem dünnen Brei anrührt, diesen zum Kochen erhitzt und nun so lange Aetzkali in Stücken hinzusetzt, bis die Temperatur unter fortwährendem Kochen bis auf 150° C. gestiegen ist. In weit geringerer Menge bildet sie sich, wenn man sich zuerst eine bei 150° C. kochende Kalilösung bereitet und in dieselbe bei der Siedehitze Indigblau in kleinen Mengen einträgt; in beiden Fällen ist sie jedoch so durch die ganze Masse vertheilt, dass es mir nicht gelang, sie mechanisch abzuscheiden, um sie getrennt untersuchen zu können. Man kann zwar aus der erhaltenen Masse den grössten Theil des überschüssigen Kali dadurch entfernen, dass man die Masse zwischen zwei Ziegelsteine legt und von ihnen sowohl die darin schon enthaltene, als auch die durch das Zersliessen des Kali an der Luft noch sich bildende Flüssigkeit einsaugen lässt; allein das dann zurückleibende Gemenge des gelben Salzes mit der dunkelfarbigen Substanz giebt keine günstigeren Resultate bei den Versuchen, seine beiden Gemengtheile zu trennen, als die Masse selbst, und da es mir demnach nicht gelang, ein Auflösungsmittel zu finden, welches nur auf eine der beiden Substanzen wirkte, so habe ich sie nur mit einander gemengt untersuchen können.

Uebergiesst man die auf die eine oder die andere Art erhaltene Masse mit Wasser, so scheidet sich augenblicklich eine grosse Menge Indigblau in demselben Zustande aus, wie diesz bei einer alkalischen Auflösung von reducirtem Indigo stattfindet, und verfolgt man die Einwirkung des Wassers unter dem Mikroskope, so erkennt man deutlich, dass die Ausscheidung des Indigblau's von der dunkelfarbigen Substanz ausgeht. Filtrirt man die erhaltene Auflösung sogleich, so sieht man auch in der durchgelaufenen Flüssigkeit bei der Berührung mit der atmosphärischen Luft noch viel Indigblau sich abscheiden, und

70 Fritzsche, üb. die Producte der Einwirkung des

erst nach längerem Stehen an der Lust hört diese Ausscheidung aus. Sie wird jedoch nicht einzig und allein durch die dunkelfarbige Substanz hervorgebracht, sondern sie hat auch, obgleich in weit geringerm Grade, ihren Grund in der Kinwirkung des überschüssigen Aetzkali auf das gelbe Salz, und um diese zu vermeiden und einem Verluste an der neuen Säure vorzubeugen, thut man besser, der Auslösung sogleich so lange eine Säure hinzuzusetzen, bis der grösste Theil des überschüssigen Kali gesättigt ist. Es bildet sich dann ein blaugrüner Niederschlag und man erhält beim Filtriren eine goldgelbe Flüssigkeit, welche kein Indigblau mehr absetzt. Aus dieser Flüssigkeit erhält man nun durch einen Ueberschuss von Säure einen reichlichen slockigen, voluminösen, rothbraunen Niederschlag, und dieser ist eine neue Säure, von welcher ich bald ausführlicher handeln werde.

Wendet man statt des Wassers Alkohol zur Auflösung der in Rede stehenden Masse an, so erhält man eine intensiv dunkelgrün gefärbte Auflösung, aus welcher sich nicht unter allen Umständen Indigblau abscheidet, sondern gewöhnlich nur dann, wenn die dunkelfarbige Substanz in grosser Menge vorhanden war. Die Abscheidung erfolgt danu ebensalls unter Ausnahme von Sauerstoff, das Indigblau sondert sich aber hier in krystallinischem Zustande als sehr dünne vierseitige Blättchen ab. Die grüne Farbe der Flüssigkeit stellt in keiner Verbindung mit dieser Abscheidung von Indigblau, denn nach beendigter Abscheidung ist die Flüssigkeit noch immer intensiv grün gefärbt, und aus ihr erhält man nun, wenn man sie in Wasser giesst, dem man vorher eine zur Uebersättigung hinreichende Menge Säure hinzugesetzt hat, einen reichlichen Niederschlag von der rothbraunen Säure. Lässt man jedoch die grüne weingeistige Lösung längere Zeit mit der atmosphärischen Luft in Berührung, so nimmt sie Sauerstoff aus derselben auf und es geht ihre grüne Farbe dabei allmählig in eine hellbraune über. Diese Farbenveränderung hat ihren Grund in einer Zerstörung der rothbraunen Säure, welche sich dabei in eine zweite neue Säure umwandelt, auf die ich weiter unten ebenfalls ausführlich zurückkommen werde.

Die rothbraune Säure, zu deren Beschreibung ich nun

übergehe, nenne ich, ihrer Verwandtschaft mit dem Anilin und der goldgelben Lösungen wegen, welche ihre alkalischen Salze geben:

Chrysanilsäure.

Dem, was im Vorhergehenden bereits über die Darstellung dieser Säure gesagt ist, habe ich noch hinzuzufügen, dass man die die Säure enthaltende Salzmasse auch unmittelbar mit einem angesäuerten Wasser übergiessen kann; nach vollendeter Zersetzung filtrirt man, trägt die auf dem Filter gebliebene unreine Säure in eine grössere Menge Wasser ein und setzt demselben so lange tropfenweise Aetzkalilösung zu, als die Flüssigkeit noch eine rein goldgelbe Farbe behält, worauf man filtrirt und von Neuem durch Säure fällt. Wenn man sowohl in diesem Falle als auch bei der Reinigung der Chrysanilsäure überhaupt zu viel Actzkali anwendet, so verliert die Flüssigkeit ihre goldgelbe Farbe und nimmt dafür eine grünliche an. Diess muss man sorgfältig vermeiden, weil dann nicht allein schon wieder ein Theil des Rückstandes mit aufgelöst worden ist, sondern auch ein Ueberschuss von Kali bald eine Zersetzung in der Flüssigkeit bewirkt, welche sich dadurch zu giebt, dass sie sich bald mit einer dünnen Haut von Indigblau Man muss dann wieder ein wenig Säure hinzusetzen, bis die Flüssigkeit wieder rein gelb geworden ist; es muss diess jedoch sehr allmählig geschehen, weil die Sättigungscapacität der neuen Säure sehr gering ist. Es dürfen ferner die Flüssigkeiten nicht concentrirt angewandt werden, weil das chrysanilsaure Kali, obgleich es im Allgemeinen leicht löslich ist, doch zuweilen, und namentlich, wenn die Flüssigkeit einigermaassen erhebliche Mengen anderer Salze aufgelöst enthält, daraus niederfällt und einen Verlust verursachen wür-So muss man auch das Filter beim Filtriren der goldđe. gelben Flüssigkeit erst vollkommen auslaufen lassen, es mit Wasser nachspült, und das Nachspülwasser darf nicht mit der gelben Flüssigkeit gemischt werden, weil es gewöhnlich eine grüngelbe Farbe besitzt und keine reine Säure bei der Präcipitation giebt. Endlich noch thut man wohl, die gelbe Flüssigkeit aus dem Filter unmittelbar in verdünnte Säure fallen zu lassen, weil sonst bei verzögertem Filtriren bisweilen die

durchgelausene Flüssigkeit sich mit einer Haut überzieht, und die Säure muss im Ueberschusse angewandt werden, damit nicht mit der neuen Säure zugleich sich ihr Kalisalz niederschlagen könne.

Die auf diese Weise erhaltene Säure bildet einen flockigen voluminösen Niederschlag, dessen Farbe am besten mit der des frisch gefällten Kermes verglichen werden kann. ist bald heller, bald dunkler, und zwar um so heller, je grösser der Ueberschuss an Säure in der Flüssigkeit ist; diese hellere Färbung ist aber nicht bleibend, sondern geht beim Auswaschen nach und nach wieder in die dunklere über. Beim Trocknen schrumpft der Niederschlag, welcher auch unter dem Mikroskope keine Spur einer krystallinischen Structur zeigt, unter grosser Verringerung des Volumens zu einer leicht zerreillichen formlosen Masse zusammen und nimmt dabei gewöhnlich cine dunkelbraunrothe Farbe an, welche sich jedoch zuweilen in eine dunkelgrüne umwandelt. In seltenen Fällen behält die Säure beim Trocknen die Farbe, welche sie unmittelbar nach der Fällung zeigte, auch die dunklen Nüancen aber geben beim Zerreiben ein hellbraunrothes Pulver.

In Wasser ist die Chrysanilsäure sehr wenig löslich, sie theilt ihm jedoch eine hellgelbe Farbe mit; weit löslicher ist sie in Weingeist, der damit eine rothgelbe Auflösung bildet. In einer körnig krystallinischen Form kann man sie erhalten, wenn man ein Gemenge von gleichen Theilen Alkohol und Wasser in der Siedehitze damit sättigt, dann filtrirt und erkalten lässt, wobei sich der grösste Theil des aufgelöst gewesenen in dichten sternförmigen Gruppen sehr feiner und kurzer, auch unter dem Mikroskope nur schwierig erkennbarer Nadeln wieder absetzt. In Alkalien löst sich die Chrysanilsäure leicht mit goldgelber Farbe auf, so lange kein Ueberschuss an Alkali vorhanden ist; bei einem Ueberschusse desselben nehmen diese Lösungen dagegen sehr bald eine grünliche Farbe an und bedecken sich dann beim Stehen an der Luft nach einiger Zeit mit einer dünnen Haut, welche ganz das Ansehen von Indig-Mit Metallsalzen geben die gelben Lösungen verblau hat. schiedenfarbige Niederschläge, von denen sich das Blei- und Zinksalz durch eine schön rothe Farbe auszeichnen.

Ehe ich nun weiter gehe, muss ich die Bemerkung vorausschicken, dass meine Untersuchungen über diese Säure noch nicht geschlossen sind; trotz dem, dass ich eine Menge Analysen sowohl der Säure selbst, als auch ihrer Verbindungen mit Basen angestellt habe, ist es mir doch nicht gelungen, übereinstimmende Resultate zu erhalten, und es hat sich mir daher die Ansicht aufgedrängt, dass der rothe Niederschlag vielleicht aus einem Gemenge zweier verschiedener Säuren in verschiedenen, nach dem jedesmaligen Verfahren bei der Darstellung wechselnden Mengen bestehe. Nur so wenigstens kann ich mir die verschiedenen Resultate erklären, welche ich bei den Untersuchungen über die Sättigungscapacität erhalten habe, und wenn ich diese jetzt speciell anzuführen unterlasse, so geschieht es in der Hoffnung, bald vollständigere und befriedigendere mittheilen zu können.

Ich will bier nur im Allgemeinen anführen, dass die Säure selbst mir in sechs verschiedenen Analysen folgende Mengen von Kohlenstoff und Wasserstoff gegeben hat:

I. II. III. IV. V. VI.

Kohlenstoff 65,74 66,03 66,74 68,62 68,74 69,06

Wasserstoff 4,34 4,23 4,46 4,27 4,38 4,33.

Zu den drei ersten Analysen ist eine durch blosse Präcipitation erhaltene und durch nochmaliges Auflösen in Alkali gereinigte Säure angewandt worden, während die zu den drei letzteren durch Auflösen in schwachem Alkohol gereinigt worden war; merkwürdig ist die grosse Uebereinstimmung des Wasserstoffgehaltes in den beiden Reihen dieser Analysen bei der grossen Verschiedenheit in der Menge des Kohlenstoffes.

Die Untersuchungen über die Sättigungscapacität habe ich bis jetzt nur mit einem durch Auflösen in Alkali und abermalige Präcipitation gereinigten Präparate angestellt und mich dabei hauptsächlich des Zinksalzes und des Bleisalzes bedient. Man kann diese beiden Salze, welche durch blosses Vermischen der Lösungen formlose Niederschläge bilden, als halbkrystallinisches Pulver darstellen, wenn man einer kochenden, mit etwas überschüssiger Essigsäure versetzten Lösung von essigsaurem Bleioxyd oder Zinkoxyd eine möglichst neutrale goldgelbe Auflösung von chrysanilsaurem Kali oder Ammoniak unter fortwährendem Kochen zusetzt. Es bildet sich dann ein

74 Fritzsche, üb. die Producte der Einwirkung des

schwerer pulverförmiger Niederschlag von ziegelrother Farbe, der sich leicht absetzt, leicht auswaschen lässt und, unter den Mikroskope betrachtet, zwar zu fein vertheilt ist, um Krystalle erkennen zu lassen, allein doch unverkennbar das Ansehen eines krystallinischen Pulvers hat.

Das so dargestellte Bleisalz hat mir die am meisten übereinstimmenden Resultate gegeben, welche ziemlich genau zu der Formel passen:

 $\dot{P}b + C_{20}H_{28}N_4O_5$

und darnach würde die Säure für sich, angenommen, dass sie bei ihrer Abscheidung 1 At. Wasser aufnimmt, der Formel

 $C_{28}H_{22}N_4O_6$

entsprechen, welche ziemlich genau mit den Zahlen der obigen 3 ersten Analysen zusammenfällt. Das Zinksalz jedoch gab mir auf 1 At. Zinkoxyd bald 42 At. Kohlenstoff, bald nur 14 At., Zahlen, welche allerdings mit denen des Bleisalzes in einem einfachen Verhältnisse stehen, sich aber eben so wenig als diese mit den drei letzten Analysen der Säure in Einklang bringen lassen. Ich bin daher noch nicht im Stande, die Zusammensetzung der Chrysanilsäure mit Bestimmtheit anzugeben, und daraus folgt schon von selbst, dass ich auch über ihre Bildung aus dem Indigblau noch ganz im Dunkeln geblieben bin. Wenn ich es aber wagte, diese unvollständigen Untersuchungen bekannt zu machen, so geschah es hauptsächlich, um sie nicht noch älter werden zu lassen und um den daraus möglicher Weise für mich entspringenden Nachtheilen vorzubeugen.

Das, was aus der Vergleichung der oben angeführten Zusammensetzung der Chrysanilsäure mit der des Indigblau's nach Erdmann's Formel Positives hervorgeht, besteht darin, dass die Säure mehr Sauerstoff und Wasserstoff im Verhältniss zum Kohlenstoff enthält, als das Indigblau. Ob aber das Indigblau bei der Behandlung mit Aetzkali Sauerstoff und Wasserstoff aufgenommen hat und der ganze Kohlenstoffgehalt des Indigblau's zur Bildung der neuen Säure verwandt worden ist, oder ob ein Theil des Kohlenstoffes eliminirt worden ist und zur Bildung von Nebenproducten Veranlassung gegeben hat, diess kann erst die Folge lehren. Jedenfalls wird Sauerstoff und Wasserstoff nicht im Verhältnisse des Wassers aufgenommen, sondern höchst wahrscheinlich 1 Atom Sauerstoff mehr, als der

Wasserstoff zur Wasserbildung bedarf, und daraus würde man den Schluss ziehen können, dass bei der Einwirkung des Kall auf das Indigblau ein Theil des letztern durch Entziehung von Sauerstoff in den reducirten Zustand übergeführt werde, woraus sich dann die beobachtete Abscheidung von Indigblau einfach erklärte. Von diesem Gesichtspuncte ausgehend, wollte ich versuchen, ob die Bildung der dunkelfarbigen Substanz und die durch sie bedingte Rückbildung von Indigblau verhindert würde, wenn eine andere Quelle von Sauerstoff vorhanden wäre. setzte zu diesem Zwecke einer bei + 150° kochenden Kalilösung vor dem Eintragen von Indigblau so viel chlorsaures Kali zu, als sie aufzulösen vermochte; in der That löste sich darin nun das Indigblau vollständig zu einer orangefarbenen Flüssigkeit auf, die dunkelfarbige Substanz wurde nicht gebildet und beim Auflösen der beim Erkalten ebenfalls erstarrenden Masse setzte sich nur eine geringe Menge von Indigblau ab. Die auf diese Weise dargestellte Säure besitzt im Allgemeinen eine hellere Farbe als die ohne Mithülfe von chlorsaurem Kali dargestellte, es ist jedoch kein Chlor in die Zusammensetzung derselben mit eingegangen und sie zeichnet sich übrigens durch keine besonderen Eigenschaften von der auf anderem Wege erhaltenen aus.

Bei einem Versuche, welchen ich in Bezug auf die Menge der sich aus dem Indigblau unter Mithülfe von chlorsaurem Kali biidenden Chrysanilsäure anstellte, erhielt ich von 0,250 Gr. reinen krystallinischen Indigblau's 0,203 Gr. oder mehr als 80 p.C. bei 100° getrockneter Chrysanilsäure.

Höchst merkwürdig ist das Verhalten der Chrysanilsäure beim Kochen mit einer verdünnten Mineralsäure und namentlich mit Schwefelsäure; die Flüssigkeit fängt bald an, sich blauroth zu färben, und während diese Farbe bei fortgesetztem Kochen immer intensiver wird, zerlegt sich die Chrysanilsäure vollständig in zwei neue Körper, von denen der eine in der Auflösung bleibt, der andere aber sich beim Erkalten fast vollständig aus der Flüssigkeit ausscheidet. Dieser letztere nun bildet ein Haufwerk sehr feiner Nadeln von tietblauschwarzer Farbe und ist die Ursache der Färbung der Flüssigkeit bei seiner Bildung, indem er bei der Siedehitze in derselben löslich ist. Der in der Flüssigkeit aufgelöst gebliebene Körper ist eine

76 Fritzsche, üb. die Producte der Einwirkung des

neue Säure und zwar dieselbe, welche sich bildet, wenn mat die oben erwähnte grüne alkoholische Lösung der Kinwirkung des Sauerstoffes aussetzt. Sie will ich zuerst ausführlich beschreiben und ihr den Namen geben:

Anthranilsäure.

Zur Darstellung der Anthranilsäure verfährt man am besten ganz eben so, wie ich es für die Chrysanilsäure angegeben habe. Die erstarrte Masse löst man in Alkohol auf und überlässt die erhaltene Lösung so lange dem Einslusse der almosphärischen Luft, bis ihre grüne Farbe sich in eine braum umgewandelt hat. Nun lässt man so lange einen Strom von Kohlensäure durch dieselbe streichen, bis alles überschüssige Alkali in kohlensaures verwandelt ist, nach dessen Absetze man von der Flüssigkeit den Weingeist abdestillirt. Bei gebiriger Concentration sondert sich dann aus der rückständige Flüssigkeit ein Salz in sehr kleinen und dünnen zusammergruppirten Blättern ab, welche das Kalisalz der Anthranilsaut sind; man lässt die Mutterlauge von Papier einsaugen, löst das Salz wieder in möglichst wenig Wasser auf und setzt zu der filtrirten Flüssigkeit tropfenweise Essigsäure hinzu, wodurch in ersten Augenblicke eine milchige Trübung der Flüssigkeit entsteht, bald aber ein reichlicher krystallinischer Niederschlag von wasserhaltiger Anthranilsäure sich bildet.

Eine zweite Bereitungsart der Anthranilsäure ergiebt sich aus der Zersetzung der Chrysanilsäure durch Kochen mit Mineralsäuren; in diesem Falle erhält man sie aber mit einer andern Säure gleichzeitig in Wasser aufgelöst. Um sie daram abzuscheiden, thut man am besten, in der Flüssigkeit einem Ueberschuss von schwefelsaurem Zinkoxyd aufzulösen und dans vorsichtig mit einem verdünnten Alkali zu neutralisiren; es scheidet sich dann anthranilsaures Zinkoxyd als ein feines gelbliches, körnig-krystallinisches Pulver ab, das sich leicht in der Flüssigkeit zu Boden setzt und leicht ausgewaschen werden kann. Oft bildet sich vor dem Beginne der Ausscheidung dieses Salzes ein geringer slockiger bräunlicher Niederschlag, und von diesem muss man die Flüssigkeit vor der weitern Neutralisation durch Filtriren trennen.

Aus dem so erhaltenen Zinksalze kann man nun die Säure

fäss mit Alkohol übergiesst, diesen zum Kochen erhitzt und mun tropfenweise mit Alkohol verdünnte Schweselsäure hinzusetzt. Hat man nicht zu viel Säure zugesetzt, so kann man sogleich filtriren, und man erhält dann entweder schon beim Erkalten, oder nach vorhergegangener theilweiser Verdampfung des Weingeistes die Anthranilsäure in krystallinischer Form.

Die Anthranilsäure ist in reinem Zustande farblos und besitzt einen süsslichen Geschmack, welcher auch ihren Verbindungen mit den Alkalien eigenthümlich ist. Man erhält sie nach der ersten Methode gewöhnlich als ein sandartiges Pulver; wenn man jedoch die Essigsäure sorgfältig über die Flüssigkeit giesst und die Zersetzung nur ganz allmählig vor sich gehen lässt, kann man sie auch als schuppige Krystalle vom Ansehen der Benzoësäure erhalten. In kaltem Wasser ist die Anthranilsäure ziemlich schwer löslich und kann daher ohne zu grossen Verlust ausgewaschen werden. Viel leichter löskich ist sie dagegen bei höherer Temperatur, so dass man sie also leicht umkrystallisiren kann. In Alkohol und Aether ist sie sehr leicht löslich, und aus ersterem namentlich kann man sie in grösseren Blättern krystallisirt erhalten.

Bei einer Temperatur von + 135°C. ungefähr schmilzt die Anthranilsäure und sublimirt sieh dabei als ein feines Krystallmehl an die zunächstliegenden kälteren Körper; über diese Temperatur erhitzt, fängt sie bald an zu kochen, und nun geht eine sehr merkwürdige Zersetzung vor sieh, welche ich jedoch erst nach den Resultaten über ihre Zusammensetzung genauer anführen will.

Die Anthranilsäure giebt mit den Alkalien sehr leicht sowohl in Wasser als auch in Weingeist lösliche Salze, welche sich jedoch krystallisirt darstellen lassen und sich an der Luft, ohne zu zersliessen, erhalten. Mit den Salzen des Kupfers, Zinks und Bleies geben sie krystallinische Niederschläge, und auch das Silbersalz kann man durch Auflösen in Ammoniak krystallinisch darstellen.

Zur Analyse habe ich mich des Silbersalzes bedient, weiches man leicht erhält, wenn man anthranilsaures Kali oder Ammoniak mit salpetersaurem Silberoxyd fällt. Es entsteht ein blendend weisser Niederschlag, welcher sowohl in Salpeter78 Fritzsche, üb. die Producte der Einwirkung des

säure als auch in Ammoniak leicht löslich ist und sich leicht auswaschen lässt.

I. 0,514 Gr. bei +100° getrockneten Silbersalzes gaben 0,646 Kohlensäure, 0,107 Wasser und 0,228 metallisches Silber;

II. 0,502 Gr. desselben Salzes gaben 0,635 Kohlensäure, 0,115 Wasser und 0,222 metallisches Silber;

III. 0,340 Gr. endlich gaben 16 C.C. Stickstoffgas bei 0° und 0,76 M. B. St. und 0,151 metallisches Silber.

Diese Mengen betragen in Procenten:

	I.	II.	III.	Mittelzahl.
Silberoxyd	47,70	47,56	47,69	47,65
Kohlenstoff	34,77	34,97		34,87
Wasserstoff	2,31	2,54		2,42
Stickstoff	-		5,90	

Diese Zahlen stimmen hinreichend überein mit der Formel Åg+C₁₄H₁₂N₂O₃,

wie sich aus folgender Vergleichung ergiebt:

0	9	•
	Ber.	Gef.
Silberoxyd	47,23	47,65
Kohlenstoff	34,81	34,87
Wasserstoff	2,44	2,42
Stickstoff	5,76	5,90
Sauerstoff	9,76	9,16
	100,00	100,00.

Das Atomgewicht des Silbersalzes ist demnach 3073,61. Die Analyse der wasserhaltigen Säure gab folgende Resultate:

- I. 0,354 Gr. geschmolzener Säure gaben 0,797 Kohlensäure und 0,164 Wasser;
- II. 0,537 Gr. derselben Säure gaben 1,197 Kohlensäure und 0,246 Wasser;

III. 0,336 Gr. geschmolzener Säure gaben 29 C.C. Stickstoffgas bei 0° und 0,76 M.B. St.

Diese Mengen betragen in Procenten:

	I.	II.	III.	Mittelzahl.
Kohlenstoff	62,25	61,63	-	61,94
Wasserstoff	4,86	5,09	·	4,97
Stickstoff			10,94	_

Diese gefundenen Zahlen stimmen aber mit den nach r Formel:

 $C_{14}H_{12}N_2O_3 + aq.$

rechneten so genau als möglich überein, wie die folgende ergleichung zeigt:

	Ber.	Gef.
Kohlenstoff	61,69	61,94
Wasserstoff	5,03	4,97
Stickstoff	10,21	10,94
Sauerstoff	23,07	22,15
***************************************	100,00	100,00.

Demnach beträgt also das Atomgewicht der wasserhaltigen ure 1734,48 und das der wasserfreien 1622,00.

Die wasserfreie Anthranilsäure enthält 18,49 p.C. Sauerstoff dihre Sättigungscapacität ist ½ dieser Zahl oder 6,16.

Wenn nun schon die hinreichend genauen Zahlen der obin Analysen keinen Zweisel über die Zusammensetzung der
nthranilsäure mehr zulassen, so ergiebt sich noch eine Beitigung der aus ihnen abgeleiteten Formel aus der merkwürgen Zersetzung der wasserhaltigen Säure durch höhere Temratur. Die wasserhaltige Anthranilsäure zerfällt nämlich,
enn man sie bis jenseits ihres Schmelzpunctes erhitzt, in
h gasförmig entwickelnde Kohlensäure und in Anilin.

Am vollkommensten und schnellsten erfolgt diese Zersezing in einer engen Glasröhre, und in einer solchen nahm ich
vor, um die Menge der sich entwickelnden Kohlensäure
bestimmen; in einem bauchigen Gefässe dagegen verflücht sich beim Anfange der Zersetzung sehr viel unzersetzte
iure, und mit kleinen Mengen wenigstens gelang es mir in
lchen Gefässen nicht, sie zu Ende zu führen.

In das zugeschmolzene Ende einer 2 Fuss langen und ½ ill weiten Glasröhre brachte ich 0,154 Gr. geschmolzene Säure d gab nun der Röhre, indem ich sie durch 2 Biegungen in gleiche Schenkel theilte, eine solche Form, dass der geschlosne Schenkel einen Winkel von 45° mit den beiden anderen, nz nahe neben einander parallellaufenden Schenkeln bildete; zu beiden letzteren wurden in einen mit Quecksilber gefüllner eingesenkt und über das aus demselben hervorrande offene Ende der Röhre ein getheiltes Rohr zum Auffan-

Aufkochen statt, welches gegen das Ende derselben immer geringer ward, bis endlich ein stossweise eintretendes Kochen die Beendigung der Operation anzeigte; es hatte sich nun das Volumen der in dem getheilten Rohre befindlichen Luft um 25 C.C. vermehrt (welche, auf 0° und 0,76 M. B. St. reducirt, 24,5 C.C. betrugen) und diese wurden beim Einbringen von Kalilösung wieder vollständig absorbirt. Die erhaltenen 24,5 C.C. Kohlensäure wiegen 0,04850 Gr. und diess beträgt 31,49 p.C. von Gewichte der angewandten Säure; wenn sich aber

$$C_{14}H_{12}N_2O_3 + aq.$$

in $C_{12}H_{14}N_2 + 2\ddot{C}$ zerlegt,

so müssten 31,93 p.C. Kohlensäure gebildet werden, und die Zerlegung geht daher in der That nach der gegebenen Formel vor sich.

Es ist gewiss eine recht merkwürdige Erscheinung, dass eine ziemlich starke Säure sich durch blosse Einwirkung der Wärme in Kohlensäure und in eine Base zerlegt, welche sich durch den gänzlichen Mangel an Sauerstoff besonders auszeichnet, und nicht minder interessant ist es, dass dabei eine Wasserzersetzung stattfindet, wenn man nicht mit Liebig die Säure als

$C_{14}H_{12}N_2O_4+H_2$

betrachtet, wofür die Art und Weise ihrer Zersetzung vielleicht sprechen möchte; auch dann aber ist es auffallend, dass der weniger innig gebundene Wasserstoff in das Hauptproduct der Zersetzung eintritt und nicht vielmehr mit einem Theile des austretenden Sauerstoffes sich verbindet.

Nicht so einfach wie die Zersetzung der wasserhaltigen Säure ist die Zersetzung der anthranilsauren Salze, und zwar ganz einfach deshalb, weil bei ihnen das zu jenem Zerfallen nöthige Atom Wasser durch 1 At. Base ersetzt worden ist. Man erhält zwar bei der trocknen Destillation dieser Salze ebenfalls Anilin, allein es scheidet sich auch viel Kohle dabei aus und die Zersetzung lässt sich nicht genau verfolgen.

Ich habe bereits erwähnt, dass beim Zersetzen einer Auflösung von anthranilsaurem Kali durch Säure im ersten Augenblicke eine milchige Trübung in der Flüssigkeit entsteht;

diese hat ihren Grund darin, dass die Anthranilsäure, wie man unter dem Mikroskope sehr gut sehen kann, zuerst als eine Flüssigkeit in sehr kleinen Tropfen ausgeschieden wird, welche erst nach einiger Zeit sich zu Krystallen vereinigen. Dieser Umstand kann in sofern von Wichtigkeit sein, als, wenn man eine Anthranilsäure und Chrysanilsäure enthaltende Flüssigkeit durch Säuren zersetzt, dann vielleicht die Anthranilsäure in der flüssigen Form von der Chrysanilsäure mit niedergerissen wird, und es kann diess vielleicht zur Erklärung der verschiedenen Resultate führen, welche mir die Untersuchung der Chrysanilsäure gegeben hat.

Was das Verhältniss der Chrysanilsäure zur Anthranilsäure betrifft, so glaubte ich, dasselbe durch die interessante Zersetzung der Chrysanilsäure beim Kochen mit Mineralsäuren genau bestimmen zu können, und ich habe daher zu diesem Zwecke
Versuche angestellt über das Verhältniss der beiden entstehenden Producte sowohl, als auch über die Zusammensetzung des
krystallinischen blauschwarzen Körpers. Allein auch hier habe
ich sehr abweichende Resultate bekommen, von welchen ich
nur die von 3 Verbrennungen des blauschwarzen Körpers anführen will; ich erhielt dabei:

	I.	11.	III.
Kohlenstoff	66,85	73,89	72,55
Wasserstoff.	3,95	3,96	3,97.

Auch hier also zeigt sich wieder dieselbe mèrkwürdige Uebereinstimmung im Wasserstoffgehalte wie bei der Chrysanilsäure, die Differenz im Kohlenstoffgehalte ist aber hier noch viel grösser und beträgt 7 p.C.; es ist diess jedoch, wie ich sogleich zeigen werde, nur eine Folge der Differenz, welche die Chrysanilsäure in ihrem Kohlenstoffgehalte gab, je nachdem sie aus Alkohol krystallisirt war oder nicht. Die zur ersten Analyse verwandte Substanz nämlich ist aus einer nicht durch Alkohol gereinigten Säure dargestellt, welche durchschnittlich 66,17 p.C. Kohlenstoff und 4,34 Wasserstoff gab; nimmt man nun diese Zahlen doppelt und zieht davon den Gehalt der wasserfreien Anthranilsäure an Kohlenstoff und Wasserstoff ab, so erhält man:

1	32,34		8,68	
	65,98		4,62	
	66,36 C	und	4,06	H

für die blauschwarze Substanz, Zahlen, welche ziemlich gut zu der ersten Analyse stimmen. Wenn man nun die wasserhaltige Chrysanilsäure nach der Formel C28 H22 N2 O6 zusammengesetzt annimmt, so würde sie zersallen in 1 At. wasserfreie Anthranilsäure, welche aus der Flüssigkeit 1 At. Wasser aufnimmt, und in 1 At. der neuen Substanz, deren Formel dann C₁₄H₁₀N₂O₃ sein würde, nach welcher sie 66,48 p.C. Kohlenstoff und 3,88 p.C. Wasserstoff enthält. Diese Formel wird nun zwar durch die beiden letzten Analysen nicht bestätigt, allein auch bei ihnen sinden wir eine Uebereinstimmung mit den thnen entsprechenden Analysen der aus Alkohol krystallisirten Chrysanilsäure, aus welcher die zu ihnen verwandte Substanz dargestellt worden war. Die aus Alkohol krystallisirte Säure batte durchschnittlich 68,81 p.C. Kohlenstoff und 4,33 p.C. Wasserstoff gegeben, und wenn wir mit diesen Zahlen eben se wie vorher verfahren, so erhalten wir:

> 137,62 8,62 65,68 4,62 = 71,64 C und 4,04 H

für die neue Substanz, Zahlen, welche sich denen der Analysen im Kohlenstoffgehalte zwar nur nähern, im Wasserstoffgehalte aber damit übereinstimmen. Es geht nun aber aus dem Angeführten hinreichend hervor, dass es sich vor Allem darum handelt, die Zusammensetzung der Chrysanilsäure mit Bestimmtheit zu ermitteln, und darauf werden meine Bestrebungen gerichtet sein; bis diese Frage gelöst sein wird, möge die neue Substanz noch namenlos bleiben, einige ihrer hauptsächlichsten Eigenschaften will ich hier jedoch noch anführen. Sie ist, wie es scheint, weder basischer noch saurer Natur und zeigt verschiedene Eigenschaften, je nachdem sie noch im feuchten Zustande und frisch bereitet, oder getrocknet und mit der atmosphärischen Luft einige Zeit in Berührung gewesen war. Im frischen Zustande ist sie mit tief purpurrother, in Blau sich neigender Farbe in Weingeist löslich, diese Löslichkeit verliert sie jedoch zum Theil nach dem Trocknen und giebt dann nur noch eine rothbraune Lösung; beide Lösungen scheinen durch den Einfluss der atmosphärischen Luft bald Veränderungen zu Mit Alkalien zersetzt sich die frisch bereitete Substanz sehr bald unter Ausscheidung von Indigblau, bei der getrockneten dagegen geht diess viel langsamer vor sich, so dass es fast scheint, als enthalte die Substanz reducirten Indigo in einer eigenthümlichen Verbindung und als werde dieser beim Trocknen wieder zu Indigblau oxydirt. Es bedarf daher auch diese Substanz noch einer weitern Untersuchung, und ich behalte mir vor, in der Fortsetzung dieser Arbeit auch auf sie wieder zurückzukommen.

Res bleibt mir nun nur noch übrig, ganz kurz noch eines neuen Körpers zu erwähnen, der sich durch freiwillige Zersetzung der Chrysanilsäure bildet. Wenn man nämlich eine Lösung eines chrysanilsauren alkalischen Salzes an der atmosphärischen Lust stehen lässt, so bildet sich auf ihrer Obersläche nach einiger Zeit eine Haut von hellgrüner Farbe; unter dem Mikroskope zeigt sie Spuren krystallinischer Structur und beim Auslösen in Aether giebt sie kleine Krystalle. Die von ihr erhaltene Menge war jedoch bis jetzt zu gering, um sie einer weitern Untersuchung unterwersen zu können, und ich muss mich daher vorläusig mit der Ansührung ihrer Existenz begnügen.

V.

Ueber den Schwefelkohlenstoff.

Von

J. P. COUERBE.

Erste Abhandlung, überreicht der Academie der Wissenschaften den 11. April 1836 *).

(Revue scientifique. Oct. 1840. p. 1.)

Kurzer Inhalt dieser Arbeit.

Der Schweselkohlenstoff ist von Lampadius entdeckt worden. Er betrachtete ihn als eine Verbindung von Kohlen-

^{*)} Der erste Theil der Untersuchung des Hrn. Couërbe über diesen Gegenstand, welchen der Vers. schon früher ausführlich mitgetheilt hat, wird hier, der Vollständigkeit wegen, im Auszuge aufgenommen, obwohl die Resultate, die darin enthalten sind, fast vollkommen mit denen übereinstimmen, die schon früher, ehe Hr. Couërbe seine Untersuchung ausführte, von Hrn. Zeise gewonnen und be-

Destillation von Schweselkies mit Kohle, die er in der Absicht anstellte, mehr Schwesel zu erhalten. Dieser sonderbare Körper, welcher zuerst den Namen Schweselakohol erhielt, ist, obgleich er aus zwei sesten Substanzen besteht, slüssig, ätherartig und sehr slüchtig. Er erhielt verschiedene Namen und gab zu sehr schönen Abhandlungen Veranlassung. Clément und Désormes, Berzelius, Cluzel, Vauquelin, Thénard, Zeise u. s. w. haben nach der Reihe Abhandlungen über den Schweselkohlenstoff geliesert.

Clément und Désormes sind die ersten Chemiker, welche die wirkliche qualitative Zusammensetzung des Schweselkohlenstosses gegeben haben. Ihre Versuche besinden sich unter ihren interessanten Untersuchungen über den Kohlenstoss. Sie sind in dem XLII. Bande der Annales de chimie enthalten. Sie sind auch die ersten, welche ein directes und leichtes Versahren, um ihn zu erhalten, angegeben haben. Wenn man sich ihres Versahrens bedient und statt der Porcellanröhre eine gusseiserne Röhre von 3 Fuss Länge und von ungefähr 3 oder 4 Zoll im Durchmesser anwendet, die man gehörig mit kleinen Kohlenstücken anfüllt, so kann man täglich mehrere Pfunde Schweselkohlenstoss erhalten. Da es leicht ist, mehrere Apparate auf einmal zu leiten, indem man 2 oder 3 zusammenstellt, so erhält man in einigen Stunden Massen von Product, welches wie Wasser überdestillirt.

Diese Röhren können nicht zu mehreren Operationen gebraucht werden. Der Schwesel greist sie an und durchlöchert sie oft nach Verlaus einiger Stunden. Man kann diesem Uebelstande dadurch abhelsen, dass man ihre innere Fläche mit einem Beschlage überzieht, welcher aus Thon, Sand und Kuhmist besteht.

kannt gemacht worden sind (Poggen d. Ann. Bd. XXXV. S. 407). Vgl. Berzelius's Jahresbericht, Bd. XVII. S. 332 und Liebig's Ann. der Pharm. Bd. XIX. S. 261. Der zweite Theil der Abhandlung des französischen Chemikers enthält jedoch eine Anzahl neuer Erfahrungen, welche demselben eigenthümlich sind und dem interessanten Gegenstande eine bedeutende Ausdehnung verleihen.

Cluzel fand in einer besondern Abhandlung über diesen lörper, welche sich hauptsächlich über seine Natur und seine usammensetzung verbreitete, nach zahlreichen schwierigen und omplicirten Versuchen, dass er besteht aus:

Kohlenstoff	28,49
Wasserstoff	5,86
Stickstoff	6,98_
Dadical des Caberratals	KOCH

Radical des Schwefels 58,67.

Diess ist ein sonderbares Resultat, sowohl wegen der Bechaffenheit der gefundenen Elemente, als wegen ihres Veriltnisses.

Die wirkliche Zusammensetzung des Schweselkohlenstosses tuns erst seit den Untersuchungen von Thénard und Vauuelin bekannt. Diese Chemiker, welche von der Academie en Austrag erhielten, Cluzel's Arbeit zu prüsen, sanden durch nsache Versuche, dass der Schweselkohlenstoss besteht aus:

Schwefel 86 Kohlenstoff 14.

Dieses Resultat wurde später durch die Analysen von Berelius und Marcet bestätigt, welche fanden:

> 1 At. Kohlenstoff 76,438 2 - Schwefel 402,320,

elche in 100 Th. ausmachen:

Schwefel 84,84 Kohlenstoff 15,16.

Diese Zahlen stimmen, wie man sieht, mit den Resultaten bénard's und Vauquelin's überein.

Die von mir angestellten Analysen leiten auf dieselbe Forel. Folgendes ist das Resultat meiner Versuche:

1)	Schwefelkohlenstoff	3,227
	Wasser erhalten	0,010
	Kohlensäure	1,903.
2)	Schwefelkohlenstoff	2,320
	Wasser	0,005
	Koblensäure	1,350.

Die Wassermenge ist hier zufällig und rührt von der Lust r, welche ich ungetrocknet nach Beendigung des Versuches reh den Apparat strömen liess. Wenn ich daher diese Spur von Feuchtigkeit unbeachtet lasse, so erhalte ich als Mittel dieser Analysen:

> 16,205 Kohlenstoff 83,795. Schwefel

Alle diese Versuche beweisen, dass der Schwefelkohlenstoff in der That nur Schwefel und Kohlenstoff in den von Vagquelin, Thénard, Berzelius und Marcet angegebenen Verhältnissen enthält.

Der Siedepunct des Schwefelkohlenstoffes ist 45°, seine Dichtigkeit = 1,265, die seines Dampses in Vergleich mit der der Luft 2,688. Sie wurde direct aus dem Versuche abgeleitet, dessen Besultate hier folgen:

Unterschied in dem Gewichte des mit Dampt

und des mit Luft angefüllten Ballons	0,300
Temperatur des Dampfes	59°
Temperatur der Lust	19°
Luftdruck	752 Mm.
in dem Ballon zurückgebliebene Luft	0
Rauminhalt des Ballons	190 Cb.C.

Der Schwefelkohlenstoff verhält sich wie eine Säure. Indessen verbindet er sich nicht direct mit den Basen, sonder er bedarf einer organischen Substanz, wenn er diese Rolle wirklich spielen soll. Eben so kann er sich in Verbindung mit Aether oder Alkohol mit den Metalloxyden vereinigen und Salze bilden.

Es giebt zwei Arten, den Schwefelkohlenstoff mit den Oxyden zu verbinden, direct, indem man das Oxyd in Alkohol auflöst, und durch doppelte Wahlverwandtschaft. Die in Alkohol oder Aether löslichen Alkalien verbinden sich direct da-Diese verschiedenen Verbindungen sind uns unter dem mit. Namen von schwefelkoblenstoffäthersauren Salzen oder unter denen von Xanthüren bekannt.

Schwefelkohlenstoffäthersaures Kali.

Die Bereitung dieses Salzes ist sehr einfach. bewerkstelligt, wenn man nimmt:

30 Gewichtstheile Kali,

36-40 Gewichtstheile absoluten Alkohol,

40 Gewichtstheile Schwefelkohlenstoff.

Man löst das Kali in Alkohol auf und setzt Schwefelkoh-

lenstoff zu, indem man das Gemenge lebhaft in einer Flasche schüttelt. Das Ganze erhitzt sich bald und giebt nach einigen Minuten Anzeigen von Krystallisation. Man muss das Gemenge in eine Schale giessen, um nach vollständiger Krystallisation die krystallinische Masse wegnehmen zu können. Wenn das Salz krystallisirt ist, was immer nach 5—6 Stunden stattfindet, wenn man 2 oder 3 Unzen Schwefelkohlenstoff auf diese Weise behandelt, so presst man es durch Leinwand und wäscht es mit Aether, um es von ein wenig darin enthaltenem Schwefelkalium zu befreien. Das auf diese Weise erhaltene Salz ist sehr rein. Es besitzt eine Strohfarbe, einen sehr widrigen Geruch und sehr widrigen bittern Geschmack.

Die Natur dieser Verbindung ist lange Zeit unbekannt gewesen. Zeise, dem man die Entdeckung der Kanthüre verdankt, glaubte anfangs, dass der Schwefelkohlenstoff dem Alkohol Wasserstoff entzöge und dass er sich so in eine Wasserstoffsäure umwandle, dass ferner der Schwefelkohlenstoff sich in einem eigenthümlichen Zustande darin befinde und die Rolle eines Radicals spiele, welches er Kanthogen, von $\xi \alpha r \vartheta o \zeta$ gelb, nannte, weil in der That diese Arten von Verbindungen mehr oder weniger gelblich sind. Diese Verbindung verlor bei Anwesenheit eines dem Bleioxyd analogen Metalloxyds seinen Wasserstoff auf Kosten des Sauerstoffes des Oxyds, und das neue Salz wurde ein Kanthür. Kurz, Zeise hatte die Theorie der Chlorüre und der chlorwasserstoffsauren Salze darauf angewandt.

In meiner Abhandlung habe ich mehrere Analysen angeführt, welche die genaue Zusammensetzung des Salzes von
Zeise geben. Meine Resultate stimmen genau mit der Theorie überein und mit den letzten Versuchen der Gelehrten, welche sie wiederholt haben. Ich will hier die Resultate meiner
Versuche in Zahlen angeben.

Die zur Bestimmung des Kali's angestellten vier Versuche gaben in 100 Theilen:

- 1) 28,30
- 2) 28,81
- 30,00
- 4) 31,52

wovon das Mittel gleich ist 29,89.

Die über den Kohlenstoff und Wasserstoff angestellten Versuche haben auf 100 Th. gegeben:

Kohlenstoff. Wasserstoff.

_		
1)	22,194	3,063
2)	21,843	3,080
3)	21,286	3,108
4)	22,687	2,964,

wovon das Mittel ist:

Kohlenstoff 22,250 Wasserstoff 3,043.

Für den Schwefel, welcher in Schwefelsäure umgewadelt und durch Baryt bestimmt wurde, erhielt ich auf 100 T

- 1) 41,39
- 2) 41,66
- 3) 40,01
- 4) 39,18.

Hieraus ergiebt sich als Mittel 40,56.

Durch diese verschiedenen Resultate erhält man folger Zusammensetzung:

Kohlenstoff	22,252
Wasserstoff	3,053
Kali	29,890
Schwefel	40,245
Sauerstoff	4,803.

Diese Zusammensetzung entspricht der Formel $C_6H_{10}S_4$, KO *), welche bei der Umwandlung in 100 Theile wird zu:

Kohlenstoff	22,75
Wasserstoff	3,06
Kali	29,24
Schwesel	39,92
Sauerstoff	5,00.

Man sieht sogleich, dass diese Zusammensetzung at folgender rationéllen Formel $C_4H_{10}O,KO,C_2S_4$ entspricht, du welche dargestellt wird:

1 At.	Aether	C_4H_1	$\mathbf{0_0}$
1 -	Kali		KO
2 -	Schwefelkohlenstoff	$\mathbf{C_2}$	$\mathbf{S}_{\mathbf{A}}.$

^{*)} C gleich 76,88.

Zeise hatte, wie ich bereits erwähnt habe, angegeben, dass der Schwefelkohlenstoff in diese Verbindungen als Radical eingehe u.s. w. Zufolge meiner Untersuchungen lassen sich diese Ansichten nicht länger behaupten.

Eben so wie der Sauerstoff kann auch der Schwefel als elektro-negativer Körper mit gewissen einfachen Körpern Säuren bilden. Diess ist jetzt eine hinlänglich erwiesene und völlig bekannte Thatsache. Indem sich der Kohlenstoff mit 1 oder 2 Atomen Sauerstoff verbindet, bildet er ein Oxyd und eine Säure, die beide gasartig sind. Wir kennen nicht die dem Kohlenoxyde entsprechende Schwefelkohlenstoffverbindung. dessen zweifle ich nicht daran, dass sie existiren kann. Aber die Schwefelkohlenstoffsäure entspricht genau der Kohlensäure und muss ihr isomorph sein. Es fragt sich daher, warum man ihm alsdann nicht elektro-negative Eigenschaften beilegt, die zwar schwach sind, aber doch bei Anwesenheit gewisser Basen gesteigert werden können. Mir scheint' diese Annahme mit bekannten Thatsachen übereinzustimmen. Schon Berzelius lässt ihn hinsichtlich der Schwefelmetalle diese Bolle spielen. Kr nennt diese Verbindungen Sulpho - Carbonate. Ich werde daber den Schwefelkohlenstoff Schwefelkohlenstoffsäure, das Salz von Zeise Schwefelkohlenstoff-Aether und Kali nennen. Man kann aber auch annehmen, und die Analogie ist hierbei sehr auffallend, dass der Aether und die Schwefelkohlenstoffsäure eine eigenthümliche Säure ausmachen, die in Verbindung mit Basen dieselbe Gruppirung wie die Aethionsäure und die Isäthionsäure u. s. w. hätte. Wie diese Säuren enthält sie 1 At. Aether auf 2 At. Säure. Auf diese Art müssen jetzt meiner Meinung nach die Schwefelkohlenstoffverbindungen betrachtet werden.

Nach diesen unerwarteten Resultaten *) wurde es nöthig, die Verbindungen zu untersuchen, welche Zeise unter dem Namen von Xanthüren beschrieben hat. Denn da es jetzt bewiesen ist, dass wir nichts mehr mit Wasserstoffsalzen zu thun

^{*)} Zu jener Zeit kannte ich noch nicht die neuen Untersuchungen von Zeise über die Zusammensetzung der Xanthate. Erst auf Veranlassung meiner Abhandlung gelangte die schöne Arbeit des dänischen Chemikers zu meiner Kenntniss.

haben, sondern mit neuen Salzen, welche ich Schwefelsauerstoffsalze nennen will, so musste ich mich überzeugen, ob die
Schwefelkohlenstoffäthersäure 1 At. Wasser verliert, oder ob sie,
ohne eine Veränderung zu erleiden, in Verbindung tritt und
unlösliche Salze bildet, je nach der Basis, welche Bestandtheil
derselben ist, wie sich übrigens die meisten Säuren verhalten.

Das Bleixanthür ist das einzige, welches ich der Analyse unterworfen habe, da mir das Kupferxanthur sonderbare und wichtige Anomalien gezeigt hatte, welche ich hier ihrer ganzen Ausdehnung nach nicht angeben kann. Sie gehören in eine andere Abhandlung, worin ich eine vollständigere Untersuchung der Xanthüre anstellen will. Indessen muss ich jetzt gleich beifügen, dass man bei Behandlung des Kupferxanthürs mit Aether eine ölige Substanz von grüner Farbe und ein anderes, in schönen harten und durchsichtigen Prismen krystallisirendes Product erhält, welches blos aus Kohlenstoff und Wasserstoff in solchen Verhältnissen besteht, wie beim ölbildenden Gase. Diese Prismen schmelzen bei der Wärme der Hand, und dieses charakteristische Kennzeichen reicht hin, um sie von dem Kobleswasserstoff von Sérullas zu unterscheiden, welcher 110°C zum Schmelzen erfordert. Das Kupferxanthür tritt auch den Aether freien Schwefel ab.

Die Analysen des Bleixanthürs leiteten auf folgende Resultate:

Kohlenstoff.		Wasserstoff.	
1)	17,83	2,07	
2)	17,32	2,10	
3)	17,48	1,99	
ittel	17.523	2.056.	

Die aus diesen Zahlen sich ergebende Formel C₄H₈, C₂S₄Pb0 macht in 100 Th. aus:

Kohlenstoff	16,940
Wasserstoff	1,843
Schwefel	29,720
Bleioxyd	51,497.

Diese Analyse zeigt, dass die Schweselkohlenstoffäthersäure bei der Verbindung mit dem Bleioxyd 1 At. Wasser verloren hat und dass die xanthinsauren Salze dieser Art aus Kohlenwasserstoff, Schweselkohlenstoff und Metalloxyd bestehen. Aber

begangen habe und der mich auf sehr verführerische Ansichten leitete, die jetzt nebst ihrem Principe der Vergessenheit übergeben sein mögen. Das xanthinsaure Bleioxyd hat in der That nicht die Formel, die ich so eben aus meiner Abhandlung angeführt habe. Es besteht, wie die anderen xanthinsauren Salze, aus Aether, Basis und Schwefelkohlenstoffsäure. Ich erkannte diess später, als ich durch Zeise's mir nicht bekannt gewordene Abhandlung, so wie durch Liebig's und Pelouze's Untersuchungen mehr darüber aufgeklärt war. Die wirkliche Formel für das xanthinsaure Bleioxyd ist daher C₄H₁₀O,PbO,C₂S₄. Sie unterscheidet sich um 1 At. Wasser von der aus meinen Versuchen abgeleiteten.

Die xanthinsauren oder schweselkohlenstossäthersauren Salze werden durch wasserhaltige Säuren leicht zersetzt. Aber nicht alle Säuren wirken auf dieselbe Weise. Wenn man das Salz von Zeise in Wasser auslöst und Schweselsäure zusetzt, so wird dadurch eine ölige Flüssigkeit von Bernsteinsarbe und einem sehr widrigen stechenden Geruch, die mit schwesliger Säure gemengt ist, gefällt. Man bemerkt auch, dass ein wenig Schwesel niederfällt.

Diese ölige Flüssigkeit, welche nichts anderes als Weinschwefelkohlensäure ist, löst sich in Wasser nicht auf. Man kann sie daher bei ihrer Bereitung waschen, sie mit einer Pipette aufziehen und in ein passendes Gefäss bringen, wo sie sogleich merkwürdige Umwandlungen erleidet. Welches auch die Temperatur ist, so bemerkt man nach 8 oder 9 Minuten, dass diese ölige Säure sich erhitzt, sich ausdehnt, in's Sieden kommt, Dämpfe von Schwefelkohlenstoff entweichen lässt, sich trübt und sich endlich in zwei durchsichtige Schichten von fast gleichem Volumen trennt. Die Ursache dieser plötzlichen Zersetzung ist mir unbekannt. Die untere Schicht besteht blos aus reinem Schwefelkohlenstoff; die obere Schicht ist eine Auflösung dieses Körpers in wässrigem Alkohol, oder, wenn die beiden Schichten sich nicht zeigen, ist das Ganze nur eine Auflösung von Schwefelkohlenstoff in Alkohol. Es war leicht, sich durch Versuche von diesen Besultaten zu überzeugen.

Die Bildung der Weinschwefelkohlensäure lässt sich leicht erklären. Das Salz von Zeise absorbirt bei der Behandlung

mit wässrigen Säuren 1 At. Wasser, verbindet sich wirklich mit demselben und zersetzt sich hierauf in eine ölige Säure, indem sie ihre Basis der zersetzenden Säure abtritt. Angenommen, dass die zersetzende Säure Schwefelsäure ist, so erfolgt die Reaction nach folgender Formel:

Alkohol. Schwefelkohlenstoff. Schwefelsaures Kali.

Weinschwefelkohlenstoffsäure.

Nach diesen Resultaten könnte die Schwefelkohlenstoffäthersäure im freien Zustande nicht ohne Wasser existiren, wie die Aethionsäure und die Isäthionsäure. Sie würde immer der Weinschwefelsäure entsprechen, mit dem Unterschiede, dass die letztere in Verbindung treten kann, ohne Wasser zu verlieren, während die Weinschwefelkohlenstoffsäure immer ihr Wasser verliert und zu $C_4H_{19}O$, C_2S_4 wird. Indessen beweist die von Hennell und Marchand angestellte Analyse des weinschwefelsauren Kali's hinreichend, dass dieses Salz ein ätherschwefelsaures Kali $= C_4H_{10}O$, S_2O_6 , KO ist, und führt auf die Annahme, dass Alkohol niemals in diese Arten von Verbindungen eingeht und dass die Weinschwefelsäure und die Weinschwefelkohlenstoffsäure dieselbe Art von Umwandlung erleiden.

Die Erklärung der Bildung des Salzes von Zeise wird jetzt, nachdem wir uns in die Details eingelassen haben, leicht, weil dieses Salz wirklich aus Aether, Schwefelkohlenstoff und Kali in den Verhältnissen C₄ H₁₀ O, C₂ S₄, KO besteht, und weil sich zugleich Schwefelkalium und unterschwefligsaures Kali bilden. Erfolgte die Reaction so, dass sie 1 At. jeder Verbindung erzeugte, so müsste man zugleich auf einander reagiren lassen:

3 At. Kali
$$= 3(K0)$$

3 - Schwefelkohlenstoff $= 3(CS_2)$
1 - Alkohol $= C_4H_{12}O_2$,

und man erhielt:

1 At. Salz von Zeise $= C_4H_{10}O, C_2S_4, KO$

1 - Schwefelkalium = KS

1 At. unterschwefligsaures Kali = KO, SO

 $1 - Wasser = H_20$

1 - Kohlenstoff = C.

Der Kohlenstoff fällt zum Theil nieder, der andere Theil kann im Schwefelkalium aufgelöst bleiben, wie ich mich überzeugt habe. Folgende Gleichung drückt die Phänomene bestimmt aus:

$$C_4H_{12}O_2+C_3S_6+K_3O_3$$

= $C_4H_{10}O$, C_2S_4 , $KO+H_2O+SO$, $KO+KS+C$.

Das Schwefelkalium und das unterschwefligsaure Kali *) bleiben in dem nicht gereinigten Salze zurück, 1 At. Wasser entwickelt sich und es setzt sich Kohlenstoff im freien Zustande ab.

Aber die Menge des Schweselkaliums, die ich nicht genau bestimmt habe, ist allemal zu gering, um anzunehmen, dass sich auf 1 At. Salz 1 At. der anderen Körper bildet. Das Phänomen bleibt dasselbe, wenn man z. B. reagiren lässt:

4 At. Alkohol = $4(C_4H_{12}O_2)$

 $9 - Schwefelkohlenstoff = 9(CS_2)$

6 - Kali = 6(KO).

In diesem Falle erhält man:

 $= 4(C_4H_{10}O, C_2S_4, KO)$

1 - Schwefelkalium = KS

1 - unterschwefligsaures Kali = KO, 80

 $4 - Wasser = 4(H_20)$

1 - Kohlenstoff = C.

Diese Verhältnisse scheinen mir beinahe denen sich zu nähern, welche ich bei meinen Versuchen beobachtet habe. Die das Phänomen erklärende Formel wird daher folgende sein:

$$C_{16}H_{48}O_8 + C_9S_{18} + K_6O_6$$

= $C_{16}H_{40}O_4$, C_8S_{16} , $K_4O_4 + KS + KO$, $SO + C + H_8O_4$.

Aus diesem Auszuge geht hervor, dass meine erste Abbandlung Analysen, so wie die vollständige Geschichte des Schwefelkohlenstoffes enthält, ferner die Phänomene seiner Re-

^{*)} Es ist zu bemerken, dass das Aequivalent des unterschwefligsauren Kali's nicht KO,SO ist, wie hier Couërbe annimmt, sonlern KO,S₂O₂.

action auf Alkohol bei Anwesenheit von Kali und die analytische Untersuchung der entstehenden Producte, sodann die Untersuchung der Weinschwefelkohlenstoffsäure und die Theorie ihrer Bildung, endlich isomorphe Beziehungen zwischen dem Schwefelkohlenstoffe und der Kohlensäure. Ueberdiess sind allen beobachteten Thatsachen zahlreiche Betrachtungen beigefügt.

Zweite Abhandlung, überreicht der Academie der Wissenschaften im September 1840.

(Revue scientifique. October 1840. p. 11.)

Ueberblick über die erste Abhandlung.

Die Verbindungen des Schweselkohlenstosses mit den Alkalien und dem Aether, die Zersetzungen seiner Salze, die
Wirkung der Hitze auf diese Salze zeigen Reactionen und erzeugen Verbindungen, mit denen die Chemiker sich bis jetzt
sehr wenig beschäftigt haben. In der von mir herausgegebenen Abhandlung glaube ich die Reactionen des in Alkohol aufgelösten Kali's auf Schweselkohlenstoss gehörig dargelegt zu haben. In der That habe ich durch Analysen bewiesen, dass
sich beständig bildet:

xanthinsaures Kali Kaliumpolysulphuret unterschwefligsaures Kali Wasser und Koblenstoff.

Der Kohlenstoff wird in dem Kaliumpolysulphuret in Auflösung gehalten, er setzt sich aber beim Concentriren der Mutterlauge und beim Trocknen des Salzes ab. Zuweilen reisst & Spuren von Schwefel mit sich fort, was man beim Waschen des schwarzen kohligen Absatzes und dem darauf folgenden Verbrennen desselben in der freien Luft bemerkt, denn alsdam giebt er eine schwache schweflige Flamme, die sich leicht zu erkennen giebt. Man kann auch die Anwesenheit von Schwefel dadurch beweisen, dass man den erwähnten Rückstand mit Braunstein in einer ausgezogenen Röhre behandelt, deren Spitze man in einige Tropfen schwefelsaures Chromoxyd taucht. Bei einer geringen Wärme des Löthrohres erzeugt sich schweflige Säure, welche in das schwefelsaure Chromoxyd übergeht und

im sogleich eine grüne Farbe giebt. Dieses Mittel ist sehr ut, um Spuren mit fortgerissenen Schwefels in den Körpern u erkennen.

Man darf nicht glauben, dass dieser Absatz eine bestimmte erbindung von Schwefel und Kehlenstoff ist. Meine darüber agestellten Analysen gaben mir, zu abweichende Resultate, als aus man an Verbindungen dieser Art denken könnte. Man ann sich auch überzeugen, dass der Schwefel diesem Absatze los beigemengt ist, wenn man den Absatz mit siedendem Terentinöl behandelt, welcher den Schwefel auflöst, ohne den lohlenstoff zu verändern. Auch will ich noch erwähnen, dass er kohlige Absatz fast immer reiner Kohlenstoff ist, dass er ber oft mit Schwefel geschwängert wird, welcher durch blosmes Waschen mit Wasser nicht entfernt werden kann.

Bekanntlich habe ich die Zusammensetzung der xanthinnuren Salze angegeben. Ich habe zwei derselben bestimmt,
en denen das eine wasserfrei, das andre wasserhaltig ist.
nurch das erstere werden die eigentlich so genannten Xanthüre
argestellt, und durch das zweite die hydroxanthinsauren Sale, wie man sie sonst nannte. Das eine enthält Aetheren, das
ndere Aether. Der Unterschied wird übrigens durch folgende
formeln klar:

Xanthüre $= C_4H_8, H_2O, C_2S_4 *$) hydroxanthinsaure Salze $= C_4H_{10}O, H_2O, C_2S_4$.

Diess sind die Ansichten, welche bei Aufstellung der Theoien gedient haben, die mich bei meiner ersten Abhandlung leisten. Aber durch Versuche, die schon vor den meinigen anjestellt worden waren und die ich nicht kannte, war die Zuammensetzung der xanthinsauren Salze im Allgemeinen durch
ine einzige der der hydroxanthinsauren Salze entsprechende
formel C₄H₁₀O, H₂O, C₂S₄ bestimmt worden. Neue von Lie-

^{*)} Da ich in der ersten Abhandlung die Zahl 76,438 als Atomewicht des Kohlenstoffes angenommen habe, so behielt ich sie a dieser bei und werde sie auch in allen folgenden Abhandlungen ber denselben Gegenstand beibehalten.

Ich musste den Leser davon benachrichtigen, weil ich in meinen etzten Abhandlungen dieses Gewicht aus Rücksichten des Isomor-hismus verkleinert hatte, welche ich in meinen Betrachtungen anzeichen habe und auf die ich zurückkommen muss.

big und Pelouze zur Zeit der Reise dieses letztern Chemikers in Deutschland unternommene Untersuchungen haben die letztern Resultate von Zeise bestätigt. Ich selbst habe seitden in den Annales de chim. et de phys. T. LXVIII. p. 171. anerkannt, dass die aus den Versuchen von Zeise hervorgehende Formel genau die Zusammensetzung der xanthinsauren Salze im Allgemeinen darstellt und dass bei meiner Analyse des Bleixanthürs ein Verlust von Wasser vorgekommen war.

Meine erste Abhandlung war besonders bestimmt, die uns ganz unbekannten Reactionen des Schwefelkohlenstoffes mit Bestimmtheit festzustellen. Sie verbreitet sich aber nicht umständlich über die verschiedenen Eigenschaften der darin enthaltene Verbindungen und erwähnt durchaus nicht die verschiedenes durch die Zersetzung der xanthinsauren Salze durch die Hitze entstehenden Oele. In dieser Abhandlung habe ich zum Zweck, die Eigenschaften der Verbindungen kennen zu lehren, welche der Schwefelkohlenstofferzeugt, und besonders die Wirkung da Hitze auf das xanthinsaure Kali sowohl als Bleioxyd zu untersuchen. Ich werde noch nicht vom xanthinsauren Kupferoxyl sprechen, da mir die Kürze der Zeit es nicht gestattet und hier auf dem Lande mir es nicht möglich ist, mich auf genaue Versuche einzulassen. Uebrigens wird dieses xanthinsaure Sals den einzigen Gegenstand einer dritten Abhandlung bilden, ich, sobald ich kann, liefern werde.

Wirkung der Hitze auf das xanthinsaure Kali.

Setzt man das xanthinsaure Kali in einem Destillirgefäss der Wirkung der Hitze aus, so zersetzt es sich, indem es eine Menge von verschiedenen Verbindungen erzeugt, unter denen das Xanthinöl von Zeise sich befindet. Die Zersetzung des Salzes zeigt sich bei 200°. Die Versuche wurden in einem Oelbade geleitet und die Producte der Destillation in einem gläsernen Schlangenrohre verdichtet. Die Gase wurden in graduirten und mit Quecksilber angefüllten Eprouvetten aufgefangen. Man erhält daher drei Arten von Substanzen, nämlich: Flüssigkeiten, sehr stinkende Gase und einen festen Rückstand.

Die flüssigen Producte (das Xanthinöl von Zeise) bestehen aus viel Mercaptan, Schwefelkohlenstoff, Xanthil, zuweilen aus ein wenig von einem andern dichtern und schwefelhalgern Oele, das ich später unter dem Namen Xanthurin unsuchen will.

Der in der Retorte zurückbleibende Rückstand besteht aus liumpolysulphuret, schwesligsaurem Kali und 7,5 p.C. Kohle. besitzt eine rothe Farbe, zieht die Feuchtigkeit der Lust urk an, fällt das basisch essigsaure Bleioxyd roth und löst sich lig in Wasser aus.

Die Gase von sehr üblem Geruche enthalten Kohlensäure, ties Kohlenoxyd, Spuren von Schwefelwasserstoff, Dämpfe Kanthin und von einer neuen gasartigen Verbindung, wele aus Kohlenoxyd und einem neuen schwefelwasserstoffhaltigen oducte besteht, welches dem oxydirten Wasser von Thénard tspricht.

Bei drei von mir zur Bestimmung der sich bei der Destilion des xanthinsauren Kali's bildenden flüssigen, festen und kförmigen Producte angestellten Analysen erhielt ich folgende kultate:

1) xanthinsaures Kali	50 Grammen
Rückstand	29 .
Flüssigkeit	14
Gase, durch den Verlust bestimmt	8
2) xanthinsaures Kali	61
Rückstand	33 ·
Flüssigkeit	18
Gas	10
3) xanthinsaures Kali	66
Rückstand	36
Flüssigkeit	20
Verlust an Gas	10

Das Mittel dieser drei Versuche gab auf 100 Gr. des nthinsauren Kali's:

Rückstand	54 ,9 5
Flüssigkeit	29,20
Gas und Dämpfe	15,05.

Das Gas dieser Menge Salz macht bei der Temperatur Berbstes ungefähr 4½ Litre aus. Diese Gase werden biter unten bei dem kanthinsauren Bleioxyde untersucht wern, weil die Destillation dieses kanthinsauren Salzes die Journ. f. prakt. Chemie. XXIII. 2.

neue gasartige Verbindung fast ohne Beimengung andrer Gee giebt.

Der röthe Rückstand von Kaliumpolysulphuret gab bei der Analyse Kohle, schwestigsaures Kali, welches durch Alkehel und Aether abgeschieden wird, und viel Kaliumpolysulphuret. Da dieser Gegenstand nichts Interessantes darbietet, so übergehe ich die genaueren Details der Versuche, welche mich aus diese Resultate geführt haben, mit Stillschweigen. Indessen will ich erwähnen, dass ich mich von der Auslösung der Kohle in den Kaliumpolysulphuret durch eine Säure überzeugt habe, durch welche die Kohle in Gestalt von leichten, mit Schwesel geschwängerten Flocken niedergeschlagen und durch Umwandlung in Kohlensäure bestimmt wurde.

Ich komme jetzt zur Untersuchung des flüssigen Productes, welches, wie weiter oben angegeben wurde, Mercaptas, Schwefelkohlenstoff und ein eigenthümliches geschwefeltes Od enthält, indem das Ganze so das Xanthinöl von Zeise aumacht. Aus dieser Zusammensetzung geht hervor, dass bei der Destillation dieses Gemenges bei 100' dasselbe vom Schwefelkohlenstoff und fast vom ganzen Mercaptan befreit wird. Die Abscheidung müsste selbst vollkommen sein. Dessenungeachte ist diese erste Reinigung nicht hinreichend. Man muss, un das Mercaptan abzuscheiden, das zurückbleibende Product nach der Destillation bei 100° durch Quecksilberoxyd abscheiden, welches sogleich das Mercaptan absorbirt und eine leicht krystallisirbare Verbindung bildet. Es bildet sich gleichfalls ein wenig Schweselquecksilber durch den freien Schwesel, welcher in dem Producte aufgelöst ist. Man filtrirt und destillirt zun zweiten Male in einem Oelbade. Das neue Product der Destillation ist nun schon fast ganz rein und kann nur noch Xanthurin, ein wenig Schwefel und zuweilen, aber selten, Spures von Schwefelkoblenstoff enthalten. Diese Körper werden von Xanthil durch in Alkohol aufgelöstes Kali abgeschieden. Wirklich erzeugen sich, wenn man gleiche Theile dieses letzten Oeles und des Xanthinöles mengt und das Gemenge 24 Staden an einem kühlen Orte der Ruhe überlässt, bei der Annahme, dass das Oel noch Schwefelkohlenstoff enthält, zwei Salze und ein wenig Kaliumpolysulphuret. Der Schwefelkohlenstof giebt xanthinsaures Kali und Xanthurin, ein eigenthümliches

Salz, welches ich weiter unten kennen lehren werde. Diese beiden Salze sind sehr löslich in Wasser, so dass dieselben, wenn man die Masse in einer Flasche mit engem Hals mit viel Wasser verdünnt, aufgelöst werden, und das Xanthil, welches unter dem Einflusse dieser Agentien keine Veränderung erleidet und unlöslich ist, auf der Oberfläche der Flüssigkeit schwimmt, wovon es durch eine Pipette entfernt wird. Es ist gelb und enthält ein wenig Wasser. Daher ist es nöthig, dasselbe über Chlorcalcium zu destilliren, um es rein zu erhalten.

Das auf diese Weise gereinigte Xanthil ist farblos, von einem sehr durchdringenden widrigen Geruche, der es aber fast nicht so sehr wie der des Mercaptan ist. Es ist in Wasser unlöslich, löslich in Aether und Alkohol. Bei 130°C. kommt es in's Sieden. Seine Dichtigkeit in Vergleich: mit der des Wasners ist 0,894. Die Dichtigkeit seines Dampfes, aus Versuchen abgeleitet, ist 3,564. Folgendes sind die Resultate der Operation:

Unterschied der Gewichte	0,190
Temperatur der Luft	11°
Temperatur des Dampfes	195°
Druck der Luft	28

Rauminhalt des Ballous 297 Cubikcent.
in dem Ballon zurückgebliebene Luft 74 Cubikcent.

Aus diesem Versuche ergiebt sich das Gewicht des Litre

Dampf zu 4,603, woraus man ableitet $\frac{4,603}{1,299} = 3,564$.

Die Elementaranalyse des Xanthils bot mit anfangs viele Schwierigkeiten dar, weil ich nicht die Vorsicht gebrauchte, dasselbe durch Aetzkali zu reinigen, und es immer veränderliche Mengen von Schwefel und Xanthurin zurückhielt. Als ich aber Mittel, es zu reinigen, aufgefunden hatte, stimmten die Resultate der Aualyse besser mit einander überein. Ich stellte eine grosse Anzahl von Versuchen an, um die Zusammensetzung des Xanthils zu bestimmen, ich will aber dessenungeachtet nur einige anführen.

1) Xanthil 0,400 Kohlensäure 0,760 Wasser 0,395.

. .

. :

Diese Resultate leiten auf folgende Zusammensetzung:

Kohlenstoff 45,68

Wasserstoff 9,55

Verlust 45,98.

2) Xanthil 0,830

Kohlensäure 1,374

Wasser 0,719.

Hieraus ergeben sich für die Elementarzusammensetzung folgende Verhältnisse:

 Kohlenstoff
 45,771

 Wasserstoff
 9,614

 Verlust
 44,615.

 3) Xanthil
 0,755

 Kohlensäure
 1,210

 Wasser
 0,655.

Diese Resultate geben folgende Zusammensetzung in 100

Theilen: Kohlenstoff 45,401

Wasserstoff 9,623 Verlust 45,399.

Diese Analysen bieten ohne Zweisel Verschiedenheiten besonders in dem Gewichte des Kohlenstoffes dar. Berücksichtigt man aber die Schwierigkeiten, welche man bei der Reinigung des Xanthils erfährt, so kann man diese geringen Abweichun-

gen entweder einer geringen Menge von Feuchtigkeit oder von Schwesel beimessen, welche die zu den Versuchen angewandten Exemplare enthalten können. Wie dem auch sei, so ist das Mittel der drei oben angeführten Analysen solgendes:

Kohlenstoff 45,650 Wasserstoff 9,595

Verlust 44,755.

Drei Versuche, welche ich zur Bestimmung des Schwefels anstellte, gaben sehr nahe kommende Zahlen, ungeachtet die geringe Menge, die ich daraus vom Xanthil erhalten hatte, mich glauben liess, dass der Schwefel keinen Bestandtheil dieses neuen Körpers ausmacht und dass er nur mit Hülfe einer geringen Menge von Xanthurin, oder selbst im freien Zustande in dem Xanthil aufgelöst, darin vorkommt. Folgendes sind übrigens die Versuche, welche darüber angestellt worden sind:

1) Xanthil 0,461 erhaltener schwefelsaurer Baryt 0,093.

Dieser Versuch giebt 0,0202 schwefelsauren Baryt auf 100 Xanthil.

2) Xanthil 0,511 schwefelsaurer Baryt 0,109.

Diess giebt 0,0213 schwefelsauren Baryt auf 100 Xanthil.

3) Xanthil '0,492 schwefelsaurer Baryt 0,101.

Hieraus ergeben sich 0,0204 schweselsaurer Baryt auf 100 Xanthil.

Das Mittel dieser drei Versuche giebt für den schwefelsauren Baryt die Zahl 0,0206 und für den Schwefel 0,00284,
also ungefähr 3 Tausendtheile. Wir können daher schliessen,
dass das Xanthil keinen Schwefel enthält, und dass die geringe
darin vorkommende Menge desselben keinen Bestandtheil ausmacht,
sondern von einer geringen Unreinigkeit herrührt. Der sich auf
45,5334 p.C. belaufende Verlust kann alsdann nur Sauerstoff sein.

Die aus dieser Zusammensetzung sich ergebende einfachste Formel ist $C_4H_{10}O_3$, welche ohne Zweisel sich auf die der Aetherarten zurücksühren lässt. Man kann in der That das Kanthil als doppeltsauerstoffhaltigen Aether $= C_4H_{10}O + O_2$, oder auch als Aldehydhydrat $= C_4H_8O_2, H_2O$, oder auch wohl, wenn man lieber will, als C_4H_6O, H_4O_2 betrachten. Ich werde aber weiter unten zeigen, dass es rationeller ist, die erstere Formel anzunehmen. Wenn man jetzt die theoretische Zusammensetzung des Kanthils außucht, indem man von dieser Formel ausgeht, so erhält man sast die durch den Versuch erhaltenen Zahlen. Wirklich hat man:

Kohlenstoff 45,765
Wasserstoff 9,340
Sauerstoff 44,895.

Wenn wir endlich aus dieser Zusammensetzung das Gewicht des Dampses von dem Xanthil zu bestätigen suchen, so Inden wir auch sehr besriedigende Annäherungen. Wirklich erhalten wir:

 $C_4 = 3,3752$ $H_{10} = 0,6870$ $O_3 = 3,3078$.

Die Summe dieser Zahlen ist 7,3700, welche die Dichtigkeit der Formel $C_4H_{10}O_3$ darstellt. Diese Zahl aber ist

ziemlich das Doppelte von der durch Versuche gefundenen Dichtigkeit, denn $\frac{7,37}{2}$ = 3,685. Der Unterschied befindet sich, wie man sieht, innerhalb der Grenze möglicher Irrthümer und kann nur aus einigen Spuren von Feuchtigkeit entstehen. Meine Versuche bestätigen sich daher gegenseitig und beweisen, dass das Xanthil bestimmt aus 10 Volumen Wasserstoffgas, 8 Volumen Kohlenstoffdampf und 3 Volumen Sauerstoff, die zu 2 Volumen verdichtet sind, besteht. Die chemische und physikalische Formel des Xanthils ist demnach = $\frac{C_4H_{10}O_3}{2}$ = 3,685.

Es fragt sich, in welcher Ordnung sich die Atome des Xanthils gruppiren? Man kann dreierlei Fälle annehmen, und vielleicht hat jeder derselben einige Reactionen für sich. Wirklich kann das Xanthil durch die drei folgenden Formeln dargestellt werden;

 $C_4H_{10}O,O_2$ $C_4H_8O_2,H_2O$ $C_4H_6O_3,H_4$.

Die erste stellt oxydirten Aether, die zweite wasserhaltiges Aldehyd, welches man auch durch $C_4H_6O_1H_4O_2$ bestimmen kann, die dritte endlich stellt das Radical der Essigsäure, verbunden mit 4 Atomen Wasserstoff und ein Hydrür bildend, dar. Ich kann noch kein Beispiel angeben, um die zwei letzteren Formeln zu bestätigen. Es ist aber wahrscheinlich, dass man durch Chlor oder einen andern Wasserstoff entziehenden Körper die 4 Atome Wasserstoff abscheiden und das reine oder entweder mit Chlor oder mit Chlorwasserstoffsäure verbundene Radical der Essigsäure erhalten kann. Wenn man aber dieses Resultat selbst erhielte, so fragt sich, ob man daraus schliessen dürfte, dass das Xanthil die Anordnung $C_4H_6O_3$, H_4 habe. Ich glaube es nicht und stütze mich dabei auf folgende Gründe:

Die Formel für das Aldehyd als Dampf lässt sich durch 4, die der Essigsäure durch 3 dividiren. Die Formel für des Aether und die für das Xanthil lassen sich in 2 Volumen theiles, das heisst, wir haben

$$\frac{C_4H_8O_2}{4} = Aldehyd,$$

$$\frac{C_4 H_8 O_4}{3} = \text{Essigsaure},$$
 $\frac{C_4 H_{10} O}{2} = \text{Aether},$
 $\frac{C_4 H_{10} O_3}{2} = \text{Xanthil}.$

Daher ist nur die Formel für den Aether mit der für das Kanthil in Uebereinstimmung, weil sich alle beide physikalisch auf dieselbe Weise verhalten. Ich sage physikalisch, weil ich den Phänomenen dieser Art eine grosse Wichtigkeit beilege. Die chemischen Reactionen sind nur feine physikalische Phänomene, deren Kräste wir nicht gehörig beurtheilen können, weil sie auf untheilbare und unsichtbare Atome wirken.

Von dieser kurzen Erörterung und Allem, was sie Interessantes darbieten kann, kehre ich zu der Formel für das Kanthil zurück. Ich erwähne daher, dass die Anordnung seiner Atome der der Atome des Aethers gemäss ist und dass seine rationelle Formel in diesem Falle $= C_4H_{10}O_3$ oder $C_4H_{10}O_2$ ist. Es ist hiernach viel Grund vorhanden, die Existenz eines dritten intermediären Körpers, welcher $C_4H_{10}O_2$ ähnlich ist, anzunehmen.

Malaguti hat bei seinen Versuchen mit den Aetherarten eine umfassende Hypothese aufgestellt, durch die er alle Aetherarten in die Classe der Aldehydverbindungen bringt. Ich glaube aber nicht, dass die von diesem Chemiker daraus abgeleiteten Folgerungen sich allgemein anwenden lassen, und es scheint mir erwiesen, dass zwei Classen von Radicalen existiren: das Radical des Aldehyds und das des Aethyls. Es wird überraschen, dass meine Ansicht die Chemiker vielleicht nach Alkohol und Aether nicht zu demselben Radical gehören sollen. Der Alkohol verliert nicht allein bei seiner Umwandlung in Aether ein Atom Wasser, sondern die Anordnung seiner Atome ändert sich auch ganz. Daher haben wir als Aldehydgruppe den Alkohol, das Aldehyd, das Mercaptan u. s. w., und als Aethylgruppe den Aether, das Xanthil, das Alkarsin u. s. w. Malaguti ist bei Aufstellung seiner Theorie von der Wirkung des Chlors auf den Aether ausgegangen. Aber daraus, dass das Chlor durch Abscheidung von 4 Atomen Wasserstoff reagirt, kann man wohl nicht schliessen, dass der Aether sich durch $C_4H_6O+H_4$ darstellen lässt. Die Sache würde ganz einleuchtend sein, wenn das Chlor seine Wirkung auf die 4 Atome Wasserstoff beschränkte und wenn andre Körper dieselbe Menge von Wasserstoff abscheiden könnten. Nun ist diese aber nicht der Fall. Wenn man z. B. durch ein anderes Agens nur zwei Atome Wasserstoff abscheiden könnte, so hätte mas Grund, den Aether als $C_4H_8O_2H_3$ zu betrachten, und wenn man durch ein in günstige Umstände versetztes Alkali eine der Fermel $C_4H_8O_3M_3$ ähnliche und aus dieser Reaction entstehende Verbindung erhielte.

 $C_4H_8O_1H_2+MO=C_4H_8O_1M+H_2O_1$

Es fragt sich, ob es nicht rationell ist, den Aether als eine Wasserstoffsäure zu betrachten, deren Radical C₄H₈O, und die fähig wäre, sich mit den Metallen zu verbinden. Ich glaube, dass diese Annahme eben so natürlich, eben so logisch richtig ist, wie die andern, und dass sie beweist, wie schwierig es ist, eine rationelle Formel zu geben, selbst wenn man von noch so sehr bestimmten chemischen Reactionen ausgeht. Dagegen lässt sich freilich sagen, dass man doch wählen und bestimmen müsse, welches die wirkliche Formel für den Aether ist, ob man diesen Körper durch die erste, die zweite, die dritte oder die vierte dieser Formeln darstellen soll.

- 1) C₄H₁₀O
- 2) $C_4H_6O+H_4$
- 3) $C_4H_8O+H_2$
- 4) C₄H₈,H₂0.

Ich lasse für jetzt die Frage unbeantwortet.

Ungeachtet der so eben angegebenen grossen Verlegenheit, um die chemischen Körper darzustellen, trägt man kein Bedenken, rationelle Formeln zu geben, und alle Tage sieht mas dieselbe Verbindung durch verschiedene Formeln darstellen. So ist das Aldehyd, welches anfangs $C_4H_8O_2$ war, nach Liebig $C_4H_8O_3H_2O$. Ganz neuerlich ist die Formel von Dumas in C_2O_3 , C_2H_2 , H_6 umgewandelt worden. Die Essigsäure $C_4H_8O_4$, deren Reactionen so gut bestimmt und deren Radical bei uns neutral $= C_4H_6O_3$ wird, ist bei Dumas $= C_2O_2$, C_2H_2 , H_6 , eine wahrhaft sonderbare Formel, die durch nichts, selbst nicht einmal durch Dumas's Versuche gerechtfertigt wird.

Wie es sich auch mit diesen verschiedenen Ansichten erhalten mag, so ist es jetzt, wo wir alle dazu erforderlichen ata haben, leicht, die Wirkung der Wärme auf das xanthinaure Kali durch eine Formel darzustellen. Ich will zuerst die rhaltenen verschiedenen Producte nochmals erwähnen. Es sind urer sieben, nämlich:

Mercaptan
Xanthil
Xanthingas
Kohlensäure
Schwefelwasserstoff
Kohle
Kaliumpolysulphuret.

Ich habe auch unterschwefligsaures Kali und Schwefelphlenstoff angegeben; ich habe mich aber überzeugt, dass das
retere sich erst spät bildet und durch den Zutritt der Luft zum
aliumpolysulphuret, und dass alsdann der Sauerstoff des Salzes
icht mit in Rechnung kommt. Vom Schwefelkohlenstoff bilden
ch nur Spuren, und wenn die Operation gehörig geleitet
rird, bildet sich auch keiner. Der Mechanismus der Zerseznng wird mit 6 Atomen xanthinsauren Kali's auf folgender
Veise bewerkstelligt:

$$6(C_4H_{10}O,CS_2+KO,CS_2)=C_{36}H_{60}O_{12}S_{24}K_6$$
wirkende Atome.
$$3(C_4H_{12}S_2)+2(C_4H_{10}O_3)+C_2O_2,H_2S_2+2(CO_2)+H_2S_2+C_{12}+6(KS_2^{1/2})$$
Producte.

Das heisst: aus 6 Atomen xanthinsauren Kali's $= C_{36}H_{60}O_{19}$ Le bilden sich durch die Wirkung einer Wärme von 200° C.:

3 At. Mercaptan $= 3(C_4H_{12}S_2)=2348,856$ 2 - Xanthil $= 2(C_4H_{10}O_3)=1336,304$ 2 - Xanthingas $= C_2O_2H_2S_2=767,676$ 1 - Schwefelwasserstoffsäure $= H_2S = 213,640$ 2 - Kohlensäure $= C_2O_4 = 552,876$ 12 - Kohle $= C_{12} = 917,256$ 6 - Kaliumpolysulphuret $= 6(KS_2^{1/2}) = 5956,920$.

Bei der Berechnung dieser Resultate in 100 Theilen erilt man:

Mercaptan	19,409)	20 469	William what
Xanthil	11,059	00,200	Flüssigkeit
Xanthingas	6,356		·
Kohlensäure	4,571 = 1,766	12,693	Gas
Schwefelwasserstoffsäure	1,766)	•	•
Kohlenstoff	7,583)_	KG 990	Dishatand
Kaliumpolysulphuret	49,256}	00,003	Rückstand.

Ich glaube, dass es nicht möglich ist, übereinstimmender Resultate zu erhalten, das heisst, dass sie bei den flüssigen, gasförmigen und festen Producten, welche bei den Versuche angegeben sind, wiederkehren. Denn die geringe Differens entsteht ohne Zweifel daraus, dass sich das Gas anfangs mit Xanthindämpfen sättigt, welche aus den Dämpfen des Mercaptan und Xanthil bestehen; sodann auch daraus, dass die Flüssigkeit bei ihrer Verdampfung Spuren von Schwefel des Keliumpolysulphurets mit sich fortreisst, denn man wird sich erinnern, dass ich den Dampf in dem Gase und den freier Schwefel in der Flüssigkeit angegeben bahe. Zufolge dieser theoretischen Resultate, so wie deren der Versuche, würde die Flüssigkeit 2 Procent Schwesel und das Gas 1/2 Procent von dem Dampfe der Flüssigkeit mit sich fortreissen, welche aus viel Mercaptan und wenig Xanthil besteht, indem das erstere flüchtiger als das zweite ist. Diess ist unter den Umstanden, wobei diese Operationen vorgenommen werden, ganz unvermeidlich.

Es geht daher aus allen diesen Thatsachen hervor, dass sich bei der Destillation des xanthinsauren Kali's, wenn sie mit Vorsicht in einem Oelbade geleitet wird, weder Schwefelkohlenstoff, noch unterschwefligsaures Kali bilden darf und dass die Beaction auf 6 Atome xanthinsaures Kali stattfindet.

Von den xanthinsauren Metallsalzen.

Die xanthinsauren Metallsalze, welche man sonst Xanthüre nannte, haben die Zusammensetzung der xanthinsauren Alkalies, d. h. sie enthalten:

1 Atom Aether $= C_4H_{10}O$ 1 - Oxyd = MO2 - Schwefelkohlenstoff $= C_2S_4$.

Ihre Bereitung ist sehr einfach. Sie besteht darin, dam man zwei sehr verdünnte Auflösungen eines Metallsalzes und

eines löslichen xanthinsauren Salzes, wie z. B. das des Kali'a, zusammenmischt, so dass man eine vollständige Zersetzung erhält, und der Niederschlag mit destillirtem Wasser gewaschen wird. Der Niederschlag ist nach gehörigem Waschen und Troeknen reines Xanthür. Es ist bei dieser Bereitung sehr wichtig, nicht zu concentrirte Auflösungen anzuwenden, wenn man eine Zersetzung der xanthinsauren Salze vermeiden und die Abscheidung eines gelblichen, stark riechenden und der Hydroxanthinsture analogen Oeles bewirken will, welches ein sehr mit Schwefel geschwängertes Xanthurin ist. Ich will bei dem xanthinsauren Kupferoxyd davon sprechen. Eine mit 200 Gr. xanthinsaurem Kali, welches in 500 Gr. Wasser aufgelöst wurde, vorgenommene Operation bewirkte durch Reaction auf eine entsprechende Menge essigsauren Bleioxyds die Abscheidung eiber grossen Menge einer öligen Substanz, welche ich sehr leicht durch eine Pipette entfernen und der Analyse ohne vorgängige Beinigung unterwerfen konnte. Wenn dieses Phänomen sich zeigt, so muss das Gemenge stark geschüttelt werden, um die Verbindung wieder herzustellen. Aber das erhaltene Salz ist alsdann niemals so schön, es ist riechend und hat ein fettiges Ansehen. Nach dieser Bemerkung ist es daher von Wichtigkeit, die Auflösungen bei der Bereitung der unlöslichen xanthinsauren Salze zu verdünnen.

Xanthinsaures Bleioxyd.

Das xanthinsaure Bleioxyd wird durch Zersetzung des xanthinsauren Kali's durch essigsaures Bleioxyd bereitet. Der Niederschlag, mit destillirtem Wasser gewaschen und in der Hitze oder an der Sonne getrocknet, ist amorphes xanthinsaures Bleioxyd. Dieses durch blosses Fällen erhaltene Salz ist sehr veränderlich und wird mit der Zeit, selbst in einer hermetisch verschlossenen Flasche, schwarz. Es zeigt zuweilen Verschiedenbeiten in seiner Zusammensetzung. Aus diesem Grunde gaben ohne Zweifel meine ersten Analysen Abweichungen in ihren Resultaten und veranlassten mich, die xanthinsauren Metallsalze als Verbindungen mit Doppeltkohlenwasserstoff statt mit Aether, den sie wirklich enthalten, zu betrachten.

Das xanthinsaure Bleioxyd wird dadurch gereinigt, dass man es in Alkohol krystallisiren lässt. Zu diesem Zwecke löst

man es darin bei einer Temperatur von 45-50°C. auf. Das xanthinsaure Bleioxyd löst sich bei dieser Temperatur auf mi krystallisirt beim Erkalten in langen seidenglänzenden Nadels von einer etwas gelblichen Farbe und einem asbestartigen Aus-Bringt man das Ganze auf ein Filter, so erhält ma seben. die Krystalle in höchster Reinheit. Es ist von Wichtigkeit, der Alkohol nicht in's Sieden kommen zu lassen, weil sich dam ein Theil des Salzes zersetzt. Es bildet sich unlösliches Schwefelblei, welches beim Erkalten auf die Krystalle niederfälk und sie verunreinigt. Es ist eine grosse Menge von Alkohol zur Auflösung des xanthinsauren Bleioxyds bei der angegebena Temperatur erforderlich. In der Kälte lösen sich nicht einmal Spuren davon auf.

Mit dem auf diese Weise bereiteten xanthinsauren Bleioxyl babe ich Versuche angestellt, um seine Zusammensetzung mit Bestimmtheit kennen zu lernen. Die von mir angestellten Amlysen stimmen alle mit den von Zeise gefundenen Resultaten überein. Wie die Zusammensetzung der xanthinsauren Alkalien, enthält die des xanthinsauren Bleioxyds

> 1 At. Aether =468,7521 - Bleioxyd = 1394,5102 - Schwefelkohlenstoff = 957,510.

Hieraus leitet man die Formel C₄ H₁₀ O, Pb O, C₂ S₄ ab, wonach man in 100 Th. hat:

> 16,262 Kohlenstoff 2,210 Wasserstoff 49,447 Bleioxyd Schwesei 28,531 3,550. Saverstoff

Das xanthinsaure Bleioxyd ist unlöslich in Wasser, löslich in siedendem Alkohol, unlöslich und unzersetzbar in Aether und wird durch Hitze und Säuren leicht zerstört (Ann. de Chim. et de Phys. LXVIII. 172).

Die Zersetzung des xanthinsauren Bleioxyds durch Hitze wird in einer Retorte oder einem Kolben vorgenommen, deren Bauch in ein Oelbad ganz eingetaucht wird. Die Destillation beginnt bei 130° C. und es bilden sich, wie bei dem xanthinsauren Kali, Flüssigkeiten und viel Gas. Wenn man dem Aparate eine solche Einrichtung giebt, dass man alle Producte ammeln kann, so erhält man folgende Resultate:

1)	Xanthinsaures	Bleioxyd	92,0 Gr.	==	auf 100
	Rückstand		54,0 -	==	58,69
	Flüssigkeit		30,0 -	=	8,71.

Das Gasvolumen bei einer Temperatur von 10° und einem aftdrucke von 765 Mm. betrug 2400 Cubikcent., ungefähr 1/2 Litre.

2)	Xanthinsaures	Bleioxyd	87	Gr.	==	auf 100
	Rückstand		50	-	=	57,47
	Flüssigkeit		30	-	=	34,48
	Gas ·		7	-		8.05.

Das Gasvolumen bei einer Temperatur von 8° und einem uftdrucke von 766 Mm. betrug 2940 Cubikeent., ungefähr ¼ Litre.

3)	Xauthinsaures	Bleioxyd	8 2 G r	_	auf 100
	Flüssigkeit		2 9 –	=	35,36
	Rückstand		45 -	==	54,87
	Gas	•	8 -		9,70.

Das Gasvolumen betrug 2128 Cubikcent. bei einem Luft-rucke von 766 Mm. und einer Temperatur von 8°.

4)	Xanthinsaures	Bleioxyd '	48	Gr.	==	auf 100
	Rückstand		28	-	==	58,33
	Flüssigkeit		16	•	==	33,88
	Gas		4	-	==	8,34.

Das bei diesem Versuche erhaltene Gas betrug 1270 Cukcent., d. h. ungefähr $1\frac{1}{4}$ Litre. Als Mittel für diese 4 ersuche ergiebt sich in 100 Th.:

Rückst	and	57,34
Flüssig	keiten	33,94
~		3.79.

Die Verschiedenheiten, welche man bei diesen Versuchen merkt, rühren von der grössern oder geringern Trockenheit is Salzes her, denn jedesmal wurde neues xanthinsaures Bleiyd angewandt. Nimmt man an, dass der Rückstand nur reis Schwefelblei ist = PbS, so giebt die Theorie die Zahlit, welche der des dritten Versuches entspricht. Wenn men
er bedenkt, dass man es mit durch blosses Fällen erhaltenem athinsaurem Bleioxyd zu thun hat und dass es fast unmög-

110 Couërbe, üb. den Schweselkohlenstoff.

lich ist, es in diesem Zustande so zu erhalten, dass es der angegebenen theoretischen Zusammensetzung entspricht, dass ferner der von seiner Zersetzung herrübrende Rückstand von Schwefelblei beständig einen starken Geruch hat und dass er alsdann Spuren von organischen Substanzen enthalten muss, so ist die durch die Versuche angezeigte Zersetzung des kanthinsauren Bleioxyds durch Hitze innerhalb der Grenzen der Wahrheit. Das überdiess in der Retorte zurückbleibende Sulfür hält immer etwas mehr Schwefel zurück, als zur Bildung des Kinfachschwefelmetalles erforderlich ist. Es hält auch Spuren von Kohle zurück, denn 20 Gr. dieses Sulfürs, mit Borax und Eisenfeilspänen geschmolzen, gaben einen Bleikönig, welcher ib Gr. und 2 Decigr. wog. Ein anderer Versuch mit Salpetersäure gab auf 1 Gr. zurückbleibendes Sulfür eine 0,765 dieses Metalles entsprechende Menge von schwefelsaurem Bleiexyd.

Die durch die Destillation des xanthinsauren Bleioxyds entstehenden Flüssigkeiten.

Die Flüssigkeiten, welche man bei der Destillation des xanthinsauren Bleioxyds erhält, bestehen aus Schweselkohlenstof, ein wenig Mercaptan, Alkohol, Xanthurin und zuweilen aus Spuren von Xanthil. Man kann daher 4 Zeitpuncte der Destillation annehmen, welche dazu dienen, sie von einander abzuscheiden und die Producte mehr oder weniger zu reinigen.

- 1) Destillation bei 60°
- 2) - 120°
- 3) — 140°
- 4) 200°.

Die Flüssigkeiten der drei ersten Destillationen sind farblos und von einer von der des Wassers nicht sehr verschiedenen Dichtigkeit. Die von der vierten Destillation ist etwas gelblich und schwerer als Wasser. Sie unterscheidet aich von der der dritten Destillation nur durch eine darin aufgelöste geringe Menge von Schwefel. Die bei der Temperatur von 60° erhaltene Flüssigkeit besitzt einen widrigen Geruch, und ihr spec. Gew. ist 1,1971. Beim Verbrennen bildet sie Wasser, schweflige Säure und Kohlensäure. Ihre Analyse leitete auf folgeste Zehlen:

Flüssigkeit bei 60° 0,925 Kohlensäure 0,631 Wasser 0,105,

:•

oraus sich für die Elementarzusammensetzung von 100 Th. abstanz ergiebt:

Kohlenstoff 18,860 Wasserstoff 1,254 Schwefel 79,884.

Die Formel für diese Flüssigkeit ist $C_{15}H_{12}S_{24}$, welche in $C_4H_{12}S_2+C_{11}S_{22}$ umwandle und welche deutlich ein emenge anzeigt von:

1 At. Mercaptan = $C_4H_{12}S_2$ 11 - Schwefelkohlenstoff = C_{11} S_{22} .

Daher bestehen, wie ich es weiter oben angegeben habe. e ersten bei der Zersetzung des xanfhinsauren Bleioxyds übershenden Portionen von Flüssigkeit aus reinem Schwefelkohnstoff und reinem Mercaptan in nicht constanten Mengen, wie h mich durch eine grosse Anzahl von Versuchen überzeugt ibe. Man überzeugt sich auch leicht, dass die bei 60° überstillirende Portion Mercaptan cothält, wenn man sie über Queckberoxyd erhitzt. Die Flüssigkeit wird etwas sehwarz und es Met sich sogleich Quecksilbermercaptid, welches fast sogleich rystallisirt. Die Anwesenheit von Schwefelkohlenstoff kann man arch weingeistige Kaliauflösung beweisen, welche sogleich de Krystallisation von mit Mercaptan verunreinigtem xanthinurem Kali erzeugt. Es geht daher aus diesen Thatsachen rvor, dass die Anwesenheit von Schwefelkohlenstoff und von ercaptan in der Flüssigkeit der ersten Destillation nicht bereifelt werden kann.

Die bei 100 und 120° flüchtigen Flüssigkeiten bestehen sch aus ein wenig Mercaptan, zuweilen aus Spuren von Schweikehlenstoff, Alkohol und ein wenig bei 140° überdestillinder Flüssigkeit; denn es ist unmöglich, diese verschiedenen biper durch blosse Destillationen zu entfernen. Der Alkoholneht den grössten Theil davon aus. Man beweist das Dasein eser Producte: 1) des Mercaptan durch Quecksilberoxyd; 2) is Schwefelkohlenstoffes und des Alkohols durch Aetzkali, elebes Salz von Zeise giebt; 3) durch Verdüssen der Flüssichet mit Alkohol und durch nachberige Behandlung dersel-

ben mit sehr wenig in Alkohol aufgelöstem Kali; indem man die Reaction einige Stunden fortgehen lässt und das Ganze mit Wasser behandelt, löst sich das Salz von Zeise vollständig auf und die Flüssigkeit von 140° schwimmt nach einigen Stunden Ruhe oben auf. Zuweilen findet man Spuren von Xanthil. Es ist bei diesem letztern Versuche unerlässlich, die weingeistigen Flüssigkeiten zu verdünnen, denn wenn man sie concentrirt anwendet, so wird die Flüssigkeit von 140° auch fest und giebt ein in Wasser lösliches Salz, so dass sie ganz verschwindet. Auf jeden Fall ist dieses Salz von dem von Zeise verschieden, so dass man bei einer aufmerksamen Untersuchung sie leicht von einander unterscheiden kans.

Da die Flüssigkeiten von 60 und 190° bekannt sind, so bleibt uns noch die durch die Destillation bei 140° entstehende zu untersuchen übrig. Ibre Natur, ihre Zusammensetzung und die Art, wie sie sich gegen Kali verhält, machen sie unserer Aufmerksamkeit werth. Ich nenne sie Xanthuria.

Von dem Xanthurin.

Um dieses Product in reinem Zustande zu erhalten, muss man nach Abscheiden der erwähnten Flüssigkeiten durch Destillation sie mehrere Male bei 145° destilliren und sie nur bei dieser Temperatur sammeln, denn bei einer niedrigern Temperatur könnte sie flüchtigere Flüssigkeiten, besonders aber ein wenig Xanthil zurückhalten, welches sich oft bei der Destillation der Xanthüre bildet und das man nur durch Destillation abscheiden kann, da ich noch keine Verbindung kenne, welche sich desselben direct bemächtigen könnte.

Das reine Xanthurin ist farblos, von einem eigenthümlichen, nicht widrigen Geruche, von einem milden Geschmacke und einem von dem des Wassers nicht sehr verschiedenen spec. Gewichte, welches 1,012 beträgt. Eine 4,357 destillirtes Wasser bei einer Temperatur von 8° enthaltende Flasche enthielt 4,445 Xanthurin. Indessen kann seine Dichtigkeit von 1,012 bis 1,020 abweichen, wegen des darin aufgelösten freien Schwefels, von dem es schwierig ist, dasselbe mit Sicherheit zu befreien. Man kann jedoch eine grosse Menge davon durch Destilliren desselben über Aetzkali oder durch Schütteln desselben mit einer wässrigen und concentrirten Auflösung von Aetzkali abeiner wässrigen und concentrirten Auflösung von Aetzkali ab-

scheiden. Wie dem auch sei, so bringt diese geringe Menge Schwefel keine Veränderung in dem Resultate seiner Reaction hervor und macht die Phänomene nicht merklich complicirter.

Die Dichtigkeit seines Dampses betrug 4,541. Versuch:

Unterschied der Gewichte 0,350
Temperatur der Luft 11°

Luftdruck 28 Zoll

Temperatur des Dampfes 195°

Rauminhalt des Ballons 260 Cubikcent.

zurückgebliebene Luft 74 —

Das Xanthurin enthält Kohlenstoff, Wasserstoff, Schwefel und Sauerstoff. Aus folgenden Analysen wird man sehen, dass wir diesen Körper als einen zusammengesetzten Aether betrachten müssen.

Xanthurin 0,511
 Kohlensäure 0,860
 Wasser 0,356.
 Xanthurin 0,670
 Kohlensäure 1,130
 Wasser 0,470.

Diese zwei Versuche geben auf 100 Th. Substanz:

Kohlenstoff 46,510 46,614

Wasserstoff 7,726 7,781,

woraus sich als Mittel ergiebt:

Kohlenstoff 46,562 Wasserstoff 7,753.

Andere Untersuchungen gaben ähnliche Resultate.

Bestimmung des Schwefels.

1) X	anthurin			0,473
e	rbaltener schv	vefelsaurer	Baryt	0,546
8	chwefel			0,075.
2) X	Canthurin ,			0,608
. 8	chwefelsaurer	Baryt		0,608.
	anthurin	•	·	0,560
•	ohwefelsaurer	Baryt	•	0,587
	chwefel		•	0,081.
	anthurin		. 6.	0,390
	chwefelsaurer	Baryt .		0,450
	chwefel	•		0,062.

Journ. f. prakt. Chemie. XXIII. 2.

114 Couërbe, üb. den Schwefelkohlenstoff.

Diese nach den in der ersten Abhandlung angegebenen Verfahrungsarten angestellten Versuche geben auf 100 Thek Xanthurin:

- 1) 15,88 Schwefel
- 2) 14,97
- 3) 14,46
- 4) 15,92.

Das Mittel dieser vier Analysen ist gleich 15,307 Schwefel auf 100. Ich nehme daher folgende Zusammensetzung in Xanthurins an:

Kohlenstoff	46,562
Wasserstoff	7,726
Schwefel	15,307
Sauerstoff	30,405.

Die mit diesen Zahlen übereinstimmende Formel ist C_8H_{16} O_4S , denn sie leitet auf folgende Zahlen:

Kohlenstoff	46,59
Wasserstoff	7,66
Schwefel	15,34
Sauerstoff	30,47.

Es fragt sich jetzt, ob man das Xanthurin als eine besondere Schweselverbindung, oder als einen eigenthümliche, unverbundenen Schwesel enthaltenden Körper betrachten soll. Durch die Formel kann zugleich Essigäther oder Aldehyd dargestellt werden, denn $C_8H_{16}O_4S = C_4H_8O_2 \times 2 + S = C_4H_{10}O_4$ $+C_4H_6O_3+S$. Es lässt sich aber vermuthen, dass, wenn man ein solches Gemenge in Alkohol und nachher in Wasser auflös, die ganze ölige Xanthurinslüssigkeit verschwinden würde, wei das Aldehyd und die Essigsäure in Wasser löslich sind und weil alsdann der Schwesel niederfallen und die Flüssigkeit trübe machen würde, was nicht der Fall ist, weil endlich die Destillation bei gehöriger Leitung Aldehyd und Essigäther in mehr oder weniger reinem Zustande, so wie einen Rückstand von Schwefel geben würde, was auch nicht geschicht. es unwahrscheinlich, dass ihr Siedepunct so hoch sein würde, weil das Aldehyd bei 22° und der Essigäther bei 72° siedet. Wenn bei der Destillation die Auflösungsmittel und neutrales Fällungsmittel den Schwefel nicht daraus abscheiden, so mus man daraus schliessen, dass man es nicht mit einer Auflörung,

örbindung zu thun hat. Uebrigens reicht es hin, Kanthurin n einziges Mal gesehen, gerochen und gekostet zu haben, um immer wieder zu erkennen und um sich zu überzeugen, dass ein eigenthümlicher neuer Körper ist.

Virkung des in Alkokol aufgelösten Kali's auf das Xanthurin.

Wenn man Xanthurin mit in Alkohol aufgelöstem Kali beindelt, so krystallisirt das Gemenge sogleich, bildet ein weisis Salz, welches man durch Auspressen zwischen Leinwand
hält und welches man mit Aether waschen muss, um es rein
i erhalten. Fast die Hälfte der Flüssigkeit verschwindet. Wenn
an dieses Salz nach vorheriger Reinigung der Analyse unrwirft, so bemerkt man, dass es aus Schwesel, Wasserstoff,
inderstoff, Kohlenstoff und Kali besteht. Wir wollen jetzt in
e Details der Versuche eingehen.

Bestimmung des Kohlenstoffes und Wasserstoffes.

1)	Salz	1,020
	Kohlensäure	0,649
	Wasser	0,222.
2)	Salz	1,384
	Kohlensäure	0,840
	Wasser	0,275.
3)	Salz	0,948
	Kohlensäure	0,599
	Wasser	0,208.

Diese Resultate geben auf 100 Th. für den Kohlenstoff und 'asserstoff:

1) Kohlenstoff	17,539	Wasserstoff	2,415
2) -	17,780	•	2,200
3) —	17,470	****	2,430
Mittel	17,596	M ittel	2,381.

Bestimmung des Schwefels.

1)	Salz		0,419
	schwefelsaurer	Baryt	9,340
	Schwefel	·	0,047.
2)	Salz	•	0,472
	schwefelsaurer	Baryt	0,390
	Schwefel	•	0,054.

116 Couërbe, üb. den Schweselkohlenstoff.

Das Mittel dieser beiden Versuche ist auf 100 gleich 11,33, indem der erstere 11,22 und der zweite 11,44 Schwefel auf 100 gegeben hatte.

1)	Salz	0,587
•	Chlorkalium	0,450.
2)	Salz	0,790
·	Chlorkalium	0,605.
Mittel =	Chlorkalium	0,7720
	Kalium	0,4055
=	Kali	0,4882.

Hieraus ergiebt sich:

Kohlenstoff	17,596	
Wasserstoff	2,381	
Schwefel	11,440	
Kali	48,820	
Sauerstoff	19,763.	

Die mit diesen Zahlen zusammenfallende Formel ist gleich $C_4H_6O_3$, $KO+\frac{1}{3}KS$. Sie drückt ein Gemenge von 1 At. essigsaurem Kali und $\frac{1}{3}$ Atom Dreifachschwefelkalium aus. Die aus dieser Formel abgeleitete theoretische Zusammenseszung ist:

Kohļenstoff	17,667	
Wasserstoff	2,163	
Kali	39,859	
Kalium	11,361	
Schwefel	11,633	
Sauerstoff	17,317.	

Anfangs glaubte ich, es mit einem neuen eigenthümliches Salze zu thun zu haben, und berechnete dafür die Formel C₄H₆O₃ S, 1½ K O, welche auf diese Weise ein Salz darstellt, das auf 1 At. Schwefelsäure ½ Basis enthalten haben würde, indes die aus dieser Formel abgeleitete Zusammensetzung in 100 The sich übrigens sehr wenig von der direct gefundenen Zusammensetzung entfernt. Wirklich ist sie:

Kohlenstoff	17,330
Wasserstoff	2,122
Schwefel	11,408

Kali 52,140 Sauerstoff 17,006.

Nur erst später und nachdem ich meine Bemerkungen auferksamer geprüft hatte, habe ich die Ansicht, eine solche Verindung anzunehmen, aufgegeben und bin veranlasst worden, nige neue Versuche über dieses Salz anzustellen. Alsdann berzeugte ich mich durch das essigsaure Bleioxyd, dass das alz, obwohl sehr weiss, doch Kaliumpolysulphuret enthält, und ass nach Entfernung dieser Portion Kaliumpolysulphuret aus der ormel essigsaures Kali zurückbleibt, das ich nachher gereinigt ad so behandelt habe, dass es mir gelang, dasselbe zu erkennen.

Das Xanthurin zersetzt sich also beim Zusammentressen mit Alkohol aufgelöstem Kali völlig, so dass es seinen Schwe- abgiebt und essigsaures Kali und Alkohol bildet.

Von dem Xanthingase.

Nachdem ich mich nach einander mit dem Rückstande, elcher in dem Sulfür und verschiedenen Flüssigkeiten besteht, schäftigt habe, muss ich, um Alles, was mit der Destillation ar kanthinsauren Salze in Beziehung steht, anzugeben, von am Kanthingase sprechen. Ich glaubte anfangs, dass dieses as nur ein Gemenge von Kohlensäure, Kohlenoxydgas und chwefelwasserstoffgas sei. Als ich aber später eine grössere lenge dieses Productes behandelte, konnte ich seine wirkliche atur, welche neu ist, erkennen.

Dieses Gas ist äusserst stinkend. Der Geruch des Merptan ist nichts gegen den seinigen, obwohl er dem des Merptan sehr nahe kommt. An der Luft entzündet, brennt es it blauer Flamme, wie es bei einem Gemenge von Schwefelasserstoff und Kohlensäure der Fall ist. Das Product dieser erbrennung ist Wasser, schweftige Säure und Kohlensäure, setzt sich Schwefel ab. Die Luft muss erneuert werden, enn man will, dass die Verbrennung vollständig erfolgen soll. ie metallischen Auflösungen geben kaum schwarzes Sulfür nd das sich bildende rührt nur von Spuren damit gemengten chwefelwasserstoffes her. Wenn man in eine ziemlich grosse prouvette, z. B. von einem halben Litre, die über Quecksilber chracht und mit diesem Gase angefüllt ist, vermittelst einer gekrümmten Pipette ungefähr eine halbe Unze Kalilauge

118 Couerbe, üb. den Schwefelkohlenstoff.

von 36° bringt, so erfolgt die Absorption langsam. Nach Verlauf von 24 Stunden ist sie vollständig und man findet sekt durchsichtige Krystalle von Schwefelwasserstoff – Schwefelkelium, wodurch metallische Lösungen schwarz gefällt werden. Die Auflösung enthält auch kohlensaures Kali. Alkohol, Atther und ätherische Oele lösen das Xanthingas ungefähr in Megenden Verhältnissen auf:

 Alkohol
 12 Vol.

 Aether
 20 —

 Terpentinöl
 10 — ♯)

Reines Bleioxyd zersetzt es nicht. Durch ein sechstägige Zusammensein erlitt das Gas keine Veränderung. Das Oxyl bräunte sich etwas auf seiner Obersläche. Der schwammige Borax bewirkte eben so wenig eine Veränderung des Volumen, so dass ich mit Gewissheit behaupten kann, dass dieses Gas keine schweslige Säure enthält.

Um die genaue Zusammensetzung dieses eigenthämliches Productes zu erkennen, musste ich nothwendig mehrere erfolglose Versuche anstellen. Ich wandte zuerst Zinn an, um den Schwefel zu absorbiren. Der Versuch wurde in einer gekrümmten Glocke über Quecksilber vorgenommen, wie bei der Analyse der Schwefelwasserstoffsäure; es war mir aber nachher zu meinem grossen Erstaunen unmöglich, durch dieses Mittel meinen Zweck zu erreichen. Das Zinn bemächtigte sich nick des Schwefels. Mit dem Kalium, welches ich nachher aswandte, gelang es mir nicht besser, denn das Gas wurde durch dieses Metall völlig absorbirt, so dass das feste Product nur durch das Kalium in den festen Zustand versetztes Xanthings war. Um zu verhüten, dass sich das Quecksilber mit dem Product vermengte, setzte ich 1/2 Vol. Stickstoff zu, welches nach dem Versuche zurückblieb. Das feste Product bestand aus mehr oder weniger schwefelhaltigem Schwefelkalium, aus Kali, Schwefelwasserstoff - Schwefelkalium und Kohle. Beim Auflösen in Wasser fällt die Kohle als schwarzes Pulver nieder und die

^{*)} Ich werde nächstens von diesen verschiedenen Auflösungen und ihrer Wirkung auf die ätzenden Alkalien sprechen. Die Zest gestattete mir nicht, auch diese Frage zu untersuchen.

die Auflösung werden die Kupfersalze, die Bleisalze u. s. w. schwarz gefällt. Aus allen diesen Reactionen kann man schon jetzt schliessen, dass das Kanthingas Schwefel, Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff enthält, dass der Schwefel und Wasserstoff in einem Verhältnisse verbunden sind, welches nicht das des Schwefelwasserstoffes ist, und dass endlich der Kohlenstoff und der Sauerstoff sehr wahrscheinlich auch mit einander verbunden sind.

Die Analyse des Xanthingases wurde mit dem Quecksilbereudiometer vorgenommen. Eine grosse Anzahl von Versuchen bewies mir, dass das Verhältniss zwischen der oxydirten
Kohlenstoffverbindung und der Schwefelwasserstoffverbindung
micht bei allen Operationen constant war und dass gewöhnlich
die Kohlenstoffverbindung vorherrscht. Folgendes sind die Resultate der Analyse des Xanthingases in so reinem Zustande, als
die mit Sorgfalt geleitete Destillation des xanthinsauren Bleioxyds, welches durch Borax und schwefelsaures Kupferoxyd
gereinigt war, es mir geben konnte. Andere mit eben so viel
Gas angestellte Versuche gaben ähnliche Resultate.

Xanthingas 46 Vol.
Sauerstoff 131 —
Absorption 32 —
hieraus der Wasserstoff 20 —

Von dem 145 Vol. betragenden Rückstande der elektrischen Verbrennung absorbirte das etwas befeuchtete Bleioxyd 40 Vol. und das Kali 42 Vol. Dieser eudiometrische Versuch erzeugt daher mit 46 Vol. Xanthingas:

20 Vol. Wasserstoff,

40 - schweflige Säure,

42 - Kohlensäure,

24 - Sauerstoff.

Gehen wir daher von der Annahme aus, dass die schweslige Säure die Hälste ihres Volumens Schwesel enthält und dass es mit dem Schweselwasserstoffgas sich eben so verhält, so bestehen 100 Vol. Xanthingas aus:

43,5 Wasserstoff, 43,5 Schwefel,

120. Couërbe, üb. den Schwefelkohlenstoff.

91,3 Kohlenstoff, 52,3 Sauerstoff.

Wenn ich jetzt die Bemerkung mache, dass sich in den Kanthingase Spuren von Schweseswasserstoff und ungefähr ½ freie Kohlensäure besinden, so glaube ich nicht von der Wahrheit abzuweichen, wenn ich annehme, dieses Gas bestehe in reinem Zustande in 100 Vol. aus:

40 Vol. Wasserstoff,

40 - Schwefel,

80 - Kohlenstoff,

40 — Sauerstoff.

Durch diese Zahlen werden 200 Vol. dargestellt. Es ist daher eine Verdichtung zu der Hälfte des Volumens der einfachen Bestandtheile erfolgt. Seine chemische Formei ist demnach CH+CO. Seine Dichtigkeit lässt sich theoretisch aus folgenden Zahlen ableiten:

 2 Vol. Wasserstoff
 = 0,1374

 2 — Schwefeldampf
 = 4,4800

 4 — Kohlenstoffdampf
 = 1,6876

 2 — Sauerstoff
 = 2,2052

 10 Vρl,
 8,5102.

Diese 10 Vol. der gasförmigen einfachen Bestandtheile verdichten sich bei ihrer Verbindung um die Hälfte ihres Volumens. Das wirkliche Volumen ist daher nur noch 5 Vol. Um daher die Dichtigkeit eines Volumens zu finden, muss man setzen $\frac{8,5102}{5} = 1,702$, welches die Dichtigkeit von dem Volumen des Xanthingases ist. Die chemische Formel dieses Körpers ist daher $\frac{C_2O_2H_2S_3}{3} = 1,703$. Sie stellt eine neue Verbindung zwischen dem Kohlenoxyd und einem neuen, dem oxydirten Wasser von Thénard entsprechenden Schwefelwasserstoff dar. Ich hoffe, diese Verbindung so zerstören zu können, dass ich einerseits Kohlenoxyd, andererseits Doppeltschwefelwasserstoff erhalte, welcher bei der gewöhnlichen Temperatur auf die Metallsalze ohne Wirkung zu sein scheint.

Wir sind jetzt weit genug vorgerückt, um die Zersetzung des xanthinsauren Bleioxyds durch die Hitze erklären und die

schiedenen sich bildenden Producte untersucht und kennen ernt haben. Wie bei dem xanthinsauren Kali erfolgt die action auf 6 At. xanthinsaures Bleioxyd. Wir haben daher:

 $6(C_4H_{10}O, CS_2, PbO, CS_2) = C_{36}H_{60}O_{12}S_{24}Pb_6$

Reagirende Atome.

 $H_{12}S_2 + C_{16}H_{32}O_8S_2 + C_4H_{10}O_3 + C_4S_8 + C_2O_2, H_2S_2 + H_4S_2 + Pb_6S_6 + C_6 + S_2.$

Erzeugte Atome.

Das heisst: 6 At. xanthinsaures Bleioxyd = $6(C_4 H_{10} O, S_4 Pb O)$ erzeugen:

 $= {^{\text{C}}_{4}}{^{\text{H}}_{12}}{^{\text{S}}_{2}} = 782,619$ $= {^{\text{C}}_{8}}{^{\text{H}}_{16}}{^{\text{O}}_{4}}{^{\text{S}}}) = 2625,008$ At. Mercaptan Xanthurin $= C_4 H_{10} O_3 = 668,152$ Xanthil Schwefelkohlenstoff $=4(CS_2)$ = 1915,032 $= C_2O_2, H_2S_2 = 767,676$ Xanthingas Schwefelwasserstoffsäure = H_4S_2 = 427,280=6(PbS) =8943,960Schwefelblei $\mathbf{C_6}$ 458,628 Kohle. Schwefel = S_2 402,320.

Wir nahmen an, dass sich keine Kohlensäure bildet, dass sich nur bildet, wenn die Hitze nicht gehörig geleitet wird I wenn man eine zu grosse Masse Salz auf einmal behant. Denn alsdann reagiren die einfachen Bestandtheile, ehe in der von mir angegebenen Form entweichen, zum zwei-Male auf einander und erzeugen immer complicitere Phämene. Der freie Schwefel wird zum Theil durch die Flüskeiten mit fortgerissen und man findet, wie ich angegeben be, ihn leicht wieder. Ein anderer sehr kleiner Theil bleibt der Kohle und dem Schwefelblei zurück. Da diess stattdet, wollen wir das Sulfür in 100 Theilen berechnen, um Zahlen mit den durch den directen Versuch erhaltenen versichen zu können. Wir finden daher:

Mercaptan 4,606
Xanthurin 15,421
Xanthil 3,932
Schwefelkohlenstoff 11,300

4,606

= 85,259 Flüssigkeit.

122 Couërbe, üb. den Schwefelkohlenstoff.

Wenden wir das von dem xanthinsauren Kali Gesagte hier wieder an, dass nämlich das Gas Dampf aufnimmt und das Schwefel in die Flüssigkeiten übergeht, so haben wir einen deutlichen und bestimmten Ausdruck für das Phänomen, welches wir zu erklären suchten. Die Theorie stimmt daher mit dem Versuche überein. Ich will, damit die Sache sich beser beurtheilen lässt, die beiden Resultate neben einander stellen.

Resultate des V	ersuches.	Resultate de	er Theorie.
Rückstand	57 ,3 4	57	,708
Flüssigkeiten	33,94	35	,259
Gas	8,72	7	,034.

Schlüsse.

Aus den in dieser Abhandlung angegebenen Versuchen ust Analysen geht hervor:

- 1) dass das xanthinsaure Kali und das xanthinsaure Bleioxyd sich verschieden verhalten, wenn man sie der Wirkung der Hitze aussetzt. Während das xanthinsaure Kali ein Gemenge von Kaliumpolysulphuret und Kohle giebt, lässt das xanthinsaure Bleioxyd einen Rückstand von Einfachschwefelkalium und Spuren von Kohle, ungefähr 2 p.C.;
- 2) dass das xanthinsaure Bleioxyd, welches aus Acther, Bleioxyd und Schwefelkohlenstoff besteht, in warmem Alkohol sich auflösen und darin krystallisiren kann;
- 3) dass die Zersetzung des xanthinsauren Bleioxyds durch Hitze bei 130°C. sich zeigt und einen schwarzen Rückstand von Schwefelblei so wie Flüssigkeiten erzeugt, welche aus Mercaptan, Xanthurin, Xanthil, Schwefelkohlenstoff und Gasen bestehen, die sich als Xanthuringas, Schwefelwasserstoffgas und Kohlensäure entwickeln. Auf 100 Gr. xanthinsaures Bleioxyd erhält man:

Schwefelblei 56
Flüssigkeit 85
Gas 8 = 2½ Litre;

- 4) dass der flüssige Theil zwei neue Aether enthält, von nen der eine sich, wie der gewöhnliche Aether, durch kalien nicht verändern lässt und zur Formel $C_4H_{10}O_3$ hat, d der andere sich beim Zusammentreffen mit Aetzkali in Alhol, Schwefel und Essigsäure zersetzt. Seine Formel ist $H_{10}O, C_4H_6O_3S$;
- 5) dass das Xanthuringas bei der eudiometrischen Analyse ie sehr einfache Zusammensetzung zeigt, welche sich dar-lien lässt durch:

2 Vol. Wasserstoff,

2 - Schwefel,

4 - Kohlenstoff,

2 - Sauerstoff,

- 5 Vol. verdichtet, und dass, wenn man dieses Gas durch Formel $H_2S_2C_2O_2$ darstellt, es eine Art von gasförmigem lz darstellt, indem das Kohlenoxyd die Base und der neue hweselwasserstoff die Säure ist;
- 6) dass dieses Gas in sehr grosser Menge durch Aether, kohol und ätherische Oele absorbirt werden kann;
- 7) dass die Zersetzung des xanthinsauren Kali's durch tze bei 200° C. beginnt, und dass sich, wie bei dem xannsauren Bleioxyd, ein sester Rückstand, Flüssigkeiten und se bilden. Der Rückstand enthält Kaliumpolysulphuret und 5 p.C. Kohle. Die Flüssigkeiten enthalten Mercaptae, Xanlund zuweilen Spuren von Xanthurin. Die Gase enthalten ihlensäure, Schweselwasserstoffsäure und Xanthuringas in sehr rschiedenen Verhältnissen;
- 8) dass man die Entfernung dieser verschiedenen Gase beirkt 1) durch Metallauflösungen, welche den Schwefelwasrstoff zerstören, wodurch er verschwindet, 2) durch Aether,
 elcher das neue Gas auflöst, 3) durch Schwefelsäure, welche
 h des Aetherdampfes bemächtigt, 4) endlich durch Kali,
 rch welches die Menge des Kohlenoxyds und der Kohlenure aufgefunden wird.

Diess sind die Resultate meiner Untersuchungen über die pthinsauren Salze. In der dritten Abhandlung will ich mich mit

dem xanthinsauren Kupferoxyd beschäftigen. Ausserdem werde ich die Wirkungen des Chlors und verschiedener anderer Gass auf das Xanthil und auf verschiedene andere, nicht wenige merkwürdige neue Producte kennen lehren. Hoffentlich wird diese Abhandlung neue und sehr interessante Thatsachen für die Theorie darbieten.

VI.

Untersuchungen über die durch zalpetrige Säure (acide nitreux) und salpetrige Salpetersäure (acide hyponitrique) gebildeten Bleisalze.

Von

PÉLIGOT.

(Compt. rend. T. XI. p. 860.)

Proust hat zuerst beobachtet, dass sich das Blei in beträchtlicher Menge löst, wenn man es mit einer heissen Auflösung von salpetersaurem Bleioxyd in Berührung bringt; das dadurch hervorgebrachte Salz setzt sich durch Abkühlung der Flüssigkeit in Gestalt von gelben glänzenden Schuppen ab.

Der Schluss, welchen Proust aus diesem Versuche zog. war, dass das Bleioxyd auf eine niedrigere Stufe als die des Oxyds gebracht wird; aber. Berzelius that in einer 1812 veröffentlichten Arbeit dar, dass die Lösung des Bleies nicht in Folge einer Reduction des Bleioxyds vor sich gehe, sondern auf Kosten der im angewandten Salze enthaltenen Salpetersäure.

Chevreul kam in einer zu derselben Zeit mitgetheilten Arbeit zu denselben Folgerungen und beschrieb zwei verschiedene Salze, welche durch die von verschiedenen Mengen Blei auf salpetersaures Bleioxyd ausgeübte Einwirkung entstanden waren, und theilte dann in einem zweiten Berichte über diesen Gegenstand die Uebereinstimmung mit, weiche in den Analysen obwaltet, und die Verschiedenheiten, welche man in den Eigenschaften der von ihm und Berzelius zugleich studirten Salze bemerkt.

Da ich durch eine Reihe von Untersuchungen, die ich über die obigen beiden Säuren unternommen habe, beiläufig dazu kam, das Salz von Proust zu analysiren, so erhielt ich Besultate, deren Erklärung weit von der gewöhnlich angenommenen Erklärung der Natur dieses Körpers abweicht. In der That glaube ich zeigen zu können, dass ausserdem, dass drei scharf unterschiedene, durch die Einwirkung von Blei auf salpetersaures Bleioxyd gebildete Salze existiren, zwei derselben nicht, wie Berzelius und Chevreul meinen, salpetrige Säure, sondern salpetrige Salpetersäure enthalten; so wäre also die letztere Säure, die nach den Analysen von Dulong aus 2 Vol. Stickstoff und 4 Vol. Sauerstoff besteht, gegen alle angenommenen Meinungen, doch im Stande, wenn nicht sich direct mit den Basen zu verbinden, so doch wenigstens, wie die Salpetersäure, in der Verbindung mit denselben zu existiren.

Das Salz von Proust habe ich bereitet, indem ich 1 Aeq. salpetersaures Bleioxyd (2071) und 1 Aeq. Blei (1294) zusammenbrachte. Es ist bequem, 63 Th. Blei auf 100 Th. Salz zu nehmen. Wendet man, wie Berzelius angiebt, 78 Th. Blei an, so erhält man, wie es schon Chevreul bemerkt hatte, ein Gemenge des gelben mit dem orangefarbenen Salze, das sich später bildet; wendet man im Gegentheile weniger als 1 Aeq. Blei an, so erhält man ein Product, das mit zweifachbasisch-salpetersaurem Bleioxyd gemengt ist.

Die Reaction geht vor sich und bis zu Ende bei einer Temperatur unterhalb 60 oder 70 Grad, ohne dass eine Entwikkelung von Stickstoffoxyd stattfände; dieses Gas entbindet sich nur, wenn in der Hitze das gewonnene gelbe Salz zersetzt wird.

In dem Falle, wo letzteres mit dem orangefarbenen Salze gemengt ist, kann man übrigens diese beiden Salze trennen, indem man ihr Gemenge mit so viel warmem Wasser übergieset, dass es zur Auflösung des Ganzen nicht hinreicht, und so die viel grössere Auflöslichkeit des gelben Salzes benutzt.

Die Analyse dieses Salzes bestand in der directen Bestimmung des Bleioxyds, Stickstoffes und Wassers, welche es enthälf.

Die Resultate, welche ich gewann, kommen so gut als irgend möglich mit der nachstehenden Formel überein:

NO4, 2Pb O, HO.

von Barzelius und Chevreul zusammen; aber Berzelius,

der den Stickstoff nicht bestimmt hat, nimmt hypothetisch an, indem er sich auf die nothwendige Gegenwart der salpetrigen Säure stützt, dass es 6,4 p.C. Wasser enthalten müsse; die Erfahrung giebt nur 3,2. So also giebt die sehr einfache Gleichung

 NO_5 , $PbO + Pb + HO = NO_4$, PbO, HO

Rechenschaft von der Entstehung des Salzes, die bis jetzt noch sehr dunkel war.

Das zweite Salz, welches sich bildet, ist von röthlicher Orangefarbe. Man erhält dasselbe, wenn man 2½ Aeq. Blei in der siedenden Auflösung von 1 Aeq. salpetersaurem Bleioxyd löst; durch Abkühlung der Flüssigkeit gewinnt man ein Gemenge des gelben und orangefarbenen Salzes und nimmt das gelbe Salz mit siedendem Wasser fort, da das andere viel weniger löslich ist. Die Analysen dieses Salzes geben alle die Formel:

N208, 7Pb 0, 3HO.

Die Zusammensetzung dieses Salzes bestätigt sich durch die Synthese, denn wenn man zweisach-basisches salpetrigsalpetersaures Salz mit Bleioxyd kocht, so erhält man dieses orangesarbene Salz. — Das anhaltende Kochen einer Auslösung von salpetersaurem Bleioxyd mit mehr als 2 oder 3 Aeq. Bleigiebt endlich das von Chevreül bezeichnete rosenrothe Salz, dessen Zusammensetzung nach seinen, Berzelius's und meinen Analysen sich unter der Formel

NO3,4Pb O, HO

darstellt.

Das Wasser, welches jede dieser Verbindungen enthält, wird nur bei einer Temperatur über 100° abgeschieden.

Nur mit dem rosenrothen Salze und der Kohlensäure kann man neutrales salpetrigsaures Bleioxyd darstellen; die gelbe Flüssigkeit, welche dasselbe enthält, abgedampft im luftieren Raume, liefert lange gelbe, sehr veränderliche Prismen; dieses Salz ist sehr verschieden von dem, welches Berzelius beschrieben hat und welches er nothwendiger Weise mit salpetersaurem Bleioxyd gemengt erhalten hat, da er zu der Darstellung desselben das gelbe Salz von Proust anwandte.

Da die Vorgänge bei der directen Analyse, die Verschiedenbeiten, welche zwischen den Resultaten der Rechnung und

denen der Erfahrung obwalten, alle auf die Vereinigung des Sauerstoffes mit Stickstoff zur Bildung von salpetriger Säure oder salpetriger Salpetersäure hinweisen, und da diese Sauerstoffbestimmung der Culminationspunct dieser Frage ist, so habe ich versucht, die Quantität dieses Elementes auf mehr directe Weise zu bestimmen, indem ich einerseits aus der noch unbekannten Eigenschaft jedes der drei genannten Salze, sich in concentrirter überschüssiger Essigsäure zu lösen, und andererseits aus der Einwirkung, welche Bleisuperoxyd auf die so aufgelösten Salze ausübt, Vortheil zog. Die letztgenannte Einwirkung besteht darin, Sauerstoff an die salpetrige Säure oder an die salpetrige Salpetersäure abzugeben, um sie in Salpetersäure umzuwandeln. Da die salpetrige Säure einmal mehr Bleisuperoxyd auflöst, als die salpetrige Salpetersäure, und dieses Oxyd ein sehr hohes Atomgewicht hat, so schien mir die Anwendung von Bleisuperoxyd im Stande, entscheidende Resultate über die Zusammensetzung dieser Salze zu liefern.

Die Resultate, welche ich erhalten habe, indem ich sodiese Körper, nachdem ich sie gewogen, mit einander zusammenbrachte und die Quantität Bleisuperoxyd bestimmte, die von jeder in diesen Salzen enthaltenen Säure aufgelöst wurde, bestätigen auch vollständig die Formeln, die ich angenommen habe, um die Zusammensetzung eines jeden von ihnen darzustellen.

VII.

Künstliche Färbung der Cocons.

(Brief des Hrn. Bonafous.)

(Comptes rendus T. XI. p. 123.)

Das chinesische Versahren, welches darin besteht, Reismehl auf die Maulbeerblätter zu streuen, die man den Seiden-würmern giebt, brachte mich auf den Gedanken, statt dieses nährenden Mehles eine Substanz anzuwenden, die im Stande wäre, in die seideführenden Gefässe dieser Insecten zu dringen. Ich überreiche der Academie 1) blaugrüne Cocons von Würmern, die im vierten Zeitraume (age) von Maulbeerblättern lebten, die mit Indigo überstreut waren;

2) leicht rosenroth gefärbte Cocons von Würmern, die in

128 Umwandl. v. Faserstoff in Eiweiss. — Literatur.

derselben Zeit von Blättern lebten, die mit Krapp bestreut waren.

Ich wünsche, indem ich diese Mittheilung mache, dass dieser Umstand zugleich die Aufmerksamkeit der Physiologen und die der Seidenbauer auf sich ziehe.

VIII.

Umwandlung von Faserstoff in Eiweiss.

Hr. Letellier theilt eine Notiz mit in Betreff eines von Denis angegebenen Mittels, wodurch man die Blutfaser in eine Flüssigkeit umwandelt, welche mehrere der Haupteigenschaften des Albumins zeigt. "Wenn man meistens bei Wiederholung dieses Versuches erfolglos gearbeitet hat," sagt Hr. Letellier, "so liegt es daran, dass man nicht die zur Mischung erforderlichen Verhältnisse genommen oder dieselben einer zu hohen Temperatur ausgesetzt hat. Nimmt man 3 Gr. gut gewaschene und getrocknete Faser und weicht sie bei einer Temperatur von 20° in 10 Gr. Wasser und 0,4 Gr. kohlensaurem Natron, so erhält man nach einiger Zeit aus diesen Gemenge eine Flüssigkeit, die in der Hitze fest und durch Alkohol und Säuren weiss gefällt wird."

(Compt. rend. T. XI. p. 877.)

Literatur.

Viro illustrissimo C. A. C. H. libero Baroni de Kamptz etc. volemnia semisaecularia muneris sui publici etc. rite celebrando congratulatur academia caesarea Leopoldino-Carolina natural curiosorum interprete E. F. de Glocker. Inest de graphite moravico et de phaen omenis quibusdam originem graphitae illustrantibus commentatio. Cum tabulis duabus. Vratislaviae, es offic. typographica Barthiana. MDCCCXL. 4. 28 S.

三角子 化二维元 化甲基二甲酚 化二甲酚 化二甲酚 医电影 医电影 医二氏管 医二氏管 Titte to a second of the control of the second of the seco and the state of t And the second second ing and the file of the second of the second

Untersuchungen über das Refractionsvermögen der Flüssigkeiten.

Von

EDMUND BECQUEREL und AUGUST CAHOURS.

(Comptes rendus T. XI. pag. 867,)

Die Resultate, welche wir heute der Academie vorzulegen die Ehre haben, sind nur der Anfang einer sehr ausgedehnten Arbeit über die Bestimmung des lichtbrechenden und zerstreuenden Vermögens der Flüssigkeiten, die wir unternommen haben. Da die bis jetzt als Refractionsindices angegebenen Zahlen sich meintentheils nur auf Körper beziehen, deren Zusammensetzung meth micht genau festgestellt ist, so glaubten wir, diese Frage anschmen und zum Ausgangspunct diejenigen sehr reinen Körper wählen zu müssen, über deren Zusammensetzung die Chemiker einig sind. Da wir uns eine grosse Anzahl von Flüsigkeiten verschafft haben, deren einige sehr entschiedene Reiten bilden, so geben wir heute die mittleren Refractionsindices lieser Flüssigkeiten, und diese Zahlen, die mit Genauigkeit bedimmt sind, werden uns vielleicht zu einigen Mittheilungen über hre Beschaffenheit 'führen.

... Brewster, der eine sehr grosse Anzahl von Bestimmungen her Refractionsindices geliefert hat (oftmals aber von unreinen körpern), bediente sich eines sehr bequemen Verfahrens, welhom wir auch mit Abänderungen, wie wir sie sogleich angech werden, gefeigt sind. Brewster's Verfahren besteht darin, less man unter das Objectiv eines Mikroskops eine recht ebene Masplatte legt, so dass sie die Linse berührt; und dass man lima zwischen die Linse und diese ebene Platte einen Tropfen ber Flüssigkeit bringt, deren Refractionbindex man messen will. Bis hildet sich aun aussersten Paacte des Objective eine Man: concave. Linse von Flüssigkeit, weiche wine Veränderung mi der Lage bervorruft, die man einem Kerper geben muss, lamit wich sein: Bild stets an demselben Puncte zeige. zeichnet man dann mit n und n' die Refractionsindices zweier

130 Becquerelu. Cahours, üb. Refractionsvermögen

Flüssigkeiten bei dem Durchgange aus der Luft in diese Körper, durch D, d und d' die Entfernungen, in welchen mas einen Gegenstand anbringen muss, damit er im Mikroskope gesehen werde, wenn nach einander Luft und die beiden Flüssigkeiten winzeln nich zwischen der binne und wier Platte beinden, und welche Kntfernungen man vom Objectiv un rechnet, so findet man leicht diese Formel:

$$\frac{n-1}{n'-1} = \frac{\frac{1}{D}}{\frac{1}{d}} \quad \text{oder } \frac{n-1}{n'-1} = \frac{\frac{D}{d}}{\frac{1}{d'}}$$

Man kann also durch disses Mittel aur den Refractionshim einer Elüssigkeit mit Bezug auf eine andere erhalten. — Wit lieben diese Verfahren dehim abgeändert, dess wir statt der Estfernungen D, d, d' die Zahlen P., p, p' der Eintheilung eine auf den Objectträger befestigten Mikrometers suchten, die zwischen zwei feste Furchen eines im Foens des Oenlarglases befestigten Mikrometers fellen. Diese Zahlen sind, wie leicht zweigen ist, den vorigen proportional, und man hat noch:

$$\frac{\mathbf{a}-\mathbf{1}}{\mathbf{n}'-\mathbf{1}}=\frac{\mathbf{1}-\frac{\mathbf{p}}{\mathbf{p}}}{\mathbf{1}-\frac{\mathbf{p}}{\mathbf{p}';}}$$

debei baben sie den Vortheil, dass sie viel rescher und visleicht mit mehr Genauigkeit beobachtet werden können.

Die Klüssigkeit, auf welche wir die Befractionsindices bezigen haben, ist das destillirte Wasser. Wir haben die Zeilnich 4/6 = 1,3933 als den mittlern Index dieses Kärpars augenommen. Hebrigens kann man mit Hülfe des folgenden Verfahrens die Zehl direct bestimmen. Diese Verfahren bestaht desin, dass man zwischen das Objectiv eines Mikroskeps auf den beshachteten Gegenstand einen flüssigen Schirm mit nach leicht au seigen ist, den Gegenstand tiefer stellen, um dha nach ferser is Mikroskop zu sehen, denn obgleich die Liichtstrahlen paralisheraustreten, wann sie durch jenen Schirm gegangen sied, seigen sie doch eine Ablenkung von ihrer ursprünglichen Bichtung; bezeichnet man ann mit e die Dicke den Schirmes mit

t:

mit d site Grösse, um welche man das Object aus seiner ersten Lage verrückt hat, so erhält man:

$$d = e \left(\frac{n - 1}{n} \right),$$

we in der Refractionsindex ist. Diese sehr einfache Hermel ikann eben so direct den Refractionsindex eines festen Körpers geboni

Bei der Anwendung dieses Verfahrens auf destillittes Wasser fanden wir, dass, wend e gleich 40 Mm. ist, man

d == 9 Mm., 509 cubalt.

Man hat nun

$$\frac{n-1}{n}=0,2502$$
, workus $n=1,3336$,

des heisst n== 4/3, da der Unterschied von 0,008 hier unwesentlich ist.

25 Wir geben in der Fortsetzung dieses Berichtes die Zusammenstellung der verschiedenen Zahlen, die mit Hölfe des erstenen von uns mitgetheilten Verfahrens ethalten worden sind. Aus: der Prüfung dieser Zusammenstellung geht hervor:

- 1) Dass Körper von gleicher Zusammensetzung, deren Dichtigkeit im slüssigen Zustande durch wenig verschiedene Zuhlen angegeben wird, meines Brechungsindex haben, der zwischen schr beschräukten i Grenzen schwankt, während dagegen: bei cieer Verdichtung der Substanz dersche zueimmt (Beispiel: das Terpentinöi und das Colophen).
- 3 Dass die flüssigen Kohlenwasserstoffe bei fast gleicher Dichtigkeit ein um 40 böheres Brechungsvermögen besitzen, je mehr darin der Kohlenstoff vorherrschend obwaltst; so besitzt sum Beispiel das Retinolen (C64 H32) einen viel grösseren Refractionsindex als das Ceten (C₆₄ H₆₄), weiches viel wehlger Kahlenstoff enthält und dessen Dichtigkeit im flüssigen Bustander weerig von ersterem abweicht.

. By Dass bei den aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff; bestehenden Körpern der Brechungsindex und das Brechungsvermögen um so beträchtlicher sind, je weniger Sauerstoff die Substanz enthält — immer vorausgesetzt, dass die Dichtigkeit dieser Körper wenig verschieden sei; schwankt aber die Dichtigkeit zwischen sehr merklichen Abständen, so kann das Gegentheil stattfinden, was deutlich darthut, dass die Dichtigkeit des Körpers im flüssigen Zustande von gfösstem Einflusse ist.

132 Becquerel u. Cahours, üb. Refractionsvermögen

So hat der Kümmeläther, der weniger Procente Sauerstoff enthält als der Benzoëäther, einen kleineren Brechungsindex als der letztere, aber auch die Dichtigkeit des ersteren ist geringer als die des Wassers, während die Dichtigkeit des zweiten grösser ist. Wir könnten noch eine ähnliche Beebachtung in Betreff des Essig- und Oxaläthers machen.

- 4) Dass für die isomerischen Körper, wie das essigsaure Methylen und der Ameisensther, die ausserdem in : flüssigen Zustande eine fast gleiche Dichtigkeit besitzen, die Brechungsindices ebenfalls gleich sind.
- 5) Dass, nach Maassgabe wie Chlor, Brom und Jod sich Körpern einer Familie anhäufen, der Brechungsindex sunimmt, was vielleicht auf eine vermehrte Dichtigkeit des fitssigen Zustandes dieser Körper hinweist.
- 6) Endlich haben wir bemerkt, dass noch ein anderes Element da ist, dessen Dazwischenkunst eine sehr entschiedene Einwirkung auf den Brechungsindex äussern kann, nämlich die Zähigkeit der Substanz. Das ist zugleich das Ergebniss von Herra Heinr. Deville's Beobachtungen über die Chlorovalerisin- und die Chlorovalerosinsäure. Wir haben untersucht, ob bei einem Gemenge von Flüssigkeiten, die chemisch auf einander nicht einwirken, das Brechungsvermögen gleich der Summe der Brechungsvermögen disspr beiden Flüssigkeiten sei, und nach den verschiedenen se diesem Ende gemachten Experimenten schien uns dieses Gests entschieden wahr zu sein. Hier folgen einige der erhaltenen Resultate.

o	Gen	nenge von Al	kohol und Elemiöl.
index ode	rn	n ² -1	Dichtigkeit bei 9° C.
Alkohol Elemiöl	,	0,841 1,175	0,802
Erates Gem.	1,411	0,990 (beob.) 0,990 (ber.)	1 Vol. Elemiol 19-
Zweites Gem.	1,897	(0,952 (benb.) 0,955 (ber.)	0,818 enthält 1,70l. Riemiöl.

Gemenge von Wacholderöl und chlorwaeserstoffsauren

index oder n.	n2-1 :20	Dichtigkeit bei 9° C. , No.			
Wacholderöl 1,476 Chiw. Terpen-	1,175	0,8635			
tinöl	1;214	1,019	į		
20 July 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	(1.197 (book)	0,981 Vol. Wa-	•		
Gemenge 1,479	1,195 (ber.)	0,944 enthält cholderöl Vol. Chlw. Terpentinöl.	cholderöl i Vol. Chiw. Ter-		

Wir haben die Ebre, der Academie diese kleine Ansahl von Beobachtungen vorzulegen, nur um einen Anfang zu machen; in einer bald nachfolgenden Arbeit wollen wir das Zeratreuungsvermögen der Flüssigkeiten untersuchen, die an der von uns mitgetheilten Tabelle Theil haben, wie nuch anderer, deren Zusammensetzung gleich gut festgeatellt ist. Ausserdem wollen wir die Abweichungen studiren, welche das Brechungs- und Zerstreuungsvermögen der Flüssigkeiten im Augenblick der Verbindung zeigen, indem wir hauptsächlich uns vornehmen, die Besultate, welche wir durch verschiedene Verfahrungsweisen erhalten werden, zu vergleichen, um über ihren Werth zu entscheiden.

P (Luft) 20,8 p (Wass.) 34,88 Angenommener Index d. Wassers n=1,3338 od. 14.

Tafel der mittleren Indices.

Namen der Stoffe.	Zablen p',	Cea.	Namen der Stoffe.	Zahlen P	Tadi-
Terpoptinöl	47,0	1,471	Citronenather,	44,0	1,446
Citronenti	47,5	1,475	Pyrocitronenather	44,0	1,446
Meani ôl	47,5	1,475	Campbersäure	45,5	1,450
Wacholderöl	47,5	1,475	Cuminather	51,5	1,504
Wegenen	48,0	1,479	Beuzoëäther	52,5	1.511
Terebiles	48,0	1,479	Essigeaur. Methylen	86,38	1,8(0)
Cabebenői	49,5	1,490	Ameisenäthet,	86,381	1,361
Colophen	53.5	1,517	Benzoylwasserstoff	58,5	1,545
Colophilea	58,5		Salicy lwassers coff	65,0	-1,870
Rupion .	40,88	1,409	Absoluter Aikohole,	136,83	1,861
Ceten	45,0	1,436	Krystallis. Eesigs.		1,876
Benzen ' ' '	51,5	1/504	Terpenticul	47,0	1,47
Cinnamen	56,0	1,531	Chlorypaseratoff.	Shee i	181
Retinolen	65,5	1,577	flűssig	49,0	1,488
Cymen	48,75		Bromwasserstoff.	59,5	1,310
Naphta	40,88	1,409	Monochloroteroben	. \$6,33 ₀	1,584
Retinylen	53,5	1,517	Chlorür	57,5	1,540
Bethaphten	51,0	1,500	Baldriansaure " ' "	89,9	1,400
Naphtole	45,8	1,467	Chlorovalerisins.	50,5	1,49%
Kohlenwasserstoff			Chlorovalerosins.	52,5	1,510
, d. Aethalefiure .	44,5	1,450	Benzen .: .		: 1,504
Acther	86,0	1,857	Nitrobenzid	60,38	1,054
Bromwasserstoff—	` '	1	Chlorkohlenwällser-		
äther	41,0	1,417.		44,0	1,446
Jod wasserstoffither		1,512	Bromkohlenwaaser-	1	15.71
Ameisenäther '	36,33	1,861	etoff	56,5	1,584
Benighther L	87,0	1,870		97,5	1,878
Oxalather , , ,	39,75	1,406	Ranigeaures, Amilen	39,75	1,499
Odpantanther /	49,0	1,497	Nelkenöl	51,5	1,504

Veber die Bestimmung des Refractionsindes einiger wich organischen Chemie gehöriger Körper.

. The State of the State

Von

to the state of the DEVILLE.

Comptes rendus T. XI. pag 865.)

Der Apparat, dessen ich mich bediente, ist das Goniometer Mit Hülfe einiger besonderer Vorrichtungen ist von Babinet. dieses instrument sohr passend; selbst ganif schwache Unterschiede (z. B. bis in die Zehntausendtheile) zu enthüllen, wie sie nur die Indices von Körpern, die vom Gesichtspuncte dieser physikalischen Eigenschaft einander sehr nahe stehen, darbieten können. : Auch habe ich mit sehr grossen Genauigkeit die Indices des Alkohol bestimmen können, wenn er mit verschiedenen Proportionen Wasser gemengt ist, und eiwa zwanzig Beobachtungen über Alkohole, deren Gehalt in regelmässiger Weise sidnimmt, gestatteten mit festzusetzen, dass es ein Maximum für den Alkehel gieht bei einem Atom Wasser, d. h. wenn er beinahe 20/100 dieses Körpers enthält; geht man dann von Hier wis, so nimmt der Index ab, bis es für den Alkahol, der 90/106 Wester enthält, giefch dem Index des Wassers ist, geht folglich durch einen Punot, we sein Werth gleich dem für den absoluten Alkehel Der entsprechende Gehaft ware dann der, der dem Alkohol von Rudberg zukommt, d. b. bei dem Maximum der Confractions: Das Refractionsvernibgen bietet; wie man denken kant, kein Maximum dar, weil die Dichtigkeit viel schneller wächst all der Index.

Die Kesigsäure hat mir gleiebfalls sin Maximus für den Refractionsindex, das mit ihrer grössten Dichtigkeit übereinkommt, wed ein Minimum für das Befractionsvermögen geliefert, welches ganz nahe bei dem Maximum der Dichtigkeit liegt, was dazut hinweist, dass dieselbe viel languamer abnimmt sie der Index. Die untereinander isomerischen Kürper, welche ich us-

terencia habe graben mir denselben Melractionsindex, duch muss ich hinzufügen, dus sie nothwendiger Weise beinahe denselben Grad der Dichtigkeit und Zähigkeit zeigen müssen, damit finien jene physikalische Migenschaft gemein sei! Die meisten filleh George Dete ven der Zusammensetzung C5 H8, isomerisch mit dem Terpentinöl, die alle beinahe gleich schwer und gleich flüssig sind, befinden sich in diesem Faller. Das essigsaure Methylen und der Ameisenäfter haben gleich nach litter Reinigung denselben Refractionsindex *).

Die Zähigkeit hat das Bestreben, in den isomerischen Flüssigkeiten die Zahlides Index auf eine Vielibeträchtlichere Weise zu vergrösser So haben mir zwei isomerische Körper von gleicher Dichtigkeit und entsprechenden cher Eigenschaften in Folge ihrer ungleichen Zähigheit bei der Prüfung ihrer optischen Eigenschiaften sehr grosse Unterschiede gegeben. Die Chlorovalerosinsticre, ein neuerlich von Dumas und Stass entdeckter Körper, gab mir Gelegenheit, ehren sehr lehrreichen VerA such in diesem Betracht anzustellen. Biese Soure ist bei der gewöhnlichel Temperatur Von 15° zähe, und zwar so; dässues schwer ist, Me in der Flasche fliessen zu machen Abel bet einer Tempelatär, die kaum 30° therstelgte wild sie so massig wie Wasser. Lifen konnte nie bei dem Uebergunge aus dem flüssigen in den Dastand beobachten, und die Verrückung des Spectrums der die Vergrösserung des Refractionshum T mum schien anti-siu beträchtlich, als dass sie bies wich Preingel keitswechsel zuschreiben wäre, den elle Kerner dan die lei; der sich unter dem Kinfluss der Kälte zusammenzieht. Matisieri, wie nützlich Bestachtungen dieser Art ist, die Tende ratur anzugebeh; bei welcher man arbeitet. In Sommer wall der Index der Thetrovalerosinsäure ganz verschieden von der Ten-T jenigen sein, Stendisch bei 15° gefunden habe. · undquloD 1.5175

^{*)} Hierbeitellich bemerken, dass ich die beiden von mir beitellich teten Aetherarten ich Herren Becquerel und Cah etwarzen ertemitel und dass diese mit einem von dem meinigen verschiedenen und außein anderes Princip begründeten Apparat diese Gleichheit bestätigt haben aber diese Körper andern sich sehr schnell. Uebrigens haben diese Herren auch noch desetben Indices für einige Stone erhäuten, von den nen dieselben 1900 durch mich untersucht waren. Onnenniselle V

136 Deville, üb. Refractionsindex organ. Körper.

Folgendes sind die Hauptresultate, zu obin. Jeder Versuch ist wenigstens zweims einige viefmal, auch ist die Ziffer nicht ehe	al wiederholt w
wenn die Versuche mit einander übereinstimn	_
Wasser von	0,8336 bis 0,33
Absoluter Alkohol ,	1,3683
— mit 10/100 Wasser	1,3653
- mit ²⁰ / ₁₀₀	1,3662
$- \qquad - \qquad \text{mit} \frac{30}{100} - \qquad \cdot \cdot \vdots$	1,3651
-:: mit 4%100 1	1,3633 •
— mit 45/100 —	1,3699
$- mit ^{50}/_{100} - $	•
mit 60/100	•
mit 70/100	•
mit 80/100 —	
mit 90/100 3 1	
Alkohol mit einigen Spuren von Wasser	
— mit ² / ₁₀₀ . Wasser	•
Käuflicher Alkohol mit beinahe 20/100 Wasser	
Krystallisirbare Essigsäure	
Essignaure bei der grössten Dichtigkeit . 1	•
bei einer Dichtigkeit von 1,0728	•
•	1,3701
•	1,472
Flüssiger Campher aus Terpentin	
Chlorür des Terpentinöles	
	1;474 1 KOO4
Chlorotereben	
Monochlorotereben	
Colophen	-
Colophilen	
Citronenöl	
Elemiöl	
Reines Copaivaöl	•
Altes Copaivaol	•
Chlorovalerosinsäure	1.4814
Chlorovalerisinsaure	1,4722
Valeriansaure	

rchand, üb. das Leidenfrost'sche Phänomen. 137

nilen
maphten
ürznelkenői
enwasseratoff der Aethalsäure 1,4508
er Aether
holderől
ıgenöl 1,474
eranzenöl
pamottöl
knes Münzöl
bies Münzöl
s Citronenöl
geaures Methylen
lsenäther
olen von Boussingault
es Terpentinöl bei einer Temperatur in 165 million im
m fast 40°, wo es sehr flüssig ist 1,4898
cs and kakes Terpentinöl 1,4938.
and the second of the second o
and the second of the second o
and the second of the second o
the entry of the first of the species XII and the transfer to the first of the telephone the be-
rige Versuche über das Leidenfrost'sche
Phänomen.
R. F. MARCHAND.
DE TO MARIE CITA NOTE CONTRACTOR OF CONTRACT
rgetragen in der Gesellschaft der naturforschenden Fraunda zu Berlin, 19. Januar 1841.)
Vor einem Jahr theilte ich eine Notizemit! über die Bil-
g der Lampensäure: bei dem Leidenfrodtechen Versuche,
n man desselben mit Alkohel noder: Aether anstellt : (Journ.
XIX S. 57) Reither bet. Herr Routions einige Ver-

y der Lampensäure: bei dem Leiden front ischen Versuche, m. man densehen mit Alkohel noder: Aether anstellt: (Journ. XIX. S. 57). Beitdem hat Herr Boutigny einige Verse angestellt, welche fecht interessant sind und welche einer Abhandlung unter dem Titel, Phänomene der Cale-ion" Compt. rend. T. X. p. 897. T. XI. 369. benchrieß hat. Herr Boutigny: fand unter andern, dass sehen in m heissen Schälchen von Blei, dessen Schünelspunet bei C. liegt, die Krzeugung des Leiden frost'schien Tropfens,

welche er Calefaction nennt, zu Stande kommt. Er fand fernd meine Beebachtung bestätigt, ohne von derselbend wie d scheint, Kenstviss gehabt zu haben, dass audi Alestroi: wil Aether sich Mu-dièsem Versucks deignsten prank weren durch al dabei in eine stechend riechende. Flüssigkeit verwitzelt: wat Herr Boatigny hielt diese anfangs für Amelsenstat sodann für Allichyd; sie ist aber in der That die signement Lampensäure. Auch Terpentinöl, Citronenöl, alkalische auf Salzlösungen, Säären u. s. w. wandte Herr Boutigerynni welche zum Wieft schon früher. von Fisch er dieu- wien. worden waren Auch Pouillet hat die Auflösungen madeles Substanzen Modicier Beziehung untersucht, und igeranden, und die wässrigen Von Baryt, Stronting Half, Pestrau in dem sie verdinipfen, den Rückstand in dem entgegeligenetatel Zustande der Blektricität zurücklassen, bis def inty den die entweichende Dampf besitzt. the spirited Company of the second

Ein selle therkwürdiger Vereuele des Herrift Blechtign y ist der, welchen er mit der tropfber Blechtige sehwetige Säure angestellt hat. Diese so äusserst flüchtige Substanz wird, in eine fast rothglühende Platinschale getropft, sogleich in stark rotirende Bewegung versetzt, rundet sich sodann ab, steht still und scheint nun selbst zu krystallisiren. Schüttet man sich das Kügelchen in die Hand, so denpflächt meh eine lehhtster Coffil von Kälte. Dabei hat sich sicht übe schweflige Säure höher oxydirt, und Herr Boutigny glaubt in der That, dieselbe erkälte sich durch die Verdampfung so stark, dass sie erstarre.

Herr Boutigny bemerkte indessen zugleich, dass, wenn man die Kügelchen kur der Schale in eine Glasichte word winder schale in eine Glasichte word wirden nach der Verdampfung der Saure einen kleinen Anflug von Feuchtigkeit in dereibten wahrdebmen künset inter dass dem eine genwessen inter fod wird Glost with Hydrate dets schwedtligen oblinen genwessen inter fod wird Glost with Hydrate dets schwedtligen oblinen genwessen inter ettindigeg und herseitigelde Wherried dienstio Erseitenung eit gebief, ettindigeg und herseitigelde Wherried dienstio Erseitenung eit gebief, obline Erweitel beierb moeb nicht eiter gleichte her unt detstätet eine herseiten gestellte, kieldhe. Wehr in her ihn alter Wertelle wert werte her in der eine siehen wird werd werden in her in dies eine eine eine eine die stelle wird die bei der die der bestellte wird die der die d

Metalles keineswegs allein dis: Bedingung ist, unter weicher der Versuch za Stande koment. Es scheint verzäglich noch anb Wäsineieitungsvermögen der Substinz in Betracht zil kommuni Let des Körper, auf weichem man den Tropfen drzeigen will ein schnischter Wärmeleiter, wigelingt der Versuch schwies riger, bin je besserer or list, westo telebrer, belief os memberth Heh mit Schwierigket verbunden, den Tropfen auf Elus zunerneugen. Herr Emsmann/hat dazu cia ciafaches Verfahren beschrieben; welches die Erschehung leicht zeigt. Erschehung Ann. I.I. S. 444.) Die Hauptschwiemglieit ist, Cass das Gus gowöhnlich :: dabet ... zerspringt, wenn der kalts Tropfen darabi filltij diess geschicht nicht, wonn man den Tropfen vorher Eru wint, Herrick memann führt dabei an, daterich die Mögei Hehlieits der "Erscheihung "aut? Glas geläugnet batte, "und CRiff dafür das Pharantecutische Centralblatti, sweiches den Auszug ans der coven angeführten Notiz enthält. En dersehen heiset es jedoch midder fraglichen Stelle: "Um zu weben, ob das Platit besenders agesignet useln "hiddhte," diese Brecheinung if Bildhig der Lempensture) herverzurufen, habe ich such gläserne, port estioners, Manke kupferne und eiserne Schalen angewendet, und zwad ink' demselben Erfolge." Ich hatte mich tiberneugt dass gliserne Schalen diese Erschehungen hervorbringen könd neh, and zwar war mir dabei kélneswége thibekanik, dass #42 so'h eir dasselbe: ischen vor langer Melt gesches hatte! (Pdyy) Ann. XXI. S. 168.) Vermuthlish ruhrt Herra Emist swifts Errthum in dieser Beziehung von einer darauf folgenten Stelle ber, wo escheicht, dass Giespwieer oder Sand; der Buden der Schalb geschüttet, die Bildung des Tyopfens hinderten. Luu Auch due Pharmacentische Centralblatt, welches Herr Emwallel citirt; bat beide hierauf bezüglichen Stellen wortlich abgedräckt

Wendet man nicht die Vorsicht des Herrn Ems man hilber des Waiser vorher zu erwärmen, so kerspringt das Glas gewöhnlich inchleichten Springen resettseiförmig, wöhet hindie kichtet inchleichten Springen resettseiförmig, wöhet hindie kichtet inchleichten sie dem Glas Glas Glas Glas Glas es auseinander dem Kosetten übersäen, ohne dass es auseinander fällt. Jo heisser das Glas ist, desto weniger, heiss hraucht das Wasser zu sein, und jet das Glas ist, desto weniger, heiss hraucht das Wasser zu sein, und jet das Glas endlich, vollständigaveins glühend, so kann das Wasser eiskalt sein.

140 Marchand, üb. das Leidenfrost'sche Phänemer.

Da das Glas bei dieser Temperatur achmilst; so muss mit den Versuch umgekehrt anstellen, nämlich nicht das Wasst auf das Glas nehmen, sondern das Glas in das Wasser fallei lassen, ein Verauch, den man im Gressen auf jeder Glashitti Im Kleinen kann man ihn leicht vor dem Kaalgasgebläse anstellen, wenn man Glasstäbe in der Flamm schmilzt und das abtropfende Glas in ein nahe untergestelltes Gefäss mit Wasser fallen lässt. Anfangs vermuthete ich, die Differenz zwischen der Temperatur des Glases und des Wassers müsste eine bestimmte sein, fand aber sehr bald, dass dies keineswegs der Fall sei, sondern die des Glases unverhältnissmässig niedrig sein könne, wenn die des Wassers sehr hoch ist. Auch hierzu wählt man besser das umgekehrte Verfahren, Wenn man eine Glasröhre, am besten in der Form eines Reagenzglases, über der Lampe mit doppeltem Luftzuge so atark erwärmt, wie es in dieser Flamme möglich ist, und man thuckt es sphnell in kaltes Wasser, so zerspringt das Glas jeder Mal. Hat man das Glas bis zur hellen Rothglübhitze erwärmt, wo es schon ziemlich: weich ist, so kann man es in Wasser von 50-60° tauchen, ohne dans es springt. Je höher die Tenperatur des Wassers ist, desto weniger booh braucht die des Glases zu sein. Kocht das Wasser, so bedarf das Glas nicht einmal :: mehr der Dunkelrothglühbitze. Tauaht man das Glas dunkelrethglühend in siedendes Wasser, so hörteman kein Zischen und es ist als ob man einen kalten Körper binein tauchte. Unter dem Wasser eicht man das Glas fortglüben i die Temperatury des. Glases fällt nach und nach ... das. :Glüben : bört auf, und pret eine geraume Zeit nachher zerspringt des Glan unter heftigem Zischen *). Man sieht, es ist diess gleichfalls nichts ab der Leiden frost'sche Versuch, nur in umgakebrter Weise augestellt. Charles of a Moia arm of highlet

Wondet man Metalle dazu an, so findet: die Erscheiuus in einer noch hübscheren Art statt, welche sie zu einem Verlesungsversuche ganz passend macht. Am besten wählt man

The first of the second second the contest to be a fifth

^{*)} Um das Rothglühen des Glases besser beobachten zu können, thut man wohl, das Innere desselben mit Kohle zu überziehen etwa mach man etwas pikrinsalpetersaures Kali darin verpullen lässt, oder dergl. m.

larchand, üb. das Leiden frost'sche Phänomen. 141

zu Plafintiegel oder -Schalen; mit Mechen gelingt der Versuch
steschwerer. Erhitzt man den Tiegel ble zum Weisiglüben,
kunn man ihn auf kaltes Wasser (0°C.) werfen. Er schwimmt
ne Zischen darauf umher, kühlt sich jedoch schneil ab und
ginnt nun mit einer kleinen Detonation das Wasser zischend
hnell zu verdampfen. Wird das Wasser erwärmt, ab darf
r Tiegel kälter sein, so dass bei Wasser von

55°C. die Temperatur des Tiegels 450°C.

70°C. — 370°C.

75°C. — 280°C.

85°C. — 280°C.

llkommene Genauigkeit machen, sie sind aber hinreichend, ale bedeutenden Differenzen zu zeigen, welche die verschiene Temperatur des Wassers gestattet.

Um die Temperatur des Platins Zenau messen zu können, si welcher der Versuch zu Stande kommt, liess ich mir eine shle Platinkugel von ungefähr einem halben Zoll Dorchmesser achen und an diese eine dunne, etwa 10 Zott lange Platinhite mit Gold aniöthen. Das innere Volumen der Kügel wurde man mit Wasser ausgemessen; indem sie leer und mit Wasr gefüllt gewogen wurde (Quecksilber konnte wegen der oldlöthung nicht angewandt werden, und es würde mit gressen chwierigkeiten verbunden sein, diese zu umgehen). "Nun wurde e Platinkugel, gegen welche der Inhalt der Röhre sehr tinedantend war; bis zur Glühhitze erwärmt und in des Wesm von verschiedener Temperatur getaucht. So wie es zischte, urde idie Röhre mit dem Finger fest verschlossen wad unter Enseer geöffnet. Dieses drang binein, bis die Angel vollig igakübit: war; sie wurde jetzt: wieder gewogen und aus der lenge.:.des): singedrungenen::: Walssers oder der :durch die Hitze pagetriebende Lustimenge nach: dem Budbergheiben Cheffiienten 0,00365 die Temperatur berechief, welche das Metall atte, in idem Augenblick, als der Veräuch zu Enderging. Ich alte diese Methode für sehr genaugundidie Uebereinstimmung der awanneneni Resultate spricht sich gleichfalls dafür nus. 🙏 and Alan Controleversuch a sturden a verschiedene Temperaturen

149 Manakatid, üb; des Loidenfrest'sche Phänomen

stage: Bades durch diese Mugel bestitumt. 100° fand ich m 101°; 150° zu 153°; 200° zu 204° nund 200° zu 205°; dies Genauigkeit ist in jedem Fulle hintelchend, um sich eine zienlich richtige Vorstellung von der zu hastimmenden Temperatu zu machen.

Die Temperaturbestimmungen beziehen mich hier natürlich auf den Moment, wo. der Versuch aufhört und nicht mehr mehr mehr mehr den Stande kommen würde. Ich habe die Versuche öfters wiederholt. Bei kochtandem Wasser war die Temperatur den zischenden Platins:

1. 2. 3. 4. Wasser 100° Platin 120° 125° 123°. 140° Wasser 175° Platin 140° 138° 137°. 127°

Wasser 35° Platin 192° 193°

Wasser 14° Platin 288° 240°

Wasser 0° Platin 400°.

Bei 70° tritt as sells gewöhnlich ein, dass die kleine Etplosion miemlich stark wird, und dann ist die Abkühlung du Kagel gewöhnlich sehr stark. So fund ich dabei zweimal die Temperatur nur zu 109° und 110°.

Dei Glas muss die Temperatur viel höher sein. Sie ist hierbeitsschwieriger zu messen, und namentlich, weit dasselle beim/Versushe jedes Mal zersprengt wird, in dem Augesblick,

wo das Wasser es zischend henetzt. Ich änderte daher da kleine Lestrument dahin ab, dass ich die Glaukugel mit eine zweiten umgeben liess, welche sehr heins zugeblauen war, das 19 mit ber ohne Gother des Zerspringens erhitzt werden kennte

or in Die Kugele wurden bis zum Glüben serhitzt und und in die Wasser getaucht; sobald die Zussere Kugel sprass, in wurde die Rähre geschlossen, die Kugel herhusgezeein I. 20 gen, mandie Böhre unter Quecksilber geöffnet und die

Temperaturbestimmung auf eine fibnliche Weise vorgeenammen wie oben. Dabei erhiekt ich für siedender
Wesser und einige andere Temperaturen folgende Ziahles:

Committee of the contract of t

zanlielist maktisch ?08 himilDinung001: spantW in vertrant muc ter, was not Porto Bush of the design Wasser, about the Charles and the Control of the Control o 10.05 min : "Wasser 2.30° : Slas 860° 10.02 .7 ... 115. The property of the Wasser on Occasing last unipershrows 800% Auch diesen Zahlen kant deh keine: vollständige: Genanige it suschreiben, indensen geben eie ziemlich richtiget digen der Verschiedenkeit, twelche bei Platin und Glas hersecht. ... Ich hätte gern den Wersuchen eine grössere Ausdehuung: getben, indamen da ein jeder Versuch, numentlich bei dem Plas sidurch das sorgfültige Anstrocknen der Kugel jedesmal über 197 halbe Stunde. Zoit erforderte und dennoch micht abtolute manigknit. darbot; so beschränke ich .mich: auf: die Mittheilung mer Natiza Sie wird: Melleicht Persenen, welche sich gleiche ls mit diesem Gegenstrad beschäftigen, willisommen sein; desid i habqimeinen, Zwecki.völlig :trreicht; wenn ich die Autwerki mkeituder Physiker auf diese Modification der Versuebe gew . Bei den vielfachen Versuchen, die viele und indieden Segenheit angestellt habe, bin ich zu der Ueberzeugung gelangt; sa es nur cine Dampfachicht ist, welche sich um das heisse etall herum bildet und welche die Flüseigkeit fertwährend zuoksträngt. Ka muss sich in der That cin Zwischenraum zwihen; Gefäss und Wasser befinden, was auch , wie ich denke, geh die Bildung der Lampensäure bestätigt wird. Ich habe et terlessen, diese Ansicht ferner soch experimentell festsustelin da sich eine andere Pesson gleichfalle mit der Hrklärung non Phänomona hoschäftigt. transfer of the contract the street of the children of mil fibility is a supposed to the transfer and the substantial and set in the state of state and were KIL . . . If he we also take a mark Lin paur neue Experimente der Galouno dem Kin dersche general **Plastik** alumng o der dark mob st , with the first the work of the cost with the start with the start of the cost with the start of the cost of t Course or and MAXIMILIAN, Herzog von Leuchtenberg. (Bullet. scient. d. St. Petersb.) Me in the state of the No. 1. The No. 1. Company of the state of the s in Sphon seine geraume Zeit den verflenegen Winters mit eig . Reiho :gri vene - plastischer : Warsushe' beschäftigt , :die : mich

144 Max., Herz. v. Leuchtenberg, üb. Galvanoplastik

zunächst praktisch und nachahmungweise mit dem vertraut machten, was mir Prof. Jacobi mitgetheilt hatte, erfuhr ich durch Prof. v. Kobell, dass es ihm gelungen sei, über ein gemake Bild oder eine Zeichnung in Tuschmanter eine Kupferplatte zu bilden, welche dann zum Abdrucke sich eignete. - Da mir v. Kobell's Versuche in sofern interessant schienen, als sie beweisen, dass auch nicht leitende Linearsiächen sich mit Kupfer überziehen pe wenn sie von gut leitenden unterbrochen und ungeben sind, so beschäftigten sie mich längere Zeit, und ich theile bier das Wesentliche mit. Das Gemälde wird auf einer blasken Platte von Silber oder Kupfer angefertigt. --- Das Males geschieht in einer Farbe, mit dem von den Porcellanmalern gebrauchten, durch Verdussten von Terpentinel als Rücksteil bleibenden dickflüssigen Oele. Als Farbe kann ein sogenannte Risearoth gebraucht werden. Eine gut angehonde und schreit trooknende Farbe erhält man auch mittelst einer Auffbaung von Damaraharz in Terpentinöl, wozu ich abwechselnd bei den einen Versuchen Eisenroth, bei anderen Mineralschwarz gemischt hatte.

Schon der erste Versuch lehrte, dass der Abdruck um se besser gelinge, je mehr das Gemälde oder die Zeichnung in Kap. ferstechermanier augefertigt ward, und dass seine feinsten Nancen sich vollkommen wiedergaben, während dickere und in die Breite gehende Tinten sich vom Kupferstiche entrernen mit Achnlichkeit mit Holzschnitten annehmen. Bei der geringe Anzahl der vorliegenden Experimente lässt sich noch nicht absehen, wie weit sich diese Procedur vervollkommuen land; jedenfalls ist sie mehr als blosse Radirung des Kupferstichs, welche bei gleichmässiger Breite und Tiefe aller Radirlinie keine Nüancen, nicht Licht, nicht Schatten darbietet; ja, diest Procedur, Deutlichkeit, Nüancirung, Schatten und Licht mit dem Kupferstiche gemein habend, besitzt noch das Eigenthümliche, dass die Linien weicher werden, und den Vorzug, dass die Zeichnung, ganz in der Macht des Malers stehend, auf kürzestem und billigstem Wege eine treue Vervielfältigung der Exemplare zulässt. Damit die lette Zeichnung mit Kupler überwachse, ist es nicht nöthig, weder die feineren noch die groberen Tinten mit irgend einem leitenden Staube, als etwa Graphi u. dgl., nu überziehen, da bei dem krystallinischen Kupferniedet-

Maz., Herz. v. Leuchtenberg, üb. Galvanoplastik: 145

schlag die Aggregation der Individuen in Blechen gern erfolgti indem ihre tesseralen Gestalten sich in dünnen Tafeln zu solen chen zusammensetzen. Der von v. Kobeli hierhei benutzte Apparat besteht in einer Kupferplatte 🎢 an welche ein anderthalk Zoll breites Blech zur Leitung unter einem rechten Winkel angenietet ist. Dieses Blech wird, den obersten Theil ausgenommen, mit Wächs isolirt. Die Platte ist so gross, dass sie die bemalte, welche darauf gelegt wird, ringe herum um einen halben Zoll ungefähr in der Fläche überragt. Unter der Platte wird ein auf Füssen oder Hölzchen von 1/4 Zoll Dicke ruhender, mit Pergament überspannter Rahmen oder ein Tambourin gestellt, in welches eine amalgamirte Zinkplatte gelegt wird, die man vom Pergament durch ein paar untergelegte Glasstäbchen getrenat hält. Um die Verbindung herzustellenigledient eine mit einem Kupferstreisen von 11/2 Zoll Breite verbundene Kupserplatte, welche etwas kleiner ist als die Zinkplatte und auf diese gelegt wird. Der Streifen ist durch Schraubenklammern mit dem Unterlagsbleche verbunden. Dieser Apparat kommt num in ein Gefäss von Glas oder Porcellan mit ebenem Boden und 9-3 Zoll hohen Wänden. Das Glasgefäss füllt man bis zum Eintauchen des Rahmens mit einer concentrirten Auflösung von Kupfervitriol und giesst einige Linien hoch werdünnte Schwefeisaure auf die Zinkplatte. Rings um die Kupferplatte sind Krystalle von Kupfervitriol zu legen. So mancher bei dieser Procedur zu beobachtender Rücksichten und Handgriffe erwähne ich nicht, in sofern sie dieselben sind, die auch anderweitige galvano-plastische Versuche erfordern. Ehe das Präcipitat zum Abdracke gebraucht wird, wäscht man die anhängende Farbe mit irgend einem Aether weg-

No 2.

Gleichzeitig beschäftigte mich das Experiment, von einer gravirten Kupferplatte identische Copien nicht mittelst intermediärer Stearinabdrücke zu gewinnen, sondern dadurch, dass ich in üben beschriebenem Apparate auf die Originalplatte Kupfer präcipitärte, das Präcipität nach mehreren Tagen abnahm und auf dieses Präcipitat von Neuem präcipitärte, wodurch die gewünsehte Copie gelang. Die Trennung der Originalplatte vom Präcipitat war nicht schwierig, nachdem ich jedesmid vor dem

, i. ·

146 Max., Herz. v.Leughtenberg, üh. Galvansplastik.

Varanche auf der Originalplatte Stearin zerjasson und wieder mit einem Lappen abgewischt hatte. Eben so hot die Tronnung der zwei Präcipitate selbst, ohne alle Stearinvermittelung, beine Schwierigkeit dar. Der praktische Natzen dieser Presider ist evident. Bei der Identität des Präcipitates mit der Originalplatte giebt sich ersteres oben so zu Abdrücken her wie letztere; es können somit die Abdrücke nach Belieben von vielfältigt werden, ohne fürehten zu müssen, dass die Opigie palphitte darauter leide. Somit fällt auch die häufigste Bedien gung des Stablistiches weg.

No. 3,

Obgleich die Freme dieser Cepien völlig bis zur Identität geht, so nehme ich mir doch ner, demnächst zu diesem Zwecks folgenden Weg zu verfolgen, der vielleicht auch anderweitig benutzt werden könnte. Statt die gravirte Originalplatte, wie num Drucke, mit Druckerschwärze zu bestreichen, werde ich sie mit der eben angegebenen Composition (Damaraharz, Eisentein und Terpentinöl) beschmieren, damit den Abdruck auf eine Silber- oder Kupferplatte so legen, dass die Farbe am Meislanklebt, werauf das Papier später, nachdem die Farbe gut gie brucknet, mit Wasser abgewaschen, das zurückbleibende Gemähle aber wie in No. 1. behandelt wird.

No. 4.

Endlich beschäftigte mich das Experiment, Kupfer in beby Formen und nicht auf Flächen zu präsipitiren, und jeh erzählt zu diesem Zwecke meinen letzten Versuch. Ein massiver Grunus aus Stearin ward mit Graphit gut überstrichen, über im in proportioneller Grösse ein kupferner hohler Cylinder gestellt, ohne den Conus irgendwo zu herühren, der Conus mit den Zinkpole, der kupferne Cylinder mit dem Kupferpale des Jeschichen Apparates verbunden, und so ju stwa 13 Studen ein dinnen, von aussen etwas rauhes und strehligen Präcipitigewonnen. Das Stearin ward nun aus dem Conus herangesehmelzen, um einen sweiten Conus mit glatter Aussenfäche in diesen einen ersten binein zu präcipitiren, was auch vollständig gelang. Der kupferne Conus mänlich ward in jainer connentier

. ; .

ax., Herz. v., Leuchtenberg, üh. Galyanoplastik. 147

k Eppfervitriolausseung an Bleibändehen so ausgehangen, dass ausgehangen auch Beitze nach unten ah und auf dem Glasgefäss ausgenden, den kupfernen Conus hinein wurde nun ein aus Zink geschter und mit Blase oder Pergament umwundener kleinerer pug so schwebend ausgehangen, dass nur vom Zink auslausde Bleibändehen auf den Bleibändehen des Kupferconus ruh. In die Blase ward verdünnte Schweselsäure gebracht, währed die Blase von aussen mit Vitriolausseung umspült ward. In die Blase von aussen mit Vitriolausseung umspült ward.

No. 5.

HI:

Ka scheint selbst nieht nöthig zu sein, zuerst in solchen lien immer ein äusseres Kupferpräcipitat zu erzwecken, um in in selbiges hineinarbeiten zu können, sondern es dürfte reichend sein, die Wachs- oder Kupferform mit dem Moie pach innen zu hesetzen, solches innen mit einer Lage von aphit zu bestreichen und nun geöltes Zink, mit Blase oder rgament umgeben, wie oben, hinein zu hängen u. s. w.

Ueberzeugt, dass in einer so wichtigen und neuen Prolur als der Jacobi'schen Galvano-Plastik auch das schwächSchärflein der Zuthat ein nicht zu verachtender Zuwachs, war es in meiner Absicht, Voranstehendes der Beurtheilung r kalserl. Academie der Wissenschaften vorzulegen, mit dem prochalt, künftighin in der Sache zu berichten, was fortgezete Experimente mir an die Hand geben werden.

Zusatz aus einem Briefe an Hrn. Jacobi.

Mes kleinen in dem Ausatze heschriebenen Apparates bemte ich mich blos zur Präcipitisung auf kleinen Klächen, und
nehr ich auch hei solchen desam Wirkung intensiv und
sichmässig sand, so ungenügend ergab er sich mir bei Verphon grämerer Ausdehung, besonders mit cubischen Formen,
pohon dem Baume nach sich nicht in die kleine Viertelzall-

148 Elsner, üb. die Methoden der Vergoldung

Distanz zwischen Tambourin und Kupferplatte stellen lassen, abgesehen davon, dass die geringen Flüssigkeitsschichten u. s. w. gewiss alle jene Mängel bedingen, von welchen Sie in Ihren Briefe sprechen.

Da aber die damals beigefügten Specimina sich zum Drucke hingeben mussten, so kam Alles darauf an, die Präcipitate m wenig spröde als möglich zu erhalten. Eminent spröde wurde das Prācipitat aber jedesmal unter zwei Bedingnissen: 1) wem ich die Elektroden von vorn berein einer zu grossen galvanischen Wirkung aussetzte, somit die Pracipitation beschleunigte. Selbst die schönste rothe körnige oder warzige Präcipitaties war in solchen Fällen spröde, die blätterige aber geradeza brichig; - 2) wenn ich die Distanz des Tambourins oft dadurch veränderte, dass ich die unterliegenden Hölzchen bald dicker, bald dünner legte. In solchen Fällen nämlich war es sichthar, dass das Prācipitat blätterige Schichten übereinander bekam, die, dem jedesmaligen Wechsel der Distanz entsprechend, eine grosse Sprödigkeit des Ganzen verursachten. — Diess zur Vermeidung eines Missverständnisses, da ich mich in allen übrigen Verstchen mit überwiegendem Vortheile Ihres grossen Apparates bediente, bis es mir vielleicht gelingen wird, in meinen Guseisenessen zu Eichstädt durch Graphit haltendes Gusseisen hierk einige Veränderungen mit Vortheil zu machen.

XIII.

Ueber die Methoden der Vergoldung auf nassem Wege.

Dr. L. ELSNER.

(Aus den Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewertfleisses in Preussen. 1840, 6. Lfg.)

Es ist bekannt, dass im Jahre 1837 in dem London Journ of arts eine neue Methode, Metalle auf nassem Wege zu vergolden, veröffentlicht wurde, deren Resultate im Ganzen befriedigend aussielen. Die Methode wurde im Laboratorium des königl. Gewerbe-Instituts geprüft und die dabei erhaltenen Resultate in den Verhandlungen des Vereins zur Beförderum

des Gewerbsleisses in Preussen, Jahrg. 1837. S. 152 von dem Hrn. Prof. Dr. Schubarth öffentlich bekannt gemacht. Die Wichtigkeit des Gegenstandes liess erwarten, dass man versuchen würde, auch noch andere Wege einzuschlagen, um eine Vergoldung auf nassem Wege zu erzielen, und in der That trat Hr. Prof. de la Rive in Genf mit der Angabe einer solchen Methode auf, welche er in der Bibliothèque universelle de Genève No. 50. Mars 1840 unter dem Titel: Notice sur un procédé électrochemique, ayant pour objet de dorer l'argent et le laiton, bekannt machte. **Eine** Uebersetzung dieses Aufsatzes findet man in dies. Journ. Bd. XX. S. 157. — Ich erhielt von dem königl. wirkl. Geh. Oberregierungsrathe Hrn. Benth den ehrenvollen Auftrag, die Versuche nach der Angabe de la Rive's zu wiederholen, deren Resultate ich nachstehend mittheile. Bevor ich dieses thue, muss ich die Operationsmethode desselben kurz erwähnen.

Er bedient sich der Wirkung des elektrischen Stromes, um mittelst desselben die Metalle zu vergolden. Sein Verfahren ist folgendes:

Man nimmt eine dünne Blase oder einen Sack von Goldschlägerhäutchen, füllt in diesen eine mit destillirtem Wasser sehr verdünnte Lösung von Gold in Königswasser, hängt ihn in ein Glasgefäss (Zuckerglas), welches Wasser mit einigen Tropfen Schwefel- oder Salpetersäure angesäuert enthält, und - taucht in dieses Wasser ein Stück Zink, an welches ein silber-.mer oder Platindraht befestigt ist, der in die Goldlösung taucht und an dessen Ende der zu vergoldende Gegenstand durch Umwickelung des Drahtes befestigt ist. Der zu vergoldende Gegenstand spielt hierbei die Rolle des negativen Metalles. Der _bei dieser Kinrichtung entstehende schwache elektrische Strom zersetzt die Goldlösung, deren Gold sich auf den zu vergoldenden Gegenstand niederschlägt, während sich das Zink in der äussern Flüssigkeit auflöst. Der Gegenstand wird vorher in säuerliches Wasser getaucht, um Staub, Oxyd etc. von seiner Oberfläche zu entfernen, die entweder pelirt oder nur ganz einfach geschliffen (adoucie) zu sein braucht. Ist der Gegenstand von Silber, so nehme man zum Abspülen Wasser, welches mit Schweselsäure ein wenig angesäuert ist, ist er von Messing, mit einigen Tropfen Salpetersäure angesäuertes Was-

150 Elsner, üb. die Methoden der Vergoldung

ier. — Nach diesem Bade wird der Gegenstätid 1.— Minken läng in die verdünkte Goldlösung eingetäucht, heräusgehömmen, ih säuerlichem Wasser abgespült, mit fehler Leinwand unter Reiben abgetröcknet und dieselbe Reihe von Operationen so eit wiederholt, die der Gegenstand binlängfich vergöldet erscheint Auf diese Weise hat de la Rive Silber und Messing vergoldet; Eisen zu vergölden gelang ihm hicht.

Als ich die Versuche nach vorsiehender Angebe mistelle, find ich sehr bald, dass durch die Wandungen der Blass übe bedeutende Menge der Goldsolution reducirt wurde, indem als die Blase fast durchaus purpurroth fürbte, ein Umstand, der ist einer einige Zeit dauernden Operation höchst unangenehm ist. Ich kam daher sehr bald darauf, das bekannte Princip der Beiquere l'schen öffer Daniell'schen galvanischen Kette auswischen, wodurch jeste Unännehmlichkelt bedeutend geringer wirk. Ich bediente mich hämlich statt der Blass eines an beiden Eiden offenen Glascylinders, desseh eines Ende mit dunner Blass verschlossen wurde. Ich füllte denselben mit der verschungen ganz is, wie es die la Rive anglebt und wie es verstehend angeführt ist


Hierbei ergab sich, dass politte Gegenstände um beste sich vergoldeten, eben so, dass der elektrische Ström nur schwich zu sein braucht, daher das in dem äussern Gefäss besindliche Wasser nur mit einigen Tropfen Schwefel- oder Salpetersäure angesändt werden darf. Die Vergoldung auf Messing siel röthlich aus, sie Vergoldung auf Silber gelb-grünlich; eben 180 Mat es auch des Vergoldungen zeigte, fanden dieselben zu dünn, was man Weschwers sehr gut an dem weissen Silber bemerk in kant.

So weit war ich im Laufe des Sommers mit den Wiederholungen der galvanischen Vergoldungsmethode gekomitch, als im August- und Septemberheft der Ann. der Chemie und Pharm. Ba. XXXV. S. 216 u. 350 ein Aufsatz von Hrn. Dr. R. Bött ger erschien: "über Vergoldung des Silbers, Messing und Stahls duf galvanischem Wege," welcher, besonders wie die Vergoldung des Silbers nach dieser Methode anlang, günstigere Resultate erhalten hat als die la Rive. Die Wichtigkeit des Gegenstandes bestimmte mich sogleich, auch die Versuche des Hrn. Dr. Bött ger zu Wiederhölen, um wo möglich

shor den praktischen Werth der galvanischen Methodo, zu 1980 gelden, bine Vergleichung anstellen zu können.

Jor Apparet, dessen sich der Verf. zu seiten Vergeldungsversuchen bedient hat, ist ein ganz ähnlicher, wie ich
mich densen sehen bei dem de la Riverschen Verfahren bedient hatte, den Verfahren bei der Vergeldung ganz desseite,
wie ich es oben sehen angegeben habe:

Wetpletinirung des Kupfers, Messings und Stahls, so wie sur Vetpletinirung des Kupfers, Silliers und Messings bedient sieh Hr. Dr. Bött ger des nebenstehend abgebildeten Apparation. U. ist. ein rundes, etwa 1 Zoll diekes Bret, in densen Contram vie mageführ 3 Lin. im Durchmenser betragendes Look id 1/2 Zoll tief eingebohrt ist; ein genau ehen so tiefen und weiten Look, f ist nelte an der Peripherie des Bretes angebracht; beide Lächer sind mit Quecksilber angefühlt und communicires durch den eingenehohenen Kupferdraht p. Auf diesem Holuganteil sieht ein oben offenes Glasgefüss aus, durch dessen Boden lander Mitte mittelst einer dreikantigen, mit Terpentisch benetzten



152 Elsner, üb. die Methoden der Vergoldung

englischen Feile ein Loch gebohrt ist, worem ein unterhalb de Glasbodens noch etwa 1/4 Zoll hervorragender, mit Siegellack dagekitteter Kupferdraht passt, dessen oberer, in das Innére des Glases reichender Theil in eine kleine kreisfermige flache Spirale b mündet, die als Träger eines Stückes amalgamirten: Zinkbleches dient, mm ist ein oben und unten offener, etwa 8 Zell hoher, unten bei i mit einer dünnen beseuchteten Thierblase verschlossener Glascylinder, um welchen, gerade up: wie bei den zur Hervorbringung von Reliefkupferplatten dienenden Cylinder. drei zuvor ausgeglühte biegsame Kupferdräbte éc gelegt sint, die als Träger dienen, wenn der Cylinder auf das Glassas gesetz werden soll. h ist ein etwa 1/2 Lin. dioker Kupferdraht, deute unteres Ende in das mit Quecksilber gefülke Lech freicht bei um dessen oberes Ende p ein dünner Platindraht geswickelt ist, an dessen entgegengesetztem Ende q der zu vergoldende Osi genstand & durch lockere Umschlingung befestigt ist.

Will man nun irgend einen Gegenstund, vzi Bereinen black polirten silbernen Löffel, vergolden, so schättet mistr in idae Glas aa bis zu der Linie ee, nachdem man zuvor auf die flache Spirale b ein Stück amalgamirten Zinkbleches gelegt hat, Wasser, welches man durch wenige Tropfen (etwa 12-29 Tropfen auf 4 Loth Wasser) verdünnte Schwefelsäure angesăuert hat, setzt hierauf das Glas aa auf das Holzgestell U, se dass der Draht b in das mit Quecksilber gefüllte Loch d taucht, und endlich den mit Thierblase verbundenen und ganz mit Chlorgoldlösung (ein Theil trocknes, möglichst säurefreies Chlergeld auf ungefähr 160 Theile destillirten Wassers) gefüllten Glascylinder mm auf das Glas aa. Hierauf senkt man das Hade des Kupferdrahtes h in die mit Quecksilber gefülke Vertiefung f, und nun erst den an dem Platindraht befestigten, also mit dem Kupferdraht h communicirenden Gegenstand in die Chlorgoldsolution, lässt den Gegenstand in der Goldlösung nie länger als höchstens 1 Minute, zieht ihn dann hervor, spült ihn ia Wasser ab, trocknet ihn schnell mit einem Leinwandläppches unter starkem Beiben sorgfältig, taucht ihn von Neuem in die Goldsolution, zieht ihn nach Ablauf von 1/2-1 Minute zum zweiten Male heraus, wäscht ihn ab, trocknet ihn und wiederholt die Operation 5-6mal (bei Vergoldung des Stahls etwa 10-12mal), oder überhaupt so lange, bis eine hinlänglich starke Vergoldung sich zu erkennen giebt.

Hierbei bemerke ich, dass ich mich zwar in der Hauptsache desselben Apparates bedient, jedoch eine kleine Abandarung dabei angebracht habe, die für die Anwendung desselben praktischer ist. Statt des Kupferdrahtes ec, welcher als
Träger des innern Glases dient, habe ich ein Bretchen angewandt, welches eine Oeffeung hat und auf welchem sich eine
Klamme von gehärtetem Messing befindet, wie aus beigegebener Zeichnung leicht zu ersehen. a ist das Bretchen und b
die Messingklemme. Zwischen diese letztere wird der innereGlascylinder eingeschoben, und man kann nun denselben mehr
oder weniger, durch Herab- oder Heraufschieben, dem Zinkhlache näbern. Auch kann man grössere und kleinere Glascylinder gebrauchen, da durch eine Schraube ce die Klemme enger oder weiter gemacht werden kann.

Wege habe ich mich diesen Sommer eines ganz ähnlichen Apparates bedient, wie sich dessen Hr. Dr. Böttger bedient hat.)

Bei dieger Methode ist, soll die Vergoldung recht schön ausfallen, Hauptsacke, dass die zu vergoldenden Gegenstände vorher vorzüglich gut polirt sein müssen, kerner dass, nachdem die Gegenstände aus der Goldlösung herausgenommen und abgespült worden sind, man sie sorgfältig mit einem sehr feinen Leinwandläppchen trocken und stark reibe. "Die Vergoldung fiel," eagt, der Verf., "ganz vorzüglich aus, und der vergoldete, vorher ... polirte Gegenstand hatte nach stattgefundener Einwirkung eine "iberaus reine spiegelblanke bochgelbe Goldfarbe, die von der "Kenervergoldung nicht zu unterscheiden "war.". Diese Angabe bezieht sich aber auf blank polirte silberne Löffel. Bei der Wiederholung der Versuche fand ich, dass, um das ie dem äussera Gefäss sich befindende Wasser anzusäuern, es nur nöthig ist, auf 2 Loth Wasser einen Tropfen verdünnte Schwefelsäure nehmen. Ich nahm gewöhnlich 20 Unzen Wasser und 20 Tropfen yerdünnte Schwefelsäure, und die Versuche gelangen ganz gut; die Verdünnung kann demnach weit grösser sein, als sie Hr. Dr. Böttger angiebt, ohne dabei befürchten zu dürfen, dass die Resultate ungünstiger ausfallen. Ferner löste ich einen Theil völlig trocknes Chlorgold in 160 Th. destillirten

454 Elsner, üb. die Methoden der Vergoldung

Waisels auf und bedichte mieh dieser Lösung zur Vergeldutg eines blank politen silbernen Löstels, erhielt über staht eine reinest gelben Vergoldung einen schwärzlich gelben Ueiterzug. Ich fand buld, dass vor Grund dieser setzt unsugenehmen Erzichtehung thesis in der sauern Reaction der Goldlöstung; und in der Contentration der letztern lag; denn; obgleicht ich ein alleh obeinischen Begrissen abutrates Goldchlörid angewändt hati, und rengirte dessen Lösung dennoch zuwer, und ich sah mie gestätnigt; die saure Reaction der Lösung durch reines kelter knietes Nätforf zu beseitigen, mit dessen Lösung im dentiblisten Wasser ich die Goldlösung genau neutralisiste.

Um den nöthigen Grad der Verdünbung des Geschlicht -zir prüfen, bediehte ich wich eines black politien silbernen Diches, weiches ich in die Goldlösung tauchter Wardo daddh nach etwa 1 Minute daubindem Bintauchen nielst mehr zeh wiriich und gab beim Abreiben eine reine gelbe Farbe y se waath ich aliebung erst. die Geldfesung ung vom wittelit derseite auf gafvanischem: Wege zu vergolden. 'Normeine mis kolleskurein: Watron acutrilicitte tha auf distingence wholes we 'diffinte' Goldlüsung giebt günstige Bosuffato', din Umblahil, da werentien ist. "Hr. Dr. Bout gor giste is and Distant th, dass man sich euch zer Vergoldung tes Döppelantzes, te stehend are Chiergold and Chloradrian, addiction kound; h Mun aber auf die öben von mit augegebene Weise, durch Nottruffsktion der Gofdlösung duftil wenige Tropfen eindr Titung von teitem kohlenskurem Natrun, denkelben Mweck efreichten habe teli likrer Einfachheit wegen lieber die letztere Meiliele gewählt. Die von mit stil die oben ungegebene Weise verfüldeten potition silvertion Livitei tratten sind reine thecharelle willfaftio und Moht die grunlich-gelie, wie ich ale früher erhale hatte. Der Grund hiervon liegt einfach im der Verdünnung der Die Vergeldung bielt den Druck des Politich wehr gut aus, nahm durch ihn eine sehf sehöne Politer in mi Beheidewasser verhielt sich gerade se wie gegen einen in Fourt vergoldeten silbernen Laffel. Book so habe len bemeikt, dus besonders derjehlge Theil des silbernet Luffels sich sehr ichte tilid stark vergoldete; weicher dem pusktiver Zith bigewalt -War, dass man daher die Puncte Wethsell wills i ar welle man den Verbindungsdraft (zwischen Zink inn den zu wi-

goldenden Gegenstand) befestigt. Nichmit man statt eines Drafftes von Platin einen von Kuffer, so fallt die Vergoldung röthlich ttis; dieselbe Bebbachtung hat auch Hr. Dr. Böttger gemacht. Ich wende mich jetzt zu den Resultaten, welche ich bei dem Versücke, andere Metalle, ausser Silber, auf hassein Wege ži vergolděh, erhalten habe. De la Rive ist, Wie dien schon · bemerkt, die Vergoldung des Staffis fileht gelungen. Bottgef tist aber Stahlfedein und stählerne Gegenstände in seinem Apparate gut vergoldet. Ich habe gefunden, dies sich Stahl-Redern', die von ihrer bladen Oxydschicht aurch Behandlung int verdünkter Salzsäure völlig gereinigt worden waren, so dass sie ganz blank waren, schon dadutch sehr schon vergelden lassen, dass man sie in die mit kohlensaufem Natron neutrali-Wirte Goldlösung legt; 1-2 Mittiten latig darin negeti Test, "Aladaan hefausnimmt; abspult Wild iffit einem feinen Läppunen "Wark reiht:" Durch ofteres Wiefferholen derselben Operation war "Me Vergoldung "Schit Schon, so dass sich dem fich Stahl" auf die einfachste Weise, ohne Anweitung itgeni eines Apparales,

Was die Vergeldung des Kapfers anlangt, so habe ich bettierkt, dass sich ein seht blanker Kupferdeuit; den löh einige Zelt läng dass sich ein seht blanker Kupferdeuit; den löh einige Zelt läng dass die heter zu befestigen, stark vergeldet hatte, so dass auch starkes Reiben nicht im Stande war, die Vergeldung zu entfernen. Auch geläng es mit, seht blank geputstes Kupferbiech dadurch seht deutlich zu vergelden; dass ich dasselbe längere Zeit in die verher gehäu neutralisite Gold-löhung einlegte und übrigens verführ, wie mehrmals bemerkt werden ist. Ueber die Vergeldung des Kupfers sagt Hr. Dr. Böttger: "ein kupferner oder verkupferter, als negative Elektrolle "Stromwirkung dauern mag, kaum siehtbar vergelset." ——"In wiefern meine Resultate abweichen, ährt die oblige Bemerking.

Was die Vergoldung des Messings auf galvätischem Wege anlaugt, so sagt von dieser Hr. Dr. Böttger, dass sie eben so sehon ausfalle wie die auf Silber. Die Resultate mehter Verwuche, Rosetten von besonders zu diesem Zwecke vom Güttler politiem Messing zu vergolden, gaben zwar eine nicht zu vergolden gaben zwa

auch de la Rive angiebt, sie war nicht so schön goldgeb.

als dieses bei der Vergoldung des Silbers der Fall ist. Bedient man sich statt der Chlorgoldlösung einer Lösung von Chlorplatin oder, was noch zweckmässiger ist, einer Lösung des Natriumplatinchlorids, welches man dadurch leicht erhalt, dass man gleiche Theile trocknes Chlorplatin und reine Kochsalz in destillirtem Wasser auflöst, und verfährt übrigens, unter Beibehaltung desselben Apparates, ganz so, wie bei der Vergoldung auf galvanischem Wege angegeben, so kann man Silber, Kupfer und Messing mit einer dünnen Schicht Platin überziehen, welcher Ueberzug besonders dann stahlgrau und glänsed erscheint, wenn man sich des Doppelsalzes aus Chlorplatin ust Kochsalz bedient. Hr. Dr. Böttger, der auch dieses Verfahren in neinem Aufsatze angiebt, bedient sich desselben besonders, un Kupferreliefplatten, die man auf hydro-elektrischem Wege erhalten bat, vor den schädlichen Einflüssen der Atmosphäre zu schützen, da ibm eine Versilberung auf galvanischem Wege keine günstigen Resultate gab. Die se plattirten Kupferplatte können nun leicht auf galvanischem Wege vergoldet werden. Ich habe auch diese Versuche wiederholt und dieselbe Besultate erhalten, muss jedoch bemerken, dass, um durch Galvanismus erhaltene Reliefkupferplatten vor der Oxydation sa schützen, ich kein Verfahren praktischer und einfacher gefuden habe, als dieselben entweder kalt zu versilbern oder tak zu vergolden. Ersteres habe ich bei allen im Laboratorium der Anstalt dargestellten Roliefkupferplatten angewandt, indem ich auf die blanken Platten salpetersaure Silberlösung mit Kochmiz aufrieb, wobei nur ein sehr schwaches Reiben erforderlich ist, und dann mit Schlämmkreide putzte; so sind dieselben auf die leichteste und einfachste Weise, ohne Anwendung irgend eines Apparates, .. recht schön versilbert und geschützt gegen die Kinfigsse der Luft. - Um die Platten kalt zu vergolden, habe ich Leinwardläppchen mit concentrirter Goldlösung getränkt, getrocknet, ver-

brannt und das erhaltene braune Pulver auf die blanke Kupferfläche mit etwas Kochsalz und Wasser aufgerieben und so seht leicht eine Vergoldung erhalten, welche die Kupferplatte schützt. Man könnte einwenden, dass sowohl bei der kalten Vernilberung, als bei der kalten Vergoldung der Gegenstand stark geriebes werden müsse; bedenkt man aber, dass sowohl bei der Vergoldung als bei der Platinirung auf galvanischem Wege starkes und öfters wiederholtes Reiben Haupterforderniss ist, so
fällt dieser Einwand völlig weg.

Was nun den praktischen Werth der zuerst von de la Rive angeregten Methode der nassen Vergoldung auf galvanischem Wege anlangt, so ist dieselbe, meiner Ansicht nach, der bekannten alten Methode, "kalt zu vergolden", an die Seite zu setzen, die in der That ihrer Einfachheit und leichten Ausführbarkeit wegen in gewisser Beziehung der galvanischen Methode noch vorzuziehen sein dürfte, weiche zu ihrer Ausführung Apparate bedarf, die, seien sie auch noch so einfach, inimer das Verfahren an sich umständlicher machen. Was die Farbe der Vergoldung anlangt, so möchte ich wohl die schöne hochgelbe Goldsarbe der galvanischen Methode der goldgeiben Farbe der kalten Vergoldung vorziehen; allein es ist jedem Praktiker bekannt genug, dass sich auch die Farbe bei der kalten Vergoldung beliebig ändern lässt. Ich muss bemerken, dass das so eben Gesagte sich auf silberne Gegenstände bezieht # bei Messing erhielt ich durch die kalte Vergoldung ein reines! Goldgelb und nicht das Röthlichgelb, wie bei der Anwendung der galvanischen Methode, welche sich demnach, meinen Versuchen zufolge, vorzugsweise nur für silberne Gegenstände eignen möchte. Die Anwendung eines elektro-chemischen Apparates zur Vergoldung für die grössere Praxis wäre daher sehr beschränkt. Vergleicht man dagegen hiermit die praktische Anwendung der englischen Methode, auf nassem Wege zu vergolden, so scheint mir, wenigstens in so weit bis jetzt die galvanische Methode durch Versuche, die zur öffentlichen Kenntnies gekommen sind, geprüft worden ist, die erstere für die Praxis den Vorzug zu haben. Nach der englischen Vergoldungsmethode lassen sich Kupfer, Messing, Bronze, verzinntes Weissblech, Neusilber, Silber, Stahl und Zink vergolden, und ein hiesiger Goldarbeiter, Hr. Voges, hat silberne Armbänder nach der englischen Methode so schön vergoldet, dass die Vergoldung von der Feuervergoldung durchaus nicht zu unterscheiden war und dass sie als Luxusgegenstände verkauft werden konnten, ein Umstand, der meiner Meinung nach sehr für die praktische Anwendung des Verfahrens spricht. Demselben Praktiker ist es gelungen, auch gepresste Bijouteriegegenstände

aus Messing mittelst der englischen Methods so schön zu vergolden, dass deren Vergoldung fer stärksten Feuerwergoldung nichts nachgiebt, so dass man hoffen kann, auch darin bald se weit zu kommen, dass man solche vergoldete Gegenständs wird können in den Haudel bringen, was in der That von Werth ist, da eine grosse Anzahl Bijouteriegegenständs, die im Haudel vorkommen, aus gepresetem Messing verfertigt sind. Die Vergoldung lässt sich sehr schön mittelst des Polirstahls polires und ist so stark, dass sie die Anwendung der gewähnlichen Färbungsmethode der Goldarbeiter sehr gut verträgt, wovon ich mich durch ganz besonders in dieser Absicht angestellte Versuche vollkommen überzeugt habe.

Eho ich diesen Aufsatz schliesse, mag noch folgende Bamerkung ihren Platz finden.

Meine Absicht bei der Bekanntmachung der Besultate meiner Versuche war keine andere, als durch dieselbe Geldacheiter zu veraulassen, Versuche über den praktischen Werth der galvanischen Methode anzustellen, damit auch von dieser Seite der Werth derselben geprüft werde, welche, so weit sie bis jetzt in ihren Besultaten zur öffentlichen Kenntniss gekommen ist, wie mir wenigstens scheint, nicht so günstige Anwendung für die grössere Praxis verspricht, als dieses mit der englischen Methode, Metalle auf nassem Wege zu vergolden, der Fall gesein scheint.

and the second of the second o

and mention of the second of t

mission of the file and the contract of the file of the contract of

and the second s

-: III

4. XIV.

-Heber das Atomgewiekt des Kohlenstoffens

O. L. ERDMANN und R. F. MARCHAND.

Eine der wichtigsten Grundlagen für alle Berechnungen im der organischen Chemie, welche durch die sorgfältigsten Hra mittelungen unahänderlich, festgestellt und durch die zahlreichsten Analysan bestätigt zu sein schien, ist durch die Herren Damas und Stass (d. Journ. XXII. 300) auf sine überram schende Weise erschüttert worden, indem die erwähnten Chemiker durch eine Reihe von Versuchen, die sich auf ein böchst cinfiches und, wie es scheint, gang vorworfsfreies Princip gränden, dargethan haben, dass das Atomgewicht des Kichlen, stoffes won 76,43 auf 75,0 herabgesetzt werden muss, um sping Ordene also, welche einen nicht geringen Kinfluss auf die Best reshnung der Formeln für eine Apzahli organischer Körper äusseen: wird. Die neue Zahl scheint auf den ersten Anblick unnichtig aein zu müssen, da sie im Widerspruche steht mit den Angeben der bewährtesten Chemiker, deren Analysen nach dem alten Atomgowichte berachnet worden sind, ahne dass der Fehre ler offenbar geworden wäre; es stehen derselben endlich die yop Bornelius noch in der veuesten Zeit *) angestellten Versyche Ebor die Zusemmensetzung des kahlenspuren und kleessuren Blaioxyds entgegen, welche den Zweck hatten, die schon von ciniges Jahren von Dumas ausgesprophenen Zweisel an der Bichtigkeit des bis jetzt angenommenen Atomgewichtes zu heseltigen, and in der That durchaus zur Bestätigung der alten Zahl führten.

Later dissen Umständen autschlossen wir une, die Vernsuche der Herren Dumas und States au wiederholen. Wir wellen gern bekannen, dass wir nieht hinn einige Zweisel an der Richtigkeit der neuen Zahl wasen Arbeiten begannen. Ingeben der franzienen des Engehniss derseihen ist genz den Angaben der franzienenen. Chemiker antsprechend ausgefallen. Unser Vornriheil für die Richtigkeit den alten Atomgewichtes hat uns nicht gezeitet, mit einer kleinen Anzahl von Versuchen uns an begrife

Tyse of the man death of the first of the man and the second

¹⁰⁰⁰ Paggend. Ann. 120. 2004. The state of the Sarge of

160 Erdmann u. Marchand, üb. das Atomgewicht

gen. Schon hatten wir drei Verbrennungen von Diamant und zwei von Graphit glücklich beendigt und dabei die volkkommenste Uebereinstimmung mit den Versuchen der Herren Dumas und Stass erhalten, als neue Zweisel uns veranlassten, noch zwei Verbrennungen von Diamant so wie zwei von künstlichem und natürlichem Graphit zu veranstalten, die aber ebenfalls sämmtlich zu der neuen Zahl führten.

Wir haben uns den Einwurf gemacht, dass vielleicht die von den Herren Dumas und Stass so wie von uns selbst angewandte Methode bei aller ihrer Einfachheit und anscheinenden Sicherheit einen versteckten Fehler enthalten und deshalb ein unrichtiges Resultat geben könne. Allein dieser Einwand beseitigt sich schon durch die Betrachtung, dass die etwa vorauszusetzende Fehlerquelle ja auch bei jeder mit Anwendung vos gasförmigem Sauerstoff ausgeführten organischen Analyse ihren Einfluss geltend machen würde. Dass aber in diesem Falle keine der Methode zur Last fallenden Fehler begangen werden. ergiebt sich daraus, dass die Resultate der mit Sauerstoff ausgeführten Analysen bei leicht verbrennlichen und nicht sehr kohlenstoffreichen Substanzen immer genau mit denen übereinstimmen, welche bei Anwendung von blossem Kupferoxyd eshalten werden. 1.14

Wenn ferner der Apparat einen versteckten Fehler hätte, so münder die damit erhaltenen Resultate je nach den angewandten Mengen der verbrannten Substanz schwanken; diess ist aber in der Thit nicht der Fall; wir haben, in derselben Röhre, bei Verbrennung von 0,7519 Gr. Diamant ein ganz gleiches Verhältniss von Kohlensaure erhalten als bei 1,683 Gr. Diamant und 1,904 Gr. Graphit, während doch der vorausgesetzte Fehler sich im lend tern Falle auf eine 2½ mat grössere Menge von Kohlensaure als im ersten vertheilt haben würde.

Wir haben endlicht durch directe Versuche, von denen wir segleich Rechenschaft geben wollen, uns die Ueberzeugung verschäft, dass die angewandte Methode keinen versteckten Fehler enthalten kann und dass sie uns aus einem bestimmten Gewichte von Kohle genau nur die Menge von Kohlensäure liefert, welche wir auch bei richtiger Ausführung der organischen Ausführung der organischen Ausführung der organischen Ausführung der organischen Menge lyse aus dem gleichen Gewichte Kohlenstoff erhalten müssen.

Obwohl wir nun von der Genauigkeit der angewandten

Methode and das Vollkommenste überzengt sind, so blieb es une -doch immer wänschenswerth, die erhaltenen Besultate durch eine auf ein andres Princip gegründete Methode zu bestätigen. Die Analyse kohlensaurer Salze, welche, sich gunächst darbot. zeigte in der Ausführung grössere Schwierigkeiten, als wir anfange geglaubt hatten. Die Resultate fielen schwankend aut. und nach mehrfachen Bemühungen waren wir genöthigt, die begonnene Arbeit fallen zu lassen, da die Methoden, von denen ein sicheres Resultat vielleicht zu erwarten gewesen wäre, nicht mehr die Einfachheit besassen, welche wir verlangen mussten. Es gab endlich noch ein Mittel, um das Atomgewicht des Kohlenstoffes zu controlicen, ein zu wichtiges, als dass wir nicht davon hätten Gebrauch machen sollen, um so mehr, da es dasjenige war, dessen man sich zuerst bediest batte, um eine sichere Zahl zu Anden, wir meinen die Wägung der gasförmigen. Verbindungen des Kohlenstoffes. Es ist bekannt, mit welcher Sorgfalt das spec. Gew. der Kohlensäure von Dulong wad Berzelius bestimmt worden ist, und zwar mit Anwendang der ausgezeichnetsten Instrumente. Es sind indessen mit solchen !- Versuchen Schwierigkeiten verknüpft, welche ! nicht leicht überwunden werden könsen und welche, selbst worste zu Tage liegen, kaum zu umgehen sind. Dennoch liessen wir was durch diese entanuthigenden Umstände nicht abschrecken. auf die völlige Entscheidung einer Frage hinzuarbeiten, deren Lösung wir bereits so beträchtliche Opfer gebracht hatten. In der That haben wir eine Reihe von Versuchen zur Bestimmung des spec. Gewichtes der Kohlensäure begonnen, wobei unsere Hauptsorge auf die Austrocknung der Gefässe und Reinheit des Gasea, genaupste Berücksichtigung der Temperaturverhältnisse, so wie auf die Vermeidung des schädlichen Einflusses gerichtet war, welcher durch die höchst wahrscheinlich eintretende Condensation des coërciblen Gases an den Wandungen der Geface hedingt ist. Wir hofften letztere pamentlich dadurch we nicht zu umgehen, doch wenigstens zu erkennen, dass wir Gefässe mit sehr verschiedenen Oberflächen; Kugeln und Röh-Wir würden nicht angestanden bahen, diesem ren anwandten. Gegenstande ferner unsere ganze Aufmerksamkeit und Thätigkeit zu widmen, wenn wir nicht schon während unserer Präliminarversuche erfahren hätten, dass zwei der ausgezeichnetsten Journ. f. prakt. Chemie. XXIII. 3: 11

162 Erdmann u. Marchand, üb. das Atomgewicht

Naturförseher sich demselten Gegenstande zugewundt inden, die in jedem Palle unsere Kenntnisse über diesen Punctmie intellen werden, dass sich von keiner Seite ein Zweiser dage gen erheben kann. Wir haben und daher sogleich wie diesen Theile der Untersuchung zurückgezagen und fürchten miet, dadurch den Vorwurf einer Nachlässigkeit auf und zur laden,

Wir geben jetzt zur Beschreibung unserer Versuche über, um diese einige Betrachtungen über den Kindus sien nem Mitemgewichtes auf die Berechnung der Furmeln! auszulinüpfin.
Die zu lösende Aufgabe *) bestand darin, ein bekantin Gewicht reiner Kuhle in Sauerstoff zu verbrennen und die gebildete Kohlensäure zu wägen, um dadurek das richtige Nachtlinies Gennen zu lernen, in welchem der Kohlenstoff sich mit dem Sauerstoffe verbindet.

Unser Apparat war dem der Herren Dum aus bied Standurchaus ähnlich construirt; wir haben uns aber überzeugt, des er einige Vereinsbehungen gestattet, und sind zuletzt bei stigender Einrichtung stehen geblieben, deren wir uns abweil zur Verbreinung von Dismant als von Graphit bedient bebes.

Platin eingelegt und dieser in einen etwas grössern Percellenachen eingesetzt, wie man sich deren als Einsätze in Percellanröbren bedient. An den Henkel des Porcellannschaus wurde
ein binreichend langer Platindraht befestigt, um glist zu vurbrennende Substanz beliebig weit in die Verbrennungsröhre anzuschieben und nach beendigter Verbrennung wieder herausssiehen, ohne dass der Rückstand durch Kupferexyd verganinigt werden konnte.

Der Nachen wurde södann bis nahe in die Mitte einer Petcellanröhre eingeschöben, deren vordere Häffte mit Kupferexyi
und geglühten Kupferdrehspänen angefüllt war, welche ietztere als ein lockerer Schwamm den vordersten Theil der
Röhre ausfüllten. Die Anwendung einer zweiten mit Kupferöxyd gefüllten Röhre, welche die Herren Dünnes und Stass
anbrachten, um jede Spur von Kohlenozyigas in verbrenze,
was sich etwa hätte erzeugen können, fanden wir übersteng.

da wir the vollständig überzeugt hatten, dass weder Diamant "noch Graphit bei der Verbrehnung in Sauerstöligas Köhlenoxyll-'gas' bilden. Das hintere Ende det Vefbrennungsröhre, die In "cifich Liebig'schen Verbrennungsofen gelegt wurde, stand mit dendem durch Kälkmilch gesperrten Gasometer voll Sauerstoffgås 'h''Vefbindting, das aus chlorsaurem Kali eitwickeit worden War und vor seinem Eintreten in die Röhre, welches aureh Einen Hahn mit langem Hebel genau legulirt werden konnte, Lucist durch einen mit concentrirter Schwefelskure gefühlten Liebig'schen Absorptionsapparat und dann durch ein ? Puss Thinges, weites und mit Stücken von trocknem Kalibydrat angestill-Hes Gläsrohr geleitet wurde. Aus der Verbrennungsröhre trat das Che zunächst in ein mit Chiorcalcium gefülltes Rohr, um jede zufäl-By Spur von Feuchtigkeit zurückzuhalten. Zur Aufnahme der Bebildeten Köhlensäure dienten zwei hinter einander angebrachte, "thit gesättigter Kahlauge angefüllte Liebig'sche Apparate, auf welche noch 4 mit Kahbydratstücken angefühlte Uförmige Böhren folgten, von denen jedoch die letzte nur zur Abhaltung von Feuchtigkeit und Kohlensäure aus der Atmosphäre diente und "deshulb nicht gewogen war." Die Kalisticken in den der Ver-"Wehrungsröhre zugekehrten Schehkeln"der beiden ersten Roh-Teh waren mit concentrirter Kalilauge befeuchtet.

- "Es schien uns nothwendig; bei Gelegenheit dieser Versuche noch 'Einmal genau zu untersuchen, ob nicht die Anwendung des gastirinigen Sauerstoffes bei der Verbrennung kohlenstoffhaltiger Körper, Vermöge einer besondern Absorptionsfähigkeit der Kalilauge für 'den Sauerstoff, einen Gewichtsüberschuss in der Bestimmung des Kohlenstoffes herbeiführen konne. Zugleich mussten diese Verdiche den Beweis geben, dass das durch die Schwefelsaure und "Kalirohr geleitete Sauerstoffgas wirklich vollkommen rein und frei von Kohlensäure und Wasser in die Verbrennungs-Fohre eintrat. Wir stellten zu diesem Zwecke den Apparat, nachdem die Condensatoren gewogen worden waren, so auf, als ch wir eine Verbrennung ausführen wollten, und leiteten darauf "The Viertelstunde lang einen langsamen Strom von Feinem trocknem Sauerstoffgase bindurch. Die zur Aufnahme der Kohlensäure bestimmten Apparate ...wurden "sodann gewogen. "Der -egste: Kaliapparut : batte um:0,009, : der izweite um:0,019,..das erste Kalirohr um 0,003, das zweite um 0,004 Gr. zugenem -

men. (¡Die Gewichtszunahme des ganzen Apparates, dessen Gesammtgewicht vor dem Versuche zu 143,2025 Gr. gefpele worden war, hetrug also 0,028, Gq. wighthe coffenhar, dalar gührten, dass die in den Apparaten epthaltene atmosphärische Luft durch Sauerstoffgas verdrängt worden war. Wir leitete nun einen verstärkten Strom von Sauerstoffgas noch währen einer halben Stunde durch den Apparat Hierbei nahm, der ente Kaliapparat wieder um 0,002, der zweite um 0,001,Gr., ab, 4gegen vermehrte sich das Gewicht des ersten Kalinohres m 0,002 Gr.; das des zweiten blieb unverändert. Zuletzt wurde ein rascher Strom von getrockneter und kohlensäurefreier atmosphärischer Luft, deren Volumen mindestens das Vierzigfich vom Rauminhalte des Apparates betrug, durch den Apparat getrieben. Bei der darauf erfolgenden Wägung ergab sich, der der erste Kaliapparat jetzt wieder gegen sein ursprüngliche Gewicht 7 Milligr., der zweite aber 5 Milligr. verloren, degegen das erste Kalirohr um 10 Milligr., das zweite um 1% Milligr. zugenommen hatte *). Das Gesammtgewicht der Apparate nach Beendigung des Versuches betrug 143,2020 Gr., also 0,0005 Gr. weniger als vor demselben, oder vielmehr, & diese Differenz, die sich auf 8 Wägungen vertheilt, nur ab Wägungsfehler betrachtet werden kann, es war das Gewicht unverändert geblieben und die Kalilauge hatte also keinen Squastoff absorbirt. Wir fügen diesem Versuche die Resultate von noch drei anderen hinzu, bei welchen der Apparat so vorgerichtet war wie zu einer organischen Analyse. Die Condenstoren bestanden aus einem Liebig'schen Apparate und chem Uförmigen, mit Stücken von Kalihydrat gefüllten Rohre, ver welches noch ein ungewogenes Kalirohr gelegt wurde. Im Gewicht des Kaliapparates und des ersten Rohres betrug 97,2315 Nachdem 1/2 Stunde lang Sauerstoffgas hindurchgeleitst worden war, betrug das Gewicht 97,241 Gr. Der Sauerstof

and the court of the state of the court of the contract of the

^{*)} Liebig hat zwar angegeben, dass aus der Kalilauge duck 800 C. C. trockne Luft 13—17 Milligr. Wasser fortgeführt werden; wir dürfen aber dabei nicht vergessen, dass er Lauge von 1,25 spet Gewicht tarirte, wir aber fast gesättigte vom spec. Gew. 1,6 m wandten, deren Tension bei gewöhnlicher Temperatur, par sehr gering sein kann.

wurde darauf durch einen 1/2 Stunde anhaltenden Strom trockner almosphärischer Luft verdrängt, worauf sich das Gewicht 27,2312; also unverändert, wie vor dem Versuche, fand! Mit diesem Versuche stimmte ein anderer, wobei ein ziemlich grosser Kaliapparat angewandt wurde, vollkommen überein. Das Gewicht des Kaliapparates und des Rohres betrug zusammen #15,60% Gr. Es wurden dieselben an eine mit Kupferoxyd gefüllte Röhre, vor welcher ein Chlorcalciumrohr angebrächt war, gebunden", "das Kupferoxyd glübend gemacht" und 1/4 Stunde lang reines Sauerstoffgas hindurchgeleitet, darauf das Kupferoxyd erkalten gelassen und, ohne den Apparat aus einander zu nehmen, 1/4 Stunde lang trockne almosphärische Luft hindurchgetrieben. Nach Beendigung des Versuches fand sich das Gewicht der Kallapparate wieder = 115,002 Gr. Bei einem dritten Verstuche fand sich mach Beendigung des Versuches eine Cowidits with of Gerl Apparate unit, 0,0005 Gel A Diese Wer sticke beweisch une zugleich; tiss der in ten Apparace entr haltene Sauerstoff durch einen Strom von atmosphärischer Luft im: Verlaufe von 1/4 Stande vollständig ausgetrieben werden kann; die Gase mengen sich in den Röhren nur wenig, und man erkennt durch ein vor den Ausgang der ganzen Leitung gehaltenes glimmendes Hölzchen ziemlich bestimmt den Punct, bei weiehem das Sauerstoffgas durch die nachdrängende Luft saute 'ausgetrieben worden ist. Wir haben indessen die Wagungen finner erst lange nach diesem Zeitpuncte angestellt. Wenn nun eine Absorption von Sauerstoff durch die Kalllauge nicht zu fürchten war, so konnte, zufolge einiger Er? - Altrungen y ein Fehler im entgegengesetzten Sinne entstehen; wenn das geschmolzene Chlorcalcium, durch welches die Kohi ichsädre vor dem Eintreten in die Kaliapparate streichen musste, die Bigenschaft besässe, Kohlensaure zu abschlien. "In der That scheinen die Herren Dumas und Stass die Anwendung von Chlorcalcium bei ihren Versuchen aus diesem Grunde möglichst vermieden zu haben. Wir wollten dagegen die Anwendung des mil Schwefelsaure befeuchteten Asbests vermeiden, um dem Einwande zu begegnen, als könne die durchstrell chenda Kehlensäure Schwefelsäure mechanisch mit fortreissch wait in den Kallapparat überführen. Andererseits war noch zw versuchen, ob die gewöhnliche Länge der Chlorcalciumroh-

14

ren binreichend sei, um alles mit der Kohlensäure aus dem Verbrennungsrohre tretende Wasser vollständig zu verdichten. Zs diesem Behufe stellten wir noch folgende, Verauche an deres Resultate ganz mit denen übersinstimmen, welche der eine ver uns schon bei einer frühern Gelegenheit veröffentlicht hat. Die Verbrennungsröhre wurde mit glühendem Kupferexyd: bis 34, 34 ibrer Weite wie gewöhnlich angefüllt, nach dem Erkalten; die mit 0,2655 Gr. Wasser gefüllte Glaskugel eingeschohen; ein gewogenes Chlorcalciumrohr vorgelegt, das vor dem mit Chlercalcium angefüllten Theile mit einer ziemlich grossen leere Kugel zur Aufnahme des tropfbar flüssigen Wassers versehm war, sodann ein Sauerstoffstrom hindurchgeleitet und die Röhm zum Glüben gebracht. Nachdem das Wasser überdestillirt und ein trockeer Luftstrom durch den Apparat geleitet werden wat fand sich das Gewicht der Chlorogicismröhre um 0,26525 Ga vermehrt. Als sie darauf wieder ap den Apparat, gehracht und auf's Noue mit Sauersteff gefühlt worden war, erhähte zich ik Gewicht auf 0,26925; das Gewicht des in den leeren Raumen des Rohres enthaltenen Sauerstoffgases betrug, also 4 Milligt. mehr als das eines gleichen Volumens atmosphägischer Infl. Das zu diesen Versuchen dienende Chlorcalcium, war mit fielmiak geschmolzen, zerkleinert und dann in einer Röhre mehrere Stunden lang einem Strome von Kohlepsäuzegas ausgestst worden. Um uns zu überzeugen, dans diese, Vorbereitungen hinreichend gewesen, um dem Chlorcalcium das Vermöges sy nehmen, Kohlensäure zu absorbiren, wurde durch ein 28,6282 Gr. wiegendes Chlorcalcium ohr zuerst 1/2 Stunde lang ein Stres trockner Kohlensäure geleitet, diese dann durch atmosphärische Luft verdrängt und der Apparat auf's Neue gewogen. Gew. fand sich jetzt == 28,6290; wir, sind; sehr geneigt, die Differenz einem Wägungsfehler oder einer Spur von Fenehtigkeit in dem hindurchgeleiteten Gasvelumen zuzuschreiben.

Zu upseren Wägungen bedienten wir ung einen von Ansteiner C. Hoffmann in Leipzig gefertigten Wage von anerkannter Vortrefflichkeit, welche dieser ausgezeichnete Machanikes die Güte hatte, zu unserer Verfügung zu stellen. Win waren der durch in den Stand gesetzt, unsere Gewichtsbestimmungen bis auf 1/10 Milligr. genau auszuführen. Die kleinen Gewichtsbestimmungen bis ferenzen, welche sich in der Regel bei, wiederholten Wägen-

gen grösserer Belastungen, selbst auf guten Wagen, ergeben, betragen auf dieser Wage bei einfacher Wägung von 80-100 Grm., in sofern Temperaturverschiedenheiten, Verdunstung u. s. w. gehörig vermieden werden, nie 1 Milligr. Bei doppelter Wägung

bleiben die Differenzen unter ½0 Milligr.

Ueber das Verfahren bei den Verbrennungen selbst bedarf
en pur weniger Worte, Nachdem der Apparat zusammengestellt und auf vollkommenen Schluss aller Theile durch Aussiehen eines Theils der darin enthaltenen Luft geprüft worden war, begannen wir zunächst, den Sauerstoff langsam durchströ-men zu lassen, sodann wurde die Porcellanröhre durch Umge-bung mit glühenden Kohlen erhitzt und die Verbrennung sodann durch entsprechende Zuleitung von Sauerstoff so geregelt, dass während der ganzen Verbrennung, die gewöhnlich nicht über 3 Stunden dauerte, möglichst wenig freies Sauerstoffgas entweichen konnte. Nach Beendigung der Verbrennung
wurde der Sauerstoffstrom noch längere Zeit durch den Apparat geleitet, darauf wurden die Kohlen entfernt, der Hahn des Gasometers geschlossen, die Verbindung zwischen dem Schweselsäureapparate und dem Gasometer gelöst, letzteres gegen ein mit atmösphärischer Luft gefühltes, mit Kalkmifch gesperrtes Gasometer vertauscht und etwa 1/2 Stunde l'lang reine atmosphärische Luft durch den Apparat geleitet, bis dieser völlig erkaltet war. Bei einigen Versuchen wurde die Luft mittelst eines Aspirators ausgewechselt; wir zogen es aber später vor, uns eines mit Luft gefüllten Gasometers zu bediehen, um dem Vorwurfe zu begegnen, dass die durchgesaugte kohlensaurehaltige Luft wahrend thres Burchganges durch die zur Reinigung derselben bestimmte Kaffröhre nicht völlig von Kohlensäure befreit worden sei und auf diese Weise zu einem Fehler Veranlassung gegeben habe.

Dass der Sauerstoff völlig durch die atmosphärische Luft aus dem Apparate verdrängt worden sei, erkennt man feicht daraus, dass die letzte gewogene Kaliröhre, in welcher weder Kohlensäure noch Wasser condensirt werden, nach Beendigung des Versuches wieder ihr ursprüngliches Gewicht zeigt. Dieses Mittel ist um so sicherer, als gerade aus den letzten Röhren der Sauerstoff am spätesten verdrängt werden muss. Wir gehan jetzt zu den einzelnen Versuchen über

reinsten, aus breiten Blüttere bestehenden Massen wurden, sich möglichst feinem Zerreiben, der von den Hétren Dumas und Stass angewandten. Reinigung unterworfen, mit Kali-geschmolzen , ausgewaschen, mit Königswasser zusgekocht und saleist in einem Chloretroate der Weissglähhltze ausgesotzt. Das Kinigswasser färbte sich dabei kaum merklich und die abgegosene Flankgkuit gab, mit Ammoniak gesättigt, nur elden höcht unbedeutenden Niederschlag. Das Glüben im Chleratrome ergie sich für unsern Graphit als äberflässig, as 'bildetet sich kam Spur von Chibraisen; nachdem das Chier 2 Standen lang ast den glübenden Graphit eingewirkt hatte, wurde letzterer ut Wasser ans der Böbre gespült, um ihn von etwa ankängesden löslichen Substanzen und Chier-zu befreien, allein des Wasser gab weder mit Kallumeisencyanür noch mit Gallustinete elps, Basstion, da maigte nur einen unbudeutendem Chinggalat. Beim Verbrennen hinterliess der gereinigte Graphit nichts sie Kieselerde in schnesweisses welliges Flackes, welche hei neireren Verguchen einzelne: Graphithiättohen seingemongt segbiet, die durch den Kleinlardeüberzug gegen die Verbrennung geschätzt worden waren. Die grosse Reinheit des von sits nangewanden Graphits, vermögenderen die Blättchen von den Resegentien nicht corrodirt worden waren, ist wahrscheinlich die Ursache daves, dass wie beim Abwagen des zur Verbrennung hestimmten, Emphits durchaus keinen Schwierigkeites begegnetenz indem wir ungerw / Graphik might merklich / hygnetikapieck i fingden, . Wir drückten den Graphit in etwas feuchtem Zust**eute in de**n Phtinnachen möglichst fest ein nad arhitzten ihn dann vorsichüg über der Lampe bis zum stärksten Glüben. Nach dem Erkalten unter einer Glocke über Schwefelssure wurde er im Schifchen gewogen. Das Gewicht fand sich hei zwei Versuches unverändert wieder, ale die Wägung nach Verlauf einer Vierteletunde wiederholt wurde, während welcher der Graphit in unbedeckten Schiffchen auf der Wage gelegen hatte. Den se nneren Versuchen angewandten künstlichen Graphit, verdacke wir der Güts, des. Hen. Oberbergrath: Keingast en war in greson Bifttern krystalijeirt und wurde derbelbin Beinigung wie de ं केंग्रिक्ट व स्थान भागां करण है है है maturitche unterworten. ar, digered Versuch an ververious Some Controlled and State Controlled to Controlled Controlled to Controlled Controlled to Controlled Control

a) Naturlicher Graphit. 1) 1,5746 Gr. Graphit hinterliessen 0,0370 Kieselerde mit igen eingemengten Graphitschuppen. r'erste Kallapparat hatte zugenommen um 5,6095 Gr. ஆழியுமு வடம்பி மடி மார் மார் மார் மு. மு. மு. முர் ஆகிய மி அம s crate Rohr and Indicate of the control of the con 1,5376. Gr. Kohlenstoff = 5,6367 Gr. Kohls.

Atomgewicht = 75,02. 10 2) 1,6578: Gr. binterlicenen 0,0084: Kienelerde, werrin nech wilerster Kalispparatihatie ungenammen, um. 4,0485.Gr. 197 112 t similtenie - - in emiliar in film in in in the O,9488dim-eninglish s zweite — - 0,0001 - : notice 1,6494 Gr. Kohlenstoff G. & G. Kohlens. the residents and some wight, and 17518 3) 1,4580 Gr. Materlieusen 0,0075 Kicsvierde. er erste Kallapparati hatté wegénemmen valm ville, 20325 Gr. 1.4506 Gr. Kohldastoff 44 5,81575 Gr. Atomgowitht wit (75,05. b) Künstlicher Graphit. 4) 1,9040 Gr. gaben 0,0105 weverbiesölichen Rückstand. er erste Kalispparat hatte zalgenommen um 6,9285 Gr. r zweite is erste Boliv in A Collins in him and The College -- 0,0010 سال ۱۳۰۶ المنظمة الأن المنظمة المنظم . Sentros o . . . 1;8985 Gr. Kohlenstoff . . . G;9855 G. Mohlens. -Alongewicht im 75,10. Das Mittel der 4 Graphitverbrennungen gieht das Atempefolit des Mohlenstoffes - 1986/087; established a manual constants of

Dur Mittel aus uiten 9 Vertrennungen aber giebt dus Atomi-

gewicht = 75,054 oder fast genau 75,0, and wir stehen nicht an, letztere Zahl für die richtige zu halten.

Es könnte ein Einwurf gegen die Zuverlässigkeit diese Zahl vielleicht, von dem Aschengehalte der Diamanten so des Graphits hergenommen werden. Man könnte dass die erhaltene Kieselerde vielleicht erst aus Silicium, wahrscheinliche Kisenoxydgehalt der Diamantasche aber aus Kise entstanden seien. Dieser Kinwand würde zu Gunsten der alter Indessen ist leicht zu übersehen, dass die Berücksichtigung der Aschengehalte in dieser Beziehung nur eine höchst unbedeutende Aenderung des Besultates herbeiführen könnte. Wir wollen beispielewieles anhehmen, die Hälfte des LAsschenrückstandes bestände aus aufgenommenem Bappratoff; no das wir von iden velkenmen Substanzen nus die Militet edbes Aschen gehaltes ablifelien dürften. -Wir würden in dieseme Balle to den drei ersich Damantverbrennungen folgende Zählen erhalte 重じししむ haben: onis // i

O,806 Diamair; Stories 13 1010,1 O,806 Diamair; Stories 12 1010,1 O,0010 gewögeher Aecherückstand,

4. 1580 Galangendon Anchengendus 0831.1

adeA olay a

3010 0,0009 gewogener Aschenrückstand, -- 1111773 FE

33 777 0,00045 wirklicher Aschengehalt,

. 1,08625 Kohlenstoff == 3,9875 Kohlensäure.

At. 74,88, während wir fanden 74,84.

4) 1,8675 Diament, 2010, oday .18 0108, 1 (4 color oday) 0,0018 gewogener Aschantickstand, all oday oday

. 0,0009 wirklicher Aschenrückstand,

1,8566 Kohlenstoff = 4,9659 Kohlenstyre

2000 At. 75,17, während wir fanden 75,10 en

welcher wir uns hinsichtlich des Zustandes, in welchem die Bestandtheile : der Asche im Diamant enthalten; sindy hefindes, durchaus keinen merklichen Einfluss auf des Repultet habes kann, denn jedenfalls musste derselbe noch weit geringer seis,

ale wir beispielsweise angenommen, haben. Was naber den Graphit anbetrifit, so wird die gewiss höchst wahrscheinliche Appahme , dags die Kieselerde schon als solche und keinerwegs als Silicium darin enthalten sei durch die Uebereinstimmung seinen Verbrennungsproducte mit denen des Diamants, ungeschiet des beträchtlichen Aschenrückstandes, vollkommen bestätigt.... Ohwohl durch siltere und neuere Versuche, inspesondere Aureh die der Herren Dumas und Stass, hinlänglich festgestellt jet, dass heisder. Verbrenning des Diamants so, wie hei der des Graphita kein Wasser, gehildet wird :: so wollten wir doch die Gelegenheit, uns durch eigene Versuche von dieser Thatsache zu überzeugen, nicht vergäumen. Wir haben demhalb sowohl hei einer Graphitverhrennung als hei einer Diamantverbrennung; hei welchen auf das Sorgfältigste der Zutritt gen fenchter Luft zum "geglühten, Kupferoxyd abgehalten "worden , pran, die Chlorcalciumschre gewogen, Bei der Graphitverbranpung mogidas, Chlorcalciumrobe: " , essie hun essur a olono net haten, very 12 or dem Versuche 31,5725, Gryer netal ben _______nach dem Versuche 31,5730, -- _____Bei der Diamantverbrennung:,, a og till get in till till and der yezh de vor dem Versuche 31,57375 Gr. nach dem Versuche 31,57400 ----And it winds about the commence of the first of the commence of the comment Jestich Constitution of the Constitution of th

hingewiesen, dassidas alta Atomgewieht in den zahlreichen Analysen, welche nach demselben berechnet sind, eine feste Stütze zuchaben scheine. Betrachtet man indessen den Kinfluss, welchen die Herabsetzung der Zahl suff die Berechnung der Formele ausüben kann, etwas näher, so überzeugt man sich leicht, dass die Aenderung für die grosse Mehrzahl der organischen Kerbindungen ohne merklichen Kinfluss ist, dem bei Verbindungen; deren (Kahlenstoffgehalte unter 40 p.C. liegen, fallen die entstehenden Differenzen innerhalb der Grenzen der Nochsuchschler. Nun: sind aber grade dieses weniger kohlenstoffereichen. Substanzen i higher am sorgfähigsten studirt; und ihre Formeln: durch Bestimmungen der Sättigungscapacität; festge-stelltwerden. Beit den kohlenstoffeisheren Säuren, Benzoesaure,

Edministure v. s. W., zeigt zwar die Berechnung nach den neuen Attimgewichte Verluste an, welche man bei dem blibeHigen Verlahren erlitten hat, es haben aber die Herren Dumis
und Stars an mehreren Beispielen gezoigt, das wir wersen is
bestätigen, dass diese Verluste keineswegs von solcher Bederung sind, um eine Aenderung der für diese Kürper angenommenen Pormein nöting zu machen. Im Gegentheil bifingt da
inene Atungewicht, während es einen Verlust im gefundenen
Kohlenstosse nachweist, die gefundenen Wasserstossehalte in
den berechneten gewöhnlich in vollkommenere Uebereinstimmung.
Bel einer Anzahl sehr kohlenstossreicher Körper aber, dere
Formein eine Aenderung werden erleiden mülisch, bietet de
Antilyse hinreichende Schwierigkeiten dar, um die dabel statgehabten Verluste an Kohlenstoss genügend zu erklären.

Das alte Atomgewicht hat die bei dem bisherigen Verhiten der Atomgewicht höglichen Kohlenstoffverluste, dem Quelle Dumas und Stass, wie es scheint, sehr richtig bezeichnet haben, verdeckt. Das neue Atomgewicht zeigt die Nothwendigkeit, die Verbrennungen stets im Sauerstoffstrome vorzunehmen. Bei dieser Methode werden, in sofern nur die zu verbrennenden Substanzen wirklich rein sind und die gehörige Sorgfalt auf die Verdichtung der Kohlensäure verwandt wird, Resultate anhalten, deren Tebereinstimmung mit der Berechnung nach des neuen Atomgewichte in der That nichts zu wünschen übrig läst.

Wir wollen zunächst einige Beispiele von der Geringfügigkeit den Hinflusses geben, welchen die Veränderung des Atomgewichts auf Körper mit nicht sehr hohem Kohlensjoffgehalte äussert.

Beider Analyse erhielten wir von 0,415 Gr. Zucker 0,645 Koblenskure, 0,242 Wasser; diese beträgt

nach dem aken Atg. nach dem neuen Atg. 15 p. G. Kehlensteff.

42,15 p. G. Kehlensteff.

6,47 - Wassersteff.

Own distance. Ber sine von une hat vor Kursom sine Arbeit

riber die Zusammensetzung der Citronensäure 3. bekannt gemacht und sich bei seinen Berechnungen des alten Atomgewichtes besient. Wir wollen zeigen, dass die wach dem neuen Atomgewichte berechneten Formeln when so gut mit den dort entwickelten Amsichten übereinstimmen.

Alt. Atg. in 100 Th. Neues Atg. ... in 100 Th. area

Bei der Analyse gaben 0,4905 Substanz 0,612 Kohlensäure und 0,2065 Wasser; diess ist

0,2065 Wasser; diess ist
nach dem alten Atg.
nach dem neuen Atg. 34,09 34,55 C.

- and Dis Bifferenz zwischen den gefundenen und den berechne ten Kohlenstoffgehalten ist alse in beiden Kallen fast genau dieselbe.

Anders verhält es stett killerdingsubei sehr kohlenstväreichen Sebilanzen und diese können, in solern ihre Atomgewichte aus anderen theoretischen Gsünden-feststehen, als Mittel zur Eptschridung der Frage über das wahre Atomgewicht des Kohlenstoffes dienen. Wir baben einige Körper dieser Art; namentlich die Benzoësäure, deren Formel wohl zu den sichersten gehort, in dieser Beziehung analysirt. Wir bedienten uns dabei, wie bei den so eben angeführten Analysen, des Hess'schen Apparates und wandten, um durch Verbrennung grösserer dem Resultate mehr Sicherheit geben zu können, gegen 4 Fuss lange Verbrennungsröhren an. Die Verbrennung wurde so geleitet, dass während derselben kein Sauerstoff durch den Apparat entweichen konnte und Alles sich in den ersten Kugeln des mit sehr concentrirter Kalilauge gefüllten Kaliapparates verdichtete. Hinter den Kaliapparat war zuerst eine Uformige, mit Kalihydrat angefüllte und gewogene Röhre gelegt, hinter diese eine zweite, nicht gewogene, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Kohlensaufe in den Apparat zu verhindern. Diess ist die Einrichtung des Apparates, welche wir von nun an stets anzuwenden gedenken. Wir bemerken dabei, dass das erste Kallrohr in keinem Falle über 4—5 Milligr.

is a 1989) These Fourist Examination of the contract of the co

an Gewicht! zunahm, da die gesättigte Kalilauge nur schrwenig Watzer an das durchströmende Gas abgeben kann. Wir liegen auf die Concentration der Kalilauge ein besonderes Gewicht, da wir Ursache haben zu fürchten, dass die gewöhnlich benutzte Lauge von 1,28—1,30 ihrem Zwecke, nicht so velkommen entspricht.

Benzeëzäure, aus Pserdeharn dargestellt, von ausgezeichneter Reinheit. Sie wurde bei 100° im luftleeren Raume getrecket.

0,924 Gr. gaben 0,414 Wasser, 2,332 Kohlensaure.

Nach dem alten Atg.Nach dem neuen Atg.ber.gef.ber.gef.C = 69,2669,78C = 68,8668,83H = 4,864,97H = 4,914,97

Die Analyse wurde, ohne Berücksichtigung des Wasserstoffes, mit fast absolut gleichem Resultate hinsichtlicht des Kellenstoffes: wiederholt. Es gaben nämlich 0,679 Gr. 1,710 Kahless. 29:79-p. C. nach dem alten Atomgewichte.

Dieselbe Saure hat der eine von uns früher blos mit Kupferoxyd ohne Anwendung von Sauerstoff analysirt. (D. Journ XIII. 423.) Es wurden dabei 69,42 p.C. Kohlenstoff gefunden, als jedeufalls schon mehr, als die Berechnung voraussetzt.

Zimmtsäure, aus Storax bereitet, durch Destillation, Auspressen zwischen mit Alkohol befeuchtetem Papier und wiederboltes Umkrystallisiren gereinigt, von vorzüglicher Schönheit. Bei 100° im luftleeren Raume getrocknet.

0,832 Gr. gaben 0,406 Wasser und 2,225 Kohlensäure.

 Nach dem alt. Atg.
 Nach dem neuen Atg.

 ber.
 gef.

 C=73,38
 73,94

 H= 5,33
 5,43

 Nach dem neuen Atg.

 ber.
 gef.

 72,96
 72,93

 5,40
 5,43.

Indifferentes Nelkenöl. 1,5775 Gr. (deren Verbrennung 5 Stunden dauerte) gaben 5,100 Kohlensäure und 1,680 Wasser. Nach dem alt. Atg. Nach dem neuen Atg.

ber. gef. ber. gef. C₅= 88,46 89,37 88,25 88,24 $H_8 = 11,54$ 11,82 11,75 11,82 100,00 101,19 100,00 100,06.

Um zu sehen, ob sich gleiche Resultate auch bei geringeren

Mengen würden erhalten lassen, wurden noch zwei Verbrennungen desselben Oele gemacht.

0,2605 Gr. gaben 0,842 C und 0,276 H=88,15 C, 11,77 H. 0,25575 Gr. gaben 0,826 C und 0,270 H=88,09 C, 11,72 H.

Naphtalin.

0,654 Gr. aus Steinkohlentheer bereitetes, durch sehr oft wiederholtes Umkrystallisiren und Sublimation gereinigtes Naphalin gaben 0,369 Gr. Wasser und 2,244 Gr. Kohlensäure. Das für sich aufgefangene Wasser besass deutlich Naphtalingeruch, es musste also jedenfalls eine Spur von Naphtalin der Verbrenaung entgangen sein, und es war ein zu niedriger Kohlenstoffgehalt und zu hoher Wasserstoffgehalt zu erwarten. Dennoch gab die Berechnung nach dem alten Atomgewicht, wie folgende Vergleichung zeigt, einen viel zu hohen Kohlenstoffgehalt.

Altes Atomgewicht.		Neues Atomgewicht.		
ber.	gef.	- ber.	gef.	
C = 93,87	94,87	93,76	93,58	
H = 6,13	6,27	6,24	6,27	
100,00	101,14	100,00	99,85.	

Man sieht, dass die in allen diesen Versuchen erhaltenen Differenzen zwischen den berechneten und den gefundenen Zahlen entschieden zu Gunsten des neuen Atomgewichtes sind.

Wir haben ferner noch zwei Verbrennungen von Naphtalin ohne Anwendung von Sauerstoff ausgeführt und wollen die Resultate derselben, die in mehrfacher Beziehung entscheidend sind, hier angeben. Der Wasserstoffgehalt des Naphtalins von 6,25 p. C. steht nach vielen Analysen, worunter wir nur die von Mitscherlich nennen wollen, fest. Wir durften also im Naphtalin 93,75 p.C. Kohlenstoff annehmen, und das Resultat der Verbrennung musste ein fast eben so sicheres Mittel zur Bestimmung des Atomgewichtes des Kohlenstoffes abgeben als die Verbrennung von reinem Kohlenstoff. Nur durch den Umstand musste die Genauigkeit der Bestimmung beeinträchtigt werden, nicht so grosse Menge von Substanz verbrannt werden konnte als von Diamant oder Graphit. Die Anwendung von Sauerstoff wurde bei diesen Analysen vermieden, weil es unsere Absicht war, durch dieselben entweder darzuthun, dass man mit blossem Kupferoxyd gleiche Resultate wie bei Anwen-

dung von gasförmigem Sauerstoff erhalten könne, oder, wen diess nicht der Fall wäre, die Ursache der Differenz zwischen den Ergebnissen beider Methoden nachzuweisen.

0,702 Gr. Naphtalin gaben 2,406 Kohlensäure und 0,397 Wasser. Hiernach enthielte das Naphtalin:

Wasserstoff 6,28
Kohlenstoff (n. A.) 93,47
99,75.

Die angewandte Menge Naphtalin enthält wirklich, nach Abzug des Wasserstoffes, 0,658 Kohlenstoff. Hieraus ergäbe sich für den Kohlenstoff das Atomgewicht = 75,28.

0,750 Gr. Naphtalin gaben ferner 2,570 Kohlensäure und 0,423 Wasser. Hieraus ergiebt sich:

Wasserstoff 6,26
Kohlenstoff (n. A.) 93,45
99,71.

Die Menge des verbrannten Kohlenstoffes betrug 0,703 Gr. Hieraus würde sich das Atom des Kohlenstoffes = 75,30 ergeben.

Es war leicht, den Grund auszusinden, weshalb diese Versuche einen etwas niedrigeren Kohlenstoffgehalt gegeben hallen als die Rechnung voraussetzt. Nach Beendigung des letzten Versuches stellten wir den Apparat nochmals zusammen, verbanden das hintere Ende der Verbrennungsröhre mit dem Gasometer, umgaben das Rohr von Neuem mit glühenden Kohlen und leitefen so lange Sauerstoffgas durch den Apparat, bis alles reducirte Kupfer verbrannt war, worauf das Sauerstof durch einen Strom trockner Luft ausgetrieben wurde. erhielten jetzt noch 0,007 Gr. Kohlensäure. Es war also asfangs Kohlenstoff unverbrannt zurückgeblieben. Rechnen wir diese 7 Milligr. zu der zuerst erhaltenen Menge von Kohlensäure, so erhalten wir 2,577 Kohlensäure = 93,71 p. C. Kohlenstoff, und das Atomgewicht des letztern wird = 75,08,

Wir wollen bei dieser Gelegenheit noch einen Versuch anführen, den wir in der Hoffnung angestellt hatten, durch eine leichte Operation reine Kohle darzustellen, und der darn bestand, dass reine Zuckerkohle der heftigsten Glühhitze ausgesetzt wurde. Der Erfolg zeigte, dass es auf keine Weise möglich sei, den Wasserstoff und Sauerstoff völlig daraus z

entfernen. Die Resultate der Untersuchung der geglühten Kohle enthalten indessen ebenfalls eine Bestätigung des neuen Atomgewichtes.

0,642 Gr. stark geglhüte Zuckerkohle, im luftleeren Raume erkaltet und mit jeder Vorsichtsmaassregel gewogen, so dass kaum eine Anziehung von Wasser denkbar war, gaben bei der Verbrennung 2,2905 Gr. Kohlensäure und 0,037 Gr. Wasser. Der Apparat war auf das sorgfältigste durch Auspumpen bei Glühbitze ausgetrocknet, so dass wir diesen und die folgenden Versuche in Bezug auf die Wasserbestimmung als sehr genau betrachten können. Es geben die erhaltenen Verbrennungsproducte

 nach dem alten Atg.
 nach dem neuen Atg.

 $98,6\frac{0}{0}$ C.
 $97,3\frac{0}{0}$ C.

 $0,6\frac{0}{0}$ H.
 $0,6\frac{0}{0}$ H.

 $0,8\frac{0}{0}$ O.
 $2,1\frac{0}{0}$ O.

Die Kohle wurde darauf nochmals drei Stunden lang im Sefström'schen Gebläseofen der heftigsten Glühhitze ausgesetzt, darauf sogleich in den luftleeren Raum über Schwefelsäure gebracht und die zur Analyse bestimmten Stücke in einer Glastöhre abgewogen.

0,895 Gr. dieser Kohle lieferten 3,261 Gr. Ĉ und 0,018 Wasser. Diess würde nach dem alten Atomgewichte schon mehr Kehlenstoff betragen, als Kohle angewandt worden ist, nämlich 100,7 p. C. C und 0,2% H. Da die Kohle aber doch höchst wahrscheinlich noch Sauerstoff enthielt, so liegt hierin ein neuer Beweis für die Richtigkeit des neuen Atomgewichtes. Die Zahl 75,0 giebt für die Zusammensetzung der zuletzt erwähnten Kohle, 99,3% C, 0,2% H, 0,5% O.

Nachschrift.

Das neue, von uns bestätigte Atomgewicht wird, wie es scheint, nicht sofort allgemein angenommen werden. Wir erfahren, dass sowohl Berzelius als Liebig auf verschiedenen Wegen, jedoch nicht durch Versuche über Verbrennung von Kohle, zu dem Resultate gekommen sind, dass dasselbe unrichtig sei und dass die wahre Zahl zwischen der alten und der neuen in der Mitte liege. Dagegen erhält das neue Atomgewicht eine Bestätigung durch die

Untersuchungen von Mitscherlich über die Zusammensezzung des Benzins und des Naphtalins, aus welchen sich ergeben hat, dass in der Kohlensäure nicht über 27,30 p.C. Kohlenstoff enthalten sind. (S. Mitscherlich's Lehrbuch d. Chemie, 4. Aufl. S. 138. Anmerk.) Aus dieser Zahl würde für
den Kohlenstoff das Atomgewicht 75,10 folgen, was mit unseren
Bestimmungen sehr nahe übereinkommt.

Wir sind nicht im Stande, in der von Dumas und Stass so wie von uns angewandten Methode einen Fehler zu sinden, und für uns muss daher die Zahl 75,0, so lange man uns nicht einen Principsehler nachzuweisen vermag, diejenige bleiben, deren wir uns künstig bei unseren Rechnungen bedienen werden. Die indirecten Methoden, deren die zuerst genannten ausgezeichneten Natursorscher sich bei ihren abweichenden Bestimmungen bedient haben, werden nach unsrer Ueberzeugung, auch bei der geschicktesten Anwendung, nie ein so sichres Resultat zu liesern im Stande sein, als die so einsache directe Verbindung des Kohlenstosses mit dem Sauerstosse.

Die in diesem Journ. Bd. XXII. S. 300 nach den Comptrend. gegebene Nachricht von den Versuchen der Herren Dumas und Stass enthielt nur die allgemeinen Resultate ihrer Versuche. Die Wichtigkeit des Gegenstandes macht es jedoch nöthig, unsere Leser auch, so weit es zur Beurtheilung der Resultate erforderlich ist, mit den Details der Arbeit der französischen Chemiker bekannt zu machen, welche wir dem seit der ersten Mittheilung uns zugekommenen Januarheste der Ann. d. chimauszugsweise entnehmen.

Graphit.

Der angewandte natürliche Graphit von Ceylon war durch Glühen mit Aetzkali, Auswaschen mit Wasser und Salzsäure, Sieden mit Königswasser und mindestens 18stündiges Glühen in einem Chlorstrome gereinigt. Es entwickelte sich dabei Chloreisen und Chlorsilicium während der ersten vier Stunden, während der letzten Zeit ging nur reines Chlor hindurch. Der zu verbrennende Graphit wurde in ein Platinschiffehen gebracht und dieses in eine Röhre eingesetzt, die bereits ein Gemenge von Kupferoxyd und 15 Gr. geschmolzenem chlorsauren Kali enthielt. Vor das Schiffehen wurde reines Kupferoxyd gebracht,

- e Röhre mit einem Kupferbleche umgeben und während der auer der Verbrennung, die sieben Stunden dauerte, rothlühend erhalten. Nach Beendigung des Versuches fand sich Schiffehen kein wägbarer Rückstand.
 - 1) 1,000 Graphit gaben

im 1. Liebig'schen Apparate 3,636 Gr.

im 2. - 0,018 -

im Kalirohre 0,017 -

3,671 Gr. Kohlensäure.

Angenommen, dass die Kohlensäure 27,67 Kohlenstoff entelte, so würde diese Menge 1015,76 Kohlenstoff darstellen, ährend wirklich nur 1000 angewandt worden sind.

Nimmt man dagegen an, dass die Kohlensäure nur 27,27. ohlenstoff enthält, so findet man für 3,671 Kohlensäure 1001 ohlenstoff, was bis auf ein Tausendtheil genau die angewandte lenge ist.

Das aus diesem Versuche abgeleitete Atomgewicht ist 74,88.

2) Bei einem zweiten Versuche wurde eine Röhre mit chwefelsäure vor die Kaliapparate gebracht, um die hygro-copische Wirkung des Chlorcalciums zu unterstützen.

0,998 Graphit gaben

im 1. Kaliapparate 3,639 Gr.

im 2. -0,008 -

im Kalirohre 0,013 -

3,660 Gr. Kohlensäure.

Atomgewicht = 74,98.

- 3) Bei einem dritten Versuche hinterliess der gereinigte aphit einige in der Masse desselben zerstreut gewesene indkörner.
- 1,000 Graphit von Ceylon hinterliessen 0,006 weisse Sandrner; die verbrannten 0,994 Kohlenstoff gaben

im 1. Kaliapparate 3,630 Gr.

im 2. — 0,005 –

im Kalirohr 0,010 -

3,645 Gr. Kohlensäure.

Atomgewicht = 74,996.

4) Bei diesem Versuche wurde sorgfältig gercinigter gasmiger Sauerstoff aus einem Gasometer durch die Verbrennungshre geleitet. Die Verbrennung geschah in einer Porcellan-

röhre. Zur Außammlung der Verbrennungsproducte dienten 1) eine mit Bimssteinstücken, die mit Schwefelsäure befeuchtet waren, angefüllte Röhre; 2) ein grosser Liebig'scher Apparat; 3) ein kleinerer Liebig'scher Apparat; 4) eine Röhre mit Bimssteinstücken, die mit Kali befeuchtet waren; 5) eine Röhre mit trocknem Kali; 6) eine Röhre mit Bimsstein, der mit Schwefelsäure befeuchtet war. Der Apparat endigte mit einer mit Kalistücken gefüllten Röhre zur Abhaltung der Feuchtigkeit und Kohlensäure aus der Atmosphäre. Nach Beendigung des Versuches wurde lange Zeit trockne und reine atmosphärische Luft durch den Apparat geleitet, um allen Sauerstoff zu verdrängen.

5) 1,472 Gr. Graphit hinterliessen 0,001 sandigen Rückstand; die verbrannten 1,471 Gr. Kohlenstoff lieserten

im 1. Kaliapparate 5,359 Gr.

im 2. — 0,016 -

in einer Röhre mit

trocknem u. flüs-

sigem Kali 0,020 - 5,395 Gr. Kohlensäure.

Atomgewicht = 74,97.

Künstlicher Graphit.

Dieser Graphit hatte sich in einem mit Holzkohlen betriebenen Hohofen gebildet und wurde aus einer Eisenmasse ausgeschieden, durch Kochen mit Salzsäure, welche das meiste Eisen auflöste. Der Rückstand wurde mit Königswasser und dann mit starker Kalilauge gekocht. Zuletzt wurde er in einem Chlorstrome geglüht, wobei sich Chloreisen und Chlorsilicium entwickelten. Er enthielt nach dieser Behandlung noch einige Spuren von eingemengtem Kieselsand. Der gereinigte Graphit erschien in schönen breiten Blättern, die aber hie und da angegriffen waren.

1) 0,993 Gr. hinterliessen 0,001 Kieselsand; die verbrannten 0,992 Kohle lieferten:

im 1. Kaliapparate 3,621 Gr.

im 2. — 0,008 -

im Kalirohre 0,013 -

3,642 Gr. Kohlensäure.

Atomgewicht = 74,87.

2) Ein zweiter Versuch gab das gleiche Resultat. 0,999 Gr. künstlicher Graphit hinterliessen 0,001 Sand. Die verbrannten 0,998 Kohle lieferten 3,662 Gr. Kohlensäure.

- Atomgewicht = 74,92.

3) 1,665 Gr. Graphit, in gasförmigem Sauerstoff verbrannt, gaben 0,005 Rückstand; die 1,660 reine Kohle lieferten 6,085 Gr. Kohlensäure.

Atomgewicht = 75,02.

4) 1,465 Gr. reiner Graphit gahen 5,369 Kohlensäure.

Atomgewicht = 75,05.

Dieser Versuch diente zugleich dazu, die Abwesenheit von Wasserstoff im Graphit darzuthun. Die gebildete Kohlensäure setzte in einer mit Bimssteinstücken, die mit Schweselsäure befeuchtet waren, angefüllten Röhre nur 0,002 Wasser ab, was unstreitig als unvermeidlicher Versuchssehler betrachtet werden kann.

Diamant.

Alle Diamantverbrennungen wurden in einer Porcellanröhre mittelst eines Sauerstoffstromes vorgenommen, der auf die schon früher angegebene Weise gereinigt worden war. Die gebildete Kohlensäure wurde aus der Verbrennungsröhre noch durch eine zweite, mit glühendem Kupferoxyd gefüllte Röhre geleitet. Bei dem ersten Versuche wurden zwei Kaliapparate angewandt, später nur einer, um die leeren Räume des Apparates möglichst zu vermeiden, die immer in sofern einige Unsicherheit herbeiführen, als man die Temperatur der darin enthaltenen Luft nicht genau kennt.

1) 0,717 Gr. Diamant in Bruchstücken,

0,009 - Rückstand im Schiffchen,

0,708 - verbrannter Diamant.

2,532 Gr. Kohlensäure im ersten Kaliapparate, 0,017 im zweiten im ersten Kalirohre, 0,042 -0,007 im zweiten

2,598 Gr. Kohlensäure.

A(g. = 74,91.

2) 0,865 Gr. rohe Diamanten, nach langem Sieden in Königswasser und gelinden Glühen gewogen,

0,001 - röthliche Asche,

0,864 - Kohle,

3,1675- Kohlensäure.

Atg. = 75,01.

3) 1,221 Gr. rohe Diamanten, nach langem Kochen mit Königswasser und gelinden Glühen gewogen,

0,002 - Asche,

1,219 - wirkl. Kohlenstoff,

4,465 - Kohlensäure.

Atg. = 75,10.

4) 1,233 Gr. mit Königswasser gekochte und geglühte Diamanten, zwei grosse robe und drei etwas gefärbte geschnitten Steine,

0,001 - röthliche Asche,

1,232 - wirklicher Kohlenstoff,

4,517 - Kohlensäure im Ganzen, durch doppelte Wägung auf der Fortin'schen Wage erhalten,

0,001 - Wasser, welches vom Wasserstoffe des Diamants herrühren könnte.

1,232 Gr. Kohle hätten nach Berzelius geben müssen: 4,454 Gr. Kohlensäure,

nach dem neuen Atg. 4,517

4,517

Wir haben erhalten: A(g. = 75,00.

> 5) 1,377 Gr. rohe Diamanten in kleinen Körnern, mit Königswasser gekocht u. geglühl,

0,002 Gr. Asche,

1,375 - wirklicher Kohlenstoff,

0,001 - Wasser,

5,042 - Kohlensäure, im Ganzen gewogen durch doppelte Wägung auf der Fortin'-schen Wage,

5,041 - auf dieselbe Weise wiederholte Wägung,

5,042 - bei Wägung der einzelnen Apparate.

Atg. = 74,99.

Das Mittel sämmtlicher Versuche der Herren Dumas und tass giebt das Atomgewicht des Kohlenstoffes = 74,97. Das littel aus dieser Zahl und der von uns erhaltenen giebt 75,02.

Organische Analyse.

Die Verf. haben eine Reihe von Verbrennungen sehr kohnstoffreicher Substanzen mit Hülfe von Sauerstoff angestellt. ie bedienten sich dabei eines Apparates, bei welchem im Rohre ilbst aus chlorsaurem Kali Sauerstoff entwickelt wurde und essen Beschreibung wir übergehen können, da er jedenfalls nvollkommener ist, als der bei uns hinreichend bekannte Hess'- he Apparat.

Wir lassen die erhaltenen Zahlen folgen, welche mit dem euen Atomgewichte und, soweit wir die Analysen wiederholt aben, auch mit unseren Resultaten in vollkommener Uebereinimmung stehen.

Naphtalin.

1) 8,500 Gr. Naphtalin aus Harz gaben 0,281 Wasser und ,724 Kohlensäure.

Altes	Atomgew.	Neues Atomgew.	
C 95,40		94,02	
н 6,24		6,24	
	101,64	100.26.	

2) 0,713 Gr. Naphtalin gaben 0,406 Wasser und 2,453 ohlensäure.

Altes	Atomgew.	Neucs Atomge	w.
C	95,2	93,8	
H	6,3	6,3	
	101,5	100,1.	•

3) 0,736 Gr. Naphtalin gaben 0,417 Wasser und 2,537 ohlensäure.

Altes Alongew.	Neues Atomgew.
C 9 5,3 8	93,86
н 6,29	6,29
101,67	100,15.

4) 0,700 Gr. Naphtalin gaben 0,398 Wasser u. 2,409 Kollensäure.

Altes Atomge	w. Neues Atomgew.
C 95,22	93,84
н 6,31	6,31
101,53	100,15.

Berechnet man die Zusammensetzung des Naphtalins mit dem neuen Atomgewichte nach der Formel C₂₀H₁₆, so findet mm:

	Ber.	Mittel der Analysen	
$\mathbf{C_{20}}$	1500	1501	
H ₁₆	100	100,6	
	1600	1601,6.	

Nach dem alten Atomgewichte würde die Berechnung geben:

Mittel der Analysen.

C₂₀ 1530 1553,4

H₁₆ 100 102,4

1630 1655,8.

Benzin.

1,171 Gr. Benzin, in einer verschlossenen Kugel abgewoge, so dass das Kupferoxyd stark erhitzt werden konnte, ehe der Dampf damit in Berührung kam, gaben 0,821 Wasser und 3,958 Kohlensäure.

Altes	Atomgew.	Neues Atomgew.	Ber.
\mathbf{C}	93,53	92,2	92,3
H	7,70	7,7	7,7
	101,23	99,9	100,0.

Campher.

Unter den Analysen des Camphers, welche der eine von uns veröffentlicht hat, besindet sich eine, welche 80 p.C. Koblenstoff gab, während die Formel nur 79,2 p.C. forderte. Man wird sich überzeugen, dass nur diese Analyse richtig war.

1) 1,011 Campher gaben 0,959 Wasser und 2,931 Kehlensäure.

	Altes Atomgew.		Neues Alongew	
	Gef.	Ber.	Gef.	Ber.
\mathbf{C}	80,21	79,27	79,05	78,95
H	10,52	10,36	i 0, 52	10,52
0	9,27	10,37	10,43	10,53
	100,00	100,00	100,00	100,00.

2) 1,007 Gr. Campher gaben 0,956 Wasser und 2,918 Kohpsäure.

	Altes A	tongew.	Neues Atomgew	
	Gef.	Ber.	Gef.	Ber.
C	80,17	79,27	79,02	78,95
H	10,57	10,36	10,57	10,52
0	9,26	10,37	10,41	10,53
	100,00	100,00	100,00	100,00.

Bei der dritten Analyse wurde zwischen die Chlorcalciumhre und den Kaiiapparat noch eine Röhre mit Schwefelsäuresianth gebracht.

3) 1,006 Gr. Campher gaben 0,964 Wasser, wovon 0,004 der Schwefelsäure und 2,911 Kohlensäure.

	Altes A	domgew.	Neues Atomgew	
	Gef.	Ber.	Gef.	Ber.
\mathbf{C}	80,06	79,27	78,91	78,95
H.	10,65	10,36	10,65	10,52
0	9,29	10,37	10,44	10,53
	100,00	100,00	100,00	100,00.

Benzoësäure.

Niemand wird daran denken, die Formel der Benzoësäure lern zu wollen, aber es ist dennoch möglich, dass die Menge Kohlenstoffes nicht ganz richtig bestimmt und das Atomwicht etwas zu hoch angenommen worden ist.

Diese Fehler sind leicht zu begreisen, denn wenn man bei er unvollständigen Verbrennung Kohlenstoff verliert und dafür n erhaltenen zufolge eines unrichtigen Atomgewichtes zu hoch rechnet, so können diese Fehler sich compensiren. Diess ist der That bei den sonst so glücklichen Analysen von Liegund Wöhler der Fall gewesen.

Was das Atomgewicht der Benzoësäure anbetrifft, so ist cht zu beweisen, dass das aus den Analysen der beiden

berühmten Chemiker hervorgehende besser mit dem neuen Atongewichte der Kohle als mit dem alten übereinstimmt, abgeseten von der wahren Grösse des Atomgewichtes der Körper, welche zur Bestimmung desselben gedient haben.

Liebig und Wöhler erhielten bei 3 Analysen der Bazoësäure 69,155, 68,970, 68,902 p.C. Kohlenstoff.

Wir bedienten uns einer aus Benzoë durch Sublimation gwonnenen Säure. Sie wurde, um von ihrer Reinheit überzent zu sein, in benzoësaures Kali verwandelt und lange gekock um jede Spur von Oel zu vertreiben. Die mittelst Salpetersim gefällte Säure wurde dann noch dreimal destillirt.

- 1) 1,100 Gr. Benzoësäure gaben 0,489 Wasser und 2,78 Kohlensäure.
- 2) 1,106 Gr. Benzoësäure gaben 0,496 Wasser und 2,797 Kohlensäure.

	Altes	Alongew.	•	Ne	ues Atom	gew.
	Ber. G		ef.	Ber.	Gef.	
		1)	2)		1)	2)
C	69,25	69,98	69,97	68,86	68,96	68,96
H	4,86	4,93	4,97	4,91	4,93	4,97
0	25 ,89	25 ,09	25,06	26,23	26,11	26,07.

Vergleichen wir jetzt die beiden Atomgewichte der Sint Die alte Zahl für den Kohlenstoff giebt 1433,78, die neue 1413,54, die Analyse des benzoësauren Silberoxyds von Wöhler mit Liebig giebt ein zwischen beide Zahlen fallendes Results, nämlich 1420. Wir werden später auf diesen Punct zurückkommen.

Zimmtsäure.

Hr. Cabours hat auf unsere Bitte einige Analysen we sehr reiner Zimmtsäure ausgeführt, welche ihm folgende Besultate gaben:

	Säure.	Wasser.	Koblensäure.
1)	0,900	0,444	2,402
2)	1,200	0,590	3,198.

Mit dem alten Atomgewichte geben diese Analysen:

	1).	2)	Ber.
Kohlenstoff	73,85	73,74	73,38
Wasser	5,47	5,45	5,33
Sauerstoff	20,68	20,81	21,29
	100,00	100,00	100,00.

Iit dem neuen dagegen geben sie:

	1)	2)	Ber.
Kohlenstoff	72,78	72,67	72,96
Wasserstoff	5,47	5,45	5,40
Sauerstoff	21,75	21,88	21,64
	100,00	100,00	100,00.

ieben, welcher dem von Mitscherlich angewandten ihnlich, aber weit weniger volkommen eingerichtet ist ei welchem der Sauerstoff aus einer an das hintere Ende erbrennungsröhre gebundenen Retorte entwickelt wird. Der parat hat statt der 3 mittleren Kugeln deren 5, wodurch bsorptionsfähigkeit vermehrt werden soll; hinter dieselben ch ein Uförmiges Kalirohr gelegt. (Ann. de chim. Jan.) Er hat mittelst dieses Apparates einige Analysen von 1, bei +137° schmelzendem Cholesterin ausgeführt.

	1)	2)	3)
Substanz	0,638	0,812	0,517
Kohlensäure	1,962	2,495	1,590
Wasser	0,682	0,870	0,552.
	•	Altes Atg.	·
Kohlenstoff	85,09	85,06	85,09
Wasserstoff	11,85	11,89	11,84
Sauerstoff	3,06	3,05	3,07
•	100,00	100,00	100,00.
	·	Neues Atg.	•
Koblenstoff	83,86	73,79	83,86
Wasserstoff	11,85	11,89	11,84
Sauerstoff	4,29	4,32	4,30
-	100,00	100,00	100,00.

XV.

Praktische Beiträge zur Galvanoplastik.

Von

Dr. SCHUBERT in Würzburg.

Ein mir kürzlich zu Gesicht gekommener, aus der Leipt allgem. Zeit. in das Gewerbeblatt f. Sachsen aufgenomment Artikel, worin einer von Stöhrer construirten constanten Diniell'schen Batterie Erwähnung geschieht, gab mir Veranlasung zu folgenden Bemerkungen:

Vor längerer Zeit mit Galvanoplastik beschäftigt, versucht ich, bei Erregung des elektrischen Stromes das Zink durch Esen zu ersetzen. Obgleich der Process bedeutend langsant vor sich ging, blieb ich in Betracht des anschnlichen ökonmischen Vortheils bef diesem Metalle. Diese Versuche wars jedesmal mit Schmiedeeisen angestellt worden. Als ich aber spätat in Erwägung zog, dass das Gusseisen vermöge seines bedeutenden Kohlenstoffgehaltes, ähnlich dem mit anderen Metalle verunreinigten Zink, elektro-positiver sei als das reinere Schmiedeeisen, wie sich eben so auch nach Mallet eine Legirung aus? At. Kupfer mit 1 At. Zink elektro-negativer verhält als reise Kupfer, so stellte ich den Versuch mit Gusseisen an und fast, dass hierbei die Ablagerung des Kupfers so rasch vor sich gehe, wie bei Anwendung von Zink.

Ich hatte mich seither zur Auflösung des Eisens inmer der Schweselsäure bedient. Um aber auch diese durch eine wohlseilere Substanz zu ersetzen, stellte ich auch hierüber Versuche an und sand, dass, freilich mit einiger Verzögerung des Processes, eine Auflösung von Kochsalz oder Glaubersalz die Schweselsäure ersetzen könne. Das Interessanteste aber wir mir, auf diese Weise eine vollkommen constante Kette zu erhalten, welche mehrere Tage, und ich zweise sogar nicht, auf immer mit völlig gleicher Krast sortwirkt, insosern man un nebst dem Kupservitriol das allmählig verdampste und zersetze Wasser, so wie das endlich aufgelöste Eisen erneuern würde; denn, verbindet sich auch das Eisen mit dem Chlor des Chlornatriums, so wird ersteres immer wieder von dem frei gewordenen Natron gefällt und von Neuem Chlornatrium gebildet, wodurch also, so zu sagen, ein Perpetuum mobile entstände.

Schubert, prakt. Beiträge zur Galvanoplastik. 191

Dass diess Verfahren für die Galvanoplastik einen bedeuenden Vortheil bringe, erheilt von selbst; ob aber dasselbe sich
uch als constant wirkende Batterie zum Elektromagnetismus
ils Treibkraft eignen werde, davon habe ich mieh zur Zeit noch
sicht überzeugt, und weil den nöthigen Apparat zu erhalten,
ür mich sobald noch nicht in Aussicht steht, so haben doch
rielleicht diese Bemerkungen den Nutzen, diese Erwartung durch
nehrseitige Versuche widerlegt oder hestätigt zu sehen.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir, noch etwas über Verminderung der Kosten bei der Galvanoplastik anzuführen. Ich meine nämlich die Gewinnung eines wohlseilen Kupservitiols, welche, wenigstens wo nicht ganz im Grossen gearbeitet wird, anwendbar sein dürste. Man erhält nach diesem Verhahren einen Kupservitriol ohne alle Wärmeanwendung.

Man verwendet dazu die ganz billige, etwa 50 p.C. Kupfer ind ziemlich wenig Eisen enthaltende Kupferasche, welche die Kupförschmiede aus ihrem Löschwasser sammeln. (Vielleicht dürfien sich hierzu noch vortheilhafter die in Kupferhämmern varkommenden Schlacken eignen.) Diese, grösstentheils ichon Oxydul, verbindet sich äusserst leicht nach der Mehode von Bérard mit Schwefelsäure. Man rührt sie mit verdünnter Schwefelsänre von 15 - 20° Beaumé zu dickem 3rei an, den man auf grossen flachen Tellern von Steinzeug der in Trögen von Blei oder gefirnisstem Holze möglichst ausebreitet bei gewöhnlicher Temperatur der Luft aussetzt und ners des Tages wendet. Nach 24 Stunden wird die Masse lit Schwefelsäure von obiger Stärke ausgewaschen, welche nach dem Absetzen der ungelösten Theile wieder abgiesst der ablässt und diess so oft wiederholt, bis die Kupferasche rschöpft und die Schwefelsäure hinlänglich gesättigt ist. Erteres erkennt man daran, wenn die Masse aufhört, beim Ansuchten immer roth zu werden, sondern schwarz bleibt, das ndere am Aufhören der sauren Reaction und der gesättigten farbe der Auflösung.

Hierzu kommt nun noch der Vortheil, dass man sich die schwefelsäure nur zur Auflösung der ersten Portion anzuschafzen braucht, für die Folge verwendet man dazu immer die lurch den galvanischen Process erschöpfte Kupfervitriollösung.

XVI.

Literarische Nachweisungen.

Ann. der Physik u. Chemie. Von Poggend. 1841. No. I.

Ueber die Verbindungen der flüchtigen Chloride mit Ammoniak. Von H. Rose.

Ueber die Bromsäure und deren Salze. Von C. Rammelsberg. Thermochemische Untersuchungen. Von H. Hess.

Untersuchungen üb. die spec. Wärme. Von de la Rive u. Marcel,

No. II.

Ueber die Sulfantimoniate und Sulfarseniate. Von C. Rammelberg.

Ueber die Volumentheorie. Von H. Kopp.

Ueber die Abkängigkeit der Krystallform vom Atomvolumen. Van Demselben.

Ueber die specifische Wärme zusammengesetzter Körper. Von II.
Schröder.

Ueber die Gährungsfähigkeit der Zuckerarten. Von H. Rose. (Der Rohrzucker ist nicht gährungsfähig, er verwandelt sich, ehe er die Gährung erleidet, in Traubenzucker.)

Ann. der Chemie u. Pharm.. Von Wöhler und Liebig.
März.

Verhalten der Fette gegen Metalloxyde; Seifen und Pflaster. Von J. Liebig.

Ueber die Metamorphose des mellithsauren Ammoniaks in höherer Temperatur. Von F. Wöhler.

Ueber die Zusammensetzung des Guano.

Ueber die Einwirkung der Salpetersäure auf die fetten Säuren. Ves Bromeis.

Ueber den Fichtelit (eine neue Art Bergtalg). Von Demselben.

Eigenschaften der Catechusäure; nach Untersuchungen von II. Wackenroder.

Ueber Catechin. Von C. Zwenger.

Ueber die Zusammensetzung des Catechin. Von R. Hagen.

Ueber Chromsulfuret. Von Harten.

Chem. Notizen. Von Rochleder.

XVII.

and the second of the second of the second

Teber die Nothwendigkeit einer genügenden Beachtung der Krystallographie in der Chemie.

Von

HEINRICH WACKENBODER.

: Allgemein anerkannt ist die grosse Bedeutung: der Krytattographie für die Mineralogie. Jedermann weiss zwie manhe der ausgezeichnetsten Mineralogen, namentlich Mobs und eine Nachfolger, die Krystallographie selbst zur Basis ihrer timeralogischen Systeme gemacht haben, wie sie in einer, nupres Bedünkens einseitigen Auffassung des Objects ihrer Wisneschaft zu dem merkwürdigen Extrem gelangten, welches sie as natürliche, richtiger jedoch auch das naturhistorische Mi-Mealsystem nannten und wovon sie behanpten, dass es völlig jenüge in seiner Unabhängigkeit von den übrigen Naturwissenchaften, vorzüglich der Chemie. Während dieses geschehen, mt die Krystallographie, als Krystallbeschreibung, in unserer Wisenschaft, gleichsam zur Wiedervergeltung, eine so unbedeumide und erfolglese Anerkennung gefunden, dass es fast als in Wagniss erscheint, auf eine Aenderung dieses Zustandes le eine Nothwendigkeit hinzuweisen. Eine Opposition unter wh. Wissenschaften, zumal den Naturwissenschaften j. ist jedoch la lächerliches Beginnen; das seine kurze Abfertigung schon Bemerkung findet, dass wir, gemäss dem so fruchtbrinbaden Principe der neueren Naturforschungguuns in idie Arbeit wilen müssen, um die Resultate der Forschung Aller zur Ernichung eines speciellen Zweckes benutzen zu. können... Nur emjenigen, der in seine specielle Disciplin gewissesmaassen vezebt ist, mag man es zu gute halten, die Hülfe anderer Wisenschaften für überflüssig oder gar wohl;schädlich seinem Ziele ur erklären. Gern mögen wir zugeben, dass, de die Bildung er. Mehrzahl der Mineralien bereits beendigt ist, die Mineraleste auf die Erforschung und panktlichte Bestimmung der :phy-Malischen Eigenschaften der Fossilien verzugzweise Werth nge. Nichts desto weniger: muss; sie Eugleich eine Chemie der Mineralien sein, wenn wir anders nicht bine blosse Aufzählung

194 Wackenroder, üb. Krystallographie und Chemie.

der naturhistorischen, sogenannten äusseren Eigenschaften, sondern eine vollständige Kenntniss der Mineralien von ihr erwatten. Eine reine Naturgeschichte des Mineralreichs genügt us lange nicht mehr. Die Charakteristik und Physiographie der Mineralien, wie sie Mohs gegeben, können unzweifelbaft eine ben so wohl begründetes Mineralsystem abgeben, als die Charaktere und Beschreibungen der Pflanzen und Thiere vollständigt naturhistorische Systeme begründen können. Niemandem kann er aber ernstlich in den Sinn kommen, solche botanische und zoelogische Systeme für den vollständigen Ausdruck der Betaut und Zoelogie zu halten.

Wenn wir in unserer Wissenschaft vorzugsweise die Vaänderungen der Körper, welche sie in Folge der thätig wadenden chemischen Kraft erleiden, zu untersuchen haben, w schliesst diese Aufgabe nicht allein die Erforschung der physikalischen Kigenschaften der Körper, die wir zerlegen oder is neue Producte erhalten, nicht aus, sondern verlangt dieselt vielmehr unabweislich. Dieser Antorderung möchten wir un alsdann etwa nur entziehen können, wenn es uns einfallen selle, ihr in einer neu zu schaffenden Disciplin, in einer Physicgraphie der Naturgeschichte der chemisch erzeugten oder au Naturproducten ausgeschiedenen Körper, wie z. B. der Alksloide und organischen Säuren, zu genügen. Unberücksichigt können daher die physikalischen Eigenschaften der Körper in der Chemie nicht bleiben, so lange es uns noch für ein unbestreitbares Axiom gilt, dass jeder Elementalistoff und jegliche chemische Verbindung mit gewissen wesentlichen Eigenschaften begabt sein müsse, die nur mit Hülfe der Physik und Mathematik, so wie durch einfache Anwendung unserer Sinne # ermitteln sind. Die Unterscheidung der chemischen Productein natürlich entstandene und künstlich erzeugte kann aber auf nichts anderem beruhen, als auf einer sehr nöthigen und verständigen Abgrenzung der Wissenschaften. Ob die ewig waltenden Naturgesetze in der Schöpfung wirken, oder ob wirst in unseren Laboratorien nach Willkühr leiten, das kann in der That keinen triftigen Grund abgeben, die Producte derselbs Kräfte als Gegensätze zu hetrachten, deren Erforschung mei ganz entgegengesetzten Principien und Regeln zu vollführen si Unter den physikalischen Eigenschaften der durch chasi-

sche Verwandtschaft erzeugten Natur - und Kunstproducte stehen ohne Zweisel diejenigen oben an, welche von der Krystallisationskraft abhängig sind. Zwar möchten wir nicht einmai innerhalb der Grenzen des Mineralreichs mit Mohs (Grundries der Mineralogie I. 23) "die Krystallisationskraft besser die individualisirende Kraft" nennen, um nicht noch weiter davon abzukommen im Bereiche der Chemie. Niemand wird die Individualität der zabliosen Menge von Gasen, tropfbaren Flüssigkeiten und völlig amorphen festen Körpern läugnen wollen. He mützt zu: nichts, diese Körper, deren Masse nicht abgegrenzt ist; nur wegen einer supponirten Krystallisirbarkeit derselben als naturhistorische Individuen gelten zu lassen; denn' der Begriff der Untheilbarkeit des Individuums darf sich bier offenbar nicht bids auf die Massentheile der Körper, sondern muss sich auch auf ihre Bestandtheile erstrecken. Gleichwohl ist allbekannt; welch einen grossen Binfluss die Krystallisationskraft auf die Ladividualisirung, ja seibst auf die Bildung chemischer Producte aucht. Demnach wäre es wohl sehr natürlich, wenn wir auch im der Chemiengenau unterrichtet würden von den Gestalten der krystallisirten Individuen, deren regelmässige und scharfe körf perliche Begrenzung ihnen einen in hohem Grade bezeichnenden Charakter sufprägt. Wer aber wird, wenn er einen Blick elbst in die ausgezeichnetsten und .renommirtesten Werke unseder Wissenschaft thut, noch einen Augenblick darüber in Zweifelt sein, dass diese Seite der Chemie gründlich verkümmert seif Widf liegende allgemeine Gründe müssen veranlasst haben. dass die weit gediehene Krystallographie im Allgemeinen so werig Eingang bei den Chemikern gefunden hat. Täuschen wir uns nicht, so ist diess eine Folge der Entwickelungsepoche der Krystallographie selbst. Keine Uebereinstimmung in der Terminologie und Bezeichnung der Krystalle, keine gleichmässigé Annahme der Grundgestalten, keine Gleichförmigkeit in der Ableitung der verschiedenen Krystallformen aus Grundformen eder Krystallsystemen darbietend, bleibt die unter den Natuszwissenschaften am meisten abstracte Wissenschaft noch immer entweder auf sich beschränkt, oder bewegt_sich nor vorzugsweise in dem verhältnissmässig engern Kreise der Oryktognosie. Das verschiedene Verfahren der Pfleger der Krystallographie igenau kennen zu lernen, um es selbet leicht anwenden zu können,

196 Wackenroder, üb. Krystallographie und Chemie.

erfordert einen weit grössern Aufwand von Zeit, als den meisten Chemikern für diese Hülfswissenschaft billiger Weise zuzu-Auch widerstrebt das bartnäckige Durchkreuze muthea ist. entgegengesetzter Grundansichten in der Krystallographie sche an sich dem Charakter der Chemie, in welcher nur die Thasache unbedingte und allgemeine Geltung verlangt. daher richtiger gebildete oder wohllautendere chemische Benennungen anstatt älterer und allgemein verständlicher Namen einführen wollten, etwa Steatin für Stearin, kieselsaures Alamerdebarytwasser für Barytharmotom, schwefelsaures Talkerdekalihydrat für Polyhalit, oder wenn wir neue unbehülfliche Nama wie Kaliumbaryumferrocyanürhydrat u. dgl. m. gebrauchen wellten, so würden wir mindestens gehalten sein, die durch Wirter hervorgebrachte Confusion durch allgemein verständlicht, im Wesentlichen unabänderliche chemische Formeln wieder gu zu machen. In der Krystallographie aber hat man sich bis jetzt noch nicht verständigt, weder zu allgemein gültigen symbolischen Zeichen, dem ersten Erforderniss in jeder mathematischen Wissenschaft, noch zu gleichlautenden terminis technicis. Letztere scheinen oftmals, obgleich folgerichtig und consequent gräcisirt, auf eine besondere und noch grössere Volubilität der Zunge berechnet, als sie ausserdem schon häufig genug in der Chemie erforderlich ist. Wörter wie Hemilkositetraeder, Trapezoidtidodekaëder, Hemioktakishexaëder u. dgl. erfordern doch meistens wohl ein eigenes Exercition, um leicht, zwangles mi glatt über die Lippen zu fliessen. Man sollte meinen, das kurze Umschreibungen solchen Sprachhemmnissen vorzuzieher seien, zumal in der Krystallographie noch Synonyme geneg übrig bleiben würden, die um so schwieriger sind, als sie sich oftmals mehr auf abstracte Begriffe und Vorstellungen, als an sinnliche Objecte beziehen. Das grösste Hinderniss aber 21 einem wirksamern Eingreisen der Krystallographie in die Chemie, besonders zu einer mehr praktischen Anwendung derselben, liegt, unserer Ansicht nach, in der Verschiedenheit der krystallographischen Symbole, die bei Colgerechter und stress wissenschaftlicher Construction alle gleichen Werth haben kin nen, wenn auch die von der Willkühr abhängigen Principies, auf denem sie beruhen, ganz verschieden sinder Khe also nich eine Vereinigung stattgefunden, dürfen wir ans zu der nich

unbilligen Forderung berechtigt halten, dass bei Beschreibungen von Krystallcombinationen die Symbolik nach den vorzüglichsten Methoden von Weiss, G. Rose, Hausmann, Mohs, Naúmann, Breithaupt u. A. gleichzeitig zur beliebigen Auswahl gegeben werde; oder dass mindestens der beliebten Symbolik noch allgemein verständliche, aus der Stereometrie hersliessonde Beschreibungen der Krystallformen hinzugefügt würden in Nimmer werden sich die Chemiker, bei den übrigen grossen Anforderungen der Chemie an sie, allgemein dezu verstehen, eine übermässige Zeit aufzuwenden, um sich imit den sinn- und phantasiereichen Vorstellungen in der Symbolik aller Krystalle-- : Unter den obwaltenden Umständen scheint die Rückkehr zu der ursprünglichen, beschreibenden krystallographischen Methode in Bezug auf die Chemie vorläufig sehr wünschenswerth. Dass dieselbe auch in der Oryktognosie noch recht wohl praktikabel sei, zeigt das von einigen Krystallographen zwar mit Heftigkeit angegriffene, nichts desto weniger ein nutzreiches Studium der Mineralogie fördernde:,, Handbuch der Mineralogie in techniecher Beziehung, von Walchner. Carlsruhe, 1829." Zehn Jahre später erklärt sich auch Glocker in seinem "Grundriss der Mineralogie. Nürnberg, 1839. S. 60" dahin, dass man "bei diéser längst recipirten Methode eine grössere Genauigkeit erreichen könne, als es auf den ersten Blick scheinen möchte, wenn man nämlich zugleich die Neigung der abgeleiteten Fläohen gegen die Krystallaxe oder gegen einander, und da, wo das Verhältniss der Axenlängen sich ändert, das Maass für diese angebe." Aber seibst auch mit Weglassung dieser An+ gaben, wo sie entweder noch fehlen, oder, wie bei mikroskopischen Krystallen, unmöglich erscheinen, darf man schon von der Feststellung von Grundformen oder Grundgestalten für die krystallisirenden Körper grossen Nutzea erwarten. Denn durch supponirte Abstumpfung, Zuschärfung und Zuspitzung an Ecken, Kanten und Flächen der Grundformen, in bekannter Weise und nach bekannten Regeln, lassen sich alle Krystallcombinationen, die bei einer und derselben krystallisirenden Substanz möglicher Weise vorkommen können, meistens genügend und leicht entwickeln and demnach auch kurz und bündig beschreiben. Ohne solche leitende Idee müssen, wie die alltägliche Erfahrung lehrt, die

the first gooding a countries supplied by the experience of

Beschreibungen der Krystalle ohne sonderlichen Werth, ja eine Interesse bleiben. Eine Hinneigung zu dieser descriptiven Methode zeigt sich auch zuweilen in der Beschreibung neuer krystallisirter Körper. So führt z. B. Wöhler in den Ann. der Chem. und Pharm. B. 37. S. 267 an, das zweifach mellithenure Kall krystallisire in geschobenen vierneitigen Prismen (schiefen thombischen Prismen oder Dyhenoëdern?) mit Achstumpfungund. zuweilen auch Zuschärfungen der sicharfen Seitenkann und Abstumpfungen der Endkanten.

An die Grundsormen eben knüpft sich der leitende 61danke, vermöge dessen wir erst in den Stand gesetzt werde, den Zusammenhang unter den tausendfältigen Krystallforme zu erkennen und einen tiefern Sinn hineinzutragen in die krystallegraphischen Betrachtungen. Da die Grundformen diejesigen einfachen Krystallgestalten sind, welche in keinem krystallegenetischen Verhältnisse zu einander stehen, also in der Natw niemals in einander übergehen, sich demnach zwar mathematisch, aber nicht krystallographisch auf einander reduciren lassen, se bilden sie die Typen aller möglichen Krystallformen bei eine und derselben Substanz, in sofern diese nicht dimorph ist. Der für die Chemie so wichtige Dimorphismus der Körper besteht eben darin, dass ein Körper von gleich bleibender chemischer Mischung in zweierlei Arten von Krystallformen sich darstelles kann, deren jede aus einer besondern Grundform abzuleiten ist nach den Symmetriegesetzen, die überhaupt gelten für die Alleitung der Krystallcombinationen aus den Grundformen, oder, was dasselbe ist, für die Entwickelung dieser aus jenes Der Schwesel hat z. B. sowohl ein gerades als auch ci schiefes rhombisches Prisma zur Grundform. Im Canzen is die Annahme von Grundformen identisch mit der jetzt gebräuchlicher gewordenen Annahme von Krystallsystemen. Die einfachen, geschlossenen oder ungeschlossenen, Formen, welche sich aus den von jedem Krystallsysteme umfassten zusammengesetzte Krystallformen ableiten lassen, schliessen sich krystallographisch gegenseitig aus und sind Grundformen. Umgekehrt repräsertiren die Grundformen eben so viele Krystallsysteme, indem sie die Anzahl und Neigung der Krystallaxen zu einander ausdrücken, ohne zugleich die Längendimensionen derselben anzudeutes. Daher kans eine und dieselbe Grundform je nach der Axendimension zwar gleichgestaltige, aber nicht ganz gleiche Krymar durch Messungen näher zu bestimmen, in der Chemie indessen häufig genug von geringerem Interesse sind. Die homoëdrische oder hemiëdrische, immer aber symmetrische Veränderung der gleichnamigen Theile der Grundgestalt nimmt zunächst unser Interesse in Anspruch.

Hält man sich nun überzeugt von der Nothwendigkeit oder mindestens Nützlichkeit der Annahme von Grundformen, so bleibt noch immer festzustellen übrig, welche Krystallgestaken als solche anzunehmen sind.: Nach der ursprünglichen Vorstellung von primitiven Krystallformen dürsten streng genommen nur solche Gestalten als Grundformen angesehen werden, welche aus der Structur der Krystalle sich ergeben, also zu den letzteren in einem physisch-genetischen Verhältnisse stehen. Daher wird z. B. auch für den hexaëdrischen Flussspath das reguläre Octaöder und für den Gips das schiefe rectanguläre Prisma als Grundform betrachtet. Allein bei der Schwierigkeit oder auch Unmöglichkeit, die Spaltbarkeit der künstlich erzeugten Krystalle überhaupt oder genau auszumitteln, muss es genügen, diejenige Krystallgestalt als Grundform anzunehmen, welche in den gewöhnlichsten Krystallcombinationen eines krystallisirenden Körpers die vorherrschende ist und demnach die Entwickelung der zusammengesetzten Gestalten am meisten erleichtert. daher auch vorkommenden Falles eine Grundform mit einer andern, aus ihr abzuleitenden Krystallform vertauscht werden, z. B. ein Rhomboëder mit einem Dibexaëder, ein quadratisches Prisma mit einem Quadratoctaëder; einfache Formen jedoch, und zwar gleichviel ob geschlossene oder ungeschlossene, können nur die Grundformen sein. Nicht häufig dürste man veranlasst werden, die Normalgestalt als- Typus der Krystallisationen eines und desselben Körpers zu wechseln, obwohl es von unter-'geordneter Bedeutung wäre, da wir die einmal angenommenen Grundformen nur als Repräsentanten von eben so vie-. -ten verschiedenen Krystallisationssystemen betrachten, welche niemals in einander übergehen. Indem wir uns nicht in den Streit der Krystallographen einmischen, ob man vier, oder sechs, oder sieben Krystallsysteme annehmen, oder alle sammt und sonders aus einem einzigen, dem regulären Systeme, deduciren -müsse, glauben wir bei der Ersahrung stehen bleiben zu dürfen, dass alle monomorphen, nicht allein natürlich vorkommen-

200 Wackenroder, üb. Krystallographie und Chemie.

den, sondern auch künstlich erzeugten Körper nur in Krystallformen, die im Bereiche einer einzigen Grundform liegen, vor-Dabei ist freilich das Bereich einer jeden kommen können. Grundform als ein abgemessenes vorausgesetzt, obgleich um darüber nicht zweiselhast sein kann, dass die Anzahl der wu einer einfachen Krystallgestalt beherrschten Formen grösser ule kleiner, mithik auch die Anzahl der Grundformen kleiner ode grösser angenommen werden könne. Mir scheinen die sieba Grundformen; weiche auch Walchner in seinem Handbuck der Mineralogie zur Ableitung aller Krystallgestalten des Mneralreichs Venutzt, überall völfig genügend und dem Zweck einer leichten Zurlickführung der mannigfaltigen Krystallisation auf einfache; die Körper oftmals bestimmt charakterisirent Formen sehr gut entsprechend. Indem ich diese Grundformen hier kurz anführe, ohne in Discussionen über sie selbst einzugehen, will ich zugleich erwähnen, wie sie sich zu den Krystallsystemen, die am meisten angenommen werden, verhalten.

- 1) Der Würfel, oder das reguläre Octaëder, oder auch eine andere daraus herzuleitende einfache homoëdrische, selten hemiëdrische Form. Diese Grundform entspricht also dem regulären Krystalbystem von Weiss, G. Rose und Glocker; dem isometrischen System von Hausmann; dem tessularischen System von Mohs; dem tesseralen System von Naumann und Breithaupt.
- 2) Ein Quadratoctaëder, oder ein gerades quadratisches Prisma.

 Es repräsentirt das zwei- und einaxige System von W. und G. R.; das monodimetrische System von H.; das pyramidale System von M.; das tetragonale System von N. und B.; das quadratische System von Glocker.
- 3) Ein Dihexaëder (doppelt sechsseitige Pyramide) und die in physisch-genetischer Hinsicht auch häufig selbstständige hemiëdrische Form desselben, ein Rhomboëder, oder auch ein regulär sechsseitiges Prisma. Diese Grundform kommt gleich dem drei- und einaxigen System von W. und G. R.; dem monotrimetrischen System von H.; dem rhomboëdrischen System von M.; dem hexagonalen von N. und B.; dem dihexaëdrischnomboëdrischen System von G.
- 4) Ein gerades rhombisches Prisma, oder ein Rhombenettaëder. Diese Grundform stimmt ganz überein mit dem ein-

und einaxigen System von Weiss und G. Rose, dem rhombischen von Naumann und dem orthotypen von Mohs, betrifft aber nur einen Theil der Krystallformen, die dem trimetrischen System von Hausmann und dem rhombischen von Briefthaupt und Glocker angebören, indem zu den letzteren Systemen auch die Krystallformen mit schiefen Axes hinzugerechnet werden. -to a Chroschiefes arhombisches Prisma. den autheit noch a reine Today Ginigerades rectangulares Prismant gustad and unieftendes schiefes thomboldisches Prismali- Diese drei Grand-Tormen umfassen eine grossedAnzahl von-Krystallfornien streilthe fact sommtlick von Weiss und G. Hose in daszweit und singiledrige und in das ein- und eingliedrige; von Mohs in das hemiss thotype (anorthotype und hemianorthotype und von Nelumania in dhe monoklinoëdrische; diklinoëdrische und triklinoëdrische System gesetzt werden. Sie geben, weil sie en zich die am wenigsten einfachen Grundgestalten sind, auch die am meisten complicirten Krystallcombinationen, deren Beduction auf ihre Grundform manchmal sehr schwierig sein und eine anhaltende und vielseitige Betrachtung der Krystallenerfordern kann, vorzüglich wenn die Krystalle von mikroskopischer Kleinheit sind. Namentlich sind die organischen Säuren dadurch ausgezeichnet, dass ihren Krystallisationen ausser einem geraden rhombischen Prisma eins der letzteren Prismen mit schiefer Hauptaxe zum Grunde liegt. Und gerade bei diesen Körpern habe ich in der lm Februar d. J. vollendeten "Charakteristik der wichtigern stickstofffreien organischen Säuren" die Aufstellung von Grundformen versucht, ium neben einem bestimmten und unzweideutigen Ausdrucke für die Krystallsormen derselben im Allgemeinen auch einen sichern Anhaltepunct für die Beschreibung ihrer besondern und eigenthümlichen Krystallgestalten zu gewinnen.

Lassen wir es uns vorerst in der Chemie genügen mit der Bestimmung der Grundsormen der krystallisirenden Körper und mit der daraus hersliessenden kurzen und regelrechten Beschreibung der Krystallisationen, so wünschen wir dennoch gar sehr, die Krystallgestalten auch nach ihren Winkelgrössen, nach der Lage ihrer Flächen zu einander und gegen ihre Axe, vorzüglich aber die Axendimensionen ihrer Grundsormen recht genau and allseitig kennen zu lernen. Bevor aber die Ausmessun-

202 Wackenroder, Krystallform. den organ. Säuren.

gen der sämmtlichen Krystalle geleistet sein werden, dürfte noch eine gar geranme Zeit verfliessen. Sollen wir uns aber bis dahin der wichtigen Beihülfe der Krystallographie in der Chemie begeben? Sollen wir das allgemein Anwendhare der Speciellen opfern, das in seiner Specialität allerdings vortreflich ist und der streng wissenschaftlichen Anforderung genügt, aber jetzt noch keiné allgemeineren Beziehungen gestatet? Der Umfang der Cheinie nistnauch in krystallographische Hinsicht.ein unläugbar: viel grösserer, als: den den Oryktognosk Während an den Mineralien keine Espetalistische vorkomme dürfte, die. nicht ausgemessen, berechset und genau bestimm wäre, der man nicht ihren Platz in der Krystallcombissie anzuweisen vermöchte, für die man nicht ein symbolisches Zeichen geben könnte, wissen wir von den in der Chemie abgehandelten krystallisirten Körpern sehr häufig gar nicht einmal, welchem Krystallsysteme oder welcher Grundform; sie angehören Als nothwendig erachten wir es daher, dass die Krystallographie heraustrete aus dem engen Kreise der Oryktognosie, der sie zwar ihren Ursprung verdankt, aber nicht allein angehöt, und dass sie einen allgemeinern Einfluss erlange auf die Chemie, von welcher sie durch die Entdeckung des Isomorphismus und Dimorphismus der Körper einen neuen lebendige Aufschwung erhalten hat.

XVIII.

-Neue Bestimmungen der Krystallformen der wichtigeren stickstoffreien organischen Säuren.

Von

HEINRICH WACKENRODER.

In einer vorangegangenen Abhandlung habe ich die Beweggründe angegeben, die mich bestimmten, in der "Charatteristik der organischen Säuren (Jena 1841)" für die Krystallformen dieser Säuren bestimmte Grundformen oder Normatformen aufzustellen. Indem man dadurch einen einfachen Aufruck für die verschiedenen Krystallformen erhält, ergeber sich darade ohne Schwierigkeit alle Krystallformen, Krystall

nach den sehr einfachen krystallogenetischen Gesetzen möglitcher Weise aus jeder Grundform für sich vorkommen können. Obwohl meistens die Bestimmung Aer Grundform, oder, was im Wesentlichen dasselbe ist, des Krystallayatems, zu welchem die Krystalle der chemischen Producte gehören, uns das Nächste und Wichtigste ist, so wird und solk dadurch doch keineswegs die Abmessung der Krystalle und ihrer Grundgestalten zur Feststellung ihrer Krystallreihe ausgeschlossen sein. "Den grössten Werth hat, wie-mich dückt, die Krystallographie fündie Chemie, indem sie uns lehrt, aus der ungemessehen. Anzahl der Karastallcombinationen die einfache Grundgestalt zu entwickeln, conform den naturgemässen symmetrischen Veränderungen der einfachen Formen oder Grundformen durch: Abstumpfung, Zuschärfung oder Zuspitzung der Ecken, Kauten und Flächen derselben. Die Wahl der Grundform für eine krystallisirie Substanz kann bis zu einem gewissen Grade willkührlich sein, wenn die Structurverhältnisse der Krystalle unbekannt sied. Diese Unsicherheit wird aber bei Beachtung der verherrschenden Krystallflächen meistentheils von selbst verschwinden.

1) Oxalsaure. — Grandform: ein schiefes rhembisches Prisma. Die Krystallisation dieser Säure wird gar, verschieden beschrieben. Berzelius (Lehrbuch II. 105) sagt von der Oxalsaure, "dass ihre Krystalle zusammengehäufte Prismen seien, wenn die Säure rasch krystallisire, und mehr oder weniger dicke Tafeln, wenn sie langsam entstehen." Ausführlicher wird die Krystallisation der Oxalsäure von Liebig (in Geiger's Handb. Neue Aufl. I. 610) beschrieben. Sie bilde nämlich "schiefe rhombische Saulen, mit einer (?) oder zwei Flächen zugeschärst oder mit abgestumpsten Mittelseiten, woraus ungleich sechsseitige Säulen entstehen, mit zwei, auch vier auf den Mittelseitenkanten aufgesetzten Flä-· chen zugeschärft." In den meisten anderen Lehrbüchern, der Obemie finden wir die Krystallisation der Oxalsaure, gleichwie aller übrigen organischen Säuren, entweder nur sehr wenig, oder ganz und gar nicht berücksichtigt. Nur L. Gmelin hat in seinem Handb. der Chemie die Krystallisationen aller darin abgehandelten Körper so vollständig, als es überhaupt möglich war, angegeben. In diesem Handbuche (II. 105) sind die Messungen der Oxalsäure von Brooke mitgetheilt, denen zufolge die Oxalsäure zum 2- und Igliedrigen oder zu dem menoklinoëdrischen Systeme gehört. — Dieser Angabe von Brookt
entspricht nun auch die Annahme eines schiesen rhombischen
Prisma als Grundsorm für die Oxalsäure. Häusig bildet sie langt,
längsgestreiste unvollständige Prismen; seltener irreguläre, aus de
Grundsorm abzuleitende Octaëder. Bei regelmässiger Ausbildung erscheinen ihre Krystalle gewöhnlich als schiese rhombische Prismen, welche an den Seitenecken bis zur Zuschärfung
des Prisma und eben se den Seitenecken bis zur Zuschärfung
des Prisma und eben den Seitenecken Seitenkanten stat
abgestumpst sind. Durch diese Veränderungen der Grundsun
müssen also irregulär sechäseitige Prismen entstehen.

- Prisma (?). Die Grundform wird so iange zweiselhaft bleben, die es geglückt sein wird, unter den bekannten Nach und Blättehen der Benznesaure vollständig ausgebüldete Krystale zu entdecken. Liebig giebt (a. a. O. S. 669) an, dass de Benzoesaure auch in sechsseitigen Nadeln krystalksire.
- Prisma. Die Zimmtsäure krystallisitt nach Liebig (a. a. O. 693) in Blättern und rhombischen Säulen. Nach Herzogigenauerer Angabe (s. Archiv der Pharm. 2. R. Bd. XX. 3. 162) gehört sie in das 2- und igliedrige System, womit dem nach die von mir angenommene Grundform übereinstimmt. Sie krystallisitt in schiefen rectangulären Prismen, welche wegen Abstumpfung der beiden rechtwinkligen gleichnamige Grundkanten zugeschärst sind. Ihre blättrige Structur ist aufgezeichnet; die Spaltbarkeit parallel der rhombolitalen Seitenfäche der Grundform. Aus einer gehörig concentrirten wissrigen Lösung krystallisitt die Zimmtsäure auch in ziemlich lagen Nadeln, an denen jedoch keine deutlichen Plächen verkommen.
- 4) Bernsteinsäure. Grundform: ein schiefes rectangtläres Prisma. Ueber die Krystallisation der Bernsteinsäure
 führt L. Gmelin (a. a. O. 186) an, dass sie in das 2- und
 2gliedrige System nach Weiss gehöre. Die Ableitung geschieht leicht aus der aufgestellten Grundform, indem die Krystalle als schiefes rectanguläres Prisma, welches nach den rhesbeidaten Seitenflächen, also nach der zweiten Nebenaze des
 Prisma, stark verkürzt ist, erscheinen und demnach rhombei-

nten des Prisma abgestumpft, wodurch denn die platten Prism in verwendeter Stellung sich als irregulär sechsseitige Tazeigen. Nach dieser Abstumpfungsfläche ist die Bernsteinare ausgezeichnet spaltbar, was, wie mir scheint, bisher überhein worden ist. Häufig bildet die Bernsteinsäure unvollstänge lose oder zusammengewachsene Krystalle.

- 5) Brenzweinsäure. Aus den bekannt gewordenen Bepreibungen der Krystallformen dieser Säure scheint auf ein biefes rhombisches Prisma als ihre Grundform geschlossen erden zu dürfen.
- 6) Meconsaure. Grundform: ein gerades rhombisches isma. — Die Meconsäure krystallisirt nach Liebig (a. a. 846) in Blättern und Schuppen, nach Berzelius (Lehrb. I. 147) in Schuppen und Nadeln, nach Sertürner in glimprartigen Blättern und nach Merk (Gmélin's Handb. II. 159) grossen rautenförmigen: Krystallen: /-- Die bekannten glimrartigen Schuppen wind Blätter der Meconsäure erweisen sich loch unter dem Mikroskope als vollständige regelmässige Kryille. Sie sind oblonge, an den beiden längeren Seiten zugeharfte Tafeln, welche als platte Prismen anzusehen sind, entnden durch eine starke: Abstumpfung von zwei, wahrscheinhider beiden scharfen Seitenkanten der Grundform. Die Endchen dieses combinirten rhombischen Prisma sind gerade ansetat. Nach denseiben sind die Krystalle deutlich spaltbar, so e auch wahrscheinlich spaltbar nach den Abstumpfungsflä-Street Marist William en der Seitenkanten der Grundgestalt.
- 7) Aepfelsäure. Die seinen Nadeln, in denen diese iure, wenn gleich nur sehr schwierig, krystallisit, geben der ermuthung Raum, dass der Krystallisation derselben irgend is der rhombischen Prismen zum Grunde liege, welche in sestliender Weise bei den übrigen bis jetzt untersuchten organiben Säuren als Grundsormen verkommen.
- 8) Chinasaure. Grundforme ein schiefes rhombeidisches tisma: Ueber die Krystallform der Chinasaure scheint noch ar michts ausgemacht zu sein. Früher kannte man die Säure ist Wörzchen und Blätteben krystallisirt. Henry und Phisteilen sie in ziemlich grossen und netten Krystallen. ie von mir untersachte, welche ich der gefälligen Mittheilung

Krystalldruse von etwa 1 Quadratzoli Grösse. Die hervorragenden Krystalle sind zum Theil einige Linien lang und bei flüchtigem Ansehen sehr ähnlich der Weinsäure. Sie zeigen sich als schiese rhomboïdische Prismen mit verkürzte kleinerer horizontaler Nebenaxe, so dass sie in verwendete Stellung als rhomboïdische Taseln erscheinen. Die Prismen sie nur zuweilen durch Abstumpfung einer Grund- oder Seitenkaste ein wenig verändert. Sie sind von blättriger Structur und dener deutlichen Spaltbarkeit nach den grösseren Seitenslächen der Grundsorm.

9) Citronensäure. — Grundform: ein gerades rhombische Prisma. - Bekanntlich hat man bisher angenommen, dass die Citropensaure mit 5' und mit 4 At. aq. krystallisire und das nur die erstere durch Austrocknen einen Theil ihres Wassers abgetten Rönne. Die Richtigkeit dieser Annahme vorausgesetz, durfte man auch eine Verschiedenheit der Krystallisation bei beiden Säuren erwarten. Wirklich führt auch Berzelius (a. a. O. II. 144) an, dass die Satomige Säure wasserklin Krystaile bilde, welche durch ihr anderes Anschen und ihr andere Form unterschieden seien von den selten regelmässige oder durchsichtigen Krystallen der 4atomigen Saure, deren Krystallform nicht bestimmt sei. Diese blossen Andeutungen kösnen jedoch keine sichere Unterscheidung begründen, und daher bleibt es ungewiss, welche von beiden Säuren Lichig (a. 4 O. 865) als regelmässige rhombische, durch 4 Flächen zugspitzte Prismen beschreibt. Indessen ist es höchst wahrscheislich, dass Liebig die gewöhnliche käufliche Citronensäure beschrieb, von welcher ich kürzlich (im Archiv der Pharm. Bl. XXIII. H. 3. S. 266) und, wie mich dünkt, mit Sicherheit nachgewiesen habe, dass sie weder die 4atomige noch die 5atemige, sondern die Satomige Säure sei, die durch kein bekasstes Mittel mit mehr Wasser zu verbinden ist. Wenn democa die Existenz der beiden ersteren Säuren in Zweisel gestellt is, darf man wohl glauben, dass Brooke (Gmelin II. 87) unsere gewöhnliche. Citronensäure, = 3aq. + C, krystalloguphisch untersucht habe. Ihm zufolge gehört die Krystallfor der Ekronensäure in das 2- und 2gliedrige Bystem, oder jett in das 1- und 1axige System. — Dieser Angabe entepricht.

auch die von mir aufgestellte Grundform für die käufliche oder Satomige Citronensäure. Ihre Krystalle sind kurze gerade rhombische Prismen, deren spitze Ecken bis zur Zuschärfung der Prismen abgestumpft sind. Gewöhnlicher jedoch treten noch Abstumpfungen der stumpfen Ecken der Grundform hinzu, wo alsdann die Prismen ungleichmässig vierslächig zugespitzt erscheinen. Die 4 Seitenkanten des geraden rhombischen Prisma sind entweder sämmtlich einfach abgestumpft, und dann zeigen sich die Krystalle als ungleichmässig achtseitige Prismen, oder es treten noch andere verticale Flächen hinzu. Bei schneller und gestörter Krystallisation bildet die Citronensaure auch eine blättrig - oder faserig - strahlige Krystallmasse. Sie Desitzt eine ausgezeichnete Spaltbarkeit, und zwar nach der Abstampfungsfläche der scharfen Seitenkanten der Grundform. 10) Traubensäure. - Grundform: ein schiefes rhombofdisches Prisma. - Nach Berzelius (VI. 109), much Löwig fChemie der organ. Verb. I. 30) u. A. krystallisirt die Traubensäure in schiefen rhombischen Prismen. Richtiger und bestimmter lautet die Angabe von Walchner (Gmelin II. 54): Ihm zufolge gehört die Krystalform der Traubensäure in das 14 und 1gliedrige System. --- Damit stimmt denn auch die Aunalishe eines schiefen rhomboïdischen Prisma als Grundform Mr.: die Traubensäure vollkommen überein. Die Krystalle dieser Maure sind eben solche Prismen, deren längere oder kürzere scharfe Grundkaaten abgestompft sind, woraus denn eine Zuschärfung der Prismen hervorgeht. Oder es sind öfters: die Prienten, wegen einer Abstumpfung der spitzen Grundecken der Grundgestalt, unregelmässig droiflächig zugespitzt. An den Sciton des Prisma findet sich, ausser einigen anderen Flächencombinationen, besonders eine asymmetrische oder vielmehr hemiëdrische Abstumpfung einer scharfen Seitenkante. Eine Spak4 barkeit ist an dieser Säure nicht wahrzunehmen. Der Bruch ist glasglänzend. Häufig krystallisirt die Traubensäure in drusenformigen dicken Krystallrinden, und bei schneller und geeterter Krystallisation bildet sie eine strablige und federförmige Mrystalimasse. 91 . 11) Weinsäure. - Grundform: ein schiefes rhomboldischeb

bea. Löwig (a. a. O. 26) nennt ihre Krystalle "grosse wasserhelle Säulen. Berzelius (II. 137) sagt von ihr: " sind sechsseitige Prismen mit schief angesetzter Endläche; bi langsamer Krystallisation vergrössern sich zwei Seitenflächen in der Art, dass die Krystalle tafelartig werden." Nach Liebig (a. a. 0. 877) sind die Krystalle der Weinsäure "schiefe rhonbische, mit zwei Flächen zugeschärfte Säulen mit abgestumpften Seitenkanten, oder sechsseitige, mit 3 Flächen zugeschäfte (?) Prismen; gewöhnlich eutstehen bei langsamer Krystallisation tafelförmige Krystalle, indem zwei parallele Flächen ich stärker als die andere ausdehnen." Genau ist sie von Brooks (Gmelin II. 59) gemessen und bestimmt worden, dem zufelge sie in das 2 - und 1gliedrige System gestellt ist. -- Dient Bestimmung entspricht nun auch die Annahme eines schiefen rhomboïdischen Prisma als Grundform für die Weinsaure, desen Axendimensionen, wie sich von selbst versteht, eigenthämlich und folglich auch verschieden sind von denen der ahrichen Grundform der Traubensäure. Hieraus erklärt sich dem auch die Verschiedenheit zwischen Weinsäure und Traubensäure in Anschung ihrer Flächencombinationen. Die Krystelle der Weinsäure sind schiefe rhomboïdische Prismen mit algestumpften scharfen Grundkanten und scharfen Seitenkanten. Odters sind die Prismen in der Richtung der zweiten horizonisch Nebenaxe, also nach den grösseren Seitenflächen, verkürzt zu erscheinen dann in verwendeter Stellung als rhomboïdische Defeln. Eine Spakbarkeit ist nicht daran wahrzunehmen; der Bruch ist uneben und glasglänzend. Häufig bildet die Waltsäure drusenförmige Krystallrinden und bei schneller und gestörter Krystallisation auch eine krystallinisch-blättrige Mass.

Prisma. — Man hat sich bisher, wie es scheint, lediglich mider Angabe beguügt, dass die Schleimsäure ein krystallinische Pulver darstelle. Indessen besteht dieses vermeintliche Pulver der Schleimsäure (insbesondere der Milchauckersäure) aus mikommen ausgebildeten regelmässigen Krystallen. Dib felm Krystallrinden, in denen sie sich manchmal aus der männige Lösung absetzt, sind wahre mikroskopische Krystalldrusen. Ihr Krystalle erscheinen bei starker Vergrösserung alst schiefe richt bische Prismen mit so starker Abstumpfung der beiden seher

fen Seitenkanten, dass sie sich als ganz platte sechsseitige Prismen, oder in verwendeter Stellung als Tafeln darstellen. Oefters sind auch die stumpfen Seitenkanten zugleich abgestumpft, und dann zeigen sich die Prismen vierseitig. Gewöhnlich sind die Prismen an ihren Enden zugeschärft wegen starker Abstumpfung der Seitenecken der Grundform.

13) Gallussäure. — Grundform: ein gerades rhombisches Prisma. — Die Krystalle der reinen Gallussäure werden gewöhnlich, z. B. in Berzelius's Lehrb. VI. 233, in Liebig's Handbuch der Pharm. von Geiger, S. 855, Nadeln genannt. Diese Bezeichnung ist aber unrichtig, da die Krystalle eine gleichmässige lineare Ausdehnung haben und keineswegs in eine Spitze auslaufen, wie es der Begriff von Nadel verlangen würde. Die sich bildende Gallussäure, von welcher Liebig (a. a. O. 855) angiebt, dass sie in grossen dicken zusammengehäuften Säulen krystallisire, habe ich bis jetzt nur als ein körnig-krystallinisches Polver béobachten können, dessen Körner unter dem Mikroskope mir als unvollständige kurze, manchmal farblos durchsichtige Prismen erschienen sind. Da aber die rohe Gallussäure nach meiner Untersuchung Kalk, Kali und auch Ammoniak enthält, so kann ihre Krystallform hier ohne Weiteres nicht in Betracht gezogen werden. Die genaue krystallographische Beschreibung der Gallussäure von Brooke (Gme-1372 II. 165) bezieht sich höchst wahrscheinlich auf die Brenzgallussäure, welche man bekanntlich früherhin für einerlei mit der Gallussäure hielt. Wenn nach Brooke's Beschreibung die Krystallform der Gallussäure in das 1- und 1gliedrige System za setzen ist, so folgt, wie ich glaube, schon allein daraus ein zuverlässiger und bestimmter Unterschied zwischen der sublimirten und der aus einer wässrigen Lösung krystallisirten gemeinen Gallussäure. - Die feinen, locker zusammengehäuften Krystalle der reinen und namentlich auch von Ammoniak freien Gallussäure zeigen sich unter dem Mikroskope als glasglänzende, farblos durchsichtige oblonge Tafeln, die an den beiden längeren Seiten gleichmässig zugeschärft, an den beiden kürzeren gerade abgeschnitten sind. Sie können also betrachtet werden platte, ungleichmässig sechsseitige Prismen, entstanden durch eine starke Abstumpfung der beiden scharfen, oder vielleicht auch der beiden stumpfen Seitenkanten eines geraden

rhombischen Prisma. Bei der Annahme dieser Grundform gehört aber die Krystallform der Gallussäure in das 1- und 1axige System, oder in das rhombische, nach Naumann. Die Richtigkeit der Ableitung folgt aus der dentlichen Spaltbarkeit der Krystalle nach den Endflächen, also rechtwinklig gegen die Hauptaxe eines geraden rhombischen Prisma. Eine zweite Spaltungsebene scheint zu liegen parallel den verticalen Abstumpfungsflächen der Seitenkanten des Prisma. — Auch hat später einer meiner Zuhörer, Hr. H. Bley, bei weiter fortgesetzter mikroskopischer Untersuchung der Gallussäure einzelte Krystalle derselben beobachtet, an denen sich wegen hinzugetretener Abstumpfung von zwei Ecken der Grundform noch medere Krystallcombinationen zeigten.

14) Catechusäure. — Obgleich diese Säure sehr leicht mit deutlich krystallisirt erhalten werden kann, wie ich zuerst in den Ann. der Pharm. Bd. XXXI. 74 dargethan habe, so ist doch bis jetzt nichts Bestimmtes über ihre Krystallform auszumittels möglich gewesen. Sie bildet stets nur feine, an beiden Enden zugespitzte Nadeln, die also wahrscheinlich von einem der rhonbischen Prismen abzuleiten sind, welche in so auffallender Weise die Grundgestalt bilden für die Krystallformen der stickstoffreies organischen Säuren. — Die Brenzeatechusäure, welche ich tei der trocknen Destillation der reinen Catechusäure entdeckt habe, unterscheidet sich, ausser anderen sehr bestimmten Merkmalen, auch dadurch, dass sie leicht in platten, noch nicht näher testimmten Prismen krystallisirt (s. Charakteristik der organ. Säuren S. 12 u. 21; auch Ann. der Chemie und Pharm. Bd. XXXVII. S. 309.)

XIX.

Ueber die Metamorphose des mellithsauren Ammoniaks in höherer Temperatur.

Von

F. WÖHLER.

(Aus den Gött. gel. Anzeigen No. 5. 1841, mit späteren Berichtigugen des Hrn. Verf.)

Die Seltenheit des Körpers, welcher den Gegenstand der folgenden Untersuchung ausmacht, stellte der Vollendung der-

selben ein Hinderniss entgegen, dessen Beseitigung nicht in meiner Gewalt stand. Dieser Umstand möge die Unvollständigkeit dieser Arbeit, die noch viele Fragen unbeantwortet, noch manchen Zweifel übrig lässt, entschuldigen. Ich würde mich zu ihrer Publication nicht entschlossen baben, wenn nicht die erhaltenen Resultate, so fragmentarisch sie sind, Verhältnisse von sehr merkwürdiger und, wie mir scheint, eigenthümlicher Art auswiesen, deren vorläufige Kenntniss vielleicht veranlassen wird, Ahnliche Verwandlungsvorgänge bei anderen Körpern aufzusuchen, deren Vorkommen für ein erschöpfendes Studium keine Schwierigkeit haben kann. Jedenfalls behalte ich mir vor, diese Untersuchung zu ergänzen, sobald ich durch den Besitz von neuem Material, das sich glücklicher Weise wieder in den Braunkohlen zu Aftern zu zeigen anfängt, dazu in den Stand gesetzt sein werde. Vielleicht giebt übrigens das neue Interesse, welches diese Säure durch das zu beschreibende Verhalten erlangt hat, einen Beweggrund mehr zur Aufsuchung und Entdeckung eines Verfahrens, sie künstlich hervorzubringen. Unter den vielen Versuchen indessen, die ich in dieser Hinsicht angestellt habe, namentlich mit der Bernsteinsäure, die sich nur um 2 Aeq. Wasserstoff, die sie enthält, von ihr unterscheidet, hat keiner der Erwartung entsprochen. Auch habe ich mich durch Versuche überzeugt, dass sie nicht etwa in unsichtbarer Form, wie man mit einiger Wahrscheinlichkeit vermuthen durfte, in den Braunkohlen von Artern eingemischt enthalten ist. -Ich habe es für angemessen gehalten, bei dieser Gelegenheit für den Namen Honigsteinsäure den weniger trivial klingenden und für Zusammensetzungen passendern Namen Mellithsäure (zusammengezogen aus $\mu \ell \lambda \iota$ und $\lambda \ell \vartheta \circ \varsigma$) vorzuschlagen, um so mehr, als auch in der Mineralogie von Vielen Mellith für Honigstein gebraucht wird.

Ich will einige Worte über die Säure selbst vorausschikken, da dadurch einige frühere Angaben berichtigt werden, die Zusammensetzung der krystallisirten Säure auch früherhin nicht bekannt gewesen ist. Die Zersetzung des Honigsteins geschieht bekanntlich am besten mit kohlensaurem Ammoniak. Selbstganze Krystalle lösen sich, schon bei gewöhnlicher Temperatur, unter Entwickelung von Kohlensäure und Zurücklassung von Thonerde, im Ammoniaksalz auf. Diese Thonerde behält in-

dessen nach dem Auswaschen und Trocknen kohlensaures Ammoniak in Verbindung zurück; sie enthält ausserdem eine kleine Menge durch das Ammoniaksalz nicht ausziehbarer Mellithsäur, ohne Zweisel in Gestalt eines sehr basischen Salzes. Löst ma sie in Salpetersäure auf und lässt die gesättigte, durch gelink Abdampfung concentrirte Lösung einige Tage stehen, so setzen sich daraus sehr kleine, aber sehr scharfe und glänzende, theis farblose, theils gelblich gefärbte Krystalle ab, die in Wasser ganz unlöslich sind. Sie enthalten keine Salpetersäure; beim Erhitzen verhalten sie sich vollkommen wie mellithsaure Thoserde. Die Analyse und die nähere Betrachtung ihrer Form zeigte, dass sie in der That nichts anderes sind als wieder gebildeter Honigstein $= Al_2O_3 + 3C_4O_3 + 18H_2O$. Sie sind theile Octaëder mit Abstumpfungen aller Ecken, theils Octaëder blos mit abgestumpften Grundecken, und oft mit so vergrösserter Abstumpfungssläche, dass daraus ganz die Form des Hyacinthe entsteht.

Das mellithsaure Ammoniak verliert schon beim Kochen seiner Auflösung Ammoniak und verwandelt sich in ein saure Salz. Hat man daher den Honigstein in der Siedehitze mit kohlensaurem Ammoniak zersetzt, so geschieht es leicht, dass die Auflösung saures Salz und dieses dann Thonerde aufgelöst enthält:, die bei der Darstellung des Blei- oder Silbersalzes in diese mit übergeht. Bei der Abscheidung aus diesen wird die Säure dann thonerdehaltig, was man um so cher übersieht, da sie dann besser zu krystallisiren scheint. Bei der Analyse gab sie in diesem unreinen Zustande fast doppelt so viel Wasser als die reine Säure. Man muss daher bei der Darstellung des Ammoniaksalzes dieses vor Allem thonerdefrei zu erhalten suchen, was man dadurch erreicht, dass man seine Auflösung, zur Entfernung des überschüssigen kohlensauren Ammoniaks, längere Zeit im Sieden erhält, dann wieder mit kaustischen Ammoniak sättigt, von der Thonerde abfiltrirt, das Salz krystallisiren lässt und durch wiederholtes Umkrystallisiren, jedesmal unter neuem Zusatz von Ammoniak, reinigt. — Das saure Ammoniaksalz ist viel leichter löslich als das neutrale; mischt man zu seiner concentrirten Lösung Ammoniak, so gesteht sie zu einem krystallinischen Magma von neutralem Salz.

Zur Isolirung der Säure bereitet man sich das Blei- oder

das Silbersalz. Ersteres zersetzt man durch Schweselwasserstoff, letzteres durch Chlorwasserstoffsäure, deren Ueberschuss sich von der Mellithsäure abdunsten lässt. Sie ist sehr leicht löslich und krystallisirt erst in sehr concentrirter Lösung in Gestalt einer aus sehr seinen Krystallnadeln verwebten seideglänzenden Masse. Sie ist lustbeständig, schmeckt stark sauer, schmilzt beim Erhitzen und verbrennt an der Lust mit leuchtender russender Flamme unter Verbreitung eines aromatischen Geruches und Zurücklassung von viel Kohle, die zuletzt ohne Rückstand verschwindet. In einem Destillationsgesässe erhitzt, versüchtigt sich ein Theil unzersetzt, das meiste aber wird zerstört.

Die krystallisirte Mellithsäure verliert beim Erhitzen bis gegen 200° kein Wasser. Sie enthält aber, wie die Analyse zeigte, 1 At. oder 15,66 p.C. basisches Wasser; sie ist also H_2 $O + C_4$ O_3 .

, 0,360 Gr. Säure gaben 0,552 Kohlensäure und 0,059 Wasser. Diess giebt folgende Zusammensetzung:

			Ber.	Gef.
4 At. Ko	blenstoff	305,74	42,5 8	42,38
3 - Sau	erstoff	300,00	41,76	41,24
1 - W	asser	112,48	15 ,66	16,38
		718,22	100,00	100,00.

Ich habe früher angegeben *), dass aus der Auslösung des neutralen mellithsauren Kali's durch Salpetersäure ein sehr schwer lösliches saures Salz gefällt werde, welches in unsymmetrischen sechsseitigen Prismen, an den Enden mit einer auf zwei Flächen des Prisma gerade aufgesetzten Zuschärfung, krystallisirt erhalten werden könne. Ich habe später gefunden, dass dieses Salz keineswegs das eigentliche saure Salz, sondern dass es, selbst nach wiederholtem Umkrystallisiren, eine constante Verbindung desselben mit einer bestimmten Proportion salpetersauren Kali's ist. Mit Schweselsäure entwickelt es Dämpse von Salpetersäure, beim Erhitzen bläht es sich ausserordentlich auf, indem es dabei, unabhängig vom Lustzutritt, ein Verglimmen

^{*)} Poggend. Ann. Bd. VII. S. 332.

214 Wöhler, üb. die Metamorphose des mellithsauren

zeigt. Bei 150° getrocknet, verlor es, ohne zu zerfallen, 7 p.C. Wasser.

In 3 Versuchen gab es 30,7 — 30,8 — 29,7 p.C. Kail. Mit Kupferoxyd verbrannt, gaben 2 Analysen 25,338 und 25,279 Kohlensäure und 11,38 und 12,25 Wasser. Hieraus lässt sich folgende Zusammensetzung berechnen:

		Ber.	Gef.
1 At.	salpetersaures Kali	13,2) = 30,7 Kali	30,4
4 -	zweifach-melliths. Kali	75,1 = 25,4 Kohlenstoff	25,3
10 -	Wasser	11,7	11,8
		100,0.	-

In der Wärme verliert das Salz 7 p.C. oder 6 At. Waser, die übrigen 4 Atome sind nicht ohne Zersetzung des Salzes abscheidbar. Seine Zusammensctzung kann also durch die Formel $KO, N_2O_5 + 4(KOM + H_2OM) + 6H_2O$ ausgedrückt werden. Es ist ein bemerkenswerther Umstand, dass es vorzugsweise salpetersaure Salze sind, welche die sonderbaren Verbindungen dieser Art hervorbringen; es gehören hierzu die Verbindungen von salpetersaurem Kali mit Kalium – Sulfowolframiat (Berzelius) und die von salpetersaurem Silber mit Cyanüren.

Das eigentliche zweisach-mellithsaure Kali ist ein Salz von ganz anderer Beschassenheit. Ich erhielt es durch unmittelbare Vereinigung der Säure mit Kali. Es ist viel leichter löslich als das eben beschriebene und bildet ansehnlich grosse durchsichtige Krystalle, die geschoben vierseitige Prismen sind, mit Abstumpfungen und zuweilen. auch Zuschärfungen der scharsen Seitenkanten und Abstumpfungen der Endkanten. Beim gelinden Erwärmen verliert es Wasser und wird milchweiss, ohne zu zersallen. Aus seiner Auflösung wird durch Salpetersäure das salpeterhaltige Salz gefällt.

100 Th. dieses Salzes, bis zu 180° erhitzt, gaben 17,98 Wasser.

0,347 Gr., durch Schwefelsäure zersetzt, gaben 0,154 schwefelsaures Kali, also 23,99 p.C. Kali.

0,524 gaben bei der Analyse mit Kupferoxyd 0,486 Kohlensäure, also 25,64 p.C. Kohlenstoff, entsprechend 51,06 Mellithsäure; ausserdem 23,85 p.C. Wasser.

Hiernach ist das Salz zweifach-mellithsaures Kali mit 5 At. asser und besteht nach der Rechnung aus:

			Gef.
1 At.	Kali	24,96	23,99
2 -	Mellithsäure	51,25	51,06
5 -	Wasser	23,79	23,85
		100,00.	

In der Wärme gehen daraus 4/5 des Wassers weg und es sibt 1 At. zurück, das sich erst bei der Zerstörung der Säure igt, das Salz ist also $(KO, \overline{M} + H_2O, \overline{M}) + 4H_2O$. Die Form dieses und des vorhergehenden Salzes verdienen wohl närtestimmt und mit einander verglichen zu werden; vielleicht hen beide dieselbe Form, und zwar die des Salpeters. Man unte das salpeterhaltige Salz als zweisach-mellithsaures Kalitrachten, worin das eine At. salpetersaure Kali ein Aequivativäre für 10 At. Krystallwasser.

Ich komme nun zu dem sehr merkwürdigen Verhalten des allithsauren Ammoniaks in höherer Temperatur. Bis zu 150° itzt, verliert dasselbe viel Ammoniak und Wasser und vermedelt sich in zwei neue stickstoffhaltige organische Körper, n denen der eine wenigstens entschieden eine Säure ist und saures Ammoniaksalz mit dem andern, der in Wasser ganz läche ist, gemengt zurückbleibt. Es ist diess, wie ich glaube, a erste Beispiel der Erzeugung einer stickstoffbaltigen organienen Säure aus dem Ammoniaksalze einer stickstofffreien.

Diese Umwandlung ist sehr leicht zu bewirken in einem Ibade, werin man das fein geriebene Salz, auf einer Porcellannale dünn ausgebreitet, mehrere Stunden lang und unter öfem Umrühren in einer Temperatur zwischen 150 und 160°
nält, oder so lange, als es noch nach Ammoniak riecht. Die nmoniakentbindung beginnt schon bei 100°. Uebersteigt die mperatur 160°, so entstehen secundäre Producte, die das Relat verwirren. Es ist auffallend, jedoch leicht erklärbar, dass e concentrirte Auflösung von mellithsaurem Ammoniak, in eir zugeschmolzenen starken Glasröhre mehrere Stunden lang hat bis zu 200° erhitzt, durchaus keine Veränderung erleidet.

Nach beendigter Zersetzung ist das Salz in ein blassgelbhes Pulver umgeändert. Von Wasser wird es in zweierlei bstanzen zerlegt, in einen weissen Körper, der ungelöst zu216 Wöhler, üb. die Metamorphose des mellithsauren

rückbleibt, und in ein Ammoniaksalz, das sich auflöst. Min bringt die Masse auf ein Filter, lässt die Lösung absiesen und wäscht dann den weissen Körper mit Hülfe der Waschsiasche so lange mit Wasser aus, bis das Durchlaufende nick mehr sauer reagirt. Es ist hierzu sehr langes Auswaschen erforderlich, und zwar mit kaltem Wasser, weil durch heises der weisse Körper, wenn auch nur sehr langsam, verändet wird. Die erhaltene Auflösung wird zur Trockne verdunste, wobei das neue Ammoniaksalz in Gestalt einer weissen, kann krystallinischen Masse zurückbleibt.

In Bezug auf die gleich anzugebenden Eigenschaften schlage ich für den weissen unlöslichen Körper, als einer Art von Amid, den Namen Paramid, und für die Säure im Ammoniaksalze den Namen Euchronsäure vor (von εύχροος, von schöner Farbe).

Das Paramid bildet im trocknen Zustande eine weise, ziemlich hart zusammengebackene Masse. An der Lust wird es allmählig gelblich, wahrscheinlich durch Einwirkung von Ammoniak. Es ist vollkommen geschmack - und geruchke. Mit Wasser gerieben, sieht es genau wie mit Wasser zerriebener weisser Thon aus, auch riecht es dann wie beseuch-Es ist unlöslich in Wasser, Alkohol, Salpetersäure und selbst in Königswasser. Von heisser Schwefelsian wird es aufgelöst, von Wasser wird es daraus wieder usverändert gefällt. Bei 200° verändert es sich nicht, es verliert kein Wasser. Beim stärkeren Erhitzen verkohlt es sich, entwickelt Cyanammonium und bildet ein Sublimat, welche theils tief blaugrün und halb geschmolzen ist, theils aus schwefelgelben Krystallnadeln besteht, die durch einen sehr bitten Geschmack ausgezeichnet sind. War bei der Bildung des Paramids die Temperatur zu hoch gestiegen, so enthält es nachher von diesem bittern Körper eingemengt, der sich nicht mit Sicherheit davon trennen lässt. - Es war leicht zu finden, das das Paramid nicht Oxamid war.

Mit vielem Wasser Tage lang gekocht, löst sich das Paramid nach und nach auf. Die Auflösung ist sauer und histerlässt nach dem Verdunsten ein neu gebildetes Ammoniaksalz. Diese Umwandlung geht mit der grössten Leichtigkeit vor sich, wenn man Wasser bei einer Temperatur von unge-

fähr 200° in einem zugeschmolzenen Glasrohre auf das Paramid einwirken lässt. Man erhält eine sehr saure Auflösung, die nichts anderes enthält, als saures mellithsaures Ammoniak.

Hieraus ging hervor, dass zwischen dem Paramid und dem mellithsauren Ammoniak eine ähnliche Beziehung in der Zusammensetzung bestehen müsse, wie zwischen den Amiden und den correspondirenden Ammoniaksalzen. Es konnte dadurch entstanden sein, dass von 2 Atomen mellithsaurem Ammonium-oxyd $= C_8 H_{16} N_4 O_8$, 1 Aeq. Ammoniak und 4 Aeq. Wasser, d. h. noch einmal so viel als das Salz gebildet enthält, weggegangen waren. Der Rest ist dann $C_8 H_2 N_2 O_4$. Die Analysen haben gezeigt, dass diess in der That die Zusammensetzung des Paramids ist, obgleich diese Erklärung seiner Bildung, da nie die zugleich entstehende Euchronsäure unberücksichtigt lässt, nicht ganz exact ist und es nur unter der Voraussetzung sein konnte, dass Euchronsäure und Paramid gleiche Zusammensezzung hätten.

I.	0,374	Paramid	gaben	5	0,683	Kohlensäure,	•
				•	0,052	Wasser.	
TT	0,366			5	0,680	Kohlensäure,	
11.	0,000			Į	0,064	Kohlensäure, Wasser.	
TIT	0,372			(0,695	Kohlensäure,	
111.	U,UIR			Į	0,050	Kohlensäure, Wasser.	

Bei einer qualitativen Stickstoffbestimmung wurden Stickgas und Kohlensäuregas genau in dem Verhältniss von 1:8 erhalten. Diese Data geben folgende Zusammensetzung:

		Berechnet.	I.	II.	III.
8	At. Kohlenstof	50,916	50,48	51,37	51,65
2	- Wasserstof	f 1,03 9	1,54	1,93	1,49
2	- Stickstoff	14,740	•		
4	- Sauerstoff	33,305			
	-	100,000.			

Die wichtigste Controle für die Richtigkeit dieser Zusammensetzung war das Verhalten zu Wasser; war sie richtig,
so musste es gerade auf verwandelt werden in zweisach. mellithsaures Ammoniak. Der Versuch hat gezeigt, dass diess in
der That der Fall ist. Bei der Einwirkung von Wasser treten
zu 1 At. Paramid die Elemente von 2 At. Wasser und bilden

damit 1 Aeq. Ammoniak und 2 At. Mellitbsäure. Diess geschieht jedoch nur mit Wasser von 200°. Bei 100° geht dien Umwandlung nicht allein sehr langsam, sondern auch nur putiell vor sich, und es bildet sich zugleich euchronsaures Anmoniak, welches sich dann bei dieser Temperatur unveränder erhält. Es war vorauszusehen, dass die Alkalien dieselbe Vawandlung veranlassen würden; indessen geschieht sie durch diese ebenfalls nicht augenblicklich, sondern das Paramid schein sich anfangs, oder wenn kein Ueberschuss von Base vorhande ist, unverändert damit zu verbinden. Denn übergieset man Polver von Paramid mit Kali oder Ammoniak, so verändert essgleich sein Ansehen, es wird voluminös, flockig und löst seh dann bei Zusatz von Wasser auf. Aus dieser Auflösung wid durch Salzsäure, wenn man sie sogleich zumischt, unter michiger Trübung der Flüssigkeit, ein weisses, unkrystallinisches Pulver gefällt, welches unverändertes Paramid ist. Lässt mas aber die Auslösung in Kali eine Zeit lang stehen, so fängt se an Ammoniak zu entwickeln, und von Säuren wird sie dann nickt mehr getrübt. Dagegen zeigt sie nun die eigenthümlichen Reactionen der Euchronsäure. Aber auch diese gehen bald vorüber und dann findet man in der Auflösung nur Mellithsäure. In der Wärme geht diese Umwandlung augenblicklich vor sich. Bei Anwendung von Ammoniak jedoch scheint die Verwandlung in Mellithsäure nur partiell vor sich zu gehen und de Theil des euchronsauren Ammoniaks sich unverändert zu erhalten. - Mit der so wieder gebildeten Mellithsäure wurden das krystallisirte Ammoniaksalz und das Silbersalz dargestellt, letzteres analysirt und die Säure daraus abgeschieden.

Es' war möglich, dass das Paramid gebundenes Wasser enthielt, dass es also eigentlich ein wasserstofffreier Körper wäre $= C_8 \, N_2 \, O_3 + H_2 \, O$. Zur Beantwortung dieser Frage wurde in sehr verdünntes kaustisches Ammoniak Paramid, und die Bildung von Euchronsäure möglichst zu verhüten, auf einmal in grossem Ueberschuss geschüttet, die Auflösung von den Ungelösten absiltrirt und mit salpetersaurem Silberoxyd vermischt. Es entstand ein sehr voluminöser schleimiger Niederschlag, der nach dem Auswaschen und Trocknen gelbliche Stücke bildete. Bei 150° getrocknet, wurde diese Verbindung rein gelb und gab nach dem Verbrennen 51,32° p. C. Silber = 55,01 Silber-

yd. Diess giebt für das Paramid das Atomgewicht = 1187 las berechnete = 1201). Wäre 1 At. Wasser weggegann, so würde das Atomgewicht zu 1088,5 ausgefallen sein.

0,571 dieser Verbindung gaben 0,476 Kohlensäure und 042 Wasser, d. h. der an das Silberoxyd gebundene Körper thielt 51,22 p. C. Kohlenstoff und 1,81 Wasserstoff.

Wird die Silberverbindung bis zu 200° erhitzt, so wird rein braun, verliert noch an Gewicht, es geht aber kein asser, sondern Ammoniak weg. Sie hinterlässt dann 52,74 C. Silber. Erhitzt man sie bis zum Glühen, so zersetzt sie h ganz ruhig, indem sie sich schwärzt und Blausäure entckelt. Diess zeigt, dass bei keiner Temperatur der Wasstoff ohne die gänzliche Zerstörung des Paramids ausgeschien werden kann.

Euchronsäure. Es wurde erwähnt, dass die Masse, die h dem Erhitzen des mellithsauren Ammoniaks bis zu 150° fickbleibt, durch Wasser in Paramid und in ein lösliches moniaksalz zerlegt wird. Diescs Salz ist saures euchrontes Ammoniak. War die Zersetzung nicht vollständig, so hält es saures mellithsaures Ammoniak; war die Temperatur ver gestiegen, so ist es gelb und enthält den gelben bittern sper. Es setzt sich in kaum krystallinischen weissen Rinab, ist in kaltem Wasser nur wenig und nur sehr langabilich und reagirt stark sauer.

Um die Säure daraus abzuscheiden, löst man es in der insten nöthigen Menge siedenden Wassers auf und vermischt se Lösung, noch heiss, mit Salzsäure oder Salpetersäure. wie sie um einige Grade abgekühlt ist, fängt die Säure an, h in Gestalt eines weissen krystallinischen Pulvers abzuschein; nach dem völligen Erkalten bleibt nur sehr wenig aufget. Man reinigt sie durch Umkrystallisiren aus siedend heism Wasser; durch sehr langsames Erkalten dieser Lösung nn sie in kleinen, aber bestimmbaren Krystallen erhalten wern. Durch Essigsäure wird das Ammoniaksalz nicht zersetzt. Die Euchronsäure krystallisirt in sehr niedrigen, geschonvierseitigen Prismen, die mehrentheils auf eigenthümliche eise zu Zwillingen verwachsen sind. Sie ist sehr sehwer lich, reagirt aber stark sauer und schmeckt ungefähr wie emor tartari. In der Wärme verlieren die Krystalle Wasser

220 Wöhler, üb. die Metamorphose des mellithsauen

und werden undurchsichtig, ohne zu zerfallen. Sie scheint ich ungleichen Temperaturen gerade Bruchtheile vom ganzen Wusergehalte zu verlieren; zuweilen erhält man sie in gelbliche grösseren Krystallen, die auch in der Form von den farblom verschieden zu sein scheinen. Aber dann findet man stets Spren von Ammoniak darin, und es sieht fast aus, als ob sie ich der Krystallisation aus einer salmiakhaltigen Flüssigkeit der Salmiak theilweise zersetzen könne. Bei 200° verliert sie alle Wasser, welches sie ohne Zersetzung abgeben kann.

 0,462
 Euchronsäure gaben 0,050
 Wasser = 10,82 p.C.

 0,174
 —
 —
 0,018
 —
 = 10,34
 —

 0,386
 —
 —
 0,042
 —
 = 10,88
 —

 0,203
 —
 —
 0,021
 —
 = 10,84
 —

Die berechnete Wassermenge, die sie bei 200° verliet, ist 10,49 p.C. und beträgt 2 Atome.

Sie lässt sich dann bis zu wenigstens 280° erhitzen, ohn weitere Veränderung. Weiter erhitzt, schmilzt sie unter Kechen und Zersetzung, indem sich, wie beim Paramid, Cynammonium und ein tief grünes, bitter schmeckendes Sublimit bilden. In ihrer Auflösung in Wasser wird sie bei der Siedehten nicht verändert, eben so wenig durch Salzsäure oder Salpetersäum. Erhitzt man aber krystallisirte Euchronsäure mit einer zu ihrer Auflösung lange nicht hinreichenden Menge Wassers in einem zugeschmolzenen Glasrohre bis zu 200°, so löst sie sich vollstädig auf, ohne sich beim Erkalten abzusetzen, denn sie ist mein saures mellithsaures Ammoniak verwandelt.

Unter allen bekannten organischen Körpern ist die Euchrosäure durch ihr merkwürdiges Verbalten zu metallischem Ziek ausgezeichnet. Sie wird dadurch in einen tief blauen Körper umgeändert, der sich aus der aufgelösten Säure auf das Zhk niederschlägt. Stellt man das blanke Metall in eine Auflösung von Euchronsäure, so färbt sich seine Oberstäche augenblicklich prächtig blau. Die Farbe ist so intensiv, dass sich die geringste Spur von Euchronsäure zu erkennen giebt, wenn man einen Tropfen der zu prüfenden Flüssigkeit auf blankes Zink bringt Der blaue Körper löst sich nicht von selbst vom Metall ab, auch nicht, wenn man es in eine im Sieden besindliche Auslösung stellt. In diesem Falle nimmt der blaue Ueberzug nach und nach eine so intensive Farbe an, dass er schwarz aussieh,

1.

jedoch mit einem deutlichen Scheine in's Rothe, ungefähr wie Indigo. Taucht man nachher das Zink einen Augenblick in gehr verdünnte Salzsäure, so löst sich der blaue Körper ab; man kann ihn nun abfiltriren, auswaschen und trocknen. bildet eine schwarze Masse, die kein Zink enthält. Beim gelindesten Erwärmen, selbst auf Papier, wird er augenblicklich durch und durch weiss und ist dann wieder in Euchronsäure yerwandelt. Er verhält sich also vollkommen so, wie es Berselius beim farblosen Indigo entdeckt hat, nur umgekehrt in Bezug auf die Farbe. Dieses Verhalten der Euchronsäure sieht demnach ganz wie ein Reductionsprocess aus, und der blaue Körper kann entweder eine niedrigere Oxydationsstufe des Radicals dieser Säure, oder ihr Radical selbst sein. In der letzteren Voraussetzung schlage ich dafür den Namen Euchron or, der auch passend sein würde, wenn sich eine dritte Verauthung hinsichtlich seiner Natur als die richtigere erweisen bilte, wenn er nämlich eine neu gebildete Wasserstoffverbindung Fare. Zu meinem grössten Bedauern war es mir, aus ganzichem Mangel an Material, unmöglich, weitere Untersuchunren über das Verhalten und die Natur des Euchrons vorzunehhen, welches, wie man sieht, Verhältnisse von theoretischer Wichtigkeit darzubieten verspricht. Nur sein ausgezeichnetes Verhalten zu Alkalien kann ich noch angeben. In Ammoniak, wie in kaustischem Kali, löst es sich mit der prachtvollsten Purpurfarbe auf, die an Intensität und Schönheit die vom übermangansauren Kali oder vom Murexid noch zu übertreffen scheint. Aber in dieser Auflösung ist es in Berührung mit der Luft so leicht veränderlich, dass die Flüssigkeit sogleich mafängt, sich von der Obersläche an zu entfärben, und dass hinreicht, sie zu bewegen oder sie auszugiessen, um sie wollkommen farblos zu machen. - Lässt man Platin, in galvanischer Combination mit Zink, in eine Auflösung von Euchronmaure tauchen, so scheint die Bildung des Euchrons nicht vor sich zu gehen; sie tritt aber augenblicklich ein und giebt sich durch die Purpursarbe am Platin zu erkennen, sobald man die Saure mit Ammoniak sättigt.

Eine andere Bildungsweise des Euchrons findet durch Eizenoxydulsalze statt. Vermischt man Eisenchlorürlösung mit aufgelöster freier Euchronsäure, so wird diese nicht verändert;

222 Wöhler, üb. die Metamorphose des mellithsaura

fügt man aber dann ein Alkali hinzu, so entsteht ein volumnöser, tief veilchenblauer Niederschlag von grosser Schönde
der Farbe. Man kann ihn nicht unverändert abfiltriren; sowie
er an die Luft kommt, nimmt er die Farbe von Eisenoxydhydrat an. In Salzsäure ist er ohne Farbe vollständig löslich,
Manganchlorür und Zinnchlorür zeigen keine ähnliche Wirkung.
Ich habe bereits angeführt, dass das Paramid, in Alkalien aufgelöst, im ersten Augenblicke die Reactionen der Euchronsium
zeigt; es giebt mit Zink Purpur und mit Eisenchlorür die velchenblaue Verbindung. Lässt man die Auflösung in Kali ein
Zeit lang stehen oder erhitzt sie, so kommen diese Reactionen
nicht mehr zum Vorschein; die aus dem Paramid anfängtig
gebildete Euchronsäure ist dann unter Ammoniakbildung in Melithsäure übergegangen.

Es ist hervorzuheben, dass sich bei der Bildung des Eschrons durch Einwirkung von Zink auf die siedende Lösung der Euchronsäure ein Gas (Wasserstoffgas oder Ammoniakgus), jedoch in kaum bemerkbarer Menge, entwickelt. Dass es frei wird, ist gewiss nur eine secundäre Erscheinung, die vielleick mit dem Umstande zusammenhängt, dass sich zugleich in der Flüssigkeit eine kleine Menge eines weissen Pulvers niederschlägt, welches mellithsaures Zinkoxyd zu sein scheint; wenigstens enthält es Zinkoxyd und riecht beim Erhitzen aroustisch wie ein mellithsaures Salz.

Wenn es mir unmöglich war, die Vorgänge bei diese Erscheinungen genauer zu erklären, so ist es mir wenigste gelungen, wie ich glaube, die Zusammensetzung der Euchresäure festzustellen. Die Bestimmung derselben war vor Alles von Wichtigkeit, weil sie den Schlüssel zur exacten Erklärung ihrer Bildung enthielt. Es wurde bereits erwähnt, dass sie sich mit Wasser von 200° in Mellithsäure und Ammoniak verwandelt.

Da das Paramid dieselbe Metamorphose erleidet, so mussie in der Zusammensetzung zwischen beiden Körpern eine einfache Beziehung obwalten; sie mussten entweder isomerisch sein und beide dann dieselben Quantitäten von Mellithsäure und Ammoniak hervorbringen, oder die relativen Quantitäten beider Producte mussten ungleich sein. Ohne diese Controle wäre mir bei den geringen Mengen, die mir zur Untersuchung

ebote standen, unmöglich gewesen, die Zusammensetzung mit 'ahrscheinlichkeit auszumitteln.

Zur Bestimmung des Atomgewichtes der Euchronsäure urden das Silbersalz und das Bleisalz dargestellt.

Das Silbersalz ist ein blass schwefelgelbes, schweres Pul-#, welches aus einer verdünnten Auflösung von salpetersaum Silberoxyd durch freie Euchronsäure gefällt wird. Anfangs st sich der Niederschlag beim Umschütteln wieder auf; aus tem solchen wieder klar gewordenen Gemische setzt sich aber in das Silbersalz beim Erkalten ab. Es ist bemerkenswerth, as sich dieses Salz nicht in Ammoniak auflöst; es wird aber durch verändert und farblos und schlämmt sich dann so auf, ss beim Filtriren der grösste Theil durch das Papier geht. elleicht enthält es nun einen andern Körper; jedenfalls ent-It es aber nach dieser Einwirkung des Ammoniaks noch ber. Hat man zu einer siedend heissen Euchronsäurelösung r so lange tropfenweise eine neutrale Silberlösung gemischt, noch Trübung erfolgt, filtrirt dann und mischt zu der Flüskeit tropfenweise Ammoniak, so erhält man einen höchst voninösen schleimigen Niederschlag, der sich kaum abfiltriren ist und beim Auswaschen, wobei das Wasser höchst langsam rehgeht, sich theilweise wieder auflöst. Es scheint dieselbe zbindung zu sein. - Salzsäure scheidet aus dem euchroniren Silber die Euchronsäure wieder mit allen ihren Eigennaften ab. Beim Erhitzen zersetzt sich dieses Salz ruhig, er Abscheidung von viel Kohle und Entwickelung eines mit milicher Flamme brennenden Gases, das anfänglich aromash, wie verbrennende Mellithsäure, nachher wie Cyansäure cht. Nach Verbrennung der Kohle bleibt das Silber ziemh fest zusammengesintert zurück.

0,342 Gr. euchronsaures Silberoxyd, bei 170° getrocknet, ben 0,198 Silber = 62,17 p.C. Silberoxyd.

0,396 Gr. euchronsaures Silberoxyd, bei 150° getrocknet, ben 0,2985 Chlorsilber = 60,95 p.C. Silberoxyd.

0,393 Gr. euchronsaures Silberoxyd, bei 200° getrocknet, ben 0,230 Silber = 62,85 p.C. Silberoxyd.

Nimmt man die letzte Zahl, = 62,85, als die richtigste in dem Salze 1 At. Silberoxyd an, so wird hiernach das omgewicht der Euchronsäure = 858. Die zweite giebt 930.

224 Wöhler, üb. die Metamorphose des mellithsauren

0,758 Silbersalz, bei 160° getrocknet, gaben, mit Kupferoxyd verbrannt, 0,558 Kohlensäure und 0,013 Wasser. Dies beträgt 20,23 p.C. Kohlenstoff und 0,189 p.C. Wasserstoff (oder 1,71 p.C. Wasser) und zeigt, dass im Silbersalz auf 1 Atos Silber 6 At. Kohlenstoff enthalten sein müssen.

Das Bleisalz wurde durch Vermischen einer siedend heisen Lösung von Euchronsäure mit einer verdünnten Lösung von neutralem essigsaurem Bleioxyd erhaiten. Das Salz setzt sich erst beim Erkalten in mikroskopischen gelben Krystallen ab, die ein lebhaft gelbes Pulver bilden. Wird die abgegossene Flüsigkeit bis zum starken Sieden erhitzt, so trübt sie sich und setzt einen schweren weissen Niederschlag ab, der mellithsmeres Bleioxyd ist. Das Bleioxyd wirkt also hier wie die Alkalica.

0,220 euchronsaures Bleioxyd verloren nach dem Erhitzen bis zu 160° 0,025 Wasser = 11,36 p.C.

0,195 wasserfreies Salz gaben nach dem Verbrennen 0,0827 Bleioxyd oder 42,41 p.C. Diess giebt 1893 oder ungefähr ein doppelt so hohes Atomgewicht, als das Silbersalz gab, und zeigt, dass entweder letzteres 2 At. Silberoxyd, oder das Bieisalz af 1 At. Base 2 At. Säure enthält.

Erst nachdem diese Bestimmungen gemacht waren, fast lich, dass beide Salze, die ich nach dem Erhitzen bis zu 150 bis 160° für wasserfrei hielt, in der That noch Wasser enthalten, welches erst bei einer Temperatur weggeht, wobei die Säure selbst zersetzt zu werden anfängt. Es mangelte mir manber an Material, um die Analysen mit Rücksicht hierauf sawiederholen. Nur beim Silbersalz hatte ich zuletzt gefunden, dass 0,4015 Gr., bereits bei 150° getrocknet, bei 200° nech 0,0085 oder 2,11 p.C. Wasser verloren. Der nach der gleich anzugebenden Formel berechnete Wassergehalt beträgt 2,38, woraus hervorgeht, dass schon bei 150° das Salz angefangen hatte, Wasser zu verlieren. Hieraus sind die Differenzen in der obigen Analysen des ungleichen Temperaturen ausgesetzten Silbersalzes erklärlich.

Die Analyse der freien, zuvor bis zu 200° erhitzten Kuchronsäure gab folgende Resultate:

III. 0,313 gaben { 0,547 Kohlensäure = 48,32 p.C. Kohlenstoff, 0,040 Wasser = 1,41 — Wasserstoff.

Bei einer Stickstoffbestimmung, die nur einmal, und zwar mit einer gelben, also wahrscheinlich ammoniakhaltigen Säure zemacht und die auch sonst nicht ganz tadellos ausgeführt wurde, gaben 0,202 Säure 17,49 C. C. Stickgas bei 0°, also **40,98** p.C. Stickstoff.

Diese Resultate scheinen mir, wenn man dabei die Bilungsweise der Euchronsäure und ihr Verhalten zu Wasser bei $\mathbf{00^{\circ}}$ in Betracht zieht, nur mit der Zusammensetzung $\mathbf{=C_{12}}$ **0** vereinbar zu sein.

Ihr Atomgewicht ist dann = 1694,29. Das aus dem Bleialz abgeleitete Atomgewicht, wenn man 1 At. Wasser abzieht, = 1781, das aus dem bei 150° getrockneten Silbersalz beechnete, wenn man es verdoppelt und 1 At. Wasser abzieht, 1747: Ich habe schon oben den Grund der mangelnden Missern Uebereinstimmung angegeben. Er gilt auch für die 1 p.C. Wasser, die bei der Analyse des Silbersalzes mit Missipreroxyd erhalten wurden.

Das wasserfreie Silbersalz ist dann 2 Ag O + C 12 N 2 O 8, wasserhaltige = $2AgO + C_{12}N_2O_6 + H_2O$ und enthält 2,38

Wasser. Das bei 150° getrocknete Bleisalz ist Pb O, C₁₂ N₂ O₆ + und enthält nach der Rechnung: 43,56 p.C. Bleioxyd: Die Nach den Rechnung verliert es beim Tehitzen 4/5 des Wassers oder 112,32 p.C.: Der Versuch gab **36.** 36.

Die bis 200° erhäzte Euchtensäure ist = $2H_2O+O_{12}N_2O_6$, **Ne krystal**lisirte enthält ausserdem noch 2-At. Wasser, die **beim** Erhitzen weggehen und whelt der Beehnung 10,48 betrazen. Das Mittel von vier Versuchen gab 19,59. - -

Hiernach erhält man dann folgende Zusammensetzungen *):

^{*)} In dem in den Göttingischen gelehrten Anzeigen; Nr. 5. 1811, enthaltenen Atidrnck dieser Abhaudlung ist die Zusammensetzung der - Encaronsäure, anders als hier berechnet. Ich muss daher bemerken, das die obigen Angaben, die sich auf neuere Versuche gründen, als de richtigen und allein gültigen zu betrachten sind.

226 Wöhler, üb. die Metamorphose des mellithsaun

Das wasserfreie Silbersalz.

		Ber	Gef.
9 Ag (2903,22	63,14	62,85
C ₁₂	= 917,25	19,95	20,23
N ₂	= 177,04		
06	= 600,00		
	4597,51.		

Euchronsäure, bis zu 200° erhitzt = $2H_2O + C_{12}N_2O_6$ Ber. Gef.

						GCI.	
12	At.	Kohlenstoff	917,25	47,79	1. 48,96	11. 48,70	11I. 48,31
2	-	Stickstoff	177,04	9,23	_	<u> </u>	10,98
6	-	Sauerstoff	600,00	31,26	-	-	27,93
2	-	Wasser	224,96	11,72	15,81	13,70	12,77
			1919,25	100,00			100,00

Das am meisten abweichende Resultat der Analyse Lv dient am wenigsten Vertrauen, weil dazu eine gelbliche, s jedenfalls nicht vollkommen reine Euchronsäure angewandt wu

Das euchronsaure Ammoniak, wie es nach dem Erhit des mellithsauren Ammoniaks erhalten wird, müsste dann was scheinlich nach der Formel N_2H_6 , H_2O+H_2O , $C_{12}N_2O_6$ was mengesetzt sein. Ich habe es analysirt, nach dem Erhitzen zu 200°, wobei es sich nicht verändert.

0,308 gaben { 0,486 Kohlensäure = 43,6% p.C. Kohlenstel 0,081 Wasser = 2,91 — Wasserstel Nach der Bechnung enthält es:

				Ber.	Gef.
13	At.	Kohlenstoff	917,22	42,98	43,62
10	•	Wasserstoff	62,39	2,92	2,91
4	•	Stickstoff	354,08	·	•
8	-	Sauerstoff	800,00		•
			2183,69.		

Die berechnete Zusammensetzung der wasserfreien Kuchnaure ist:

12	At.	Kohlenstoff	917,32	, 54,138
2		Stickstoff	177,04	10,449
6	_	Sauerstoff	600,00	35,413
			1694,26	100,000.

Die Zersetzung des mellithsauren Ammoniaks in höherer Temperatur besteht dann darin, dass aus 7 At. des Salzes entstehen:

2 At. Paramid =
$$C_{16}H_4 N_4 O_8$$

1 - Euchronsäure = $C_{12} N_2 O_6$
4 - Ammoniak = $H_{24}N_8$
14 - Wasser = $H_{28} O_{14}$

7 At. melliths. Ammoniak = $C_{28}H_{56}N_{14}O_{28}$.

Bei der Umwandlung der Euchronsäure mit Wasser von 200° in Mellithsäure und Ammoniak metamorphosirt sich 1 At. Säure mit 3 At. Wasser (= $C_{12} H_6 N_2 O_9$) zu 3 At. Mellithsäure und 1 Aeq. Ammoniak.

3 At. Mellithsäure =
$$C_{13}$$
 O_9
1 - Ammoniak = H_6N_2
 $C_{12}H_6N_2O_9$.

Bei derselben Umwandlung des Paramids bilden die Elemente von 1 At. Paramid und von 2 At. Wasser ($\stackrel{\sim}{=}$ C₈H₆N₂O₆) 2 At. Mellithsäure und 1 Aeq. Ammoniak.

2 At. Mellithsäure
$$= C_8 O_6$$

1 - Ammoniak $= H_6N_2$
 $C_8H_6N_2O_6$.

Auch stellt sich noch die andere Zusammensetzungsbeziehung zwischen Paramid und Euchronsäure heraus, dass nämlich 3 At. Paramid, $= C_{24}H_6N_6O_{12}$, die Elemente von 2 At. Euchronsäure und 1 Aeq. Ammoniak enthalten, gleichsam als ob Paramid zweifach – euchronsaures Ammoniumoxyd gewesen wäre, welches 2 At. Wasser verloren hätte.

Es ist wahrscheinlich, dass Paramid und Euchronsäure, für sich der Einwirkung einer begrenzten höhern Temperatur ausgesetzt, ebenfalls wieder neue und merkwürdige Verwandlungsproducte erzeugen werden. Immer, wenn man mellithsures Ammoniak, oder Paramid, oder Euchronsäure bis zur Zerstörung erhitzt, erhält man ein tief grünes Sublimat und einen gelben krystallinischen bittern Körper. Ehe ich die öben beschriebene einfache Metamorphose des mellithsauren Ammoniaks bet 150° beobachtet hatte, unterwarf ich eine Portion des Salzes in einer Retorte der trocknen Destillation, in sinem Metallbade bei einer Temperatur zwischen 300 und 350°. In die Vorlage ging Wasser und Ammoniak, theils freies, theils koh-

\$28 Berzelius, üb: verschiedene Gegenstände

lensaures, über, und im Gewölbe der Retorte bildet sich ein blaugrünes, halbgeschmolzenes und in viel kleinerer Menge en weisses, wollig krystallinisches Sublimat. Die Masse in der Retorte war verkohlt. Als sie nut Wasser behandelt wurde, konnte man darin grünlich-gelbe, sehr glänzende Krystallnadela unterscheiden, die aber von der übrigen Masse nicht mechanisch Beim Verdunsten hinterliess das Wasser zu trennen waren. eine kleine Menge eines sauren Rückstandes. Die ganze Masse in der Retorte wurde mit verdünntem Ammoniak digerirt, womit eine dunkel-blaugrüne Auflösung entstand. Beim Erkalten schieden sich daraus feine weisse Blättchen, jedoch nur in geringer Menge ab, die nach dem Abfiltriren und Trocknen eine weisse schimmernde Masse bildeten. Diese verflüchtigte sich ohne Zersetzung zu einem wolligen Sublimat. - Die dunkelgrüne Lösung in Ammoniak, woraus sich diese Substanz abgesetzt hatte, gab bei der Sättigung mit Salzsäure einen dunkel-blaugrünen, sich leicht aufschlämmenden, schwer auswaschbare Niederschlag. Der Menge nach schien er das wesentlichste Zersetzungsproduct zu sein. Nach dem Trocknen bildete er eine glänzende schwarze, sich leicht zerbröckelnde Masse, die bein Zerreiben ein dunkelgrünes Pulver gab. Beim Erhitzen scheint sie nichts anderes als Kohle und Cyanammonium zu geben. Am der von diesem Körper abfiltrirten Flüssigkeit setzten sich bak nachher kleine gelbe Krystalle ab, die ohne Zweifel mit der anfangs in der destillirten Masse beobachteten Krystallnaden identisch und wahrscheinlich derselbe bittere-Körper waren, der man nach zu starkem Erhitzen dem Paramld beigemengt findet.

XX.

Ueber verschiedene Gegenstände der neueren Chemie.

(Aus einem Schreiben des Freih. v. Berzelius an Erdmann, von 9. April 1841.)

Für die neue, höchst interessante Mittheilung der fortgesetzten Versuche über die Metamorphose des Indigo's mit Chlor#)

^{*)} D. Journ. XXII. 257.

bin ich Ihnen sehr dankbar und habe sie für meinen Jahresbe-Besonders haben mich dabei die beiden sauren richt benutzt. Körper, die Chloranilsäure und das C₁₂Cl₁₀ interessirt. zine ganz neue Art von Verbindung, in welcher ein Chlorid als Säure auftritt und sich mit oxydirten Basen verbindet. Wenn wir die vormals sogenannten salzsauren Salze ausnehmen, existirt kein anderes Beispiel davon, und diese basischen Salze sind doch anderer Art. Die sogenannte Xanthogensäure giebt für Schwefelkohlenstoff ein analoges Beispiel. Wie in dieser der elektro-negative Bestandtheil der Säure Schwefel ist, so ist er in den von Ihnen entdeckten Chlor. Offenbar ist die Chloranilsaure ein saures Chlorid eines Kohlenwasserstoffes und die Verbindung C₁₂Cl₁₀ ein saures Chlorid des Kohlenstoffes. Auch die Zusammensetzung dieses Chlorids ist von dem böchsten Interesse, indem dieser Körper viele Atome von jedem Bestandtheil enthält, so wie die Krokonsäure, die Mesoxalsäure, die Honigsteinsäure, die Rhodizinsäure. Es offenbart sich hier in dem Beiche der Metamorphosen eine Zusammensetzungsart, die weder in der rein organischen, noch in der unorganischen Che-·mie gewöhnlich ist, wo nämlich viele Atome des positiven Elements mit vielen Atomen des stark negativen Elements sich zu einem einzigen, gar nicht indisserenten zusammengesetzten Atom verbinden. Es ist wohl nicht mit einem gesunden und nüchternen Urtheil vereinbar, in der Verbindung C₁₂Cl₁₀ einen Theil des Chlors als Bestandtheil des zusammengesetzten Radicals zu betrachten, um aus dem andern Theile das elektro-negative Klement zu machen. Es scheint mir, dass solche Schlüsse nicht nur ganz arbiträr sind, sondern sogar widersinnig. Wenn daber $C_{12}H_4Cl_6$ und $C_{12}Cl_{10}$ in Krystallform und äusseren Eigenschaften nahe übereinkommen, so lässt sich dieses sogar a priori aus den Kopp'schen und Ammermüller'schen Speculationen über gleiche Atomvolumina herleiten und beruht auf einem ganz gleichen Bau von gleichgestalteten Materialien, was mit der specifischen chemischen Natur nichts zu thun hat. dieser Hinsicht giebt Ihre Entdeckung dieser beiden Verbindungen uns einen neuen Stützpunct, an welchen wir uns fest- ' halten können in diesem chaotischen Meere der organischen Chemie, diesen Metamorphosen, die uns doch einmal das Räthsel der organischen Zusammensetzung enthüllen werden.

330 Berzelius, üb. verschiedene Gegenstände

Es ist Plantamour geglückt, das Stickstoffquecksiber darzustellen, welches Mitscherlich nicht gelingen wolke. Es ist ein fürchterliches Knallpräparat, das dem Jodstickstofi der Hestigkeit seiner Explosion nicht nachsteht, ist aber bi weitem nicht so empfindlich. Es ist ein dunkelbraunes Pulva, das sowohl durch Hitze, etwa über 200°, als durch Schlag mit Feuererscheinung explodirt. Mit Kupferoxyd nach Art einer erganischen Analyse zerlegt, giebt es kein Wasser, sondern bie Stickstoff und Quecksilber. Der eigentliche Kntdecker der Stick stoffmetalle ist aber Schrötter in Gratz, der mir schon in vorigen Sommer ein detonirendes Stickstoffkupfer zusandte ud mehrere Stickstoffmetalle, z. B. die Stickstoffverbindungen des Eisens, Nickels, Kobalts u. s. w., beschrieb. Das nach Liebig's Methode hergestellte Chrom soll nach ihm eine Amidvabindung enthalten.

Plantamour hat von Regnault's Speculation Verschassung genommen, das Uran zu untersuchen, um zu finden, das durch Wasserstoff hergestellte Uran nicht eine niedrigen Oxydationsstufe, etwa wie die des Vanadiums, sein könnte. Et hat sich aber gezeigt, dass Kalium es nicht verändert; es läst sich davon abdestilliren, indem nur wenig vom Uran gebunde in der Glühhitze zurückbleibt, welches sich nachher mit Wasserstoffentbindung durch Wasser entziehen lässt, indem das feizertheilte Uran als gelbbraunes Pulver abgeschieden wird. De specifische Wärme des Urans macht daher eine Ausnahme welcher Regel, eben so wie der Kohlenstoff und der Diamant, zur aber in entgegengesetzter Richtung. Vielleicht werden auch Bor und Silicium das Nämliche thun.

Wenn man der Reiset'schen Base eine rationelle Formi zu geben versucht, so scheint sie mir die Natur der vegetallischen Salzbasen zu enthüllen. Diese Base im krystallisischen Zustande ist PtNH3+NH4, es ist Ammoniumoxyd, mit Phtinoxydulammoniak (um mich der Gerhardt'schen Expression zu bedienen) copulirt, und dieses Ammoniumoxyd ist das kautisch Alkalische, das Basische darin, was sich mit den Säure verbindet; das Platinoxydul-Ammoniak ist die Copula, die der Basis in die Verbindungen folgt. Die Gros'sche Basis ist von der nämlichen Art, hat aber, wenn anders der Wasserstoffghalt zuverlässig ausgemittelt ist, Platinchlorür-Amid zur Co-

pula = Pt Cl N H2. Die vegetabilischen Salzbasen sind also Ammoniak, copulirt entweder mit einem organischen, nicht stickstoffhaltigen Oxyd, oder, wenn der Stickstoffgehalt die Sättigungscapacität übersteigt, entweder mit einem stickstoffhaltigen Oxyde, oder mit einem Oxydammoniak, oder mit einem Oxydamid copulirt. So wie man in der Reiset'schen Base das Ammoniumoxyd durch gelinde Hitze zersetzen kann, indem 1 At. Wasser entweicht, das Ammoniak aber zurückgehalten wird, no ist dieses auch bei den vegetabilischen Salzbasen der Fall. Mir will diese Sache als ausgemacht erscheinen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass eine grosse Menge solcher copulirter Basen existirt. Ettling's Salicylimid-Metalloxyde, Aschoff's Verbindung des salpetersauren Silberoxyds mit Senfölammoniak scheinen der Art zu sein, nur mit dem Unterschiede, dass hier das Metalloxyd die Basis und die Ammoniak- oder Amidverbindung die Copula ist.

Sie werden bemerkt haben, wie vielfältig sich diese copulirten Säuren und Basen mit jedem Jahre vermehren. Es ist daher diese Art von Verbindung eine allgemeine, möglicher Weise weit allgemeiner als wir bis jetzt vermuthet haben. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass viele von den organischen Werbindungen, wie z. B. Amygdalin, Asparagin, Protein u.s. w., solche copulirte Verbindungen eines in der Verbindung activen Oxyds mit einem andern passiven und copulirten Oxyde sind, das dem activen in die Verbindungen folgt, wodurch das auspehmend grosse Atomgewicht dieser Körper leicht zu erklären ware. Es scheint mir äusserst wahrscheinlich, dass die Mehrzahl der Verbindungen, die durch Austausch des Wasserstoffes gegen Chlor entstehen, ein actives, gewöhnlich elektro-negatiwes Oxyd mit einem passiven Chlorid copulirt enthalten. Ansichten dieser Art scheinen mir die wesentlichsten theoretischen Dunkelheiten dieser Substitutionen wegzuräumen.

Bei der Bearbeitung für meinen Jahresbericht von Dumas's interessanter Abhandlung über die Zerlegung der organischen Stoffe durch Einwirkung von Kalihydrat ist mir aufgefallen, dass stickstoffhaltige Körper dabei ihren ganzen Stickstoffgehalt als Ammoniak abgeben müssen, welchen man in
Salzsäure, wie Kohlensäure in Kalilauge, auffängt und als Platinsalmiak wiegt. Ich verfolge mit Plantamour diese Idee.

232 Langlois, Wirkung des Ammoniaks auf Kohlen.

Um uns gegen Cyanbildung zu verwahren, haben wir mit Cyanverbindungen angefangen. Sie geben Ammoniak so gut wie Salmiak und Kalk. Welche schätzbare und leichte Controle der Stickstoffbestimmungen wird nicht daraus entstehn, wenn in der That Alles so geht, wie es jetzt den Anschein int. Wir machen die Versuche ganz so wie die gewöhnlichen ganischen Analysen und lassen die Dämpfe durch ein Stück ungemischtes und stark erhitztes Gemenge von Kalibydrat und Kalkerdehydrat streichen, um solche Körper, wie z. B. And (C₁₂H₈+NH₃), zu zersetzen.

XXI.

Einwirkung des Ammoniakgases auf brennende Kohlen; Bildung von cyanwasserstoffsaurem Ammoniak und Entwickelung von Wasserstoffgas.

> Von LANGLOIS.

(Compt. rend. T. XII. p. 253.)

Man findet in den meisten Handbüchern der Chemie, das das Ammoniakgas, wenn es über weissglühende Kohlen streicht, Cyanwasserstoffsäure hervorbringt. Herr Thénard berichte, nach einer Angabe von Clouet, dass sich Stickstoff und Kohlenwasserstoffgas entwickeln, und dass sich eine in Wasser lösliche Substanz bildet, die den Geruch nach bittern Mandeln besitzt und die man für Blausäure gehalten hat. Lie big schreibt Sich e'e le'n diese Entdeckung zu. Die Abhandlungen dieses berühmten Chemiken sprechen aber nicht von dieser Kinwirkung. Man liest darin, das das chlorwasserstoffsaure Ammoniak in Verbindung mit Pflaszenkohle und Kali bis zur Rothglühhitze erwärht, Blutlauge, Kaliumcyanür erzeugt.

Obgleich der Gedanke, das Ammoniakgas bei erhöhter Temperatur mit Kohle in Berührung zu bringen, über ein halbes Hundert Jahre zurückgeht, so ist doch der Versuch niemals wiederholt worden. Die Bildung von Cyanwasserstoffsäure unter diesen Umständen schien mir eine interessante Thatsache und einer Bekräftigung wohl werth zu sein.

Langlois, Wirkung des Ammoniaks auf Kohlen. 238

Ich brachte ausgebrannte Kohlen in eine Porcellanröhre, die durch einen Reverberirofen gesteckt war; ich setzte das eine Ende der Röhre in Verbindung mit einem Apparat, in welchem Ammoniakgas entwickelt und durch Hinstreichen über Stücke gebrannten Kalkes getrocknet wurde; an das andere Ende befestigte ich eine röhrenartige Vorlage von der Form eines U; umgeben mit einem Gemenge von Eis und Kochsalz und sogebogen, dass sie das Gas unter Wasser – oder Quecksilberglocken leiten konnte. Als der Apparat dergestalt zusammengefügt und seine Verbindungen gut verkittet waren, brachte man die Temperatur des Porcellanrohres bis zur Glühhitze.

Als die Hitze des Rohres so hoch gestiegen war, liess ich fast eine Stunde hindurch in das Innere desselben einen Strom von trocknem Ammoniakgas streichen; während dieser ganzen Zeit entwickelte sich ein brennbares Gas, welches leichter über Wasser als über Quecksilber aufgefangen wurde. Wenn der Versuch mit Sorgfalt geleitet wird, so ist das entweichende Gas nur von einer geringen Menge Ammoniak begleitet, es führt nur ein wenig von dem Product mit sich, welches sich in der Vorlage verdichten soll; letztere enthielt im untern Theile viele kleine prismatische Krystalle, deren Gestalt in keiner Weise der von krystallisirter Cyanwasserstoffsäure äbnelten. Um sie zu sammeln, war ich genöthigt, die Uförmige Röhre in mehrere Stücke zu zerschneiden; ich löste sie dann mit einem Glasstabe und verwährte sie augenblicklich in einem Fläschchen mit eingeschmirgeltem Stöpsel. Es waren ungefähr 15 Grammen davon vorhanden. Der Versuch kann nicht vollutändigen Erfolg haben, sobald nicht des Ammoniakgas gut getrocknet und ''die Kohle völlig ausgeglüht ist; eine oberflächliche Prüfung bewies mir schon, dass diese Substanz keine Cyanwasserstoffsäure ist, sondern vielmehr cyanwasserstoffsaures Sie schlägt die Eisensalze blau nieder; Kalilösung entwickelt Ammoniak aus derselben, verdünnte Schwefelsäure macht Cyanwasserstoffsäure frei. Sie ist sehr flüchtig, wird in wenig Tagen schwarz, und zwar um so sehlenniger, je höber die Temperatur ist; in einer mit Eis rings umgebenen Flasche erhalt sie sich eine Zeit lang ohne alle Umwandlung. Ihre Beständigkeit scheint viel grösser als die des in gewöhnlicher Weise bereiteten cyanwasserstoffsauren Salzes.

934 Langlois, Wirkung des Ammoniaks auf Kohlea

Die Ursache des Entstehens von cyanwasserstoffsaurem Anmoniak mittelst der Kohle und des Ammoniaks konnte sich nur durch eine Analyse des während der Bildung entwickelm Gases herausstellen. Diess Gas, über Wasser aufgefangen, it geruchios und entzündet sich, wenn man eine brennende Kernnähert. Das Verbrennungsproduct macht in Kaikwasser keinen Niederschlag. Mit Chlor zusammen verbrannt, liefert es weine saure Dämpfe ohne Absatz von Kohle. Aus diesen Anzeige schen erkennt man die Anwesenheit von Wasserstoff; aber dies Gas könnte noch Stickstoff eingemengt enthalten und vielleicht ein wenig Kohlenwasserstoffgas. Der einzige, nun zu machese Versuch bestand darin, das Gas im Eudiometer mittelst Saurstoff zu verpuffen; ich nahm dieses über Quecksilber vor und trug alle Sorgfalt, die ein solches Experiment erheiseht.

Ich mass in einer graduirten Röhre 50 Theile dieses Gass und eine gleiche Menge reinen Sauerstoffgases. Ich liese diem Gemenge in das Eudiometer treten, welches ich verschlos, bevor ich den elektrischen Funken durchschlagen liess. Der gasige Rückstand, von Neuem gemessen, zeigte 25 Theile oder ein Viertel des angewandten Gemenges; eine Kalilösung hat des Volumen derselben nicht vermindert. Um mich zu versichen, dass der gasige Bückstand keinen Stickstoff enthalte, verschaff ich mir denselben nochmals durch Wiederholung des Experiments. Ich liess ihn darnach mit dem Doppelten seines Velumens an Wasserstoff zusammen in's Eudiometer treten und bewirkte die Entzündung dieses Gemenges. Sobald das Instrument geöffnet wurde, erhob sich das Quecksilber darin und fülle es vollständig an. Da ich diesen Versuch für sehr wichtig hielt, so wiederholte ich denselben mehrmals und stets mit demselben Erfolge. Er zeigt, dass das Gas, welches sich wikrend der Bildung des oyanwasserstoffsauren Salzes entwickel, reines Wasserstoffgas ist. Man würde also im Irrthum seis, wenn man länger, mit Clouet, annähme, dass dieses Gas de Gemenge von Stickstoff und Kohlenwasserstoffgas sei.

Jetzt, da wir die Natur der Producte kennen, welche entstehen, wenn das gasförmige Ammoniak mit glühenden Kohles in Berührung tritt, sollte es doch wohl möglich sein, uns über ihre Entstehung Rechenschaft zu geben.

Ich glaube es, aber es muss der Ausspruch gewagt wer-

den, dass die atomistische Zusammensetzung der Cyanwassenstoffsäure, so wie sie heut zu Tage angenommen ist, vielleicht nicht genau sein möchte. Da man diese Säure stets erhält, wenn man Cyan und Wasserstoff im status nascens zusammenbringt, so ist es natürlich, dass das Cyan darin dieselbe Rolté spielt, wie die Halogene in den Wasserstoffsäuren. ... Dennech möchten die so eben von uns beobachteten Thatsachen: zu der Meinung führen, dass eine aus anderer Verbindung tretende Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff sich auch mit dem Kohleastoff vereinigen und Cyanwasserstoffsäure bilden kannyohne dass dem Entstehen dieser Säure nothwendig die Bildung eines binären Atoms von Stickstoff und Kohlenstoff vorangehen müsse. Wir könne ten also annehmen, dass ein Atom Ammoniak N2 H6 in Berährung mit brennenden Kohlen sich umsetzt in N2 H2 + H4, dass diese 4 Atome oder 3 Acquivalente Wasserstoff durch 3 Acquivalente Kohle ersetzt werden, um Cyanwasserstoff N2 H2 C2 zu bilden, welcher dann sogleich mit einem Aequivalent unzersetzteh Ammoniaks in Verbindung tritt. In diesem Falle würde des Kohlenstoff einem Theile Wasserstoff des Ammoniaks sich substituiren, wie sich das Chlor dem Sauerstoff in den Metalloxy. den substituirt, wenn dieselben bei erhöhter Temperatur der Einwirkung dieses Kürpers ausgesetzt werden. Ausserdem unterliegt es keinem Zweifel, dass der Ueberschuss von Ammoniak ein Wesentliches zur Hervorrufung dieses Phänomens beiträgt; wegen seines Bestrebens, sich mit den Säuren zu verbinden; ohne diesen Ueberschuss von Ammoniak würde sicherlich die Cyanwasserstoffsäure nicht zum Vorschein kommen.

Kann man wohl leichter unter diesen Umständen die Bildung des cyanwasserstoffsauren Ammoniaks erklären, wenn man seine Zusammensetzung als Ammoniumcyanür darstellt? Ich meine nicht. Man müsste annehmen, dass ein Aequivalent Ammoniak vollständig zersetzt wird, dass sich der Stickstoff ank der Kehle verbindet, dass von den 6 Atomen Wasserstoff frei werden und 2 sich mit einem Atom Ammoniak verbinden, um Ammonium zu bilden. Die Reaction scheint mir, so betrachtet, zu complicirt, um der Ausdruck der Wahrheit zu sein.

Streicht das Ammoniak über die rothglühenden Kohlen, so liefert es in kurzer Zeit eine grosse Menge cyanwasserstoff« saures Ammoniak. Diess Verfahren ist sehr einfach und ich

236 Langlois, Wirkung des Ammoniaks auf Kohlen

halte es für verzüglicher als die anderen. Das so erhalten Salz scheint mir, wie schon gesagt, viel beständiger, als wen man wasserfreie Cyanwasserstoffsäure mit Ammoniak gas sättigt

Chlor greift dasselbe augenblicklich unter Wärmeentwickelung an; es bildet sich chlorwasserstoffsaures Ammoniak migasförmiges Cyanchlorür, welches ich aufgefangen und duch Aufnahme in eine mit Kältemischung umgebene Flasche consolidirt habe. Brom verhält sich gegen dasselbe wie Chlos.

Das cyanwasserstoffsaure Ammoniak löst sich leicht is Wasser und scheint sich nicht augenblicklich zu zersetze, wie Liebig in seiner "Organischen Chemie" angiebt. Ich glaube sogar, dass diess das einzige Mittel ist, um dasselte eine Zeit lang unverändert aufzubewahren. Es ist auch sehr löstich in Alkohol und viel weniger in Aether. Es ist eins der hestigsten Gifte; 5 Centigrammen wurden in Wasser aufgelöst und einem Kaninchen gegeben, welches augenblicklich, nachdem es diese Flüssigkeit verschluckt hatte, einen Schrei austiess und starb. Ich glaubte, es würde interessant sein, st erfahren, ob es mit gleicher Hestigkeit auf Hunde einwirkt. Man gab also ein Decigramm davon einem Hunde von mittlerer Grösse. Das Thier zuckte einige Secunden, siel um und starb.

Die kräftige Einwirkung des cyanwasserstoffsauren Ammeniaks auf die Thiere lässt mich glauben, dass mit Erfolg das Ammoniak nicht angewandt werden kann, um eine Vergiftung mit Cyanwasserstoff aufzuheben. Ich habe zu dem Ende Versucht gemacht, die ich nicht mittheilen will, die mir aber darthus, dass das Ammoniak blos durch seine aufregenden Eigenschaften wirkt.

Herr Gay-Lussac ist der erste Chemiker, der das cyanwasserstoffsaure Ammoniak kennen lehrte; er hat wegen der grossen Flüchtigkeit desselben nicht versucht, die Zusammensezzung zu bestimmen. Liebig sagt, dass es aus einem Aequivalent Basis und einem Aequivalent Säure bestehe. Da das Salz, welches ich studirte, unter neuen Umständen hervorgebracht war, so wollte ich wissen, ob seine Zusammensetzung dieselbe mit dem von dem gelehrten Chemiker in Giessen analysiren Salze sei. Gleich nach seiner Bereitung verschloss ich es is einer vollkommen verstöpselten Flasche, welche ich geme igte. Ich löste einen kleinen Theil des Salzes, das sie entelt, in Wasser auf und wägte die Flasche von Neuema-Das wicht, welches sie verloren hatte, gab mir das des aufgelösten lzes. Durch diese Vorsichtsmaassregeln umging ich die Furcht einem durch die Flüchtigkeit bedingten Verlust. Die Aufwung von cyanwasserstoffsaurem Ammoniak wurde mit einer Aufwung von salpetersaurem Silberoxyd behandelt, welches augencklich einen weissen Niederschlag von Cyansilber bildete. Elüssigkeit wurde mit Salpetersäure leicht angesäuert.

- I. 0,090 Gr. cyanwasserstoffsaures Ammoniak gaben ansilber: 0,260 Gr.
- II. 0,082 Gr. cyanwasserstoffsaures Ammoniak gaben ansilber: 0,245 Gr.
- III. 0,170 Gr. cyanwasserstoffsaures Ammoniak gaben ansilber: 0,515 Gr.

Das Mittel aus diesen Versuchen ergiebt, dass 0,114 Gr. anwasserstoffs. Ammoniak 0,340 Gr. trocknes Cyansilber lien, welches 0,068 Gr. Cyanwasserstoffsäure giebt. Diese Unsuchungen nöthigen zu der Annahme, dass diess Salz aus

- 1 Aequival. Cyanwasserstoffsäure = 342,389
- 1 Aequival. Ammoniak = 214,478
 sammengesetzt ist.

Seine Formel ist also:

C₂ N₂ H₂, N₂ H₆.

XXII.

ntersuchungen über die Luft, welche in den Poren des Schnees enthalten ist.

Von

BOUSSINGAULT.

(Compt. rend. T. XII. p. 317.)

Als Saussure während seines Aufenthaltes auf dem Col Géant die Luft untersuchte, welche sich in den Poren des innees befindet, so glaubte er zu bemerken, dass dieselbe aufliend weniger Sauerstoff als die atmosphärische Luft enthalte. In will die eigenen Worte Saussure's auführen, aus dem Beihte, den er darüber erstattete. "Wir beschlossen, zwar ein wenig spät, Lust zu sammen, welche sich in den Zwischenräumen des Schnees besindet, und brachten sie dem Hrn. Sennebier, um sie zu untersuche.

Kine Mischung von gleichen Theilen atmosphärischer Lat und Stickstoffoxydgas gab ihm zu Genua zweimal hintereinader 1,01 Maass Luft. Die Luft aus dem Schneé, auf dieselle Art untersucht, gab ihm einmal 1,85 M. und das andere Ma 1,86 M. Dieser Versuch, welcher eine so grosse Unreinkel in dieser Luft anzuzeigen schien, würde viele Experimente erfordert haben, um die Gasart zu erkennen, welche in dieser Luft den Sauerstoff ersetzt."

Zur Zeit der vortrefflichen Arbeiten des Hrn. Saussure hatte die Eudiometrie wenig Fortschritte gemacht. Wie unvolkommen sie jedoch gewesen sein mag, so kann man doch schwerlich annehmen, dass Beobachter wie Saussure und Sennebier sich in der Grösse des Unterschiedes in Hinsickt zweier von ihnen auf dieselbe Art und unter denselben Unständen untersuchter Gase getäuscht haben sollten. Diese Betrachtung war es vorzüglich, welche mich, als ich die Glescher Amerika's besuchte, die Versuche von Saussure zu wiederholen bewog.

Bei dem ersten Versuche, den der Obrist Hall und ich machten, den Chimborasso zu besteigen, fanden wir auf den Abhange, der sich nach Chillapullu hinwendet, so lockere und tiefe Schneemassen, dass es uns, trotz aller unserer Bemühungen, unmöglich war, höher als 5115 Meter zu kommen. An dieser Stelle füllte ich eine Flasche mit Schnee und verschlossie hermetisch. Als wir zu der Hütte gelangten, in welcher wir die Nacht zubringen mussten, war der Schnee vollkommen geschmolzen, so dass das entstandene Wasser an Raum ungefähr % der Flasche einnahm. Nachdem ich die Luft in den Gefässe vermittelst Phosphor analysirt hatte, fand ich, dass sie nur 16—17 p. C. Sauerstoff enthielt.

Das alte Experiment von Saussure, welches ich mit den ewigen Schnee der Anden wiederholte und bestätigte, zog de Aufmerksamkeit der Physiker auf sich. Ein deutscher Naturforscher, Hr. Bischoff, fand in einer Reihe von Untersuchungen, die er in Bezug auf die Beschaffenheit der Erdoberfische auf den Alpen anstellte, Gelegenheit, diese Experimente von

suem zu controliren. Hr. Bischoff zerrieb unter Wasser sammengesickerten Schnee. Die Luft, welche sich dabei entickelte, gab, im Eudiometer vermittelst Schweselkalium anasirt, nur 10—11 p.C. Sauerstoff.

Wir hatten bisher nur Beobachtungen, welche in hohen gionen auf Gletschern angestellt wurden. Es war zu er Vervollständigung interessant, die Luft des Schnees untersuchen, der nicht zu hoch über dem Niveau des beres gesammelt ist. Zu diesem Ende experimentirte ich t Schnee, der in Paris zu Ende des Dec. 1840 und Ang Jan. 1841 gefallen war. Am 20. Dec. that ich frisch fallenen Schnee in einen Cylinder, welchen ich über Queckber stellte. Der zusammengepresste Schnee nahm ein Volun von 287 C.C. ein.

Nach dem Schmelzen betrug das Volumen der entwickel-Luft 109 C.C. bei einer Temperatur von 4,5° und einem rucke von 0,743 M.

Diess sind 104,8 C.C. bei einer Temperatur von 0° und 10m Drucke von 0,76 M.

Das Volumen des Wassers betrug 200 C.C.

Die am 23. Dec. untersuchte Luft gab bei der ersten Anase mit Phosphor 18,6 p.C. Sauerstoff und bei einer zweiten 1,8 p.C. Sauerstoff.

Den 6. Jan. füllte ich einen Cylinder von 127 C.C. mit sammengepresstem Schnee. Nach dem Schmelzen erhielt ich I C.C. Luft bei einer Temperatur von 1° und einem Drucke in 0,735 M.

Diess sind 41,4 C.C. bei 0° Temp. und 0,76 M. Druck.

Das Volumen des Wassers betrug 80 C.C.

Die Luft, bald nach dem Schmelzen des Schmees unteroht, enthielt 19 p.C. Sauerstoff.

Es enthält also die Luft, welche sich beim Schmelzen des schnees entwickelt, zu Paris wie auf den Alpen und Anden erkwürdig weniger Sauerstoff als die gewöhnliche atmosphäche Luft. Kann man nun schon daraus schliessen, dass die uft, welche sich vor dem Schmelzen in den Poren des Schnees undet, auf diese Art zusammengesetzt ist? Durchaus nicht nd bei dieser Gelegenheit will ich die Meinung wiederholen, elche ich in der Erzählung meiner Reise auf den Chimbo-

rasso äusserte, indem ich das Factum in Betracht ziehe, welches die Beobachtung Saussure's bestätigte:

"Das eudiometrische Resultat, welches ich erhielt, ist gewiss vor jedem Einwurf sicher; dennoch, glaube ich, bedarf a noch anderer Versuche, um deutlich zu beweisen, dass die Luft, welche ich untersuchte, genau dieselbe ist, welche sich vor dem Schmelzen in den Zwischenräumen des Schnees befand. Es steht fest, dass man, um sich diese Lust zu verschaffen, den Schnee schmelzen lassen muss; das Gas in der Flasche stand in Berührung mit dem wenig oder gar nicht von atmosphärischer Luft geschwängerten Wasser, welches durch das Schmelzen entsteht. Nun weiss man aber, dass der Sauerstoff sich unter gleichen Umständen leichter in Wasser auflöst als der Stickstoff, und dass die Luft, mit der das Wasser gesättigt ist, mehr Sauerstoff enthält als die atmosphärische Luft. Die Luft also, welche sich in der Flasche entwickelte, konnte weniger Sauerstoff enthalten, wiewohl in der That die Lust in Schnee vor dem Schmelzen ganz auf die gewöhnliche Art zusammengesetzt war *)."

Das ist die wirkliche Aufklärung über den geringern Sauerstelligehalt in der Luft, die sich aus dem geschmolzenen Schne entwickelt. Und diess werden auch die schon beschriebene Experimente beweisen, nachdem ich sie dürcht folgende Beebachtungen werde vervollständigt haben.

Den 20. Dec. und 6 Jan. machte fehr wusser den ungeführten Veraucken noch andere ähnliche, dech in eidem gibbsern Maasstabe, damit ich mir mehr Wasser verschäffte, um de
Luft aus demselben herauszuziehen und zu analysiren. Ich begnüge mich, einen derselben anzuführen:

Aus 350 C.C. geschmolzenem Schnee erhielt ich durch fortwährendes Kochen 12 C.C. Luft bei einer Temperatur von 3,2° und einem Drucke von 0,751 M.

Diess sind 11,62 C.C. bei 0° und 0,76 M. Druck.

Diese Luft, vermittelst Phosphor analysirt, gab 32 p.C. Sauerstoff, ein Resultat, welches ganz mit denen übereinstimmt, die sich den Herren von Humboldt und Gay-Lussac ber-

^{*)} Denkschrift über die Eudiometrie. Journ. de Phys. 1806.

sstellten. Diese fanden in der That den Sauerstoffgehalt in r Luft des Wassers nach folgenden Proportionen:

im destillirten Wasser 32,9 p.C. Sauerstoff,

— Seinewasser 31,9 — —

— Regenwasser 31,0 — —

Kehren wir nun zu den vorhergehenden Versuchen zurück d bringen die in dem gewonnenen Wasser enthaltene Luft in schnung, so finden wir, wiewohl die aus dem Schnee entickelte Luft nur 18,7 und 19 p. C. Sauerstoff enthielt, dass beGesammtmasse dieser Luft, d. h. die gemessene und die im asser aufgelöste (deren Volumen man bisher gar nicht in Beicht gezogen hatte), nahe an 20 p. C. Sauerstoff enthält, eine hil, welche dem gewöhnlichen Sauerstoffgehalte der atmobilischen Luft sehr nahe kommt.

Man kann sich übrigens noch auf eine directere Art von der rklichen Zusammensetzung der im Schnee enthaltenen Luft überugen. Man fülle nämlich eine Retorte mit Schnee und leite Operation ganz so, wie man gewöhnlich die Luft aus einer Essigkeit treibt. Als Beleg diene folgender Versuch, den ich is. Jan. auf diese Art anstellte:

859 C. C. Schnee gaben 115 C. C. Luft bei 3,3° Temperatur d.,0,746 M. Druck.

Vermittelst Phosphor analysirt, gab diese Luft das erste Mal 20,3 p.C. Sauerstoff, das zweite Mal 21,0 —

Dieser Sauerstoffgehalt stimmt fast mit dem überein, den I denselben Tag und auf dieselbe Weise aus der atmosphäschen Luft gewann.

Res war nach meiner Meinung sehr wichtig, die wirkliche semmensetzung der im Schnee enthaltenen Luft zu bestimber. Denn ein Pactum, welches den geringern SauerstoffgeAt derselben bewiesen hätte, würde, wie ich nachher zeigen eide, die Hypothese von Dalton ganz bewährt haben, weler annimmt, dass der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre sich in p. Höhe verringere. Betrachtet man den Schnee als aus kleidie Biskrystallen zusammengesetzt, welche sich in hohen Resten bilden, so müsste man aus der grossen Quantität Luft, elehe er enthält, schliessen, dass, weun das in der Atmobäre aufgelöste Wasser sich zu Schnee verdichtet, dasselbe fourn. f. prakt. Chemie. XXIII. 4.

242 Boussingault, üb. die Lust im Schnee.

die grosse Luftquantität beibehält, welche es beim Gefrieren auf der Erdobersläche entwickelt; "wenn es nicht erlaubt wäre, zu muthmaassen," sagen v. Humboldt und Gay-Lussac, "dass der Schnee eine Quantität Luft, in seinen kleinen Krystallen eingeschlossen, zurückbehält."

Die Luft haftet in dem Schnee auf eine sehr merkwürdige Weise, welches zeigt, dass sie ihn bis in seine kleinsten Krystalle durchdringt. Man erhält nur wenig Gas, wenn man den Schnee unter eine Glocke bringt, die mit Wasser von 1 oder 2° Temperatur gefüllt ist. Nur dann, wenn der Schnee schmilzt, entwickelt sich die Luft in einem reichern Maasse. Dieser Umstand nun, dass die Luft in die kleinsten Zwischenräume der Schneekrystalle eindringt, hebt den Zweifel fast ganz auf: die Luft, welche man aus dem Schnee gewinne, komme zum grös-Bern Theile gar nicht aus den Gegenden der Atmosphäre, wo sich der Schnee selbst bildet. Nach den Analysen, die ich angeführt babe, ist man durchaus nicht berechtigt, zu glauben, dass diese Luft auf eine Art zusammengesetzt ist, welche voo der in den unteren Regionen abweicht. Wenigstens kann die geringe Abweichung, wie sie sich als Resultat aus den Experimenten dargestellt hat, aus Fehlern im Experimentiren selbst hervorgegangen sein. Richten wir übrigens unsere Aufmerksamkeit auf die Region, aus der die in dem Schnee enthaltene Luft herrührt, so sehen wir, dass dieser Gegenstand genug Interesse darbietet, um einst auf ihre Analyse zurückzukommen, wenn die Methode in der chemischen Meteorologie genügend verbessert sein wird. Doch was unsere Zeit anbetrifft und den jetzigen Zustand der Eudiometrie, so muss man wohle gestehen, dass die Dalton'sche Hypothese durch die gewonnenen Resultate nicht unterstützt werde. Auch fand Hr. Gay-Lussac durchaus nicht, dass der Sauerstoffgehalt der Luft in einer Höhe von 6636 Meter von dem der Luft zu Paris abweiche, mit welcher er eine vergleichende Analyse anstellte. Aus den Untersuchungen, welche dieser berühmte Physiker zusammen mit Hrn. v. Humboldt ausführte, ging hervor, dass der Sauerstoffgehalt der Luft zu Paris 0,21 betrage, und diese Zahl differirt wenig von den Resultaten des Hrn. Brunner, welcher die Luft auf dem Faulhorn in einer Höhe von 2600 Meter analysirte, und zwar auf eine Art, die viele Vorzüge vor den

Boussingault, üb. die Lust im Schnee. 248 früheren Methoden hat. Hr. Brunner sand in dieser Gegend den Sauerstoffgehalt der Lust = 20,915.

Um, so weit es in meinen Kräften steht, die erhaltenen Resultate über die Zusammensetzung der Atmosphäre in verschiedenen Höhen zu vervollständigen, will ich noch anführen, was sich während meines Aufenthaltes auf den Anden aus meinen Analysen ergab:

Zu Santa Fé de Bogota, in einer Höbe von 2643 Meter, fand ich im April 1825 nach dem voltaischen Eudiometer den 8auerstoffgehalt der Lust = 20,65.

Zu lbagué am Fusse der Kette von Quindiù, in einer Höhe von 1328 Meter, erhielt ich im Dec. 1826: 20,7.

Zu Mariquita, welches im Thale des Rio Grande de la Magdalena liegt, fand ich im Nov. 1826 nach einer Reihe von Amlysen durch Platinschwamm 20,77.

Bericht des Hrn. Boussingault, dass die Academie seit langer Zeit an einer genauen Bestimmung der wirklichen Zusammensetzung der Lust viel Interesse genommen hat. Nach dem Verschlage des Hrn. Laplace dürste dieser Punct der Gezenstand einer sorgfältigen Untersuchung sein. Man wird die Nothwendigkeit davon leicht einsehen, wenn man bedenkt, dass die Chemiker durch die bis jetzt bekannten Methoden den Sauerstangehalt der Lust ungefähr mit einer Genauigkeit von 1/40 bestimmt haben. Nun bedürste es aber eines ausserordentlichen Phänomens auf der Erdobersäche, um die Zusammensetzung der Lust in diesem Maasse zu verändern.

Hr. Dumas zeigt an, dass er sich zusammen mit Hrn. Bewasiagault mit einer neuen Analyse der Luft beschäftige, wonach sie durch den Vergleich des Volumens mit dem Gewichte den wirklichen Werth des Sauerstoffgehaltes bis auf 0,001 berechsen könnten.

Quantität der für das Athmen eines Pferdes nothwendigen Luft.

(Bericht, gelesen in der geheimen Comité der Sitzung der Par. Acad. vom 3. Juli (1840).)

(Compt. rend. No. 6. p. 223.)

Der Kriegsminister hat sich bei der Academie Bathes erbolt in Betreff der Frage, welches die für ein Plerd währenment 24 Stunden nothwendige Quantität Luft sei, wenn man sowolumed die mit in Auschlag bringt, die in gleicher Zeit durch de Mist und die Streu verdorben, als auch die Erneuerung, welche durch Lustventilation in dem Stalle, worin das Pferc ein geschlossen ist, hervorgebracht wird; damit man aus diesemt Kenntniss die Räumlichkeit ableiten könne, die man einem Stal für eine bestimmte Anzahl von Pferden geben muss, die ma it einer Streu 24 Stunden darin verweilen sollen, ohne durch Luftmaugel oder sogenannte Miasmen Schaden zu leiden. Urm glücklicher Weise bat sieh die Commission nicht den zahlreitchen directen Versuchen hingeben können, die jedoch unummganglich nothwendig sind, um diese Frage in ihrer gans Ausdehnung entschieden zu beantworten; sie muste also auf alle die Nachweisungen und Beebachtungen zurückkommen, chie ihr einige Genauigkeit zu haben schienen.

Die Quantität Luft, welche man gemeinhin als nothwendig für ein Pferd alle 24 Stunden ansieht, ist noch nie direct bestimmt worden, aber wohl nach dem Verhältnisse, das man zwischen der Capacität der Brust des Pferdes und der det Menschen aufgestellt hat. Man hat das Verhältniss von 2,5:1 und 3:1 gefunden.

¥

Le

Wil

रेष

41

Mit einbegriffen nahm man an, dass in einer gegebende Zeit die Zahl der Kin- und Ausathmungen des Plerdes dieselbe seit wie bei dem Monschen, und endlich hat man auch allegemein genug, augenommen, dass die ausgeathmete Luft ausgefähr 0,06 Vol. Kohlensäure enthält.

Auf diese Weise ist Vogelt zu der Annahme gekommen, dass in je 24 Stunden ein Pferd 50 Cubikmet. Lust gebrauchen würde, da ein Mensch 16—20 Cubikmet. gebraucht, und in Uebereinstimmung mit diesem Resultat hat eine von dem vor-

etzten Kriegsminister ernannte Commission den Raum von 50 Jubikmet, auf das Pferd in einem Stalle augenommen, den sie da Modell vorgeschlagen hat.

Nimmt man aber, wie man es gewähnlich thut, an, dass le, ausgenthmete Luft 0,06 ihres Volumens an Kohlensäure entall, so dark man sigh dock kaum weigern, mit Berselius pruerkengen, dass manidie von einem Menschan imperballe 24 tynden producirte. Koblensäure "überschätzt ihnt, " Diess geht us der Vergieichung; des Gewichtes des ausgesthmetes Koblesoffen mit, dem Gawichte, des, in derselben Zeit int den Nahingsmitteln aufgenommenen Kohlenstoffen, hervor : Wie ge nun sch sei, so findet man, in Uebereinstimmung mit dem frühre agebonen; dass, wenn ein Plerd die Lult, welche ihm in 34. mpden nothwendig ist, nur pinmal athmet, as 41,997 Cubikmet: ' Mars. Diese Menge, die ein Maximum apgiebt, ist noch unrader Quantität von 50 Cuhikmet., die von der durch den giograpigister ernannten Commission festgesetzt wurde. is (1 Wight, wir jetzt; nach den Angaben des Hens Durn an inden sum herschnen, d. b. indem wir annehmen, 1) dass der Mensch 382 Liter Luft alle 24 Stunden gebraucht, 2) dass 267 Liter ohlensäure hervorgebracht werden, 3) dass die ausgeathmete uft auf 100 Vol. nur 8,5 Vol. Kohlensäure enthält, so finden ir, bei der Voraussetzung, die Brust des Pferdes verhalte sich ı der des Menschen wie 3:1, dass ein Pferd nur 22,896 Cukmeter, Luft bedarf. ...

hlassene Päumlichkeit, die nach den Angaben von Monzies 1,997. Cubikmet, und nach den Angaben von Dumas 22,896 ubikmet, einschliessen müsste, gemacht haben, findet auf einen all keine Anwendung, wenn auch seine Thür und seine Fener geschlossen sind, denn es giebt immer, auch in diesem alle, Zwischenräume in den Thüren und Fenstern, durch welze die Luft von aussen in den Stall dringen kann, während einnere Luft daraus entweicht, es kann folglich eine wahrefte Ventilation stattfinden, und wir fügen hinzu, dass diese entilation in einem Stalle, worin Pferde sind, immer hervortreten strebt, aus dem Grunde, weil die Luft, die sie aushman, wie auch die, welche sie äusserlich berührt, gewöhntel wärmer ist, als die umgebende Atmosphäre, sich also

346 Menge der zum Athmen eines Pferdes nöth. Luft.

erhebt und durch die Zwischenfäume des obern Theiles des Stalles entweicht, während die äussere Luft durch die unteren Zwischenfäume hindurchdringt. Es wird also klar, dass 50 Cubikmet. Luft, wie sie von der durch den Kriegsminister ernannten Commission veranschlagt sind, 41,997 Cubikmet. aus den Angaben von Menzies berechnet, 22,896 Cubikmet. nach Dumas's Angaben berechnet, lauter Maxima sind, welche um die ganze Quantität Luft zu hoch gestellt sind, die innerhalb 34 Stunden durch Ventilation ersetzt werden kann.

Die Erfahrung glebt ein diesem Schlusse entsprechendes Besultat. Wirklich hat Hr. Boussingault, eins der Mitglieder der Commission der Academie, da er nach dem von derselben ausgesprochenen Wunsche die Luft eines Stalles vor 480 Cubikmet. Gehalt, worin 16 Pferde 13 Stunden lang eingeschlossen waren, untersuchen wollte, gefunden, dass sie nur 0,00230 ihres Gasvolumens an Kohlensäure enthielt, eine Quantität, welche nur 7 mal grösser war als die, welche eine zu gleicher Zeit auf freiem Felde eingesammelte Luft enthielt. Dem zufolge war die Luft des Stalles weit entfernt, verdorben zu sein, denn sie bestand in 100 Vol. aus:

 Stickstoff
 79,00

 Sauerstoff
 20,77

 Kohlensäure
 0,23

 100,00.

Endlich hat noch Hr. Boussing ault wahrgenommen, dass die Streu eines Pferdes, vermischt mit seinen festen und flüssigen Excrementen und bei einer Temperatur von 11° in einem kleinen, wohl verschlossenen Stalle, dessen Thüren und Fenster sorgfältig mit Lehm verschmiert waren, sich selbst überlassen, nach Verlauf von 24 Stunden der umgebenden Atmosphäre nur 2 Liter Kohlensäure mitgetheilt hatte. Wenn diese Quantität nicht alle Kohlensäure angiebt, welche in 24 Stunden entwickelt worden ist, da gewiss ein Theil derselben durch Ventilation entwichen ist, so ist es klar, dass, da diese doch auf ihr Minimum gebracht war, man daraus schliessen kann, dass die Streu keinen merklichen Einfluss auf Verderbniss der Luft im Stalle gehabt hatte.

Wir denken, nach allem Vorhergehenden, dass in einem Stalle, wo ja nach den Thüren und Fenstern und in weit hö-

ongchamp, Verb. v. Cyanquecksilb. m. Chlorkalium. 247

rem Grade nach einer fest eingerichteten Ventilation die Luftch erneuert, ein Pferd dem Mangel von atmosphärischem Saueraff nie ausgesetzt sein wird, wenn es 25 oder 30 Cubikmet. aff vorfindet.

XXIV.

Jeber die Verbindung von Cyanquecksilber mit Chlorkalium.

Von

LONGCHAMP.

(Compt. rend. T. XI. p. 360.)

Das Cyanchlorür von Quecksilber und Kalium ist weiss, shr leicht, seidenartige Nadeln bildend; es ist zusammengesetzt zwei Atomen Cyanquecksilber und einem Atom Chlorblium.

Die Hitze des Wasserbades entwickelt daraus 4 Procent suchtigkeit, Long champ ist indessen nicht der Meinung, dass bes vehemisch gebundenes Wasser sei. Er giebt bei dieser slegenheit neue Blicke in die Natur der Kraft, welche die ystallisation der Salze bestimmt. Indem er als Beispiel das swefelsaure Natron nimmt, so zeigt er dass die Axe dieses izes durch ein leeres sechsseitiges Prisman gebildet wird, rans er schilesst, dass die Krystallisation durch eine Abstosng der Salzmolecule und nicht durch eine Anziehung berkt wird. Rund um den sechsseitigen leeren Raum der Axe s Krystalls von schwefelsaurem Natron bildet sich ein sechstiger Mantel von dem Salze. Wirkt nun die Abstossung der plecule dieses Mantels auf die umgebenden Salzmolecule ein, bildet sich eine neue Leere und um diese ein neuer Manvon Salzmolecülen, und so bildet sich der Krystall successiv s einer Leere und einer Wand des Salzes.

Wenn es sich aber so verhält, so müssen die Salze beimystallisiren das Volumen der Masse, inmitten welcher sie sich
finden, vermehren, wie das Wasser beim Krystallisiren an
blumen zunimmt, und das zeigt auch in der That die Erfahng. Füllt man mit einer siedenden Salzlösung eine kleine vor
r Lampe geblasene Betorte, so zerspringt, wenn die Krystal-

lisation beginnt, die Kugel der Retorte, als wäre es Wasser, das in den Zustand des Eises überginge.

Herr Longohamp behauptet, dass keine Verbindung möglich sei, als nur zwischen Körpern von analoger Natur. Vergleicht er demnach das Cyan mit dem Chlor, zwei Körper,
deren Analogie seit lange bekannt ist, so meint er, dass man,
anstatt, wie geschehen ist, zu schliessen, dass sich das Cyan
öfters als einfacher, Körper verhält, man aus der Analogie entnehmen müsse, dass das Chlor ein zusammengesetzter Körper
sei. Er erinnert daran, dass er diese Bemerkung schon früher
bei Gelegenheit der Oxydationsstufen des Chlors gemacht habe.

XXV,

Chemische Notizen.

Von

Dr. EDUARD BIEWEND zu Clausthal am Harz:

1) Schweissbarkeit des Palladiums.

Aus rober Platinlösung abgeschiedenes Cyanpaliadium wurde nach der im Lehrbuche der Chemie von Berzelius angegebenen Methode behandelt und zuletzt durch Erhitzen des erhaltenen Chlorkaliumpaliadiums mit Salmiak im Porcellantiegel u. s. w. reines metallisches Palladium erhalten. Das so dargestellte Palladium erscheint in sehr fein vertheiltem Zustande als lockere schwammartige Stückehen, kleine Schuppen und Blättchen. Das am feinsten zertheilte Palladium hat bei durchfallendem Lichte eine kirschrothe Farbe, welche man besonders gut bemerkt, wene es mit Wasser aufgeschlämmt ist.

Um nun einen Versuch, das Palladium turch Schweissen in ein zusammenhängendes Stück zu bringen, anzustellen, verfuhr ich ganz, wie man es beim Platin nach dem Verfahren von Wollaston thut, und es wurde der Apparat nur, der geringen Menge Palladiums wegen, modificirt. Das Palladiumpulver, mit Wasser zu einem dünnen Brei angerührt, ist in einer starken, unten abgeschliffenen Glasröhre mittelst eines passenden Stempels in kleine runde Scheiben werwandelt.

Diese porösen Palladiumscheiben, getrecknet und vor dem Löthrehre auf einer kleinen Kapelle von Knochenasche eder auf

Platindraht stark ausgeglüht, dann schnell auf einen kleinen, mhe stehenden Amboss gebracht und durch einen raschen Schlag nit einem Hammer verdichtet, gaben bei öfterer Wiederholung des Glühese und darauf folgenden Hämmerns vellkommen zu: mmanhängende dünne Bledhe; wodarch die Schweissbarkeit des: Palladiums, erveiesen ist. be photologie of object and and a win Faste und Blänzedes dat Wisser erbakenen politien Palladiumbleches ist wie beim reinen Platin; aber in Bessug and Behabarlieit steht ichs Platin den Pallation keitebiehe Voran, iquen sish fetiteses um bei estivetiderheitem Adsgisten und all ser: bämmers (lässt, lohue | Kantenrieser zu bekolimen, und adel? bis zum rezhten Winkel gehendes Hin- und Herbiegen nieht gut verkrägt, ohne zu zerbrechen. Andere von den, wie oben erzählt, dargestellten portsen Palladiumscheiben wurden, um zunächst ein starkes Zusammensintern au bewirken, auf einer Unterlage von reinem weissem Quarzuand in webl verkitteten hersischen Tiegeln in einem Einz manprobirofen: diner für Eisonproben binkriglichen Temperatur nasgeedtst. Nach wem Erkalten der Tiegel fanden sich die Kanten der Palladiumscheiben ganz abgerundet und die linsenformige Gestalt wie die gestossene Oberstäche derselben zeigte doutlich; dass das Paliadium bei der angewandten Temperaturin : fast vollständigen Fluss gekommen war. Bei dem Aud-i hämmern dieser zusammengeschmolzenen Exemplate war: die selve Vorsicht möthig wie bei den blos gesehweissten Stücken, and die Producte waren auch in Bezug auf Blegsumkeit, Farbe und Cisas ganz gleich! Classicians of the confidential of the artist will appear to a fine roll I web ត្តមានីក្រុមក្នុរីជាធ្វី (**ភា**ម ៥០ ១) 🔻 Light to the model's 2) Chlorhydrat - Krystalie. Dus auf die von mir in diesem Journale, 1838, Bd. XV? 8. 440 beschriebene Art dargestellte und in Glasröhren einguschmolzene Chlor mit Wasser kann, bei einer und derselben Temperatur, zerlegt in Chlor und Wasser und auch als Chlorhydrat eracheinen: Ist es einmal Chlorhydrat, so bleibt es noch Chlor-

ches oft erst bei nabe an 0° grenzenden Temperaturen. Dei schnellem Anschiessen des Chlorhydrats zeigen sich mmer, wie Trüher erwähnt; salmiakähnHehe unbestimmbare For-

hydrat bei Temperaturen über + 16° R. Jund umgekehrti Das

in (Chlor and Wasser princete Hydrat verwandelt aich in sei-

men, welche sich jedoch bei längerem Stehen unter der Flüssigkeit in mehr oder weniger grosse gebliche krystallinische Körner verwundele, an denen jedoch keine deutliche Krystallfläche wahrzunehmen ist. Nur unter besonders günstigen Umständen hatten sich in einer solchen Röhre mit Chlorhydrat grosse scharfkantige Krystalle gebildet; die Lufttemperatur war etwa 169 C. und war an den vorhergehenden Tagen etwas höher gewesen.

Kanten und der grösste derselben: war etwa 2½ Lin. dang, thet chen: so breit und ungefähr 1%: Lin. dick. Leider war et mmöglich, die Krystallform mit Sicherheit zu bestimmen; weil die Krystalle zu einer Gruppe zusammengewachsen und überdiem einzelne Flächen wegen der Enge der Röhre nicht vollständig aungebildet waren; weil ferner sehon währendrichte Hetmehtens durch; die geringe Erwärmung die Krystalle anflagen zupschmelzen, während in einem kältern Zimmer die Röhre wieder; mit Chlorhydrat beschlug und undurchsichtig wurde. Kaschien indesson; sals wäre die Krystallform des Chlorhydrat tesseral.

dergestellt und in einem weitern Gefässe eingeschlossen, und ich hoffe so mit der Zeit die Krystallform: des Chlorbydrats genau bestimmen zu können.

enwährten Abhandlung beigefügten Zeichnung einer Glassöhre mit Chlor unter Wasser (meiner Angabe entgegen) das Chlor mit concaver Oberfläche an die obere Flüssigkeit grenzend, dargestellt ist; die Oberfläche des Chlors muss convex sein, wie ies auch stets bei zwei übereinander stehenden Elüssigkeiten der Fall ist.

3) Ueber geschmolzenes Bleioxyd,

Schon seit mehr als 60 Jahren bis auf die neueste Zeit hat der damals aufgestellte Satz: dass Bleiglätte "hatbgeschmolzenes Bleioxyd" sei, in mehreren Lehrbüchern fortgeerbt. Das vollkommen geschmolzene Bleioxyd soll dagegen eine glasige Masse bilden.

In Danmir inicht: bekannt, ist, idass irgend iein Versuch zur



öffentlichen Kenntniss gekommen ist, welcher beige Behauptungen entkräftet, so erlaube lok mir, meine Ansicht darüber hier mitzutheilen.

Die Bleiglätte ist vollkommen geschmolzenes Bleioxyd (mit them geringen Mennigegehalt und anderen unbedeutenden Beimeigungen) und das segenannte vollkommen geschmolzene Bleisenyd ist kein Bleioxyd mehr für sich, sondern ein Bleioxyddie bet, und bildet als solches eine mehr oder weniger durchsiche die Masse, das Bleiglas.

Man kann eich vom der Wahiheit des eben Gesagten leicht derzeugen, wenn man einen Platindraht und reines salpeten sures Bleionyd "anwendet und durch Hirhitzen aus dem ietztern Bleionyd erzeugt. Man mag dieses am Platindrahte in noch so hoher Temperatur dünnflüssig machen, stets bildet es beim Erkalten eine undurchsichtige polyëdrische blätterige, der Ginte gunz ähnliche Masse. Das sogenannte Bleiglas: dagegen erhält man durch Hinsufügen vom ganz wenig Kieselsäure in kieselsäure in beim Bleionyd einige Zeit, besonders in hoher Temperasitur, in gewöhnlichen Thontiegeln schmilzt.

4) Verhalten der Titunsäure gegen einige Roagentien bei verschiedener Verdünnung.

Das Titansäurehydrat wurde in wenig Chlorwasserstoff gelöst und dann, mit einer bestimmten Menge Wasser verdünnt; gegen folgende Reagentien geprüft:

- Thinsaurchydrats nach 1/2 Minute noch deutlichen flockigen Miederschlag;

 bei 59000 facter Verdünnung nach 4 Minuten und selbit bei 118000 facher Verdünnung noch nach 12 Stunden einen
- bei 118000 facher Verdünnung noch nach 12 Stunden einen deutlichen Niederschlag.
- b) Eisenkaliumcyanür fällt bei 286 facher Verdünnung des Titansäurehydrats nach wenigen Augenblicken stark, bei 472-facher Verdünnung erst nach 2 Minuten, und bei 4720 facher Verdünnung war selbst nach 12 Stunden nur geringe Trübung ohne Niederschlag entstanden.
- c) Eisenkalium eyanîd fâllt schon bei 236facher Verdünnung des Titansaurehydrats nicht gleich, und bei 472- bis 944facher



Verdfinning entsteht erst nach 2-3 Stunden eine geringe grünblaue Fähung (zum Theil durch Zersetzung des Reagens).

Dies Asche der eigentlichen Braunkehlen zeigt: wohl nie eines Alksligehalte Dessenungeschtet kann diese Ascho einen Alksligehalte Dessenungeschtet kann diese Ascho einen lichte alkelisch und geröthste Pflaszenfarben gragines und zu leicht, wann waiten keine disecten Bersuche sorgenommen werden, zu irrigen Annahmen Anlass geben.

Man kare eich leicht von der alkalischen Reaction des gebrannten: Gipses überneugen, wenn man ein Sklickeben blätterigen Gips (sogenannten Marlenglas) geiniger Augenblicke in eine Weingeintflamme hälti wo. en weise mird und nicht aufhlättert, indem
en: Wasser: werliegt, und das Stäckeben mecht dem Erkelten und
ein: genöthaten Läkunsphipiosalegt aund heiden mit ein paas Tropfen Wasser benetzt. Bald wird des Papier stork gebläut werden, von der Stelle aus, wo der Gips liegt.

herrührten den jonail Abcherich hedeutender/Quantität enthielt.

Legirung con Eisen mit Blei.

3,24 Blei

erle pouruithe de colloques des mos el grandentelle.

7) Ueber Vergoldung des Kupfers auf hydro-elektrischem Wege.
Dr. B. Böttger bemerkt in seiner Abhandlung: "Ueber
die Construction eines höchst einfachen, sowohl zur Vergoldung
des Silbers etc. — sich eignenden Apparates" in Dingler's Journ.
Bd., LXXVIII. S. 51-61, dass Kupfer auf hydro-elektrischem



grow gate France

lillen, Wirkung des Jods auf chlersaures Kali. 368

Vege sich nicht vergolden lasse. Mir ist die Vergoldung det einen polisten Kupfers auf jenem Wege recht gut gelungen.

Das vergoldete Kupfer hat indessen eine stark rothe Farbe mid ist anfangs nicht von eben so und erst frisch politiem Kupfer im unvergoldeten Zustande zu unterscheiden. Erst nach längeren Liegen an der Luft zeigt letzteres eine deutliche Verschiedenheit. Schneller kann die stattgefundene Vergoldung durch Auflösen im Salpetersäure nachgewiesen werden, webei die Gold bekanntlich zurückbleibt.

XXVI.

Wirkung des Jods auf chtorsaures Kali.

V on

MILLON.

(Compt. rend. T. XII. p. 258.)

Cay-Lussac hat in der berühmten Denkschrift, die der über das Jod und dessen Verbindungen veröffentlicht hat, angegeben, dass das Chlor die jodsauren Salze nicht zersetze. Nieser Umstand könnte unerwartet scheinen in einem Auguntlicke, wo man die Analogien, welche Jod und Chlor verbinen, entdeckte und wo mas das Chlor sieh dem Jod nach Vertinies der Acquivalente in der gauzen Reihe ihrer Verbinungen substituiren sah.

Bei einigem Nachdenken über die vergleichende Verwandtchaft dieser beiden Körper und die verwickelte Weise, in der
is sich bei Körpern von der Natur der chlor- und jodsauren
alze geigt, fasste ich die Hoffnung, eine Umsetzung der Eleienta statellangen, die der genwichten zwischen Jod und Chlor
nehachteten entgegengssetzt sein Ich liess Jed auf ohlersaures
all einwirken, und die Thatsachen entsprachen meiner Meiung auf eine entscheidende und wie ich glaube, ziemlich
netzwürdige Weise.

wischen etilorsaurem Kali und Jed; glesst man aber auf eine estimate Quantität chlorsaures Kali 3- oder 4 mal sein Gewicht estilistes Wasser und steigert die Temperatur bis zum Siede-

setzt, in beträchtlicher Quantität, obwohl die Flüssigkeit ungefänht; bleibt. Sie bleibt ferner noch farblos, wenn man nich
mehr als 1. Acq. Jod im Verhältniss zu dem angewandten chlorsauren, Kali hinzusetzt. Ist man bis zu diesem Puncte gekomment, so färbt sich die Flüssigkeit merklich gelb und dann braun
und man erhält als Endresultat neutrales jodsaures Kali und eine
mehr, oder weniger jodhaltige Chlorjodverbindung.

Dampst man bis zur Trockne ab, so entweicht das Chlorjod und das jodsaure Kali bleibt rein zurück.

Hemmt man die Einwirkung des Jods auf das Chlorat, bevor man das Verhältniss von 1 Aeq. Jod erreicht hat, so findet man, dass die Flüssigkeit schon jodsaures Salz fertig gebildet enthält, und Chlorjod, welches ohne Zweifel der Jodsäure entspricht, denn wenn man stark genug erhitzt, so entwickelt sich Chlor, und Jodchlorür JCl₃, bleibt zurück, welches mit kohlensaurem Kali einen Jodniederschlag giebt.

Die Bildung von Jodchlorür erklärt die Einwirkung. Das Jod untzieht das Chloridem chlorsauren Kali, während die viel grössers Verwandtschaft des Jods zum Sauerstoff und die grössers Cohäsion des jodsauren Salzes das Jod an die Stelle des Chlors in das Chlorat eistreten lassen. Die Reaction kann mas so darstellen kann mas

die interessante Modification, welche einige Tropfen Säure, die man zu dem Gemenge von chlorsaurem Kali und Jod hinzunetzt, der Reaction ertheilen.

Mein erster Gedanke war, die Oxydation des Jods durch Anwesenheit der Salpetersäure zu erleichtern, aber ich wemerkte sehr hald, dass einige Tropfen Säure, zu einer betrücktlichen Quantität Jod und chlorsaurem Kali hinzugesetzt, hinreichten, um eine ganz andere lebhafte Reaction als die, welcheuzwischen Jod und Chlorat allein vorgeht, zu bewirken. In der That genügt es bei dieser kleinen Zuthat von Säure, dass man die Einwirkung bei einer wenig erhöhten Temperatur beginnen lässt, damit sie in der Folge von selbst fortfahre Sie geht so bis dahin, dass die Flüssigkeit eine etwas dunkte Earhe annimmt; zu gleicher Zeit zeigt sich eine reichliche



Chiorentwickelung, und dampft man nachher bis zur Prockile ab, so erhält man sehr reines jedsaures Kali.

Es ist einleuchtend, dass bei dieder letzten Reaction die Oxydation des Jods sowohl durch die Chlorsäure, als durch die freie Salpetersäure bewirkt wird. Es bildet sich Jodsäure, welche ihre Wirkung auf eine neue Quantität des Chlorats fortpflanzt, auf's Neue Chlorsäure verdrängt und so die Oxydation des Jods und das Verdrängen der Chlorsäure bis zur vollständigen Zersetzung des Salzes fortsetzt. Was diese sonderbare Art der Einwirkung verursacht, ist, dass das Jodchlorur, welches ein wesentliches Product der Reaction des Jods auf chlorsaures Kali ist, nur als zufälliges Product bei der Reaction austritt, die unter dem Einflusse der Salpetersäure vor sich geht. Man kann die Bildung desselben fast ganz vermeiden, wenn man das Jed nach und nach zusetzt; es bildet sich kaum Jodchlorur, so sturmisch ist die Chlorentwickelung." Man musi auch, um diese Bildung von Jodchlorur zu vermeiden, die Flüssigkeit im Sieden erhalten.

Um die Richtigkeit meiner Ansicht über diese Reactionen zu bestätigen, wog ich 10 Gr. gut getrockneten chlorsauren Kali's, welche ich unter dem Einflusse einiger Tropfen Salpeteräure mit einer genügenden Menge Jod behandelte. Ich dampste bis zur Trockne ab. Das getrocknete, vollkommen weisse Product gab 17,3 Gr. jodsaures Kali; die Theorie liefert 17,4.

Um mich der Reinheit des so erhaltenen Jodats zu versichern, zersetzte ich 1,805 Gr. davon durch Hitze; ich erhielt 1,398 Gr. Jodkalium. Die Theorie giebt 1,399. Schwefelsäure und Jodsäure eignen sich eben so gut wie Salpetersäure, um die Reaction zu beginnen. Diess Verfahren ist gewiss das einfachste und leichteste, um jodsaures Kali zu bereiten, welches es vollkommen rein liefert. Man begreift, dass man so auch zur Bereitung des Jodkaliums kommen könnte; aber damit diese Anwendung ökonomisch sei, müsste der Preis des chlorsauren Kali's, der tagtäglich abnimmt, noch bedeutend fallen.

Was die Reaction betrifft, die man mit Hülfe einiger Spuren von Säure hervorruft, so erinnert sie bei der Mineralchemie an diese sonderbaren Erscheinungen einer Umwandlung durch blossen Contact, die man häufig in der organischen Chemie antrifft, Aber, was nicht immer in der organischen Chemie stattfindet, das Mittel, wodurch die Umwandlung vor sich gehrt, begreift man hier mit Leichtigkeit.

Literatur.

- Andr. Cozzi, Trattato elementare di chimica medico-farmaceutica per servire di farmacopoea, con brevi cenni di tossicologia e di reagenti, ed alcuni saggi di analisi chemica. T. I. Firenze.
- Ducoin-Girardin, Entretiens sur la chimie et ses applications les plus curieuses suivis de notions de manipulation et d'analyse chimique. Tours. 26 Bg.
- Sadebeck, Anfangsgründe der Chemie. Breslau. 3/3 Thir.
- Handbuch der Pharmacie, von Ph. L. Geiger. 1. Bd. 5. Auf., neu bearb. von Dr. Justus Liebig, Prof. a. d. Univ. zu Giessen. 6. Liefr. Heidelberg 1841. Acad. Verlagsbuchhandlung von C.F. Winter. Wien, bei C. Gerold.
- Jahresbericht über die Fortschritte der physischen Wissenschaften, v. Jacob Berzelius. Im Deutschen herausgeg. v. F. Wöhler. 20. Jahrg. II. Heft. Unorganische Chemie, Mineralogie. (Das erste Heft, welches dem physikalischen Jahresbericht enthält, wird in Kurzem erscheinen. Eben so das dritte Heft, die erganische Chemie.)
- Ueber den Einfluss der Naturwissenschaften, insbesondere der Chemie, auf die Technik. Eine Vorlesung, gehalten in der öffentlichen Sitzung der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften am 28. März 1841 von Franz von Kobell-Landshut 1841, v. Vogel'sche Verlagsbuchhandlung. 8. 38 S.

oral along the respective to the companies and and the contractions of

Hartist Committee

expected by the first the contraction

and the state of t

XXVII.

Chemische Untersuchung des Mineralwassers zu Kreuznach.

Von

C. LOEWIG.

Die Analyse des Kreuznacher sogenannten Elisensbrunnen, welche ich hiermit publicire, ist schon im Jahre 1835 von mir ausgeführt worden. Sie war genau, wie sie hier folgt, geschrieben und für den Druck bestimmt, als ich durch Herrn Dr. Engelmann in Kreuznach benachrichtigt wurde, dass Osann in Würzburg eine grosse Arbeit über die Mineralquellen in Kreuznach unternommen habe. Diess bewog mich, meine Untersuchung zurückzuhalten. Vor einiger Zeit hat Osann seine gefundenen Resultate in der Schrift: "Kreuznach und seine jod- und bromhaltigen Mineralquellen, von J. Trieger, Kreuznach bei Kehr" mitgetheilt; dieselben weichen jedoch so sehr von den meinigen ab, dass ich mich veranlasst finde, meine Untersuchung gleichfalls dem Publicum zu übergeben. Da Herr Osann die Details seiner Untersuchung nicht mitgetheilt, aber auch gegen die in der genannten Schrift sich Indenden Angaben keine Reclamation eingelegt, so glaube ich unehmen zu können, dass Herr Osann dieselben für die seinigen anerkannt und namentlich keine Schreib- und Drucksehler irrige Angaben veranlasst haben. Obgleich ich weit entfernt bin, behaupten zu wollen, meine Untersuchungen seien richtig, trotz der Sorgfalt, die ich auf dieselben verwandt, und trotz der Uebereinstimmung mit einer früher von Mettenheimer mitgetheilten, so getraue ich mir doch, mit Bestimmtheit zu behaupten, dass Osann wenigstens 50mal so viel Brom gefunden hat, als in der That in dem Wasser vorkommt. Nach Osann enthalten 100 Theile Mutterlauge 25 Theile Bromcalcium und 9 Theile Chlorcalcium (S. 61 der angezeigten Schrist). habe mich mehrere Jahre mit der Abscheidung des Broms aus den verschiedenen Mutterlaugen beschäftigt. Meine Methode, dasselbe darzustellen, ist so einfach und so vollständig, dass ieh fast sagen möchte, sie ist gar keiner Verbesserung fähig. Die Motterlauge wird mit etwas Salzsäure und Braunstein destillirt. Die Destillation wird am besten in hohen Gefässen mit engem Journ. f. prakt. Chemie, XXIII. 5. 17

Halse vorgenommen und die sich entwickelnden Dämpfe durc eine lange und kalt gehaltene Röhre geleitet. Die Verdichtun lässt sich selbst im Sommer vollständig bewerkstelligen. Noc ehe die Flüssigkeit zum Kochen kommt, ist das Brom vollständig ausgetrieben. Ich kann die Versicherung ertheilen, das ich nie im Stande gewesen bin, eine Quantität Brom zu erhalten, welche auch nur annähernd mit derjenigen übereinkam welche nach den Angaben Osann's erhalten werden müsste Es würde diesem Chemiker gewiss unmöglich werden, aus 10 Theilen sehr guter Lauge mehr als 2—3 Theile Brom zu gewinnen.

Ich weiss nicht, welchen Antheil an der grossen Menge Brom, welche Osann gefunden haben will, seine neue Methode hat. Jedoch will ich einer Angabe in meiner Schrist über das Brom, welche schon oft zu Missverständnissen Veranlassung gegeben hat, hier gedenken. Es heisst nämlich 8.14, dass ich im Stande war, die Mutterlauge so weit zu concentriren, dass ich aus 30 Pf. Mutterlauge 20 Unzen Brom abzuscheiden vermochte. Dass ich jedoch unter Mutterlauge nicht die Lauge der Saline verstanden haben kann, ergiebt sich sogleich, went das Capitel ganz gelesen wird. Es ist bestimmt angegeben dass ich die Mutterlauge durch schweselsaures Natron zersetzt habe. Dadurch wurde Brom - und Chlornatrium gebildet. Da nun das Bromnatrium äusserst leicht in Wasser löslich ist so versteht sich von selbst, dass, als die vom schweselsaurer Kalk abgepresste Flüssigkeit eingedampst wurde, das Kochsalz heraus krystallisirte, während in der Mutterlauge das Brommtrium zurückblieb. Von dieser Mutterlauge nun geben 30 Pf 20 Unzen Brom.

Die Menge Brom, welche in meiner Analyse angeführ ist, ist jedenfalls etwas zu klein. Diess rührt von der Methode der Bestimmung her; eine Methode, welche unter gewissen Umständen sehr genaue Resultate liefern kann, abenur nicht in Fällen, in denen das Chlor das Brom um das 1000 und 10,000fache übertrifft. Während meines Aufenthaltes in Kreuznach hatte ich sehr genaue Beobachtungen über den Gehalt des Broms in der Mutterlauge zu verschiedenen Zeiter angestellt; leider kann ich dieselben nicht mehr auffinden. Sollte jedoch der Gehalt an Brom und Jod in der That so gross sein,

als Osann angiebt, so würden im Durchschnitt auf ein Bad 4,878 Pfund Bromcalcium und 0,077 Pfund Jod kommen, also auf eine Cur mit 30 Bädern circa 150 Pfund Bromcalcium (Trieger's Kreuznach S. 53), eine enorme Quantität, welche selbst dem allopathischsten Arzte etwas bedenklich vorkommen müsste.

An der ausgezeichneten Wirksamkeit des Kreuznacher Mineralwassers, von der ich wahrhaftige Wunder erlebt habe, hat der Brom – und Jodgehalt sicher einen bedeutenden Antheil; aber allein wird dieselbe von diesen Stoffen gewiss nicht bedingt. Dieselbe liegt hauptsächlich in der ganzen Mischung des Wassers. Wie die Analyse zeigt, besteht dasselbe fast blos aus leicht in Wasser löslichen Salzen; es findet sich in demselben keine Spur schwefelsaurer Salze. Dann ist besonders die Mutterlauge mit ihrem grossen Gehalte an Chlorealchun zu berücksichtigen, durch welche die Bäder nach Willkühr verstärkt werden können. Auch die herrliche Lage des Ortes und der heitere gastliche Sinn seiner Bewohner üben sicher einen wohlthätigen Einfluss aus auf die Genesung des Leidenden. Kreuznach vereinigt alle Elemente, um sich in einer kurzen Zeit zu einem Curort ersten Ranges erheben zu können.

Chemische Untersuchung.

§. 1.

a) 1004 Gramm. oder 1 Litre Wasser wurden in einer tarirten Platinschale im Wasserbade zur Trockniss sehr langsam abgedampft. Schon bei gelinder Erwärmung zeigten sich Luftblasen, und in demselben Verhältnisse, als diese sich entwickelten, flelen Flocken von gelber Farbe zu Boden. Die im Wasserbade eingetrocknete Salzmasse wurde auf einer Spirituslampe so stark erhitzt, dass der Boden der Platinschale schwach zu glüben anfang. (Um bei dem Erhitzen auf der Lampe durch das entweichende Zerknisterungswasser keinen Verlust zu erkeiden, ist es nöthig, anfangs so schwach als möglich zu erwärmen und die Temperatur nur sehr langsam zu steigern. Bei dem langsamen Abdampfen des Wassers erhält man nämlich immer grosse Krystalle von Kochsalz, welche Wasser in sich einschliessen. Zu dieser Operation sind mehrere Stunden

- nöthig.) Die schwach geglühte Salzmasse wog 12,410 Cr.
- b) Dieser Rückstand wurde mit destillirtem Wasser ausgezogen; die unaufgelösten Theile, im Wasserbade so lange getrocknet, bis nach wiederholten Wägungen kein Gewichtsver-lust mehr stattfand, betrugen 0,280 Gr. Werden diese von den obigen 12,410 Gr. abgezogen, so erhält man 12,180 Gr. lösliche Theile.

1004 Gr. Wasser enthalten demnach:

- a) in Wasser lösliche Theile 12,130 Gr.
- b) in Wasser unlösliche Theile 0,280 zusammen 12,410 Gr.

S. 2.

- a) 1004 Gramm. Wasser wurden in einer Platinschale bis auf ½ Rückstand eingedampft. Der noch flüssige Theil wurde von dem sich während des Abdampfens bildenden Niederschlage abfiltrirt. Die unauflöslichen Theile, im Wasserbade vollkommen ausgetrocknet, wogen 0,260 Gr., also 0,010 Gr. weniger wie in §. 1. Dieser Ueberschuss in §. 1 rührt zum Theil daher, dass das Chlormagnium sich bei dem Glühen theilweise zersetzt und folglich eine grössere Menge Bittererde in den unauflöslichen Theilen sich besinden musste. Wiederholte Versuche haben mich überzeugt, dass die 0,270 Gr. die richtige Menge der unauflöslichen Theile ist.
- b) Die von den unauslöslichen Theilen absiltrirte Flüssigkelt wurde mit Salpetersäure angesäuert und mit salpetersauren Silberoxyd gefällt. Das sorgfältig ausgewaschene Chlorsiber, getrocknet und in einem tarirten Porcellantiegel geschmolzen, wog 29,730 Gr.
- c) Die vom Chlorsilber abfiltrirte Flüssigkeit wurde mit Ammoniak gesättigt und mit kleesaurem Ammoniak gesällt. Der getrocknete Niederschlag wurde geglüht und lieserte 1,585 Gr. kohlensauren Kalk. Dieser wurde mit etwas ausgelöstem kohlensaurem Ammoniak angeseuchtet, abermals bis zum schwachen Rothglühen gebracht und dann wieder gewogen. Es wurde keine Gewichtsänderung wahrgenommen. Der kohlensaure Kalk wurde in Salpetersäure gelöst, die Lösung zur Trockne abgedampst, der trockne Rückstand in einem

ase mit absolutem Weingeist übergossen und sodann das as luftdicht verschlossen. Es löste sich Alles auf.

d) Die vom kleesauren Kalke absiltrirte Flüssigkeit wurde s zum Kochen erhitzt und während des Kochens so lange ihlensaures Kali zugesetzt, bis sich kein Ammoniak mehr verichtigte. Die gefällte Bittererde wurde nach dem Erkalten Flüssigkeit auf einem Filter gesammelt, getrocknet und gelüht. Es blieben 0,240 Gr. reine Bittererde.

Wir werden in den folgenden Paragraphen sehen, dass e löslichen Theile auch Chlorlithium und Chlorkalium entilten. Die Quantitäten dieser Körper sind aber so unbedeund, dass sie fast keine Aenderung in dem Resultate herirbringen; sie können daher vorläufig ganz übergangen und il der Berechnung mit Chlornatrium vertauscht werden. Diess im noch um so eher geschehen, weil das Mittel der Atomiwichte von Chlorkalium und Chlorlithium ziemlich genau dem
tomgewichte des Chlornatriums entspricht.

Eben so verhält es sich auch mit dem Brom- und Jodgeide, welche in den löslichen Thellen vorkommen. Be ist narlich, dass obige 29,730 Gr. Chlorsilber auch etwas Bromit
id Jodsilber enthalten. Ich habe von demselben 19,131 Gr.
einer Glaskugel geschmolzen und während des Schmelzens
i Stunde lang trocknes Chlorgas darüber geleitet. Der
ewichtsverlust, den dieselben erlitten, betrug kwum 0,063
i. Ich nehme daher in der folgenden Berechnung den
en erhaltenen Silberniederschlag als Chlorsilber an, werde
er später nicht allein das Kalium und Lithium, sondern auch
Brom und Jod mit in die Berechnung bineinziehen.

1,585 kohlensaurer Kalk = 1,750 Chlorcalcium. 0,240 Bittererde = 0,553 Chlormagnium.

> 1,750 Chlorcalcium = 1,118 Chlor, 0,553 Chlormagnium = 0,407 —

> > Chlorgehalt = 1,525 Gr.

27,730 Chlorsilber = 7,334 Chlor; arden hiervon abgezogen = 1,525 -

so bleiben Chlor = 5,809 Gr.

5,809 Chlor = 9,620 Chlornatrium.

1004 Gr. Wasser enthalten demnach

a) lösliche Theile:

Chlornatrium 9,620 Gr.

Chlorcalcium 1,750

Chlormagnium 0,553

b) unlösliche Theile 0,270 —

12,193 Gr.

Es wurden also durch die Untersuchungen in S. 2. 0,207 Gr. weniger feste Theile erhalten als in §. 1. Dieser Ueberschuss in §. 1 rührt ohne Zweisel von kleinen Antheilen Wasser her, welche aus der trocknen Masse nicht vollständig ausgetrieben wurden.

§. 3.

1004 Gr. Wasser wurden mit einigen Grammen kohlensaurem Natron versetzt und ziemlich rasch fast zur Trockne abgedampft. Die eingedampfte Flüssigkeit wurde mit Wasser verdünnt, der Niederschlag absiltrirt, dann mit Salzsäure gesättigt und zur Trockniss abgedampft. Die trockne Salzmasse wurde in Weingeist gelöst und mit einer geistigen Lösung von Chlorplatin vermischt. Es wurden 0,267 Gr. Chlorplatinkalium erhalten. Diese entsprechen 0,0816 Gr. Chlorkalium.

0,0816 Chlorkalium == 0,0641 Chlornatrium.

Dadurch vermindern sich die in S. 2 gefundenen 9,620 Gr. Chlomatrium auf 9,5359 Gr.

\$. 4.

..... Um die in dem Wasser enthaltene Menge Lithium, Brom und Jod bestimmen zu können, ersuchte ich Hrn. Dr. Engelmann in Kreuznach, eine bedeutende Quantität frisch geschöp tes Wasser an Ort und Stelle abzudampfen und mir den trocknen Rückstand zu übersenden.

Hr. Dr. Engelmann war nicht mit den erforderlichen Instrumenten versehen, welche zu einer genauen Bestimmun & der Menge Wasser, welche eingedampst wurde, nöthig ware. Ich musste daher dieselbe aus der erhaltenen Salzmasse zu be-Zu diesem Ziele kann man auf verschiedestimmen suchen. nen Wegen gelangen. Es kann erreicht werten durch W#gung der ganzen, wohl ausgetreckneten Salzmasse, oder durch

ägung der unauflöslichen Theile, oder auch durch Bestimmung Quantität eines Bestandtheils. Man sieht leicht ein, dass 2 ersten Methoden kein sicheres Resultat geben können; na hat es schon sehr viele Schwierigkeiten, nur eine kleine inge des Salzrückstandes vollkommen zu entwässern, ohne rch Zerknistern einen Verlust zu erleiden, so müssen sich se Schwierigkeiten in demselben Verhältnisse steigern, als 1 Menge desselben zunimmt. Die ganze Salzmasse musste er nothwendig zu der Bestimmung angewandt werden, .weil tht angenommen werden kann, dass die unauflöslichen Theile, elche sich heim Abdampsen absonderten, gleichmässig in der mzen Salzmasse vertheilt sind. Eben so wenig wird man s der Quantität der unauflöslichen Theile mit Sicherheit die stige Menge des Wassers, welches eingedampft wurde, finm können, weil beim Erhitzen der Salzmasse ein Theil des blormagniums zersetzt werden konnte.

Die Bestimmung des Kalkgehaltes in den löslichen Theilen hien mir am leichtesten ein richtiges Resultat zu geben. Es urde daher die trockne Salzmasse mit Wasser ausgezogen. ie erhaltene Lösung wurde mit so viel destillirtem Wasser mischt, dass eine Maassflasche 9 mal damit angefüllt wurde. In dieser Flüssigkeit wurde ein Maassglas voll, also der unte Theil, zur Untersuchung angewandt. Sie wurde mit Izsäure angesäuert, mit Ammoniak schwach übersättigt und i kieesaurem Ammoniak gefällt. Der getrocknete kleesaure ik gab 2,250 Gr. kohlensauren Kalk. Wird dieser Kalkwalt mit 9 multiplicirt, so erhält man 29,250 Gr. als Kalkwalt in allen löslichen Theilen.

Da nun 1004 Gr. Wasser eine Menge Chlorcalcium enten, welche 1,585 Gr. kohlensaurem Kalk entspricht, so it hieraus, dass obige 29,250 Gr. kohlensaurer Kalk 1852,816 oder 18,454 Liter Wasser anzeigen, denn

1,585:1004 = 29,250:1852,816 Gr.

Die unaufgelöst gebliehenen Theile wogen 5,093 Gr. 454 Liter Wasser entsprechen 4,995 Gr. unlöslichen StofHerr Dr. Engelmann schrieb mir, er habe 18 preussische
**Tt abgedampft. Nimmt man nun 71 Liter gleich 26 Quart,
**würden 18 Quart gleich 20,6 Liter sein. Die gewöhnlichen
**Leen Quartstaschen, welche in den preussischen Rheinprovin-

zen im Gebrauch sind, enthalten jedoch nie mehr als 1 Litre, wie ich durch mehrfache Messungen gefunden habe.

Die Flüssigkeit, aus welcher der Kalk durch Kleesäure gefällt war, wurde mit den übrig gebliebenen % der Lösung vermischt und derselben auch die eben erhaltenen 2,250 Gr. kohlensaurer Kalk, nach seiner Auflösung in Salzsäure, so wie noch 7 Liter, Wasser zugesetzt, von welchen durch Abdampfen die unauflöslichen Theile getrennt waren. Die Auflösung enthielt also im Ganzen die auflöslichen Theile von 25,454 Liter = 25555,00 Gr. Wasser. Sie wurde in einer Porcellanschale zum Kochen erhitzt und kochend mit kohlensaurem Natron gefällt. Nach dem Erkalten wurden der gefällte kohlensaure Kalk und die kohlensaure Bittererde absiltrirt.

Ein Theil des Niederschlags wurde getrocknet und geglüht. Seine Quantität betrug 5,040 Gr. Diese wurden in Salpetersäure gelöst, die saure Lösung mit Ammoniak gesättigt und der Kalk mit kleesaurem Ammoniak gefällt. Der erhaltene kleesaure Kalk gab 4,381 Gr. kohlensauren Kalk. Es bleiben also 0,659 Gr. Bittererde.

Die vom kleesauren Kalk abfiltriste Flüssigkeit wurde zur Trockne abgedampft und die trockne Masse in einer weiten Platinschale sehr langsam so lange erhitzt, bis nichts mehr sich versüchtigte. Die zurückgebliebene Bittererde wurde in Schwefelsäure gelöst, die Lösung in einem Platintiegel abgedampft und geglüht. Es blieben 0,895 schwefelsaure Bittererde = 0,646 Gr. Bittererde.

In §. 2 wurden aus 1 Litre Wasser 0,585 Gr. kohlen-saurer Kalk und 0,240 Gr. reine Bittererde erhalten.

Nun ist:

1,585:0,240=4,381:0,661.

Diese Versuche stimmen daher genau mit den in §. 2 gefundenen Verhältnissen überein.

§. 5.

Die von dem Kalk und der Bittererde getrennte Flüssigkeit wurde mit Phosphorsäure zur Trockne abgedampst und die trockne Masse mit heissem Wasser übergossen. Es blieben 5,490 Gr. phosphorsaures Natronlithium ungelöst zurück. Diese entsprechen 0,679 Gr. Lithium oder 1,903 Gr. Chlorlithium.

104 Gr. Wasser enthalten demnach 0,0080 Gr. Chlorli-9,0080 Chlorlithium == 0,0230 Gr. Chlornatrium.

7ird diese Quantität Chlornatrium von den in §. 3 erhal-9,5395 Gr. abgezogen, so bleiben 9,5165 Gr. Chlor-

as erhaltene phosphorsaure Natronlithium schmolz schon tintiegel, es war also frei von Bittererde.

\$. 6.

ie von dem Lithium getrennte Flüssigkeit wurde zur Beng des Broms und Jods benutzt.

ie Methoden, welche bis jetzt zur Bestimmung des Broms ben wurden, in Gegenständen, welche zugleich Chlor en, geben sämmtlich kein sehr genaues Resultat. Vom ischen Gesichtspuncte betrachtet, scheinen zwar einige wecke vollkommen zu entsprechen. Die Schwierigkeit, naues Resultat zu erhalten, liegt aber in der Ausführung. man die Heftigkeit kennt, mit welcher das Brom auf ether einwirkt, wenn man serner bedenkt, dass in den Verbindungen, welche durch diese Einwirkung gebildet , das Brom durch die gewöhnlichen Reagentien nicht mehr t werden kann, so wird man leicht begreifen, dass die érullas und Andern vorgeschlagenen Methoden nichts r als genau sein können. Um den Aether zu umgenabe ich in Geiger's Magazin Bd. XXXIII. vorgem, das Brom auf die Weise in Chlorbrom umzuwanlass man eine Salzmasse, welche aus Chlor- und Brombesteht, darstellt, diese dann durch Chlor zersetzt, das chiedene Brom in einer Vorlage auffängt und mit der atwickelung so lange fortfährt, bis sich 5fach Chlorbrom t; hat dieses wird sodann durch Kali in Chlorkalium und ures Kali verwandelt und mit salpetersaurem Silberoxyd

Es entsteht ein Niderschlag von Chlorsilber und brom-Silberoxyd. Dieses Gemenge wird geglüht und aus der nen Menge Sauerstoff die Quantität des Broms gefunden. Methode hat Berzelius dahin abgeändert, dass er den vaschenen Niederschlag von Chlorsilber und bromsaurem xyd in einer verkorkten Flasche mit Barytwasser mawodurch sich in der Flüssigkeit bromsaure Baryterde

bildet, ohne dass Chlorsilber zersetzt wird. Die broms Baryterde wird sodann in Brombaryum durch Glühen vers delt. Diese Methode ist aber umständlich, besonders went Menge des Broms nicht beträchtlich ist, und wegen der Flügkeit des Chlorbroms nicht leicht ein Verlust zu verme

Berzelius hat die Bestimmung der Atomgewichte des Bund Jods auf die Weise vorgenommen, dass er das Bund Jodsilber durch Chlor zerlegte. (Pogg. Ann. Bd. XIV 558.) Es ist einleuchtend, dass diese Methode auch zur quitativen Bestimmung des Chlors oder Jods dienen kann und sie Resultate geben muss, welche auch bei Vorhandensein Chlor genau sein müssen, indem man aus dem Gewichtsverl den ein Gemenge von Chlor und Bromsilber bei seiner setzung durch Chlor erleidet, die Menge des vorhanden gesenen Broms findet.

Ein Verlust von 43,00 entspricht also einem Atom = 78 Brom. Um mich von der Schärse dieser Methode zu über gen, habe ich solgende Versuche angestellt.

- 1) 1 Gr. geschmolzenes Chlorkalium und 0,15 Gr. schmolzenes Bromkalium wurden in Wasser gelöst und die sung mit salpetersaurem Silberoxyd gefällt. Das erhal Chlorbromsilber geschmolzen, wog 2,166 Gr.
- 1 Gr. Chlorkalium giebt 1,924 Gr. Chlorsilber
 0,15 Bromkalium 0,238 Bromsilber
 Chlorbromsilber 2,162 Gr.

Dieses Chlorbromsilber wurde geschmolzen in eine dünne P ausgegossen und dahn in kleine Stücke geschnitten. Von die wurde der grösste Theil in eine tarirte Glaskugel gebracht, an we an beiden Seiten Glasröhren angeschmolzen waren, in derse geschmolzen und nach dem Erkalten gewogen. Die Quantität Chlorbromsitters in der Glaskugel betrug 2,130 Gr. Die Glaskuwirde nun mit einem Chlorapparat in Verhindung gesetzt, Inhalt der Kugel zum Schmelzen gebracht und langsam Ström trucknes Chlorgas darüber geleitet. Das Chlorbromsiwurde beständig flüssig erhalten. Nachdem die Operation

nahe eine Stunde gedauert, wurde der Apparat auseinander genommen, der Inhalt der Kugel nach dem Erkalten in der Luft hin und her geschwenkt, bis kein Chlorgeruch mehr zu beobachten war, und dann gewogen. Das zurückgebliebene Chlorsilber wog 2,076 Gr. Es fand also ein Gewichtsverlust von 0,054 Gr. statt.

2,130:0,054=2,162:0,055;

es würden demnach obige 2,162 Gr. Chlorbromsilber einen Verlast von 0,055 Gr. gegeben haben.

43,00:78,39 == 0,055:0,1000 Brom.

4,15 Gr. Bromkalium enthalten 0,0999 Gr. Brom.

II. 12 Gr. geschmolzenes Chlorsilber und 0,500 Gr. geschmolzenes Bromsilber wurden auf die bereits angegebene Weise durch Chlorgas zerlegt. Der Gewichtsverlust betrug 0,112 Gr.

43,00:78,39 = 0,112:0,206 Gr. Brom.

9,500 Gr. Bromsilber enthalten 0,209 Gr. Brom.

Diese Versuche zeigen, dass die Resultate, welche nach dieser Methode erhalten werden, sehr genau sind. Sie müssen um so genauer sein, je mehr Brom im Vergleich zum Chlor verhanden ist.

Dieser Methode nun habe ich mich bedient, um die Menge des Broms im Kreuznacher Wasser zu finden.

Die vom phosphorsauren Natronlithium abfiltrirte Flüssigkeit werde mit Salzsäure gesättigt und durch Abdampfen ein grosser Theil des Kochsalzes herauskrystallisirt. Das Kochsalz wurde einem Trichter mit kaltem destillirtem Wasser einige Male abgewaschen und das Abwaschwasser mit der Mutterlauge vereinigt. Diese wurde sodann mit etwas sein geriebenem Braub. stein und Salzsäure gemischt. Der Apparat, in dem die Mischung Vorgenommen wurde, war so eingerichtet, dass die Salzsäure, ohne ihn zu öffnen, nachgegossen werden konnte; zugleich war er mit einer: Gasentwickelungsröhre versehen, welche in reine Kalilange mitindete. Um die Menge des Chlors nicht zu sehr zu vergedssern, wurde die Salzsäure nur in sehr kleinen Quantiliten næugefügt und, sowie sich keine rothen Dämpfe mehr zeigten und dieselben vollständig durch die Wasserdämpfe aus dem Apparate getrieben waren, sogleich die alkalische Lauge entfernt. Die letztere wurde zur Trockniss abgedampft,

der Rückstand geglüht, die geglühte Masse in Wasser gelöst und mit Essigsäure gesättigt. Es lässt sich nicht wohl eine andere Säure zur Sättigung anwenden, ohne dass Brom abgeschieden würde. Die mit Essigsäure gesättigte Flüssigkett wurde zum Kochen gebracht und dann mit salpetersaurem Silberoxyd gefällt. Der erhaltene Niederschlag wurde einige Male mit kochendem Wasser ausgewaschen, zur Entfernung des essigsauren Silberoxyds, welches niedergefallen sein konnte.

Dass das Kreuznacher Mineralwasser Jod enthält, ist durch verschiedene Chemiker gezeigt worden. Es entstand nun die Frage: wird das Jod durch die Behandlung der Mutterlauge mit Chlor ebenfalls ausgeschieden und verflüchtigt? Um diese Frage zu beantworten habe ich die Mutterlauge zur Trockniss abgedampst, die trockne Masse in einer Flasche mit Schweselsäure übergossen und den sich entwickelnden Dampf mit Stärkekleister in Berührung gebracht. Es wurde nicht die geringste Spur einer blauen Färbung wahrgenommen. Hieraus geht also hervor, dass das Jod mit dem Brom ausgeschieden wurde und dass sämmtliches Brom, welches aus jodhaltigen Gegenständen direct durch Chlor ausgeschieden wird, jodhaltig sein muss. Um es vom Jod zu reinigen, muss man es in Kalilauge lösen. Der Niederschlag, der sich bildet, enthält sämmtliches Jod als jodsaures Kali, während das Bromkalium gelöst bleibt, woraus sich dann ein reines Brom gewinnen lässt.

Side

132

Um nun die Menge des Jods zu finden, wurde der mit salpetersaurem Silberoxyd erhaltene Niederschlag mit sehr concentrirter Ammoniakslüssigkeit übergossen. Es blieben 0,020 Gr. Jodsilber ungelöst. Dieses wurde mit Eisen und Wasse übergossen und nach stattgefundener Zersetzung zur erhaltene Lösung Salpetersäure gefügt, wodurch sogleich Jod gefäll 🗲 wurde. Demnach enthalten 25555,00 Gr. Wasser 0,010 Gr. Jod. Die vom Jodsilber absiltrirte ammoniakalische Lösung wurde mit Wasser verdünnt und mit Salpetersäure gefäll -Der erhaltene Niederschlag wurde getrocknet und geschmolzen sein Gewicht betrug 17,250 Gr. Von diesen wurden 15,53 Gr. auf die eben angegebene Weise durch Chlor zerselzt -Nachdem die Operation eine Stunde gedauert, wurde der Apparati mit dem Chlorsilber gewogen und dann abermals 1/2 Stund lang langsam Chlorgas über dasselbe geleitet. Es fand keise

Gewichtsunterschied mehr statt. Der Gewichtsverlust betrug 0,395 Gr., diess macht auf 17,250 Gr. Chlorbromsilber 0,438 Gr. 25555,00 Gr. Wasser enthalten daher 0,800 Gr. Brom. Nimmt man nun an, Jod und Brom seien mit Magnium verbunden, so erhält man auf die angegebene Menge Wasser 0,0118 Gr. Jodmagnium und 0,930 Gr. Brommagnium.

Folglich enthalten:

1001 Gr. Wasser 0,00162 Gr. Jodmagniom, 1001 — 0,08639 — Brommagnium.

Nun sind

0,00462 Jodmagnium = 0,00160 Chlormagnium,
0,0 639 Brommagnium = 0,01920 —

zusammen = 0,02080 Chlormagnium.

Zieht man diese Quantität Chlormagnium von den eben gefundenen 0,553 Gr. ab, so bleiben noch auf 1004 Gr. Wasser
0,5324 Gr. Chlormagnium.

Stellt man nun sämmtliche Resultate zusammen, so erhält man für 1004 Gr. Wasser folgende Quantitäten löslicher Salze:

Chlornatrium	9,52790 Gr.
Chlorkalium	0,08160 —
Chlorlithium	0,00800 —
Chlorcalcium	1,75000
Chlormagnium	0,53240 —
Brommagnium	0,03639 —
Jodmagnium	0,00162 —
-	11,94091 Gr.
unlösliche Theile	0, 2 7000 —
	19,91091 Gr.

S. 7.

Untersuchung der in Wasser unlöslichen Theile.

Durch die Bestimmung der in Wasser löslichen Theile Wurde eine so grosse Menge Wasser in Untersuchung genommen, dass ich 7,290 Gr. bei 100° getrocknete, in Wasser unauflösliche Theile in Untersuchung nehmen konnte. Diese entsprechen 27 Litern = 27108,00 Gr. Wasser. Dieselben wurden in einer Platinschale mit verdünnter Salpetersäure übergossen, mit einem Glase bedeckt und bei gelinder Wärme zur Trockne

abgedampst. Das Glas wurde dabei nicht angegrissen. Die trockne Salzmasse wurde mit Salpetersäure angeseuchtet, nach 1/2 Stunde mit Wasser übergossen und das Gelöste von dem Unausgelösten getrennt. Es blieben 0,470 Gr. geglühte Kieselerde. Diese hatte eine röthliche Farbe. Sie wurde mit kohlensaurem Natron geschmolzen. Die geschmolzene Masse, aus die gewöhnliche Weise zerlegt, gab 0,461 Gr. reine Kieselerde und 0,069 Gr. Eisenoxyd mit Spuren von Mangan.

Es enthalten daher 1004 Gr. Wasser 0,0170 Gr. Kieselerde.

\$. 8.

Die von der Kleselerde abfiltrirte Flüssigkeit wurde mit Ammoniak übersättigt. Der dadurch entstandene Niederschlag wurde bei abgehaltener Luft auf einem Filter gesammelt, dann in Salzsäure gelöst und die Auflösung mit Kalilauge gekocht. Die alkalische Lösung, mit Salzsäure gesättigt und mit Ammoniak gefällt, gab 0,090 Gr. phosphorsaure Thonerde.

1004 Gr. enthalten folglich 0,00330 Gr. Die Phosphorsäure wurde durch Zerlegung der Thonerdesalze mittelst Kiesel-feuchtigkeit nachgewiesen.

§. 9.

Die von der Kalilauge unaufgelöst gebliebenen Theile wurden in Salzsäure gelöst, die Auflösung mit Ammoniak genaugesättigt und das Eisenoxyd mit bernsteinsaurem Ammoniak gefällt. Da die Korkstöpsel, welche zum Verschlusse der Flaschen dienten, in welchen das Wasser mir zugesandt wurde, sehr stark schwarz gefärbt waren, so wurden sie mit verdünnter Salzsäure ausgewaschen. Die salzsaure Lösung wurde mit Ammoniak gefällt und das erhaltene gerbstoffsaure Eisenoxyd mit dem erhaltenen bernsteinsauren Eisenoxyd vermischt. Nach dem Glühen blieben 0,325 Gr. Eisenoxyd. Rechnet man die in §. 8 erhaltenen 0,009 Gr. hinzu, so erhält man 0,334 Gr. oder in 1004 Gr. Wasser 0,8120 Gr.

Die vom Eisenoxyd abfiltrirte Flüssigkeit wurde mit Sohwefelwasserstoff – Ammoniak gefällt. Das erhaltene Schwefelmangan, durch Salzsäure zerlegt und die salzsaure Lösung durch
kohlensaures Kali gefällt, gab 0,008 Gr. Manganoxydal.

S. 10.

Die Flüssigkeit, welche von dem durch Ammoniak erhalnen Niederschlag (§. 10) abfiltrirt war, lieferte, mit kleesaum Ammoniak gefällt, 6,017 Gr. kohlensauren Kalk.

Dieser wurde in Salpetersäure gelöst und die Auffösung ir Trockne verdunstet. Der vollkommen trockene Rückstand urde mit absolutem Weingeist behandelt. Das Unaufgelöste urde in Wasser gelöst und die Lösung mit kleesaurem Amoniak gefällt. Der entstandene Niederschlag, getrocknet und eglüht, gab 0,060 Gr. kohlensaures Salz. Dieses wurde in alzsäure gelöst und die Lösung abgedampft. Die zurückgeiebene Salzmasse färbte weder die Weingeiststamme noch das erzenlicht roth. Die wässrige Auflösung trübte Gipswasser hr stark. Eben so brachte sie in einer Lösung von schwelsaurem Strontian nach kurzer Zeit eine deutliche Trübung rvor. Hieraus folgt, dass obige 0,060 Gr. als kohlensaurer ryt berechnet werden müssen. Es bleiben demnach noch 957 Gr. kohlensaurer Kalk.

1004 Gr. Wasser enthalten daher 0,00220 Gr. kohlens. Baryt, 1004 — — — 0,22130 — — Kalk.

Ob die kleine Menge Baryt als kohlensaurer Baryt oder Chlorbaryum vorhanden ist, lässt sich nicht bestimmen.

S. 11.

Die vom Kalk abfiltrirte Flüssigkeit (§. 10) wurde abgeampft und die trockne Masse vorsichtig in einer weiten Plaaschale so lange erhitzt, bis sich nichts mehr verflüchtigte. Das
urückgebliebene wog 0,389 Gr. Dieser Rückstand wurde in Salziure gelöst und mit Schwefelwasserstoff-Ammoniak vermischt. Das
haltene Schwefelmangan, in Salzsäure gelöst und abermals mit
hlensaurem Kali versetzt, lieferte 0,013 Gr. Manganoxydoxydul.
bleiben demnach 0,376 Gr. Bittererde. Rechnet man zu den
13 Gr. Manganoxydoxydul die in §. 9 erhaltenen 0,008 Gr.,
erhält man 0,021 Gr.

04 Gr. Wasser enthalten also 0,00080 Gr. Manganoxydoxydul, 04 — — 0,01384 - Bittererde.

Die in Untersuchung genommenen 7,290 Gr. unauflösliche bestehen demnach aus:

ı	,	1004 Gr. Wassel
Kohlensaurem Kalk	5,976 Gr.	0,2213 Gr.
kohlensaurem Baryt	0,060 -	0,0022 -
Bittererde	0,376 -	0,0139 -
Eisenoxyd	0,334 -	0,0124 -
Manganoxydoxydul	0,021 -	0,0008 -
phosphorsaurer Thonerde	0,090 -	0,0033 -
Kieselerde	0,461 -	0,0170 -
de la constante de la constant	7,318 Gr.	0,2709 Gr.

S. 12.

Das Kreuznacher Mineralwasser enthält nach der angegebenen Untersuchung folgende Bestandtheile:

	In 1000 Th.	In 10,000 Th.
Chlornatrium	9,48999	94,8999
Chlorkalium	0,08121	0,8121
Chlorlithium	0,00797	0,0797
Chlorcalcium	1,74340	17,4340
Chlormagnium	0,53008	5,3008
Brommagnium	0,03624	0,3624
Jodmagnium	0,00460	0,0460
kohlensauren Kalk	0,22042	2,2042
kohlensauren Baryt	0,00220	0,0220
Bittererde	0,01384	0,1384
Eisenoxyd	0,01999	0,1999
phosphorsaure Thonerde	e 0,003 29	0,0329
Manganoxydoxydul	0,00080	0,0080
Kieselerde	0,01683	0,1683
· ·	12,17086	121,7086;

serner freie Kohlensäure, deren Quantität nicht bestimmt wurde.

XXVIII.

Ural-Orthit und Irit, zwei neue Mineralien.

Von

R. HERMANN.

I. Ueber den Ural-Orthit.

r dem Namen von Tschewkinit erhielt ich kürzlich aus Mineral, das zwar ganz das äussere Ansehen von nit hatte, dessen bedeutend geringeres spec. Gew. je-on. auf einen wesentlichen Unterschied zwischen beiralien hindeutete. Ich unterwarf daher dasselbe einer Untersuchung, deren Resultate ich mir erlaube, nach-itzutheilen.

es Mineral, welches ich Ural-Orthit genannt habe, finin der Umgegend von Miask in dem ilmenischen GeBegleitung von Zirkonen. Das Stück, welches ich bete ein Gewicht von 8½ Unzen. Es zeigte keine Spur
tallisation, hatte eine nierenförmige Gestalt und bestand
hgängig aus reinem Mineral. Nur hin und wieder
ch kleine Partien eingewachsenen fleischrothen Felduch kleine Krystalle von beigemengten Zirkonen wanweise zu bemerken.

spec. Gew. des ganzen Stückes betrug 3,33. çesuchte Stücke ganz reinen Ural-Orthits zeigten ein vicht von 3,41.

Härte kam der des Feldspaths nahe.

Mineral hat einen klein- und flachmuschligen Bruch, raune Farbe, ist undurchsichtig oder doch nur an den Kanten etwas durchscheinend, glänzend, von einem ler nicht ganz dem Glasglanze entspricht und den ich z nennen möchte.

dem Löthrohre verändert sich das Mineral bei schwaegraden gar nicht. Bei stärkeren Hitzegraden schmilzt
n Kanten zu einem blasigen schwarzen Glase, wobei
menkohlähnlichen Verzweigungen auswächst.

Kolben verändert es sich nicht, giebt aber etwas Wasser. lorax löst sich der Ural-Orthit in der Oxydationsslamme in der Hitze gelben, nach der Abkühlung farblosen. prakt. Chemie. XXIII. 5.

Glase auf. In der Reductionssamme erscheint die Farbe in der Hitze grünlich.

Phosphorsalz greift das Mineral schwierig an, doch löst es sich endlich unter Eisenreaction und mit Hinterlassung von Kieselerde auf.

Der Ural-Orthit giebt ein grünlich-graues Pulver, welches beim Glüben an der Luft seine Farbe verändert und rothbraun wird.

Concentrirte Salzsäure zersetzt das sorgfältig geschlämmte Mineral vollständig, wobei die Lösung nach Verjagung der überschüssigen Säure beim Eindampfen gelatinirt.

Die qualitative Analyse gab als Bestandtheile des Ural-Orthits: Kieselerde, Ceroxydul, Lanthanoxydul, Eisenoxydul, Manganoxyd, Thonerde, Kalk, Magnesia und Wasser.

Von Yttererde und Zirkonerde, die nach der Natur und den Begleitern des Minerals darin hätten vermuthet werden können, fanden sich keine Spuren.

Zur quantitativen Trennung der erwähnten Bestandtheile wurde die Zersetzung des Minerals durch Salzsäure gewählt, die Kieselerde auf bekannte Weise abgeschieden und die audonen Bestandtheile durch Aetzammoniak, kleesaures und basisch - phosphorsaures Ammoniak in Ammoniak - Niederschlags, kleesauren Kalk und phosphorsaure Magnesia getrennt. Ammoniakniederschlag wurde in Salzsäure gelöst, die überschüssige Säure durch Kali saturirt und durch überschüssiges schwefelsaures Kali das Ceroxydul und Lanthanoxydul als Deppelsalze ausgefällt, die dann durch Verwandeln in salpetersaure Salze, Glüben derselben und Trennung des Lanthenoxyds von dem Ceroxyde durch 100fach verdünnte Salpetersäure geschieden wurden. Der weitere Verlauf der Untersuchung bedærf weiter keiner Erwähnung, da er nach binreichend bekannten und bewährten Methoden ausgeführt wurde. Man erhielt auf diese Weise aus 100 Theilen Ural-Orthit:

Latus .	93,37.
Eisenoxydul	13,03
Lanthanoxydul	6,54
Ceroxydal	10,85
Thonerde	18,21
Kalk	9,25
Kieselerde	35,49
	0.000000

Transport	93, 37
Manganoxyd	2,37
Magnesia	2,06
Warner	2,00
Verlust	0,80
	100,00.

Diese Zusammensetzung zeigt eine auffallende Achnlichkeit mit der des Orthits, wie aus nachstehender Vergleichung beider Mineralien hervorgehen wird.

Nach Berzelius.

(rthit von Kinbo.	Orthit von Gott- liebs-Gang.	Ural-Orthit von Miask.
Kieselerde	36,2 5	82,00	35,49
Kalk	4,89	7,84	. 9,35
Thonerde	14,00	14,80	18,21
Ceroxydul un		•	
Lanthanoxy	dul 17,39	19,44	17,39
Bleenbrydul	11,48	13,44	13,03
Manganoxyd	1,36	3,40	2,37
Yitererde.	3,80	3,44	. 0
Magnesia	0	0	2,06
WARREL	8,70	5,30	2 ,00
Verlüst	2,19	1,28	0,20
Bumme	100,00	100,00	100,00.

Doch zeigen sich einige Verschiedenheiten, die theils nur wirklich begründet sind.

En den scheinbaren Verschiedenheiten zwischen beiden Misteralien rechne ich das Vorkommen von Lanthanoxyd in dem Ural-Orthit, während es in den Analysen des Orthits nicht aufgeführt ist. Da das Lanthan ein gewöhnlicher Begleiter des Cara ist, so dürfte es mehr als wahrscheinlich sein, dass der Orthit ehenfalls Lanthan enthält.

Wirkliche Unterschiede in der Zusammensetzung des Ural-Orthits und Orthits sind aber folgende:

Der Orthit enthält Yttererde, die im Ural-Orthit alcht vormt, daria aber durch Magnesia ersetzt wird.

Kin anderer Unterschied zwischen beiden Mineralien ist in dem grüssern Wassergehalte des Orthits begründet. Dieser grössere Wassergehalt bewirkt das für den Orthit charakterische Deschweisen bei dem Erhitzen, das dem Ural-Orthit nicht die en ist und wodurch sich beide Mineralien schon durch das Löthrohr unterscheiden lassen.

II. : Ueber den Irit.

Ich habe den Irit schon vor mehreren Jahren beschrieben; da aber die betreffende Abhandlung im Auslande unbekannt geblieben zu sein scheint, so erlaube ich mir, hier nochmals auf diesen Gegenstand zurückzukommen.

Der Irit findet sich am Ural in Begleitung von Platin. In grösseren Stücken gediegenen Platins fülk er häufig die Räume aus, die sich zwischen den einzelnen Metallkörnern finden. Besonders reich an Irit sind die dunkleren eisenhaltigeren Platinsorten.

Wenn man das ural'sche Platin in Königswasser auflöst, so bleibt der Leit gemeinschaftlich mit Osmium - Iridium, Titancisen, Chromeisen, Hyacinthen u. s. w. ungelöst. Aus diesen Rückständen der Lösung des Platins lässt sich der Irit leicht auswaschen, da er wegen seines geringen spec. Gewichtes und wegen seiner feinschuppigen flitterigen Structur leichter im Wasser suspendirt bleibt als. die anderen Bestandtheile des Rückstandes.

Der Irit scheint schon häufig beobachtet, aber bisher immer verkannt worden zu sein, da ihn Kinige für Osmium-Iridium, Andere für Iridoxydul, noch Andere für ein Gemenge von Osmium-Iridium mit Chromeisen hielten, Annahmen, denem ich auf das Bestimmteste widersprechen muss.

Der Irit ist ein seinschuppiges schwarzes absärbendes graphitähnliches Mineral, welches bei vollkommenerer Ausbildungeseiner Structur als stark glänzende Flitterchen erscheint.

Bein spec, Gew. beträgt 6,056.

13b Der Irit ist in Säuren und auch in Salpetersalzsäure gunzunlöslich, dagegen wird er von schmelzendem Salpeter unter Katwickelung von Osmienbiexyd zersetzt. Am leichtesten und vollständigsten erfolgt seine Zerlegung, wenn man ihn mit Chlor-kalium: mischt und über diese zum Glühen erbitzte Mischung Chlorgas leitet. Die Mischung fürbt sich hierbei dunkelbraen und löst sich mach beendeter und zwecknässig geleiteter Operation vollständig in Wasser mit der Farbe des rothen Weins auf. Beim Nerdunsten dieser Aufläsung setzen nich duskelpreiten, fact sehwars erscheinende Octabler eines dreifschen Salmes des Klüssigkeit und "wasscheinende Octabler eines dreifschen Salmes der Klüssigkeit und "wasscheinende Octabler eines dreifschen Salmes der Klüssigkeit und "wasscheinende Octabler eines dreifschen Salmes der Klüssigkeit und "wasscheinende Octabler eines dreifschen Salmes aus der Klüssigkeit und "wasscheinende Octabler eines dreifschen Salmes has has has har Klüssigkeit und "wasscheinende Octabler eines dreifschen Salmes har har Klüssigkeit und "wasscheinende Octabler eines dreifschen Salmes har har Klüssigkeit und "wasscheinende Osmitunischlorid — und

the position of the same that the same

idiumchlorid - Chlorkalium bestehen. In der Lauge bleibt Chromid Eisenchlorid, die durch Weingeist von dem Osmium- und idiumsalze getrennt werden können.

Mischt man jene schwarzen Octaëder mit ihrem doppelten ewichte trocknem koblensaurem Natron und glüht man das emenge in einer Retorte, so sublimirt sich Osmiumbioxyd und rück bleibt Iridiumsesquioxydul, welches aber immer noch el Osmium enthält, das ihm durch Digestion mit Königswasr, Reduction des ungelöst gebliebenen Iridiumoxyduls durch lasserstoffgas und längeres Glühen des Iridiums an der Luft fzogen werden muss. Als Aequivalent des im Mineral entitenen erhielt man eine Quantität Iridium, die 62,86g vom wicht des Minerals an Iridiumsesquioxydul entsprachen.

Die vom Weingeist aufgenommenen Eisen- und Chromlze wurden auf bekannte Weise getrennt und gaben die Aeivalente von 12,50% im Mineral enthaltenen Eisenoxyduls und n 13,70 Chromoxydul.

Der Osmiumgehalt des Minerals wurde direct bestimmt, inm man 20 Gran Irit in einer Porcellanretorte mit Salpeter hmelz, den Rückstand mit einer reichlichen Menge Salpeter-Izsaure übergoss, die überschüssige Säure abdestillirte und B bei dem Schmelzen des Minerals mit Salpeter sowohl als e bei der Destillation erzeugten flüchtigen Producte im vorwohlagenen Aetzammoniak auffing. Man erhielt dahol eine tseigkeit, die, nach vorhergegangener Neutralisation, mit hwefelwasserstoffgas einen Niederschlag von 3,75 Gran Schwelosmium erzeugte, wofür man 2,0614 Gran oder 10,8079 vom swicht des Minerals an Osmiumoxydul in Rechnung brachte.

Ausserdem versuchte man noch, den Gehalt des Irits an uerstoff direct zu bestimmen, indem man das Mineral in elm Strome von Wasserstoffgas glühte. Obgleich sich hierbei asser erzeugte, so gelang es doch nicht, auf diese Weise i'scharfes Resultat zu erhalten; man berechnete daher 'den uerstoffgehalt des Irits aus der Differenz der abgeschiedenen etalle und des Gewichtes des zur Analyse verwandten Minerals.

Man erhielt also aus 100 Theilen, Jrit :-

278 Schweizer, üb. das Mangansilicat von Tinzen.

Iridsesquioxydal	62,86
Osmiumoxydal -	10,30
Eisenoxydul	12,50
Chromoxydul	13,70
Manganoxyd, Spur	•
	99,36,

Man könnte den Irit als eine Verbindung von Iridosmiumoxydul mit Chromeisenoxydul betrachten, in der der Sauerstofgehalt beider Oxydgruppen gleich ist, nach folgender Formel:

 $(0s \ \ddot{J}r_3 + \dot{F}e_4 \ \ddot{C}r_3).$

Die nach dieser Formel berechnete Zusammensetzung des Irits würde in 100 Theilen betragen:

Iridsesquioxydul	62,85
Osmiumoxydul	10,18
Eisenoxydui.	13,31
Chromoxydul	13,66
	100,00.

XXIX.

Notis über das Mangansilicat von Tinsen.

Von.

Dr. EDUARD SCHWEIZER.

Im 51. Bande der Ann. de Chim. et de Phys. *) theille Borthier die Analyse eines Manganoxydsilicates mit, welches eine Compagnie, die in der Umgegend von Chur, im Cantos Graubändten in der Schweiz, bergmännische Nachforschungenanstellte, bei Tinzen in beträchtlicher Menge aufgefunden hatte-

Ich hatte den Anlass, dieses Manganerz ebenfalls zu untersuchen, und erlaube mir, einige Beiträge zur Kenntniss desselben zu geben.

Auf der Südostseite der Alpe Err im Oberhalbstein tretemmehrere Lager dieses Erzes angeblich mit Braunstein und Schwarzeisenstein in horizontaler Richtung über einander imm

^{*)} Dies. Journ. Bd. XVI. S. 896.

Schweiner, üb. das Mangansilicat von Tinzen. 279

r zum Vorschein. Das unterste und mächtigste Lager ist unmitbar von Eisenkiesel und dieser von Kieselschiefer überlagert. er Abbau dieses Ganges musste bald unterbrochen werden, letzterer durch eine senkrechte Gneiswand abgeschnitten urde.

Das unter diesen Verhältnissen vorkommende Mangansilit bildet eine dichte harte, ziemlich spröde Masse von körgem Bruch und schwarzer Farbe, welche an einzelnen Stellintensiver ist als an den anderen. Im Ganzen ist es matt, rhie und da zeigt es schwachen Metallglanz. Sein Pulver dünkelbraun. Beim Erhitzen verliert es sehr bald Wasser beim Glühen Sauerstoff. Von Salzsäure wird es in der Ite nur langsam angegriffen, allein in der Wärme wird es reh dieselbe ziemlich schnell unter Chlorentwickelung und scheidung der Kieselerde in gallertartigem Zustande vollndig zerlegt.

Das zur Analyse bestimmte Material wurde vorher sehr sorgtig von allen sichtbaren fremdartigen Beimengungen gereinigt. e Substanz wurde durch Salzsäure aufgeschlossen, wobei die nze Quantität der Kieselerde sich gallertartig ausschied. Zur antitativen Bestimmung des Sauerstoffes, der in dem Erze das angan zu einem höhern Oxyde, als das Manganoxydul ist, rdirt, wandte ich die Methode *) an, nach der man in eine Pauflösung von Chlorbaryum in liquider schweftiger Säure Ausschluss der Luft die Menge von Chlor leitet, welche einem bestimmten Gewichte des Manganerzes durch Salz
e entwickelt wird, und aus der Menge des erhaltenen schweauren Baryts die des Sauerstoffes berechnet, welche der Quandes entwickelten Chlors entspricht. — Diese Methode kann,
in sie mit gehöriger Vorsicht ausgeführt wird, sehr genaue ultate geben.

Die Analyse des Minerals lieferte folgendes Resultat: In 100 Theilen wurden gefunden:

^{*)} Berzelius's Lebrbuch, B. III. S. 483.

280 Schweizer, üb das Mangansilicat von Tinzen.

	1.	2.	3.	4.
Manganoxydul	68,40	70,65		
Sauerstoff	7,95	8,00	7,60	7,30
Eisenoxyd	3,70			٦.
Kalk	1,70			
Kieselerde '	15,50			
Spuren von Thonerde	•			
Wasser u. Verlust	2,75			
•	100,00.			

Die verschiedenen Analysen wurden mit Material von verschiedenen Stücken von dem Erze ausgeführt.

68,40 Manganoxydul brauchen 7,65 Sauerstoff, 70,65 Manganoxydul 7,90 Sauerstoff, um sich in Manganoxyd umzuwandeln. Das gefundene Resultat stimmt sehr nahe mit dem berechneten überein, und es ist hiernach anzunehmen, dass in dem Manganerze alles Mangan als Oxyd enthalten ist.

Da das Mineral Wasser enthält, so ist es sehr wahrscheinlich, dass dasselbe ein Gemenge von Manganoxydhydrat mit einer Verbindung von Kieselerde mit Manganoxyd ist. In welchen Atomverhältnissen die Kieselerde mit dem Manganoxyd verbunden ist, liesse sich durch eine genaue Bestimmung des Wassergehaltes entscheiden; allein bei der Ungleichartigkeit des Gemenges ist wohl hinreichende Genauigkeit einer solchen Bestimmung kaum zu erreichen. — Nach einer annähernden Berechnung möchte vielleicht der Substanz die Verbindung Mn₂ Sizu Grunde liegen.

Berthier fand in 100 Th. des Minerals: 70,7 Manganoxydul, 1,0 Eisenoxyd, 1,0 Thonerde, 2,8 Quarz, 15,4 gallertartige Kieselerde, 6,1 Sauerstoff. (Zur Bestimmung des letztern wurde die Methode mit Kleesäure angewandt.)

Die Quantität von Sauerstoff reicht nach dieser Analyse nicht hin, um die ganze Menge des Manganoxyduls in Oxyd zu verwandeln. Zufolge des gefundenen Verhältnisses von Sauerstoff hält es Berthier für das Wahrscheinlichste, das Mineral als ein Gemenge von Silicat des Manganoxydoxyduls mit Manganoxydhydrat zu betrachten. Die Existenz einer Verbindung von Kieselerde mit Manganoxydoxydul ist jedoch sehr zu bezweifeln.

Dufresnoy, Beschreibung des Greenovits. \$81

Analyse eines Braunspathes von Tinzen.

Ich benutze die Gelegenbeit, die Analyse eines Braunathes mitzutheilen, welcher sich durch seinen hoben Gehalt
a kohlensaurem Eisenoxydul vor den bis jetzt analysirten auseichnet. Er unterscheidet sich in seinen physikalischen Eienschaften von dem gewöhnlichen Braunspathe nicht besonders.
Ir ist von weisser Farbe. Die Analyse gab folgendes Resultat:

_	99,50.
in Salzsäure unlöslicher Rückstand	0,75
kohlensaures Eisenoxydul	25,40
kohlensaure Talkerde	26,95
Kohlensaurer Kalk	46,40

XXX.

Beschreibung des Greenovits.

Von

DUFRESNOY.

(Compt. rend. T. XI. p. 284.)

Die Entdeckung dieser Substanz, die aus Titan und Mann zusammengesetzt ist, füllt eine Lücke in dem allgemeinen mälde der Mineralien aus. Bis jetzt ist wirklich der Crichnit das einzige bekannte Titanat, und seine Bestimmung als ecies lässt noch etwas zu wünschen übrig.

Der Greenovit ist im den Manganlagerungen von St. Marcel Piemont gefunden worden, eingeschlossen in das krystalliche, wahrscheinlich metamorphische Terrain. Er bildet ine rosenrothe Aederchen, die unregelmässig die Masse durchfen; er ist begleitet von Epidot, von manganhaltigen Graen und von Quarz; die Entdeckung dieser Substanz verdans wir dem Hrn. Bertrand-le-Long, der seit mehreren hren zu mineralogischen Zwecken die Umgegend von St. Arcel mit grosser Beharrlichkeit und vieler Sorgfalt durchseht. Er hatte geglaubt, dass der Greenovit eine kieselsaure anganverbindung sei, und unter diesem Namen denselben mehren Sammlungen in Paris zukommen lassen.

Da jedoch die Winkelmessung des rosensarbenen Minerals n St. Marcel weder mit der Gestalt der bekannten kieselsauren Verbindungen in Einklang zu beingen war, noch auch mit der Krystallisation des Sphens, dem er durch seine äusseren Charaktere ähnlich ist, so machte ich einige Versuche mit dem Löthrohr, die mich belehrten, dass es Mangan und Titan enthalte; ausserdem glaubte ich Kiesel darin wahrgenommen zu haben.

Ich bat den Herrn Cacarrié, Ingenieureleven des Bergbaues, eine Analyse desselben zu machen. Er fand, dass diess Mineral wesentlich aus Titan und Mangan zusammengesetzt ist. Was den Kieselgehalt anbetrifft, so entsteht derselbe aus den kleinen Quarzgeweben, die zwischen den Blättchen des Greenovits liegen.

Die wesentlichen Unterschiede, die dieses neue Mineral gegen alle wirklich beschriebenen herausstellt, machen dasselbe zu einer neuen Species, die ich mit dem Namen Greenovit bezeichnet habe, zu Ehren des Herrn Greenough, dem wir die schöne geologische Karte von England verdanken.

Der Greenovit sindet sich in Krystallen und kleinen krystallenischen gestaltlosen Massen; er besitzt eine dreifache sehr leichte Spaltbarkeit, die seine primitive Form bestimmt; die beiden den Verticalebenen parallelen Spaltungen, die mit einander einen Winkel von 110° 35' machen, sind schön und spiegelne.

XXXI.

Ueber das Muttergestein des Goldes in der Provinz Minas in Brasilien.

Aus einem Briefe von Amadäus Burat an Elie de Beaumont.

(Compt. rend. T. XII. p. 252.)

Das Muttergestein des Goldes in der Provinz Minas in Brasilien bietet einige besondere Erscheinungen dar, die durch eine Prüfung der Proben, die ich Ihnen vorzulegen die Ehre habe, ihre Würdigung erhalten. Diese Proben kommen aus dem Bergwerk von Taquary, in welchem übrigens das Gestein identisch mit dem der bekanntesten Gruben von Gongo - Spoco ist *).

^{*)} Herr Amadaus Burat, Professor derGeologie an der École

Das Gold findet sich im ursprünglichen Zustande in Blechen I losen Blättern in einem ehtschieden geschichteten Boden. er Felsarten bergen dasselbe, von denen aber zwei sich nur metamorphischen Zustande befinden und ausserdem versiedene andere metallhaltige Verbindungen enthalten.

Der hauptsächlich goldhaltige Fels ist der Jacotinga, der hals quarziger compacter röthlicher Fels von blättriger ruttur zeigt (und vor dem Löthrohr nicht fliesst). Die Scheing der einzelnen Blätter ist durch den schwärzlichen brüchin Eisenglanz bezeichnet, wie er in gewissen vulcanischen idungen vorkommt. Das Gold trifft man da in kleinen, oft igen Stücken (pépites), besonders in den Platten, wo sich Eisen findet.

Ueber dem Jacotinga findet sich ein Sandstein aus Körnchen n krystallinisch durchsichtigem Quarz, welcher nach der Richig der Ablagerungsschichten Eisenglanz und kohlensaures anganoxyd enthält; das Gold begleitet diese beiden Metalle; findet sich als Klappersteine, die einen krystallinischen Anhein haben, wie Dendriten. Der Metamorphismus dieser bein Felsen und das oft krystallinische Aeussere des Goldes dürfndas Vorkommen des letzteren wohl mit den in der Geologie kannten Erscheinungen in Einklang bringen.

Die beiden anderen Felsen haben keinen metamorphischen schein; das Gold zeigt in ihnen keine krystallinische Bildung.

So findet es sich in einem Talkschiefer zwischen den Blätn eingeschaktet in langen Blechen, die oft mehr als ein Milteter Dieke haben, sonst aber sehr zart sind. Man hat sole Bleche gefunden, die 25 Centimeter lang waren. In dem
ionschiefer, einer Schieferbildung, die der von Angers ana; ist, findet sich das Gold ebenfalls in Blättchen von merklidiger Dünnheit und Ausdehnung *).

trale, hat diese Proben von einem seiner Brüder erhalten, der sie b einem mehrjährigen Aufenthalt in Brasilien von da mitbrachte.

^{*)} Herr Regnault und ich haben diese Goldbleche vor der pe untersucht und bemerkt, dass sie allenthalben, wo nur eine Verung in der Oberstäche war, sich als krystallinische Flächen zeig-

284 Burat, üb. das Muttergestein des Goldes etc.

In diesen beiden Felsen endlich findet man auch keinen Eisenglanz und kohiensaures Manganoxyd mehr; auf welche Weise kann wohl das Gold, dessen Bildung mit der dieser Felsen nicht als gleichzeitig angesehen werden darf, hier bineingebracht sein?

Die Goldförderung hat zu Taquary auf die vier Felsen hingeführt, aber dort wie zu Gongo-Socco ist der am meisten durchsuchte Fels der Jacotinga. Die Förderung ist an vielen Stellen der Provinz Minas unter freiem Himmel begonnen und durch unterirdische Arbeiten fortgesetzt. Man macht in den Stufen zwei Erzscheidungen, eine reiche, mit Hämmern gehauem und in Mulden (bateas) gewaschene, die andere arme Stufe für das Pochwerk und die Waschtröge. Das Erz von Goage-Socco ist von allen das einträglichste; zwei Jahre hindurch hat die mittlere Production täglich 15 englische Pfund Geld betragen. Diese Grube ist von dem brasilianischen Gouvernement auf 20 Procent des Ertrages geschätzt worden; die anderen Fundorte Taquary, Cocaes, Calla-Bianca, Morro das Almas, Condoga, Morro-Velho, sind von 10 bis 8 Procent hind geschätzt worden.

Man schätzt den Ertrag von Gongo-Socco seit zwölf Jahren auf 30,000 englische Pfund zweiundzwanzigkarätigen Goldes. Die Tiefe der Gruben geht nur bis zu 100 Meter, die längste Stelle hat noch keine 900 Meter und die einzigen Hindernisse, welche die Goldproduction zu hemmen scheinen, liegen in der Seltenheit der Bergleute (welche doch 250 Francs monatlich erhalten) und der Schwierigkeit einer Communication mit Rio Janeiro, von wo man nach den Gruben nur auf Mauleseln nach einer achtzehntägigen Karavanenreise gelangen kann-

ten. Im Allgemeinen schien uns ihr Ansehen an das durch galvanplastisches Verfahren niedergeschlagene Kupfer zu erinnern.

XXXII.

Lag .

Meteorsteinfall in Schlesien.

Von

E. F. v. GLOCKER.

Am 22. März dieses Jahres Nachmittags ungefähr um inh 4 Uhr hörte man bei Seifersholz im Grünberger Kreise in Niederschlesien drei starke donnerartige Schläge bei heiterem Himmel, worauf ein starkes Sausen in der Luft und das Niedefallen eines schweren Körpers folgte. Arbeiter, welche sich auf dem Felde besanden, gingen der Richtung nach, von welcher der Ton des niederfallenden Körpers zu kommen schien, und hemerkten die Erde aufgelockert und darin eine Vertiefung von ingeführ 4 Zoll im Durchmesser, in welcher sich beim Nachgraben ein Stein in einer Tiefe von ungefähr 1/2 Fuss fand, welcher aber ihrer Angabe nach kalt war. Die dieses Ertigniss begleitenden Erscheinungen sind nicht allein bei Seifersbelz, sondern auch in einem ziemlich weiten Umkreise beobachtet worden, die donnerähnlichen Schläge hat man namentlich h Sagan, Züllichau, Neusalz, Schlawe u. a. O. gehört. Fenererscheinung ist von den Arbeitern bei Seifersholz nicht wahrgenommen worden, doch will man eine solche in Sagan ad Heinersdorf gesehen haben.

Was nun den unmittelbar nach dem donnerähnlichen Gebee und Sausen in der Luft bei Seifersholz aufgefundenen Stein
tetrifft, so ist derselbe ein wahrer Meteorstein und trägt alle
Lennzeichen eines solchen in ausgezeichnetem Grade an sich.
Ir hatte in dem Zustande, in welchem er sich bei seiner Aufudung befand, eine längliche Gestalt und zeigte schon gleich
ufangs ein paar etwas beschmuzte Bruchflächen, woraus zu
tchliessen ist, dass er in der Luft zersprungen und mithin das
Iruchstück eines grösseren Steins ist. Er wog, ehe Stücke
on ihm abgeschlagen wurden, 2 Pfund 9 Loth. Im frischen
Iruche hat er — und zwar vorzüglich an den weniger meallreichen Stellen — eine täuschende Aehnlichkeit mit den 1808
ei Stanners im südwestlichen Mähren herabgefallenen Meteorteinen, und er enthält auch, wie diese, Einmengungen von
Hagnetkies, welche ausserdem nur noch von dem Meteorstein

256 v. Glocker, üb. den Meteorsteinfall in Schlesien.

von Juvenas mit Sicherheit bekannt sind. Die Grundmasse ist, wie bei den Steinen von Stannern, höchst feinkörnig und undeutlich doleritisch; ein lichte-blaulichgrauer Gemengtheil, welcher vorherrschend ist, und ein schmuzig-gelblichweisser, welcher wie eingesprengt erscheint, sind unter der Loupe wohl unterscheidbar, wenn auch stellenweise zusammensliessend, daher der Bruch im Ganzen ein lichte-hlaulichgrauge, schwach gesprengeltes Ansehen hat. Augit- und Labrador- oder Feldspaththeilchen sind nicht mit Sicherheit erkennbar; doch schein der graue Gemengtheil aufgelöster Augit zu sein, und die sehr kleinen weissen eingewachsenen Körner, welche zum Theil ein vollkommen kuglige Form besitzen, erionern an Leucitkryställchen, Ein Unterschied zwischen dem Meteorstein von Seifersbolz und den Steinen von Stannern besteht darin, dass diese kein oder nur stellenweise höchst fein eingesprengtes, kann bemerkbares metallisches Eisen (Meteoreisen) enthalten, während dagegen der erstere ausserordentlich reich daran ist. Kleinere und grössere, zum Theil zackig hervorragende vollkommen geschmeidige Eisentheilchen, bis zu 2 Linien im Durchmesser, sinch demselben in so grosser Menge eingemengt, dass die Bruchfläche an den meisten Stellen (denn die Kinmengung ist nicht überall gleich reichlich) voll lichte-strahlgrauer metallisch glauzender kleiner Partien und Pupcte erscheint. An der äussern Oberstäche des Steins sind diese Kisentheilchen sehwärzlich angelaufen, aber an ihrer Geschmeidigkeit und dem starken Metallglanze, welcher beim Ritzen zum Vorschein komm sogleich zu erkennen. Die eingewachsenen Partien von Magenetkies sind dagegen viel sparsamer, aber grösser als die Risentheilchen; sie erscheinen im Bruche theils sehr feinkörniss, theils von ausgezeichnet einfach - blättriger Structur. Wegen des starken Metallgehaltes zeigt der Seifersholzer Aërolith auch ein beträchtlich grösseres Gewicht als die Meteorsteine von Stannern, wiewohl die Grundmasse selbst als solche, ohne die Eisentheilchen, die sich aber nicht vollkommen davon trennen lassen, bei ihrer fast gänzlichen Uebereinstimmung mit den Steinen von Stannern, gewiss kein grösseres specif. Gewicht besitzt als die letzteren (nämlich ungefähr == 3,1 -- 3,2). Kin.kkiner Unterschied zwischen beiderlei Meteorsteinen liegt endlich noch darin, dass der schlesische Meteorit nur einen sehr schutien, wenig glänzenden oder blos schimmernden, unrein grauobschwarzen, durch hervorragende zackige Eisentheilchen nebenen Ueberzog mit nur sehr geringen undeutlichen Spuren m erhabenen Linien darbietet, da hingegen die Meteorsteine on Mannern mit einer deutlichen, von der übrigen Masse scharf strennten Rinde bedeckt sind, welche sich durch eine reinere nd intensivere Schwärze, sehr lebhaften Pettglanz und ein milich ausgedrücktes regelmässiges Geäder auszeichnet.

Der in Rede stehende Meteorsteinfall ist um so mehr zu eachten, da Erscheinungen dieser Art in Schlesien eine grosse altenheit sind, während man in den angrenzenden Ländera, Böhmen, Mähren und Ungarn, dergleichen mehrmals wahrjenommen hat. Seit Jahrhunderten ist nur ein einziger Fall lieser Art aus Schlesien aufgezeichnet, welcher am 6. März 1636 in der Gegend zwischen Sagan und dem Dorfe Dubrow ich ereignet hat. (Lucă, Schlesiens curiose Denkwürdigkeietc. 1689, S. 2288.) Der Steinfall vom 22. März dieses Jahres ist also erst das zweite Beispiel eines solchen Ereigniain Schlesien, von welchem wir Kunde haben. Ein Feuerpelcor ist zwar auch am 21. October 1805 bei Schweidnitz gesehen worden; aber von Steinen, welche dabei herabgefallen rein könnten, hat man nichts erfahren.

XXXIII.

Veber die Anwendbarkeit des Wasserglases uls ein Mittel, das Entbrennen feuerfangender Gegenstände zu verhüten.

Bericht der Abtheilung für Chemie und Physik des Vereins zur Beörderung des Gewerbsleisses in Preussen. Aus den Mittheilungen dieses Vereins 1841. Erste Lieferung.)

Der hiesige Magistrat, durch einen ihm mitgetheilten Aufda des Dr. Anthon über die Nützlichkeit des Wasserglases is ein Mittel, das Entbrennen seuersangender Gegenstände verhindern, veranlasst, ersuchte den Verein um eine gutthtliche Aeusserung über den Gegenstand. Diess war die Verdassung zu nachstehenden Mittheilungen einiger Mitglieder r Abtheilung für Chemie und Physik.

Herr Lüdersdorff bemerkte:

"Wiewohl das Wassergias die Elemente zu einem kräftigen Schutzmittel gegen Entzündung zu enthalten scheint, m ist diess doch nicht der Fall. Bereits vor einigen Jahren fud ich Gelegenheit, dasselbe in dieser Beziehung zu prüsen, erhiek , aber durchaus ungenügende Resultate, und zwar nicht alleis in Hinsicht des Wasserglases als Schutzmittel, sondern hinsichtlich der Möglichkeit überhaupt, brennbare Gegenstände vor der Estzündung zu schützen. Alles beschränkt sich hierbei damuf, ein leichtes Entstammen oder Feuerfangen verbrennlicher Gegenstände zu verhindern, und das kann immer nur durch einen feuersesten Ueberzug geschehen. Nun Aber ist ein soleber Ueberzug nur bei rohem Holzwerk anzubringen, wie z. B. bu Balken, Sparren, Latten u. s. w.; bei Holzwerk in Zimmers ist keine Rede davon, denn der Ueberzug muss dick sein, sonst schützt er nicht. Woraus der Ueberzug besteht, ist gleichgültig; es schützt Wasserglas nicht mehr, als ein Anstrich von Kreide, Thon oder dergleichen, wenn es beiden nicht an der erforderlichen Dicke fehlt. Dabei hat Wasserglas den Nachtheil, dass es verwittert, was sich in seuchter Lust sogar bald durch eine weisse Efflorescenz, besonders bei Natron-Wasserglas, ze Jeder Ueberzug auf Holzwerk aber ist dem erkennen giebt. Abspringen ausgesetzt, und wenn auch nicht durch das gewöhnliche Trocknen und Werfen des Holzes, doch dann, wenn eine grössere oder geringere Wärme auf ihn einwirkt, also gerade dann, wenn er schützen soll. Eine Ausnahme biefvon machen fast allein die mit Oel bereiteten Anstriche; Oel gehört aber wieder zu den leicht entzündlichen Körpern, es muss daher wiederum seinerseits vor der Entstammung geschützt werden. Diess ist nach meinen Versuchen nicht unmöglich, ja das Oel wird der Entzündbarbeit sogar ganz entzogen, wenn man dem Anstrich Zinnchlorür (Zinnsalz) beimischt.

Da aber dergleichen Anstriche für feiner bearbeitetes Holswerk, als Thüren, Fenster, Fussböden etc. unbrauchbar sind, so erstrecken sich meine Versuche auch auf ein Imprägnien derartigen Holzes mit unverbrennlichen Substanzen. Alaun, Vitriol, Pottasche und Natron würden hierzu billige Vehikel abgeben; allein die Beschassenheit des Holzes, als eines mit Last erfüllten Körpers, verhindert das Kindringen dieser Salze

vollständig, dass nach 14tägigem Verweilen desselben in den Auflösungen die Entzündlichkeit ungefähr dieselbe war, wie Die Salze waren noch nicht papierdick vor der Operation. eingedrangen, doch etwas tiefer Pottasche und Natron. erfolgte die Aufnahme, wenn das Holz mit den Auflösungen anhaltend gekocht wurde, wobei besonders die beiden letztgenannten tiefer eindrangen und nach dem Trocknen das Holz auch viel besser gegen Entzündung schützten, als die übrigen. Aber auch abgesehen davon, dass eine Kochanstalt für Thüren und Fenster mancherlei Hindernisse finden würde, sind Kali und Natron, als die eindringlichsten Mittel, kaum anzuwenden. erstere, als zersliessliches Salz, würde unsehlbar das an sich schon schmiegsame Holz so lange in alle nur erdenkbare Krümmungen ziehen, bis das Kali als doppeltkohlensaures Salz die Deliquescenz verloren hätte. Eben so dürfte beim Natron die Neigung zur Efsorescenz hinreichend sein, dasselbe von dem vorstehenden Gebrauche auszuschliessen. — Wie tief übrigens aber auch diese Schutzmittel eingedrungen, oder wie dick der schützende Ueberzug aufgetragen sein mag, so verhindert eine solche Armirung doch nur bei schwachem Feuer das Entslammen; denn ist das Feuer einigermaassen intensiv, worunter ich keineswegs ein brennendes Haus verstehe, sondern nur die Flammen von einigen Scheiten Holz, so ist von keinem Schützen mehr die Rede.

Der Vollständigkeit halber mögen auch die Resultate meiner Versuche über die Armirung von Papiergeweben einen Anscheinend stand hier ein weiteres Feld offen, Platz finden. indem sich Gegenstände dieser Art jedensalls sehr leicht mit fenerbeständigen Salzen mussten imprägniren lassen. aber im Allgemeinen nicht so, denn die allermeisten solcher Salze vermehren sogar die Feuergefährlichkeit dieser Dinge. Einmal wird durch' viele dieser Mittel nicht einmal die Entflammung verhindert, und zweitens bilden die meisten mit der Kohle des imprägnirten Gegenstandes einen Pyrophor, so dass, wenn sie sich auch nicht leicht entstammen lassen, doch der kleinste anhaftende Funke sich glimmend ausbreitet und das ganze Gewebe bis auf die letzte Spur wie Zunder verzehrt. Das Wasserglas, welches schon der Steifheit wegen, die es den Geweben ertheilt, hierzu ganz unanwendbar ist, gehört neben Alaun, Pottasche, Eisenvitriol, Borax u. s. w. in diese Kategorie, so dass die Wahl unter den anwendbaren Substanzen, von denen sich viele durch Feuchtigkeitsanziehung, durch Wirkung auf Farbe und Haltbarkeit der Gewebe schon vornweg der Benutzung entziehen, sehr beschränkt ist. Dem Zwecke am entsprechendsten fand ich indessen folgendes Mittel. Auflösung von 1 Theil Borax in 6 Theilen kochendem Wasser wird mit so viel Salzsäure versetzt, dass die Auflösung in den bekannten eigenthümlichen Zustand kommt, in welchem sie alkalisch und sauer zugleich reagirt, doch muss die alkalische Reaction etwas vorwaltend sein. Der Flüssigkeit wird darauf eine Kleinigkeit Leim oder ein anderes Bindemittel beigegeben, und das zu präparirende Gewebe darin getränkt, so dass es vollständig durchzieht. Nach dem Trocknen entslammen sich so zubereitete Gewebe nicht mehr, auch werden sie durch diese Armirung eben nicht sehr steif.

Wiewohl auf diese Weise Zeuge ziemlich hinreichend gegen Entzündung geschützt werden können, so bin ich doch weit entfernt, das Präpariren unserer Kleidungsstoffe mit diesem oder irgend einem andern Mittel empfehlen zu wollen, da die mannigfachsten Berücksichtigungen hierbei in's Spiel kommen. Meine Versuche bezogen sich damals auf das Schützen von Decorationen, und für diesen Zweck ist die Sache ausführbar genug, um nicht lächerlich zu werden. Beiliegendes Papier und Leinwand stammen von jenen Versuchen her."

Interessant ist ein Mittheilung über Versuche in einem grössern Maassstabe, welche von dem Herrn Major From, als Ingenieur vom Platz, in der Festung Thorn vor 14 Jahren veranstaltet worden sind. Herr Staberohtheilte darüber Nachstehendes mit:

"Die Bekanntmachung des Prof. Fuchs im Kastner'schen Archiv für gesammte Naturlehre B. V. S. 209. 385 interessirte mich gleich so sehr, dass ich nicht nur selbst einige Versuche im kleineren Maassstabe anstellte, sondern mich auch veranlasst fand, einen Auszug aus den Kastner'schen Mitteilungen in der Spener'schen Zeitung zu veröffentlichen, um dadurch das allgemeine Interesse für das Wasserglas, besonders aber das der Behörden dafür anzuregen. Die Folge davon war unter andern der Eingang des beigefügten Schrei-

From in Thorn mich mit den Resultaten einiger angestellten Versuche im grössern Maassstabe bekannt machte und meinen Rath über den fraglichen Gegenstand ansprach. Die ungünstigen Resultate dieser Versuche, denen ich nur Vertröstungen mit späteren Rathschlägen gegenüberstellen konnte, besonders aber die Besichtigung des Gebälks und Dachstuhls des Münchener Theaters (welches bekanntlich unter Fuchs's eigener Leitung mit Wasserglas überzogen wurde), überzeugten mich von der grossen Schwierigkeit eines vollkommenen Ueherzuges des Holzwerks eines Gebäudes mit diesem Präparat und gaben Veranlassung, die Meinung zu fassen, dass die Anwendung des Wasserglases wohl nie zu allgemeiner Anwendung gelangen dürfte."

Schreiben des Hauptmanns und Ingenieurs vom Platz, Herrn From, in Thorn.

Ew. Wohlgeboren haben in die Haude- und Spener'sche Zeitung einen Aufsatz über die Ersindung des Wasserglases und dessen Nutzbarkeit einrücken lassen, in welchem auch die Art der Anwendung desselben nach der Vorschrift des Erfinders, Herrn Professors Fuchs in München, angegeben war. Da diese Erfindung auch bei mir viel Interesse erregt hat, besonders in Bezug auf die Anwendung des Wasserglases als eines sichernden Ueberzuges gegen das rasche Verbrennen, weiche bei vielen Gegenständen der hiesigen Festungsgebäude sehr wünschenswerth wäre, so habe ich verschiedene Versuche angestellt, und zwar mit Natron-Wasserglas, welches in der Schickler'schen Spiegelmanufactur in Neustadt a. d. Dosse fabricirt worden ist. Das Resultat derselben ist indessen bis jetzt nicht befriedigend ausgefallen, und da Ew. Wohlgeboren mit jener öffentlichen Bekanntmachung zugleich das gefällige Anerbieten verbanden, Ihre Erfahrungen und Ansichten über diesen Gegenstand Theilnehmenden fernerhin mitzutheilen, so bin ich so frei, Ihnen beikommend die Beschreibung der hier ausgeführten Versuche mit der ergebensten Bitte zu übersenden, mir gefälligst wissen zu lassen, ob vielleicht die Art der Anwendung hier den Zweck hat verfehlen lassen und ob vielleicht in dem von Ew. Wohlgeboren citirten Kastner'-

292 Ueb. Anwendbark. d. Wasserglases als ein Mittel, schen Archive detaillirtere Angaben vorhanden sind, die darüber eine nähere Auskunft geben.

Beschreibung der zu Thorn unternommenen Versuche über die Anwendung des Wasserglases als Holzanstrich zur Siche- rung gegen das rasche Entzünden bei Feuersgefahr.

I. Anstrich mit reinem Wusserylas.

Es wurden zwei kleine Ziegelöfen von 12 Fuss Länge, 8 Fuss Breite, einschl. Schirm, und 9 Fuss Höhe gesetzt und über jeden ein leichtes Dach von Schwarten (die der Länge nach eingedeckt wurden) 15 Fuss lang, 10 F. breit, 3 Fuss im Forst über den Oesen hoch aufgeführt. Das eine Dach wurde in 6 Tagen, jeden Tag einmal, mit reinem Wasserglas, nach der in der Haude- und Spener'schen Zeitung mitgetheilten Vorschrift, angestrichen. Beide Oesen bekamen 4 Tage Schmauchseuer, 1 Tag Streckfeuer und darauf Grossfeuer. Nachdem diess 2 Tage unterhalten war, kam es oben heraus, worauf das Feuer eine Nacht hindurch unterhalten wurde, um den folgenden Morgen zu einer bestimmten Stunde durch starkes Schüren die Dächer anzuzunden. Der Wasserglasanstrich war unterdessen durch die anhaltend starke Hitze an vielen Stellen gesprungen, doch nicht abgeplatzt. Als den folgenden Morgen beide Oefen zu gleicher Zeit stark geschürt wurden, spielte das Feuer bei dem Dache ohne Anstrich etwa 2 Minuten an dasselbe, ehe es sich entzündete, und bei dem Dache mit dem Anstrich nur 1 oder 2 Minuten länger bis zur Entzündung, worauf sie beide, ohne sichtbaren Unterschied, brannten und deshalb niedergerissen wurden. Der Anstrich hatte sich auf den Schwarten in grossen und kleinen Blasen zusammengezogen, die mit dem Finger leicht einzudrücken waren, ausserhalb aschgrau aussahen, innerhalb, von den mit abgerissenen verbrannten Holztheilen, schwarz.

II. Anstrich mit Wasserglas und einer Beimischung von Thon.

Es wurde das eine Ofendach wieder hergestellt und wiederum in 6 Tagen, jeden Tag einmal, angestrichen. Dem dritten, vierten und fünften Anstrich wurde jedesmal ¼ Quart trockener feingesiebter Thon beigemischt; der erste, zweite und sechste Anstrich bestanden aus reinem Wasserglas. — Da die Ziegel schon ziemlich gar gebrannt waren, so konnte diessmal das Grossfeuer ohne Weiteres heraufgetrieben werden und

es wurde eine Nacht hindurch unterhalten, so dass es gegen 5 Uhr Morgens sich oben zeigte. Um 6 Uhr wurde stark geschürt und die Flamme spielte hin und wieder an das Dach an, ohne jedoch zu zünden. Es wurde nun den ganzen Tag hindurch und auch die folgende Nacht mit dem Grossfeuer fortgefahren; die Flamme spielte stellenweise immer an das Dach an, ohne zu Endlich um 5 Uhr fasste eine Stelle Feuer, das aber nur sehr langsam sich vergrösserte, so dass in einer Viertelstunde erst eine Fläche von 9 Zoll Länge und 6 Zoll Breite in Flammen stand; so brannte es allmählig weiter bis gegen 8 Uhr, wo es aber immer noch in dem Zustande war, dass man es mit einigen Schaufeln Sand hätte auslöschen können, indem sichtbar das Feuer sich nur durch die äussere Holzstäche, die nicht angestrichen war, hat mittheilen können. Das Dach wurde nun niedergerissen. Das Wasserglas bildete wieder dergleichen Blasen wie vorher.

Zu gleicher Zeit mit diesem Ofendache war ein runder Schirm von Schwarten, von 5 Fuss Breite und 2 Fuss Höhe, der mit seinem Scheitel auf einem in die Erde gesetzten Pfahl von Kreuzholz, 5 Fuss boch, ruhte, in eben derselben Art mit angestrichen. Es wurde zur gleichen Stunde, als das Feuer an das Ofendach anspielte, um den Pfahl ein möglichst heftiges Feuer von trocknem Holze gemacht. Nach 5 Minuten brannte der Pfahl an; das Feuer wurde weggerissen und der Pfahl verlöschte gleich wieder. Das Feuer wurde wieder herangebracht, der Pfahl brannte jetzt nach drei Minuten an, auch der Schirm an einigen Stellen; das Feuer wurde wieder weggerissen, die Spitze des Schirms brannte von aussen, und nachdem sie eine halbe Stunde geschwält hatte, verlöschte sie wieder.

III. Anstrich mit Thon und Wasser.

Um zu versuchen, ob das Gelingen des Versuches II in der Unverbrennlichkeit des Thons oder der des Wasserglases liege, wurde ein eben so construirtes Dach ganz in derselben Art, als früher mit Wasserglas, mit blossem Lehmwasser überstrichen und eben so, wie bei dem Leberstrich mit Wasserglas, Feuer darunter gemacht. Diess so überstrichene Dach widerstand dem grossen Feuer des Ziegelofens 47 Stunden, also 24 Stunden länger, als die Mischung von Wasserglas und Thon.

294 Ueb. Anwendbark. d. Wasserglases etc.

Diese Versuche_sprechen durchgehends nicht zum Vortheil der vorzüglichen Feuersestigkeit des Wasserglases.

IV. Ueber das Verhalten des Wasserglases an der Luft wurden an einigen Thüren des Thurms Nr. 16 des Garnisonlazareths Versuche mit Bleiweiss und Frankfurter Schwarzsen wie auch mit Kalk und Frankfurter Schwarz gemacht. Diese Mischungen halten sich aber sämmtlich nicht an der Luft, indem die Kieselerde in Gestalt kleiner Sandkörnchen abgerieben werden kann. Bei einer Mischung mit Leimwasser coagulirte die Flüssigkeit wie geronnene Milch, so dass die bisherigen Versuche in Betreff der Mischung mit Farben und des Verhaltens im Freien ebenfalls nicht gelungen sind.

V. Die Kosten des Anstrichs mit Wasserglas

und Farben lassen sich vorläufig auf einen Silbergroschen pro Quadratfuss annehmen, die Kosten des Oelanstrichs bei einmaligem Gründen und zweimaligem Ueberstreichen können hier durchschnittlich auf 1 Sgr. 10 Pf. für den Quadratfuss angenommen werden.

Da nun der Aufsatz des Herrn Dr. Anthon nichts mehr über das Wasserglas enthält, als was der Erfinder desselben, Herr Ober-Bergrath Fuchs, bereits vor 15 Jahren mittheilte, am wenigsten aber günstige Erfahrungen über dessen Nutzen als Ueberzug auf dem Holzwerk von Gebäuden bei Feuersgefahr, auf Grund von im Grossen angestellten Versuchen, so kann die Abtheilung ihr Gutachten nur dahin abgeben, dass sie wegen der verneinenden, oder wenigstens nicht genügenden Resultate der bisher damit angestellten Versuche es für den hiesigen Magistrat nicht rathsam hält, das Wasserglas in Anwendung zu setzen oder anzuempfehlen.

XXXIV.

ntersuchungen über die Sauerstoffverbindungen des Chlors.

Von

MILLON.

(Compt. rend. T. XII. p. 300.)

- 1) Die Verbindung, welche man bisher mit dem Namen utoxide de chlore bezeichnete und welcher Gay-Lussac Formel ClO₄ zugeschrieben hat, ist bis zur Temperatur n + 20° eine wirkliche Flüssigkeit.
- 2) Man erhält die Verbindung unter dieser Formel in eim Zustande der Reinheit, der es verstattet, ihren Reactionen folgen und ihren wesentlichen Charakter festzuhalten.
- 3) In Berührung mit den Alkalien wandelt sie sich in chlorsauund chlorigsaures Salz um, ganz wie sich salpetrige Salpeterure NO₄ in salpetersaures und salpetrigsaures Salz umstellt:
 - 2 (£10₄+K0) = £10₅ K0+£10₃ K0, 2 (N0₄+K0) = N0₅ K0+N0₃ K0.

Es ist von nun an passend, den Namen deutowide de lore in Unterchlorsäure umzuändern, was nicht nur mit der sammensetzung des Körpers, sondern auch noch mit einer nz fundamentalen Reaction in Verbindung steht.

- 4) Die chlorigsauren Salze bestehen mit demselben Rechte e die salpetrigsauren und bilden eine neue Reihe von Saln, die eine hinreichende Beständigkeit zeigen, um ihre Säure Metalloxyde treten zu lassen und die letzteren Salze kryllisirt zu erhalten.
- 5) Die Einwirkung der Chlorwasserstoffsäure auf das Chlorire Kali liefert kein eigenthümliches Gas, sondern ein Geinge von verschiedenen Producten, in denen man leicht eine isse Menge Chlor und Unterchlorsäure unterscheiden kann.
- 6) Die mit dem Namen unterchlorige Säure bezeichnete rbindung verhält sich mit Alkalien nicht wie eine Säure. lässt sie blos in eine Classe von Verbindungen treten, die nach Superoxyden und Chlorüren der Oxyde entsprechen. Sie rgrössert die Reihen, welche vom Wasserstoffsuperoxyd er-

296 Penny, üb. die Wirkung von Salpetersäure auf

öffnet sind, und zeigt so die Grösse und Wichtigkeit der Rolle, zu deren Ausfüllung in der Wissenschaft diese letztere Verbindung berufen ist.

XXXV.

Ueber die Wirkung von Salpetersäure auf chlor-, jod- und bromsaures Kali und Natron.

Von

F. PENNY.

(Athenäum Nr. 676. p. 798.)

Gegenwärtige Mittheilung enthält die Einzelheiten und Ergebnisse einiger Versuche, die in der Absicht unternommen wurden, eine weitere Bestätigung der Richtigkeit von des Verfassers Untersuchungen über Aequivalentzahlen zu erhalten. Diese Absicht ist ihm vereitelt worden, da die Einwirkung von Umständen begleitet ist, welche sie zu einem so delicaten Zweck als die Bestimmung von Aequivalentzahlen ist, unanwendbar machen. Jedoch sind die Resultate, die er erhalten hat, neu, und er hielt sie für hinreichend interessant, um der Ausmerksamkeit werth zu sein.

In der Absicht, die Wirkung der Salpetersäure auf chlorsaures Kali zu prüfen, wurde ein bekanntes Gewicht des Salzes in einer Retorte mit einer abgemessenen Quantität der Säure vermischt und das Gemenge in einem Sandbade erhitzt. Sobald es warm wurde, wurden Chlor und Sauerstoff im Zustande des Gemenges und nicht der Verbindung entwickelt, und das chlorsaure Salz verschwand langsam. Die Lösung wurde darnach bis zur Trockne abgedampft, und das rückständige Salz ergab sich als ein Gemenge von überchlorsaurem und salpetersaurem Kali, im Verhältniss von 3 Aequivalenten des letztern auf eins des erstern. Der Verfasser drückt die eintretende Reaction folgendermaassen aus:

$$4(K+Cl+O_6)$$
 and $3(N+O_5)=(K+Cl+O_8)$
and $3(K+N+O_6)$ and Cl_3 and O_{13} .

Die Wirkung von Salpetersäure auf chlorsaures Kali unterscheidet sich also von der der Schwefelsäure auf dasselbe Salz-

Durch Salpetersäure wird das Salz ruhig zersetzt und Chlor mit Sauerstoff unverbunden entwickelt, während durch Schweselsäure diese Gase im Zustande der Verbindung entwickelt werden, indem sie die gefährlich explodirende Verbindung, die Chlorsäure, bilden. Salpetersäure ist daher zur Darstellung von überchlorsaurem Kali vorzuziehen, da mit derselben die Operation ohne diese beftigen Detonationen vor sich gehen kann, die mit Schwefelsäure so leicht eintreten. Die Wirkung der Salpetersäure auf chlorsaures Natron ist dieselbe wie auf chlorsaures Kali. Das frei gewordene Chlor und der Sauerstoff sind in einem Zustande des Gemenges, und jede 4 Atome des Salzes liefern 3 Atome des salpetersauren Salzes und 1 Atom des überchlorsauren. Das überchlorsaure Natron ist ein sehr lösliches Salz und krystallisirt in kleinen Rhomboëdern, es wird leicht durch Mitze zersetzt, aber unterliegt keiner Einwirkung von Chlorwasserstoffsäure. Der Luft ausgesetzt, zersliesst es. Wirkung der Salpetersäure auf ein jodsaures Salz ist sehr verschieden von der auf ein chlorsaures und wird sehr klar in dem besondern Falle des jodsauren Kali's. Wird jodsaures Kali einige Zeit mit einem grossen Ueberschusse von Salpetersäure gekocht, so wird es in Kali und Jodsäure zersetzt. Das Kali verbindet sich mit seiner proportionalen Quantität Salpetersäure und bildet salpetersaures Kali, und die Jodsäure wird von der Auflösung in kleinen harten und durchsichtigen Krystallen abgesetzt. Wird die saure Auflösung von Salpeter, welche die Jodsäure enthält, dann abgedampft, so findet eine Reaction statt. Die Jodsäure zersetzt die Hälfte des Salpeters, macht dessen Salpetersäure frei und verbindet sich mit dem Kali, um das doppeltjodsaure Salz zu bilden. Diese Umwandlung wird vollständig, wenn die Mischung trocken ist, und wenn alsdann die Hitze ihr entzogen wird, so erhält man ein entschiedenes Gemenge von doppeltjodsaurem und salpetersaurem Salze. Wird die Hitze fortgesetzt, 80 ereignet sich noch eine weitere Veränderung, die Jodsäure vertreibt die ganze Menge der Salpetersäure, die sich als sal-Petrige Säure entwickelt, und Sauerstoff und neutrales jodsau-Setzt man zu diesem jodsauren Salze res Kali bleiben zurück. eine neue Quantität Salpetersäure, so werden dieselben Umwandlangen sich zeigen, mit Hülfe einer eigenen Regulation der Durch die Behandlung des jodsauren Natrons mit Sal-Wärme.

298 Schafhäutl, neue Verbind. von arseniger Säure

petersäure hat Herr Professor Penny ein doppeltjodsaures Natron erhalten, und durch Hinzufügung eines grossen Ueberschusses von Jodsäure zu einer Lösung des jodsauren Natrons, hat er ein dreifach-jodsaures Natron gefunden. Beide Salze enthalten kein Wasser. Er findet auch, dass Krystalle von jodsaurem Natron verschiedene Quantitäten Wasser, je nach der Stärke der Auflösung, aus der sie angeschossen sind, enthalten. Aus einer heissen und sehr gesättigten Lösung krystallisirt dieses Salz in nadelförmigen Bündeln, und diese Krystalle enthalten 2 Atome Wasser. Wenn die Lösung schwächer ist, so erbält man lange vierseitige Prismen, und diese enthalten 6 Atome Wasser; wenn eine Lösung von jodsaurem Natron verdampft wird, so setzen sich von selbst grosse unregelmässige Prismen ab, und diese enthalten 10 Atome Wasser. Der Luft ausgesetzt, effloresciren sie schleunigst und verlieren auf diese Weise 8 Atome Wasser. Die Wirkung der Salpetersäure auf bromsaures Kali wurde demnächst untersucht, und es ergab sich, dass sie sehr verschieden von der Wirkung dieser Säure auf chlorund jodsaures Kali war. Weder überbromsaures noch doppeltbromsaures Salz wird erzeugt, sondern blos salpetersaures Kali. Die Salpetersäure macht die ganze Menge der Bromsäure frei, und diese wird im Augenblicke ihres Freiwerdens in ihre Bestandtheile, Brom und Sauerstoff, aufgelöst. Schliesslich bemerkt der Verfasser, dass die Wirkung der Salpetersäure auf diese 3 Classen von Salzen eine leichte Methode liefert, um sie von einander zu unterscheiden.

XXXVI.

Neue Verbindung von arseniger Säure und Schwefelsäure.

Von

Dr. SCHAFHAEUTL.

(Athenäum Nr. 674. p. 744.)

Diese wurde gewonnen aus dem Rauche, der von den Kupfer-Röstöfen bei Swansea in South-Wales entweicht. Die neue Verbindung war wiederum ein besonderer Fall, wo eis

vasserfreier krystallisirter Körper blos unter der Anwesenheit on Wasser sich ausschied, und ein beachtenswerther Beweis ir die unbegrenzte Anzahl verschiedener Verbindungsformen, elche selbst in der unorganischen Natur dadurch hervorgebracht erden können, dass man chemische Stoffe unter verschiedenen mständen mit einander in Berührung setzt. Die in Southlales eingeschmolzenen Kupfererze waren grösstentheils Kuprkies, gemischt mit Eisenkies (Schwefelkies) und Fahlerz ney copper ore) u. s. w., kurz eine Mischung, in welcher e Sulfüre von Kupfer, Eisen, Arsenik, Antimon, Kobalt, Nickel, ink und Zinn unwandelbar beisammen angetroffen werden. er Schwefel und das Arsenik entweichen aus diesen Erzen wähad des Röstens als schweflige und arsenige Säure, und man at gefunden, dass sie mehrere Meilen rings um die Kupferrerke alle Vegetation zerstören, ohne auf das thierische Leben a Mindesten einen Einfluss zu äussern. Bringt man den entreichenden Bauch mit Wasserdampf in Berührung und treibt ihn urch brennende Holzkohle oder unterwirft ihn blos während er Berührung mit Wasserdampf einem starken Druck, so setzt ich die neue Verbindung an den kalten Wänden der Kammern, lie mit den Röstöfen in Verbindung stehen, in festem Aggrepationszustande ab. Sie stellte sich in schönen krystallisirten Mattern oder Tafeln dar, die vielleicht zu derselben Classe gewie Wöhler's dimorphische Modification der Krystalle 70n arseniger Säure, deren regelmässige Gestalt dem Octaëder ingehört. Es fand sich, dass sie in 100 Theilen aus

> 68,250 arseniger Säure, 27,643 Schwefelsäure, 3,029 Eisenoxydul, 0,420 Kupferoxyd,

0,656 Nickeloxyd bestanden.

99,998.

Dieser Formel entsprechen:

51,741 Arsenikmetall, 11,095 Schwefel, 2,339 Eisen, 0,336 Kupfer, 0,516 Nickel, 33,971 Sauerstoff,

99,998.

300 Delalande, Bereitung d. wasserfreien Phosphors.

Diese Krystalle zogen mit grosser Heftigkeit und Wärmeentwickelung Nässe aus der Luft an und zerfrassen Thier- und
Pflanzenstoffe eben so kräftig als concentrirte Schwefelsäure.
Ihr Geschmack war rein, aber stark sauer, fast wie der der
Schwefelsäure, und in Wasser aufgelöst, betrug der Rückstand
von 100 Theilen dieser Krystalle nur 17,436. Die Gestalt der
Krystalle wurde völlig beibehalten, nur wurde ihr Ansehn aus
einem durchsichtigen in ein opakes verwandelt. Ihre chemische Zusammensetzung fand sich zu:

16,778 arsenige Säure, 0,656 Nickeloxyd.

Was das Wasser gelöst hatte, bestand aus:

51,472 arseniger Säure,

27,643 Schwefelsäure,

3,029 Eisenoxydul,

0,420 Kupferoxyd.

Eine der merkwürdigen Verwandlungen bei Bildung dieser Verbindung war die von schwesliger Säure in Schweselsäure, wie auch die Gegenwart von Eisen, Kupfer und Nickel im Absatz von Gasen. Es scheint keine andere entschiedene Verbindung der arsenigen Säure mit einer andern Säure bekannt zu sein als die mit der organischen Weinsäure und der Paratartralsäure.

XXXVII.

Bereitung der wasserfreien Phosphorsäure.

Von

DELA-LANDE.

(Ann. d. Chim. et de Phys. Januar 1841. p. 117.)

Die Anwendung der wasserfreien Phosphorsäure bei des Untersuchungen der organischen Chemie ist so häusig gewordes, dass es nicht ohne Interesse ist, ein bequemes Versahren 22 haben, um sie in grosser Menge zu bereiten.

In dem Laboratorium von Dumas erhielt man sie immer durch Verbrennen des Phosphors unter einer Glocke von zwölf.

3lalande, Bereitung d. wasserfreien Phosphors. 301

funfzehn Litern Rauminhalt. Diese wurde auf eine Porcelplatte oder eine Glasplatte gestellt. In die Axe der Glocke
ilte man auf die Mitte der Platte einen irdenen Untersatz,
brauf eine kleine Porcellanschale gesetzt wurde, in welcher
Verbrennung des Phosphors geschah. Die auf diese Weise
zeugte Phosphorsäure siel als Schnee auf die Glas- oder Porllanplatte, von der man sie leicht sammeln konnte.

Wenn der zuerst hinein gebrachte Phosphor fast verbrannt ar, hob man die Glocke auf und warf einige neue Stückchen die Schale. Die Operation konnte so mehrere Stunden fortgestzt werden und gab ziemlich grosse Mengen von fester Phoshorsäure.

Indessen gelangte, wegen der Nothwendigkeit, die Luft der locke von Zeit zu Zeit zu erneuern, einige Feuchtigkeit in dieelbe. Ich wollte diesen Uebelstand vermeiden und die Leitung er Operation bequemer machen. Diess ist der Zweck folgenden Apparates.

Dieser Apparat besteht aus einem grossen Ballon, welcher a zwei gegenüberstehenden Puncten mit zwei horizontalen Indulaturen versehen ist. Die eine steht mit einer langen, mit klicken von Chlorcalcium angefüllten Röhre in Verbindung, lie andre dagegen durch eine Röhre mit einer zweihalsigen Insche. Auf dem einen Halse der letztern ist durch einen Indulationen Phonkitt ein aufwärts gebogenes eisernes Zugrohr angebracht, welches am untern Theile ein rundes, mit einem Rande versenens Blech trägt, durch welches das Zugrohr hindurchgeht. Auf dieses Blech stellt man einen weiten, mit vielen runden löchern durchbohrten Blechcylinder. In den ringförmigen Raum wischen den beiden Cylindern werden glühende Kohlen genacht.

Bei dieser Einrichtung entsteht ein Zug, wodurch ein Strom tockner Luft in das Innere des Apparates geführt wird. Da is Luft sich unaufhörlich erneuert, so ist es nicht nothwendig, is Operation zu unterbrechen, um jedesmal die auf Kosten der den Gefässen befindlichen Luft erzeugte Phosphorsäure zu tameln. Die Operation dauert daher immer fort und giebt tar grosse Mengen von Phosphorsäure, ehe es nothwendig ird, mit derselben aufzuhören.

Der Phosphor wird in kleinen Stücken durch eine in den

302 Persoz, üb. Kohlenstoffatom u. organische Analyse.

Hals des Ballons eingesetzte Porcellanröhre hineingebracht, an der eine kleine Schale, ebenfalls von Porcellan, hängt. Man braucht blos das erste Stück Phosphor, das man hineinbringt, zu entzünden. Die, welche man nachher, je nach dem Maasse, dass die Flamme verlöscht, hineinwirft, entzünden sich während sie in die Schale fallen. Die Röhre wird nach jedem Hineinwerfen sorgfältig verkorkt.

Wenn man mit der Operation aufhören will, entfernt man die Röhren, verschliesst den Hals des Ballons, so wie die beiden Tubulaturen, und schüttelt den Ballon. Die an den Wänden in sehr leichten wolligen Flocken verbreitete Phosphersäure sammelt sich auf dem Boden des Ballons. Sie zeigt als dann dem Anscheine nach fast die Dichtigkeit der leichten Magnesia, deren Aussehen sie auch besitzt. Der Ballon wird mit Leichtigkeit geleert und die wasserfreie Phosphorsäure in gehörig zugestöpselte Flaschen gebracht.

In der Porcellanschale findet man immer rothes Phosphoroxyd. Die Menge desselben würde selbst sehr bedeutend sein, wenn der Querschnitt der Chlorcalciumröhre geringer als 0,03 M. auf einen Ballon von 8 Litern wäre.

XXXVIII.

Beobachtungen in Betreff des Atomgewichtes der Kohle und der Anwendung der Schwefelsäure zur Bestimmung des Wassers bei organischen Analysen*).

Von

J. PERSOZ.

(Compt. rend. T. XII. p. 512.)

Bei einer Verbrennung von 2,5 Gr. Zucker mit schweselsaurem Quecksilber hätte ich, bei der Annahme des von Ber-

^{*)} Die Methode des Herrn Persoz, bei den organischen Analysen sich statt des Kupferoxyds des schwefelsauren Quecksilberoxyds zu bedienen und die Menge des Wasserstoffes und Kohlensteffes aus der gebildeten, gasförmig aufgefangenen Kohlensäure und schwefligen Säure zu bestimmen, zeichnet sich durch Originalität, aber nicht durch Zweckmässigkeit aus. Vgl. Ann. de Chim. et de Phys. 1841. T. I. Cah. 2. Persoz, Introduction dans la Chimie moléculaire.

lius gegebenen Atomgewichtes der Kohle, 3,868 Liter schwefsaures und kohlensaures Gas erhalten müssen, bei 0° und
76 Druck; bei Annahme des von Dumas gegebenen Atomwichtes hätte ich 3,912 Liter haben müssen, während mir
b Erfahrung 3,919 gegeben hat.

Nimmt man die von Liebig gegebene Atomenformel des ickers, die ich zu diesen Rechnungen benutzte, als genau, so ist dieser Versuch einer Verbrennung von 2,5 Gr. Zucker, ich hier mittheile, ein Beweis mehr (wenn es nöthig ist, ich andere Beweise beizubringen, als die, welche aus den gewein und delicaten, von Dumas und Stass gemachten Verschen hervorgehen) zu Gunsten der Nothwendigkeit, das Atomewicht der Kohle einer Reduction zu unterwerfen.

Die einzige Sache, die noch zu entscheiden steht und die icht am wenigsten wichtig ist, ist die genaue Bestimmung es Aequivalentes der Kohle. Darf man die von Dumas und itass angegebene Zahl 75 annehmen, oder muss man noch ine andere suchen? Mit dieser Frage beschäftige ich mich ben jetzt, und zu ihrer Lösung habe ich Versuche gemacht, velche ich bald der Academie vorlegen werde. Für jetzt kann ch ihr ankündigen, dass bei allen Verbrennungen, die ich vernittelst schwefelsauren Quecksilbers anstellte, ich mehr Kohlen
äure gefunden habe, als die Rechnung angab, wenn ich von ler Zahl 75 als dem Atomgewichte der Kohle ausging.

Indem ich nun der Ursache nachforschte, welche meine lesultate in Widerspruch zu den von Dumas und Stass angegebenen setzen könnte, konnte ich dieselbe nur in der Verseserung finden, welche diese Gelehrten in der Weise des luffangens von Wasser bei Verbrennung der Kohle und orscher Körper anbringen wollten. Um die leisesten Spuren in Kohlensäure oder Wasser aufzufangen und zu bestimmen, isten die Herren Dumas und Stass die Producte der Verrennung durch eine Säule von Bimsstein, mit Schwefelsäure angenchtet, streichen. Die durch Berührung mit der Schweskaure vom Wasser befreite Kohlensäure wird dann durch be kaustische Kalilauge aufgefangen, um gewogen zu werden.

Da nun aus meinen Versuchen hervorgeht, dass bei der emperatur von + 11° und bei dem Druck von 0,757 M. ein ehmen concentrirter Schwefelsäure genau ein Volumen Koh-

304 Persoz, üb. Kohlenstoffatom u. organische Analyse.

lensäuregas absorbirt, so sieht man daraus, dass die Anwendung von Schweselsäure zur Bestimmung des Wassers bei organischen Analysen nur zu salschen Resultaten führen kann.

Herr Dumas legte der Academie einige Bemerkungen über den Gegenstand dieses Schreibens vor.

Es ist klar, dass Herr Persoz dahin gekommen ist, die Nothwendigkeit, dass man dem alten Atomgewichte der Kohle entsage, zu bestätigen, und dass er, so weit seine Verfahrungsweisen es erlauben, erkannt hat, wie genau das neue für die Praxis sei. Nun bleibt noch übrig zu wissen, ob vom speculativen Standpuncte aus man bei der runden Zahl 75 oder irgend einer andern stehen bleiben soll, und das entscheidet sein Versuch nicht. Wirklich, wenn Herr Persoz Zucker verbrennt und das Volumen der erhaltenen Gase misst, so muss er annehmen:

- 1) dass sein Zucker rein sei, und dass er sein Gewicht im luftleeren Raume genommen;
 - 2) dass seine Glocke vollkommen gut graduirt ist;
- 3) dass der Coëfficient der Ausdehnung der Gase ganz genau bekannt ist, und dass er für die Temperatur seiner Gase wenigstens bis zu ½ Grad einstehen kann;
- 4) dass das Mariotte'sche Gesetz auf kohlensaures und schwefligsaures Gas anwendbar ist (gegen die Versuche des Herrn Despretz), und dass der Druck, dem seine Gase unterworfen sind, bis zu einem Drittel Millimeter bekannt sei;
 - 5) dass seine Gase absolut trocken sind;
- 6) dass die Dichtigkeit des kohlensauren und schwesligsauren Gases vollkommen bekannt sei, was wenigstens für die Kohlensäure nicht wahr ist. Inmitten aller dieser Schwierigkeiten ist man erstaunt, dass das angegebene Resultat nur um 1/800 von dem abweicht, welches wir bei Versuchen erhielten, die sich von jedem fremdartig Gegebenen losmachten, da wir blos die Kohle wogen, verbrannten und dann die Kohlensäure wogen.

Wir können nicht zugeben, dass die Dazwischenkunft der Schwefelsäure einen Fehler hätte in unsere Versuche bringen können, denn wenn wir 4 oder 5 Cubikcentimeter einer in Bimsstein gedrungenen Schwefelsäure anwandten, um die Spuren von Wasser, die aus unseren Verbrennungen von Diamant oder Graphit hervorgehen konnten, aufzufangen, haben wir ge-

Gannal, üb. Erhaltung der Fleischspeisen. 305

schen, dass diese Säure nach dem Versuche genau dasselbe Gewicht bewahrte, welches sie früher hatte.

Diess Ergebniss ist leicht zu begreifen, denn wenn die schwefelsäure zu Anfang ein wenig Kohlensäure auflösen kann, wie alle Flüssigkeiten, so unterlassen doch der Sauerstoff und lie atmosphärische Luft, die wir hernach durch den Apparat reiben, nicht, dieselbe zu verdrängen.

Mit den von uns angegebenen Vorsichtsmaassregeln, die lurch andere Gründe nicht abzuweisen sind, kann die Anwenlung von Schwefelsäure keinen Irrthum in dem von Herrn Persoz angegebenen Sinne hervorrufen. Dieser gewandte Chemiker wird sich davon ohne Mühe überzeugen, wenn er unsere Versuche oder wenigstens einige unserer Analysen wiederholen will.

XXXIX.

Ueber Erhaltung der Fleischspeisen.

Von

GANNAL.

(Compt. rend. T. XII. p. 532.)

Welche auch die Substanz sei, die man zur Conservation des Fleisches anwendet, so wird man grosse Vortheile erlangen, wenn man sie durch Injection hineinschafft, anstatt sie, wie bei dem gewöhnlichen Verfahren des Einsalzens, durch din Aufsaugen von aussen nach innen allmählig eindringen zu hasen. Dadurch wird man ausser dem Ersparniss an Zeit und Geld eine gleichförmige Vertheilung des conservirenden koffes erhalten, während durch Einweichen, besonders wo kan mit grösseren Stücken arbeitet, die dem Aeussern zunächst legenden Theile übersättigt werden müssen, bevor noch die inneren Theile genug von diesem Stoffe aufgenommen haben, im ihrer Zersetzung vorzubeugen.

Deshalb unterwarf Hr. Gannal diejenigen Stoffe einer Prüfung, welche man anstatt des gewöhnlichen Salzes anwenkönnte; er untersuchte die löslichen Thonerdesalze, welche die Eigenschaft haben, einem Austreten der faulen Gäh-

20

rung in thierischen Stoffen entschieden vorzubeugen, von denen aber einige dem Fleische entweder schädliche Eigenschaften, oder einen unangenehmen Geschmack ertheilen würden. Keine dieser Unannehmlichkeiten zeigt sich nach Hrn. Gannai bei dem Chloraluminium.

Ich war, sagt er, theoretisch überzeugt, dass ein durch dieses Salz im reinen Zustande conservirtes Fleisch gar keinen Geschmack haben müsste, weil einerseits die zur Erhaltung angewandte Menge im Verhältniss sehr klein ist und weil ferner durch die auftretende Reaction nur eine kleine Menge von Chlorkalium, Chlornatrium und Chlorcalcium sich bilden konnte, lauter Salze, welche wir täglich in unseren Speisen anwenden, in dem grauen Salze nämlich, das in unseren Küchen verbraucht wird. Was die Quantität Alaunerde betrifft, die in den animalischen Körper eingeführt und mit ihm verbunden wird, so ist die Menge derselben so unbedeutend, dass man sich daran nicht stossen darf.

Der Alaun wird in der Medicin gebraucht, und dieses Salz wirkt astringirend, aber in dem Falle ist die Thonerde mit einer Säure verbunden, während sie sich im Fleische nur als erdiges Pulver ohne Einwirkung auf die thierische Oekonomie vorfindet. In diesem Betreff kann man auch versichern, dass die Anwohner der Seineufer, welche das Wasser dieses Stromes wenigstens die Hälfte des Jahres hindurch trinken, täglich 10mal mehr Thonerde verschlucken als sie könnten, wenn sie für gewöhnlich Fleisch ässen, das nach meinem Verfahren zubereitet worden.

Versuche über den Grad von Concentration, den ich meiner Flüssigkeit geben müsste, um der Erhaltung des Fleisches sicher zu sein, ohne unnützer Weise eine zu grosse Menge Salz hineinzubringen, haben mir gezeigt, dass die passende Auflösung 10° Beaumé zeigen muss. Mithin genügt 1 Kilogramm Salz, wie es Hr. Guérin zuhereitet, für 6 Liter Wasser. Man bedarf 9 oder 12 Liter dieser Flüssigkeit, um einen Ochsen zu conserviren, d. h. man gebraucht anderthalb bis 2 Kilogr. dieses Salzes.

Was die Handgriffe des Verfahrens betrifft, so sind diese sehr einfach; wenn das Thier durch einen Schlag vor den Kopf zu Boden geschlagen ist, öffnet man ihm die Kopfschlagader und die Jugularis auf einer Seite, indem man einen Schnitt vom Larynæ bis zu den beiden bezeichneten Gefässen macht; dann heht man durch eine schnelle Bewegung das Messer, welches alle Theile durchschneidet und dem ganzen Blute abzulaufen gestattet.

Hat das Blut zu laufen aufgehört, so bringt man von oben nach unten in die Hauptader einen Heber, macht am obern Theile eine Unterbindung, um das Ablaufen der Flüssigkeit zu verhindere, unterbindet gleichfalls die beiden Oeffnungen der Jugularis und beginnt die Injection. Das zu dieser Operation passendste Instrument ist ein Schlauch von wasserdichtem Zeuge von 2 Meter Länge, 3 Centimeter Durchmesser unten und 4 his 6 Centimeter oben, und dieser Schlauch muss an dem Heber befestigt sein, der aus Holz oder Horn gefertigt ist.

Sobald man bemerkt, dass das Thier gut injicirt worden ist, d. h. wenn von der einen Seite keine Flüssigkeit mehr eindringt und man von der andern Seite die unterbundenen Adern stark angeschwellt aleht, verschliesst man den Schlauch mit ? Fingern und steigt mit einem leisen Druck längs der Säule nieder. Durch dieses Mittel kann man die Menge des Salzes im Innern des Thieres vermehren. Endlich unterbindet man unterhalb des Hebers und zieht ihn dann heraus. 20 Minuten nach dieser Operation zieht man dem Thiere die Haut ab, dann nimmt man es aus und zertheilt es darauf in gewöhnlicher Weise; man hat aber nicht mehr nöthig, die Knochen und den Talg hinweg zu sehmen wie beim Einsalzen.

Wenn das Thier gut ausgeblutet und die Injection gut gebitet worden ist, bemerkt man kaum, dass das Thier einer Zubereitung unterworfen worden; der einzige Theil, wo die Injection Spuren hinterlässt, sind die Lungen, welche welk und farblos geworden sind.

Wenn das Thier zertheilt und an die Luft gehängt worden ist, so lässt man das Fleisch in diesem Zustande so lange als nothwendig, um es abzukühlen, und die einzige nöthige Vorsicht ist, dass man das Hinzukommen von Fliegen vermeidet.

Das Fleisch, welches man aufbewahren will, fordert keine andere Vorbereitung; es genügt, wenn man dasselbe an einem trocknen und luftigen Orte aufbewahrt. Hat man die Absicht, das Fleisch länger als 14 Tage aufzubewahren, so muss man es in ein Bad legen, das aus einer Kochsalzlösung

von 10°B. und einer gleichen Quantität Chloraluminiumlösung besteht. Ist diese Waschung beendigt, so wendet man das Fleisch dazu an, wozu es bestimmt ist; soll es getrocknet werden, so wird es in eine Kammer gehängt, die mittelst eines heissen Luftstromes oder mit Holzrauch erwärmt wird, oder man hängt es in die freie Luft, doch muss man in diesem Falle Maassregeln gegen die Fliegen treffen.

Ist diess Fleisch getrocknet, so braucht man es nur in hermetisch verschlossene Tonnen zu packen und diese an einem trocknen Orte aufzubewahren.

Um das Fleisch zu gebrauchen, weicht man es 24 Stunden lang ein, und da es nicht gesalzen ist, so kann man dieses leicht in Seewasser thun.

Will man das Fleisch frisch erhalten, so schichtet man es in grosse Fässer, wie diess in den Pökelhäusern der Marine geschieht. Ist die Tonne voll, so verschliesst man sie und füllt sie mit Kochsalzlösung oder mit dem Gemenge, das vorhin zum Waschen diente, oder auch mit trocknem Kochsalz vollends. Alle 3 Mittel gaben mir gute Resultate.

Diese Lake trägt nur sehr wenig zur Erhaltung bei, aber sie verhindert die Vegetation des Schimmels.

Bei den von mir angestellten Versuchen wurde eine Tenne nach 3 Monaten geöffnet, um eine Schöpsenkeule herauszunehmen, welche gebraten, gegessen und von 12 Gästen vortrefflich gefunden wurde; da aber das Fass schlecht verschlossen gewesen war, war die Flüssigkeit der Lake ausgelaufen und das trocken zurückgebliebene Fleisch hatte sich mit Schimmel überzogen, ohne doch im Mindesten zersetzt worden zu sein.

XL.

Ueber da**s E**ffloresciren der Mauern und ähnliche Erscheinungen.

> Von KUHLMANN.

(Compt. rend. T. XII. p. 332.)

Wenn es wahr ist, dass sich unter vielen Umständen Elflorescirungen von salpetersaurem Kali oder Ammoniak bilden, umständen sich auf der Oberstäche der Mauern Esstorescenzen bilden, welche von kohlen – oder schweselsaurem Natron hertühren, und dass neugebaute, aus mit Mörtel verbundenen Steinen oder Ziegeln aufgerichtete Mauern ausserdem kaustisches oder kohlensaures Kali ausschwitzen, die Chlorkalium oder Chlornatrium enthalten.

Die Hauptquelle dieser Kali – oder Natronsalze findet sich in dem Kalk, der zu dem Baue gedient hat; eine grosse Anzahl von Kalksteinen enthalten nämlich Chlorkalium und Chlornatrium und besonders Silicate der Alkalien, welche unter dem Einflusse des kohlensauren oder des durch Brennen des Steines entstehenden kaustischen Kalkes das Entstehen von kaustischem oder kohlensaurem Kali und Natron bewirken können. Ich halte es auch für möglich, dass eine dem Gay – Lussit analoge Verbindung von kohlensaurem Kali und Natron mit Kalk in den Kalksteinen vorkomme, ohne jedoch dieser Meinung grosse Wichtigkeit beizulegen.

Die Quantität der Salze der Alkalien, die sich in den Kalksteinen findet, ist veränderlich, denn es giebt solche, welche mir durch Brennen keine Spur von Alkali geliefert haben.

Die Anwesenheit der kaustischen oder kohlensauren Alkalien im Kalk erklärt das Vorkommen von fertig gebildetem Salpeter in der Lauge der Salpetersieder, wie auch das Entstehen von Salpeterefflorescenzen.

wassers deutet auf Ursachen, die von den durch Hrn. Descroizilles angegebenen abweichen; das aus dem Kalk selbst gezogene Kali oder Natron verursachen dieselbe. Diese Alkalinität kann bei vielen industriellen Arbeiten sehr schädlich werden, und es ist von Bedeutung, dass man darauf bei Bereitung des Kalkwassers, welches als Reagens dient, Rücksicht nimmt, wenn man diese Quelle von Irrthümern bei analytischen Untersuchungen vermeiden will. Bei der Runkelrübenzuckerfabrication, wo man zur Abklärung sehr viel Kalk gebraucht, muss die Anwesenheit von Kali oder Natron in noch so geringer Menge einen verderblichen Einfluss auf die letzten Operationen äussern, wo die Flüssigkeiten zu einem gewissen Grade von Concentration gelangen.

310 Kuhlmann, üb. das Effloresciren der Mauern etc.

Ich glaube, dass der Zusatz von etwas Chlorcaicium in die Concentrationskessel oft nützliche Resultate geben würde, durch Umwandlung des kohlensauren Alkali in Chlorkalium oder Chlornatrium, deren Wirkung auf den Zucker fast Nall ist.

Die Anwesenheit veränderlicher Quantitäten von Kali- oder Natronsalzen in der Kreide ist ohne Zweifel von Kinfluss auf die Gegenwart dieser Salze in den Pflanzen, besonders wenn wir annehmen, dass in den Kalksteinen Kali und Natron als Chlorüre oder Silicate sich vorfinden, welche beide fähig sind, durch Liegen an der Luft oder Berührung mit der Kreide sich langsam zu zersetzen.

Die Untersuchung der Efflorescenzen an den Mauern und der Ursachen, denen man sie zuschreiben muss, führte mich auf eine Untersuchung der Steinkohlen in Betreff der Salztheile, die man mit ihnen verbunden findet.

Ich habe gefunden, dass die Steinkohle oft von einer grossen Menge Kalk durchdrungen ist, der sich in veränderlichen Verhältnissen mit kohlensaurer Magnesia verbunden findet.

In der Folge prüfte ich die Efflorescenzen, die auf der Oberstäche der Steinkohlen entstehen, und bemerkte, dass aus ser schwefelsaurem Eisenoxydul, das aus der Zersetzung der Kiese entspringt, sich in vielen Steinkohlen Efflorescenzen bilden, die aus fast reinem, selten mit kohlensaurem Natron vermengtem, aber stets kalifreiem schwefelsaurem Natron besteben

In diesen Efflorescenzen habe ich auch die Anwesenhek einer kleinen Menge Kobalt gefunden, die, unter diesen Umständen ziemlich ungewöhnlich, eine in geelogischer Hinsicht interessante Beobachtung bietet.

Die Bildung von schwefelsaurem Natron schrieb ich der Zersetzung der Kiese in Gegenwart der alkalischen Verbindung zu, welche letztere das Natron enthält und, so lange sie mit der Kohle gemengt bleibt, in Wasser unlöslich ist, aber durch Calcination ein in Wasser auflösliches kohlensaures Natron liefert.

Eine andere Beobachtung, welche die Aufmerksamkeit der Geologen zu fesseln verdient, ist die, dass sich das Natronsalz nur da bildet, wo sich in den festen Steinkohlenlagern eine Kohle findet, die dem Ansehen nach der Holzkohle ganz ähslich ist. Die Anwesenheit von Natron mit Ausschluss des Kalin diesen Theilen der Steinkohle wird gleichfalls nicht ohne

sdeutung für diejenigen Gelehrten sein, welche den Steinkohnhildungen einen organischen Ursprung zuschreiben.

XLI. Künstliche Marmorbeizung.

(Athenäum No. 686. pag. 1013.)

Diese Konst wurde von den Alten ausgeübt und ist von o sim us beschrieben; neuerdings macht sie wieder bedeutende rtschritte in Verena. Die Resultate sind folgende: Eine Löng von salpetersaurem Silberoxyd durchdringt den Marmor id ertheilt ihm eine tiefrothe Farbe. Eine Lösung von saltersaurem Goldoxyd dringt weniger tief und ertheilt eine schöne rpurne Veilchenfarbe. Grünspan dringt bis zur Tiefe einer nie in den Marmor ein und giebt eine schöne grüne Farbe, se Auflösung von Drachenblut giebt eine schönrothe und Gum-Guttag eine gelbe Färbung. Um diese beiden Farben anzuanden, ist es nöthig, den Marmor mit Bimsstein zu poliren, die maniharze in Alkohol zu lösen und mit einem kameelbaarenen neel aufzutragen. Die aus Hölzern, wie Brasil - und Camche-Holz, gewonnenen Färbemittel dringen tief in den Mar-M. Die Farbe von Cochenille mit wenig Alaun giebt ein bones Scharlach, äbnlich dem des afrikanischen Marmors. Instliches Operment, in Ammoniak gelöst, giebt eine lebhaft the Farbe; wird Grünspan mit weissem Wachs gekocht, das menge auf den Marmor gebracht und dann nach der Ab-, ihlung heruntergeschabt, so wird man finden, dass es fünf nien tief gedrungen ist und eine schöne Smaragdfarbe erngt hat. Wünscht man, die verschiedenen Farben in einer ufeinanderfolge anzuwenden, so sind einige Vorsichtsmaassrein nöthig. Die mit Weingeist und Terpentinöl bereiteten Färmittel müssen auf den heissen Marmor gebracht werden, aber rachenblut und Gummi-Guttae finden ihre Anwendung auf kaltem armor. Zu diesem Ende ist es nöthig, sie in Alkohol zu sen und die Gummiguttaelösung zuerst anzuwenden. elche klar, ist, wird bald trübe und giebt einen gelben Niederschlag. Die von dem Farbstoff bedeckten Theile des Marmers müssen alsdann erwärmt werden, indem man in halben Zolles Abstand eine rothglühende Eisenplatte oder einen Behälter mit Holzkohlen darüberhin bewegt. Dann darf man abkühlen und muss das Eisen wieder über die Theile bringen, wo die Farbe nicht durchgedrungen ist. Ist die gelbe Farbe eingesogen, muss eine Drachenblutlösung in derselben Weise angewandt werden, und wenn der Marmor heiss gemacht ist, muss man die anderen vegetabilen Farben aufthun. Die zuletzt anzuwendenden Farben sind die mit Wachs verbundenen. Diese müssen mit grosser Vorsicht angewandt werden, weil der kleinste Ueberschuss von Hitze verursacht, dass sie tiefer dringen als nöthig ist, was sie weniger passend für zarte Arbeiten macht. Während der Operation sollte man gelegentlich kaltes Wasser darauf giessen.

XLII.

Steinölquelle.

Ungefähr vor 10 Jahren, als man nahe bei Burksville in Kentucki nach Salzsoole bohrte und schon durch einen festen Felsen von 200 Fuss Tiefe gedrungen war, wurde eine Quelle von reinem Oel getroffen, das mehr als 12 Fuss über die Oberfläche der Erde emporsprang. Obgleich sie nach der Ausladung der ersten 5 Minuten, während welcher sie nach einem Ueberschlag 75 Gallonen in der Minute auswarf, an Quantität etwas nachliess, so fuhr sie doch noch verschiedene Tage nach einander zu fliessen fort. Da die Quelle am Rande und nahe bei der Mündung eines kleinen Wassers war, das sich in den Cumberlandfluss ergoss, so fand das Oel seinen Weg bald dahin und bedeckte lange Zeit seine Obersläche. Einige Leute unterhalb legten einen Brand daran, als plötzlich die Fläche des Stromes aufflackerte, die Flammen, auf die höchsten Klippen drangen und die Gipfel der längsten Bäume versengten. Es brennt frei und giebt eine Flamme, so leuchtend wie von Gas. Seine Eigenschaften waren damals noch unbekanut, aber eine Quantität wurde auf Fässer geschlagen, wovon jedoch das Meiste heraus-Es ist so durchdringend, dass es schwer in einem hölzernen Gefäss zu halten ist, und entwickelt so viel Gas, dass

hänfig die Bouteillen, wenn sie gefüllt und fest verkorkt werden, zerspringen. Der Luft ausgesetzt, nimmt es eine grünliche Farbe an. Es ist ausserst flüchtig, hat einen starken stechenden und unbeschreiblichen Geruch und schmeckt dem Kern der Pechtanne sehr gleich. Eine kurze Zeit nach der Entdekkung floss eine geringe Quantität des Oeles, während man das Salzwasser pumpte, was die Meinung hervorrief, es könne immer durch Pumpen heraufgeschafft werden; aber alle folgenden Versuche, es anders als durch freiwilligen Aussluss zu erhalten, sind fehlgeschlagen. Zwei solche Ausströmungen haben innerhalb der beiden letzten Jahre stattgefunden. Die letzte begann am 4. des verflossenen Júli und fubr ungefähr 6 Wochen fort, in welchem Zeitraume ungefähr 20 Fässer mit Oel erhalfen wurden. Das Oel und das Salzwasser, mit welchem es unveränderlich während dieser Ausströmungen verbunden ist, werden durch das Gas gegen 200 Fuss hoch in der Pumpe aufgetrieben, und von da fliessen sie durch die Oeffnung in einen bedeckten Trog, wo das Wasser sehr bald sich absondert and an den Boden setzt, während das Oel leicht von der Oberstäche abgehoben wird. Ein rumpelndes Geräusch, ähnlich inem fernen Donner, begleitet unveränderlich das Aussliessen les Oeles, während das Gas, welches dann jeden Tag am Ende ler Pumpe sichtbar wird, die etwa vorbeigehenden Fremden zu der Frage veranlasst, ob die Quelle brenne.

(Silliman's Journ.)

XLIII.

Neue galvanische Säule.

(Aus den Gött. gel. Anzeigen, Nr. 81. d. 24. Mai 1841.)

Der königl. Gesellschaft der Wissenschaften theilten die Professoren Wöhler und Weber von einer Entdeckung, welche Hr. Prof. Poggendorff in der Zusammensetzung galvanischer Säulen gemacht und der königl. Academie der Wissenschaften zu Berlin am 29. April d. J. vorgelegt hat, eine Anzeige nebst einigen Bemerkungen mit.

Es ist bekannt, dass man zur Hervorbringung der grössten galvanischen Wirkungen sich nicht mehr so unbequemer riesenmässiger Apparate zu bedienen braucht wie früher, sondern dass man in der neuesten Zeit gelernt hat, mit kleinen und bequemen Apparaten dieselben Wirkungen zu erhalten. Am meisten leistet in dieser Art eine Kette nach Angabe des Hrn. Grove, wo kieine Thenzellen, deren Wände sich mit Flüssigkeit durchziehen, mit gewöhnlicher Salpetersäure gefüllt und mit verdünnter Schwefelsäure äusserlich umgeben werden. In erstere Blüssigkeit werden Platinplatten, in letztere amalgamirte Zinkplatten getaucht, und mit starken Kupferdrähten die nöthigen Verbindungen hergestelk. (S. Pogyen d. Ann. 1839. Bd. XLVIII. S. 300. 1840. Bd. XLIX. S. 511.) Die Kostspieligkeit der Platinplatten beschränkte bisher den Gebrauch dieser sonst so kräftigen und bequemen Säulen; daher wird es denen, weiche aus diesem Grunde sich dieselben nicht verschaffen konnten, angenehm sein, zu erfahren, wie Hr. Prof. Poggendorft Exemplation statt Platinplatton mit fast gleichem Erfolge in Anwendung gebracht hat.

"Jetzt beschäftigen mich," schreibt Hr. Prof. Poggendorff vom 1. Mai d. J., "die Ketten mit zwei Flüssigkeiten, die offenbar die grösste Aufmerksamkeit verdienen und noch so wenig studirt sind. Ich habe gegen 50 solche Ketten dargestellt und gefunden, dass sie fast alle den unschätzbaren Vortheil gewähren, einen constanten Strom zu geben, so dass man also genaue Messungen machen kann.... Nur eins von praktischem Nutzen will ich Dir mittheilen, dass man nämlich in der Grove'schen Säule das theure Platin sehr wohl durch Eisen, Stahl oder Gusseisen ersetzen kann, sobald man statt der gewöhnlichen Salpetersäure concentrirte rauchende Säure (acidum nitricum fumans) nimmt. Man kann diese rauchende Säure sogar mit Vortheil mit 11/4 Th. gewöhnlicher Salpetersäure verdünnen, oder so weit, dass das Eisen noch nicht angegriffen wird. Letzteres ist nothwendig; nimmt man die Säure zu dünn, so wird das Eisen mit grosser Heftigkeit angegrissen. In der Säure von angegebener Concentration bleibt das Eisen so blank wie das Platin. Hier die Elemente der besagten Ketten für rauchende concentrirte Salpetersäure und Schwefelsäure mit 4 Th. Wasser. Das Zink war amalgamirt.

	Mek	tromotorische Kraft.	Widerstand.	: '.
Zink Platin	}	100,00	18,120	 16.
Zink Eisen	. }	78,62	11,275	no. Projekteja
Zink Stahl	.}	86,99	12,927	i Norte o Laterati
Ziek Gasseise	n }	89,63	12,913	terior ketar Vila sanggi

Vom Widerstand kommen hier 4,36 (Zoll Neusilberütäht n 1/8 Lin. Durchmesser) auf den Schliessungsdraht.

Du siehst also, bei gleicher Plattengtesse kann man %10 r Wirkung der Grove'schen Säule mit Eisen erlangen. Das blende Zehntheil ist leicht durch Vergrösserung der Platten ersetzen. Uebrigens ist der Strom eben so constant als bei r Grove'schen Säule."

Auf obige Mittheilung wurden von den Merren Wöhlet d Weber sogleich einige Versuche zur Bestätigung angeilt, bei denen sich zugleich das merkwürdige Resultat ergub, ss ein sehr starker Strom selbst dann eptsteht, wenn wehn esses Eisen in beide Flüssigkeiten taucht, indem man auch die verdünnte Schwefelsäure getauchte amalgamirte Zinkplatte it einer Eisenplatte vertauscht. Diese letztere Platte, weil sie cht amalgamirt werden kann, wurde zwar von der Schwesaure unter schwacher Entwickelung von Wasserstoffgas angriffen, was aber die Wirkung nicht störte; vielmehr ergab ch, dass auch diese Kette in ihrer Wirkung eben so constant ie die Grove'sche war. Es ist diese, blos aus Eisen und vei Flüssigkeiten zusammengesetzte Kette, welche so kräftige 7irkungen giebt, für die Theorie der Säule im Allgemeinen id für die Erforschung der galvanischen Eigenschaften des isens im Besondern von Interesse. Zwar sind schon häufig etten zusammengestellt worden, bei denen zwei gleichartige letalle mit zwei ungleichartigen Flüssigkeiten combinirt wuren, z. B. von Becquerel und de la Rive, wovon Fecher im Repertorium der Experimentalphysik S. 454 f. ein Verelchniss giebt; es scheint aber blos die Existenz und Richtung es Stromes Interesse erregt zu haben, die weitere Benutzung und Untersuchung aber durch die Schwäche und Unbeständigkeit der Wirkung verhindert worden zu sein. Eine so starke und constante Wirkung wie die beschriebene, wodurch diese Art von Ketten wirklich brauchbar und nützlich und einer genauen Untersuchung fähig werden, ist neu und verdient besondere Beachtung. Zwei Paare, wo jede Platte etwa nur 3 Quadratzoll Obersläche hatte, brachten dünne Platindrähte zum Glühen und genügten zur lebhasten Zersetzung des Wassers. Gewiss verdient dieser Gegenstand weiter verfolgt zu werden, wenn nicht Hr. Pros. Poggendorff vielleicht schon seine viel umsassende Untersuchung auch hieraus erstreckt hat.

Die schwache Entwickelung von Wasserstoffgas an den in die verdünnte Schwefelsäure getauchten Eisenplatten kann übrigens leicht vermieden werden, wenn man verzinntes Eisenblech anwendet, welches in dieser Beziehung denselben Dienst wie amalgamirtes Zink leistet; es scheint dem letztern sogar vorzuziehen zu sein, weil es dünn und haltbar ist, während das Zisk ädarch Quecksilber brüchig wird und einen Theil seines Amalgams leicht: verliert, welches als graues Pulver die Oberfische der Platte bedeckt oder in der Säure sich absetzt, wedarch die Wirkung der Säule geschwächt wird.

XLIV.

Oit in and a second

Ueber eine Vervollkommnung des galvanoplastischen Verfahrens.

Von

OSANN.

Zu den vielen trefflichen Aufsätzen, welche in Ihrem Journaf über Galvanoplastik niedergelegt worden sind, erlauben Sie mir, eine Anzeige hinzuzufügen, welche einen neuen Fortschritt in dieser Kunst darthut.

Es ist dem Leser dieser Zeitschrift hinlänglich bekannt, auf welche Weise der hydro-elektrische Strom angewandt worden ist, um Gegenstände mit Kupfer zu überziehen und treue Copien ihrer Erhabenheiten und Vertiefungen anzufertigen. Bei diesem Verfahren, bei welchem der elektrische Strom von einer

ferplatte durch ein aufgelöstes Kupfersalz zu dem zu überfernden Gegenstand geführt wird, wird in demselben Vernisse Kupfer von der Platte durch die Säure des Salzes aufst, in welchem Kupfer an dem Gegenstande abgesetzt wird. bisherigen Versuche waren darauf gerichtet, die Kunst, ;leichen Abdrücke zu verfertigen, zu vervollkommnen. i Verf. dieses ist es gelungen, ein Verfahren aufzufinden, ches nicht blos als eine Vervollkommnung des bisherigen betrachten ist, sondern zugleich eine ganz neue Perspective iesem technischen Theile der Elektricitätslehre eröffnet. Man i dieses Verfahren als eine Umkehrung des bisherigen behten. Anstatt dass bei diesem eine Form durch Ueberfüh-; von Kupfertheilchen gebildet wird, wird sie bei jenem' Ar Hinwegführung derselben hervorgebracht. In einem cyrischen Glase werden zwei Kupferplatten vertical und parin geringem Abstande von einander aufgehängt; nachdem der einen, welche dazu bestimmt ist, den elektrischen Strom ie Flüssigkeit überzuführen, mit einer in Wasser unauflösen Tinte eine Zeichnung aufgetragen worden ist. Hierauf i das Glas mit einer Auflösung von Kupfervitriol gefüllt beide Platten mit einem Elektromotor in leitende Verbindung Indem nun der elektrische Strom von der einen Platte andern durch die Flüssigkeit hindurchgeht, wird von allen Stellen, welche nicht mit Tinte überzogen sind, Kupfer aufist und zu der gegenüber hängenden Platte geführt. Man t leicht ein, wie, je nachdem die Zeichnung beschaffen war, erhabene oder vertiefte Form in Kupfer hervorgebracht Bis jetzt habe ich diess Verfahren benutzt, um Münzen erhabene Schrift und Zeichnungen hervorzubringen, so wie Zeichnungen auf Kupfer entstehen zu lassen, welche wie zschnitte zu Abdrücken benutzt werden können. Die in der hdruckerei des Hrn. Thein genommenen Abzüge von auf se Welse präparirten Kupferplatten haben vollkommen den vartungen entsprochen.

XLV.

Analyse des Wassers aus dem artesischen Brunnen von Grenelle.

(Brief von Payen an Arago.)

(Compt. rend. Mars 1841. p. 577.)

Von dem Augenblicke an, we das Wasser der neuen Quelle zu Grenelle reichlich aus dem Boden von Paris strömte, beschäftigte diess schöne Ergebniss so vieler und so anhaltender Versuche alle Freunde der Wissenschaften und ihrer nützlichen Anwendungen auf das Lebhafteste.

In der Absicht, den Thatsachen bei diesem glücklichen Ereigniss einige Bemerkungen hinzuzufügen, beeilte ich mich, das Wasser von Grenelle zu analysiren und der hilligen Ungeduld der Leute durch Angaha des Nutzens zu genügen, den es is den Hauptanwendungen des Hauswesens gewähren kann.

Ich nahm wahr, dass diess Wasser einen geringeren Rückstand lässt als das reinste Flusswasser, ein Resultat, das mit dem des Hrn. Pelouze ganz übereinstimmt.

Das Wesen der im Wasser von Grenelle aufgelösten Steffe ist aus verschiedenen Gesichtspuncten der Aufmerksamkeit werth. Hier folgt die Zusammensetzung des Wassers, wie sie sich ergeb, nachdem es durch das Filter von den auspendirten Steffen befreit war.

. In 100,00 Theilen enthält diess Wasser:

	kohlensauren Ka	lk	·	6,80
1.5.	kohlensaure Mag	nesia		1,42
	doppelt-kohlensa:	ires Kali		2,96
!	schwefelsaures l			1,20
	Chlorkalium		· ·	1,09
? ·	Kieselsäure			0,57
4	gelbe Substanz			0,02
3:15	stickstoffhaltige of	rganische	Bestandtheile	0,24
er.s	ucr.	6. 9	-	14,30.

Vergleicht man diese Zusammensetzung mit der des Seisewassers, so zeigt sich, dass das Wasser von Grenelle ungefähr halb so viel Kalksalze enthält und keinen schwefelsauren Kalk mitführt, welche Verbindung für die meisten Anwendungen am allerschädlichsten ist. So würde das Wasser von Grenelle denn auch weniger Kruste in den Kesseln ablagern, nimmt die Seife besser auf, wird nicht, wie jenes, durch Koehen trübe, giebt mit verschiedenen Reagentien viel weniger voluminöse Niederschläge, besonders mit salpetersaurem Silber und Chlorbaryum, ferner mit phosphorsaurem, kaustischem und oxal-saurem Ammoniak, und würde so bei einer Menge von Anwendungen und bei der Bereitung verschiedener chemischer Prolucte den Verzug verdienen.

Das Vorhandensein von Kalisalzen, besonders von kohlenuurem, welches die anderen hervorbringt, ist der Aufmerksamkeit der Geologen würdig und erklärt leicht die Abwesenheit des schwefelsauren Kalkes.

Auf 100 Liter enthält das Wasser, wie es im Moment der Aufsprudelns aufgefangen wurde, 1,80 Liter Gas, die zusammengesetzt sind aus 0,15 Kohlensäure und 16,5 Luft, in wetcher Sauerstoff und Stickstoff sich verhalten wie 22: 78.

Die Anwesenheit von Kieselsäure im Wasser von Grenelle ist bemerkenswerth, nicht so sehr als Ausnahme, denn vielmehr als Ausgangspunct einer Beobachtung über die allgemeine Verbreitung dieser Thatsache.

Ich hatte Gelegenheit, sie auch im Verlauf meiner Beobschtungen über die chemische Zusammensetzung des Pflanzenund besonders des Blattgewebes wahrzunehmen, dessen Häute fast alle voll von Kieselsäure sind; daraus schien mir hervortugehen, dass, um eine so ausgebreitete Erscheinung hervorurufen, nothwendig die meisten natürlichen Gewässer Kieseläure aufgelöst haben müssten. Ich beschäftigte mich nun danit, diese Hypothese zu bewahrheiten, und machte mit dem Wasser von Grenelle meinen Anfang. Seither habe ich nun eschen, dass das Seinewasser beinahe dieselben Mengen von Cieselsaure enthalt. Zeigt sich diess Phanomen als ganz allcemein, so wird es zur Erklärung verschiedener Kieselbilduncen, besonders der Spiculae in den Spongillen, dienen. Die Lusammensetzung des Wassers von Grenelle hat seit den ersten Tagen des Aufspringens wenig variirt; in verschiedenen Zwischenräumen analysirt, hat es etwas weniger doppelt-kohensaures Kali gegeben; die Verminderung ging von 4 auf 2,96 betrug also ungefähr 1/4. Das Gasvolumen nahm auch ein wenig ab, und zwar im Verhältniss von 0,022 zu 0,018; ohne Zweisel geschah diess in Folge der allmähligen Erwärmung der Röhrenwände; übrigens ist die Absorption der äussern Luft und des Sauerstoffes in grösseren Mengen sehr schleunig.

Die gelbe, in so geringer Menge im Wasser beobachtete Substanz hat sich bei 4 Analysen ganz beständig vorkommend gezeigt, und zwar mit denselben Eigenschaften, der Löslichkeit in Wasser, wasserfreiem und verdünntem Alkohol und Aether. Ich sende Ihnen das Ergebniss einer der Analysen.

Ich bemerkte auch im Seinewasser die Anwesenheit einer eben so gelb gefärbten, aber weniger löslichen Substanz; diess Wasser enthält viel grössere Mengen organischer Stoffe, wenigstens in Paris. Es liess nach seiner Verdampfung und der Trocknung des Rückstandes im luftleeren Raume und in der Kälte 18,5 für 100,00, d. h. ungefähr 30 p.C. mehr als das Wasser von Grenelle.

XLVI.

Literarische Nachweisungen.

Ann. der Chem. u. Pharm. Von Wöhler u. Liebig. April.

Producte der Einwirkung von Salpetersäure auf Naphtalin. Von de Marignac.

Ueber die Naphtalinsäure und ein bei ihrer Darstellung entstehen-

des flüchtiges Product. Von Demselben. Teber die Darstellung und Bildung des Blutlaugensalzes. Von J.

- Liebig.

Veber die Bleichsalze. Von Detmer.

Ueber Salpeterbildung, Inkrustation der Dampfkessel, Theorie des Bleichens, Bildung von Cyanüren. Von Kuhlmann. Methode zur Darstellung von Harnstoff. Von J. Liebig. Analyse des Wurmsamenöles.

Repertorium der Pharm. Von Buchner. Bd. XXIII, H. 2. Ueber die Eigenschaften der Chinasäure. Von Wackenroder. Darstellung der Molybdänsäure aus molybdänsaurem Bleioxyd.

Archiv der Pharm. Von Brandes und Wackenrodes. 1841. Februar.

Chem. Untersuchung der Hopfensprossen. Von Leroy.

Zur Analyse des Blutes. Von Dr. F. Simon.

Beitrag zur Kenntniss der Meconsäure. Von Wackenroder.

Ueber Kupferoxyd-Ammoniaktartrat. Von Du Menil.

Dasselbe. März.

Zur Kenntniss der rohen Kaffeebahne. Von Bolle. Untersuchung einer sehr wohlfeilen (mit Leim verfälschten) Seife. Von Geiseler.

XLVII.

Ueber die ätherischen Oele.

Von

GERHARDT und CAHOURS.

(Ann. de Chim. et de Phys. Jan. 1841. p. 60.)

Erste Abhandlung.

Unter dem Namen der ätherischen Oele begreift man in der hemie alle zugleich neutrale, flüchtige und wohlriechende Subanzen, welche sich bei der Vegetation erzeugen oder die an durch die Reaction gewisser Pflanzenstoffe künstlich bereik. Diese Benennung, welche durchaus nicht wissenschaftlich t, wird ohne Unterschied auf durchaus nicht zusammengehöge natürliche und künstliche Körper angewandt. Sie begreift ine ungeheure Menge von Verbindungen, deren Wichtigkeit in Tag zu Tage zunimmt, je nachdem die Fortschritte der Vissenschaft gestatten, tiefer in ihre Natur einzugehen.

Bis jetzt sind die ätherischen Oele nur der Gegenstand einer sehr geringen Anzahl von Untersuchungen gewesen, und die einige derselben sind einer gründlichen Untersuchung untworfen worden. Diess hängt vorzüglich von den Schwiezkeiten ab, welche ihre Reinigung verursacht. Wirklich kennt un nur sehr wenige, welche im krystallisirten Zustande erten werden. Sie sind meistens alle flüssig und bestehen aus mengen von 2 und selbst 3 eigenthümlichen Stoffen, welche un nur selten durch Destillation bei verschiedenen Temperaten abzuscheiden vermag.

Wir haben eine Reihe von Untersuchungen über diese asse von Körpern unternommen und sind gleich im Ange unserer Arbeit so glücklich gewesen, ein sehr einfaches erfahren aufzufinden, um die beiden verschiedenartigen Stoffe, denen eine grosse Anzahl ätherischer Oele besteht, im Zumde der Reinheit abzuscheiden. Dieses Verfahren bietet, ohne i allen Körpern desselben Ursprunges ohne Unterschied anwändt werden zu können, dessenungeachtet in vielen Fälneinen gewissen Vortheil dar, und wir glauben nicht uns zu en, wenn wir schon im voraus einen vollständigen Erfolg i Untersuchungen derselben Art zusichern, wie die sind, welne den Gegenstand dieser Abhandlung ausmachen.

322 Gerhardt u. Cahours, üb. d. ätherischen Oele.

Mehrere Chemiker haben bereits dargethan, dass die ätherischen Oele, welche sich auf natürliche Weise in den Pflanzen erzeugen und die man blos durch Destillation aus ihnen erhält, Gemenge eines sauerstoffhaltigen Oeles und eines Kohlenwasserstoffes in veränderlichen Verhältnissen sind. Zuweilen ist das sauerstoffhaltige Oel krystallisirt, während der damit verbundene Stoff flüssig ist. In diesem Falle gelingt die Abscheidung des erstern leicht. Diess ist aber nicht mit dem Köhlenwasserstoffe der Fall, den man beständig mit einer gewissen Menge von dem andern Product verunreinigt erhält. Uebrigens sind die Schwierigkeiten allgemein bekannt, welche sich bei diesen Darstellungen darbieten.

Da das sauerstoffhaltige Oel immer weit weniger flüchtig ist als der damit verbundene Kohlenwasserstoff, wenigstens scheinen alle Thatsachen diess zu beweisen, so ist es leicht, das erstere abzuscheiden, indem man das rohe Oel bei 20 oder 30° unter seinem Siedepuncte destillirt. Wird diese Operation ziemlich lange fortgesetzt, so geht der ganze Kohlenwasserstoff, mit einer grossen Menge sauerstoffhaltigen Oeles beladen, über und letzteres bleibt als Rückstand in der Retorte, indem es ein wenig Harz zurückhält, wovon es durch eine neue Rectification leicht gereinigt werden kann. Der Kohlenwasserstoff kann aber nicht icicht von dem oxydirten Oele ohne Anwendung eines chemischen Agens befreit werden. Mit welcher Sorgfalt er auch rectificirt wird, so gelingt es doch niemals, ihn in gehöriger Reinheit zu erhalten. Wenigstens schlugen alle unsere Bemübungen bei dieser Art von Versuchen beständig sehl. Es kan daher darauf an, einen Körper aufzufinden, der, mit dem Gemenge der beiden Flüssigkeiten zusammengebracht, das sauerstoffhaltige Oel zurückhielt und den Kohlenwasserstoff unverändert entweichen liess. Nun erfüllte schmelzendes Kali diesen Zweck vollständig. Es ist uns in allen Fällen von grösstem Nutzen gewesen, und sein Nutzen beschränkt sich ohne Zweisel niebt darauf.

Die Anwendung des schmelzenden Kali's hat uns selbst in den Stand gesetzt, das Dasein zweier eigenthümlichen Stoffe in mehreren Oelen zu erkennen, unter denen das Oel des römischen Kümmels (Cuminum Cyminum), das des Baldrians (Veleriana officinalis) und das der römischen Camille (Anthemis

Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele. 323 nebilis) besonders unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben.

Diese drei Oele enthalten jedes ein sauerstoffhaltiges Oel, welches durch das Kali in eine Säure umgewandelt wird, und einen Kehlenwasserstoff, auf den das Kali keine Wirkung äussert. Das römische Kümmelöl giebt in diesem Falle eine neue, wohl charakterisirte Säure. Das Baldrianöl und das römische Camillenöl geben Valeriansäure, dieselbe, welche Trommsderf und Ettling aus der Wurzel des Baldrians und die Dumas und Stass künstlich aus dem Fuselöle der Kartoffeln bereitet haben. Das römische Camillenöl und das Baldrianöl enthalten daher einen gemeinschaftlichen Stoff, sie unterscheiden sich aber durch den Kohlenwasserstoff von einander. Der des Baldrianöles wandelt sich unter dem Einflusse der atmosphärischen Luft oder oxydirender Reagentien in Campher *) um. Der Kohlenwasserstoff des römischen Camillenöles zeigt andere Reactionen.

Wir wollen jetzt die Resultate bekannt machen, auf die uns die Untersuchung des römischen Kümmelöles geleitet hat. Unsere Untersuchungen über die beiden anderen ätherischen Oele sind weit genug vorgerückt, um bald folgen zu können.

Römisches Kümmelöl.

Das im Handel vorkommende römische Kümmelöl wird wie den Körnern des römischen Kümmels (Cuminum Cyminum) durch blosse Destillation mit Wasser ausgezogen. Es wird auf liese Weise in ziemlich reichlicher Menge erhalten und zeigt einen sehr widrigen Kümmelgeruch. Sein Geschmack ist ausserrichentlich scharf, wie der aller ätherischen Oele, und reizt den Faumen. Es besitzt gewöhnlich eine gelbe Farbe, welche um o durkter ist, je länger das Oel dem Zutritte der Luft ausgesetzt war. Diese Färbung rührt von der Anwesenheit eines lärzes her, das sich durch die Wirkung des Sauerstoffes auf inen der Bestandtheile des Oeles bildet.

^{*)} Der Kohlenwasserstoff des Baldrianöles ist das wahre Camhogen $C_{20}H_{32}$. Seine Umwandlung in Campher erfolgt so schnell, sies es unmöglich ist, ihn aufzubewahren, ohne dass er sich vertübert.

324 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen von.

Die Wirkung der Luft bewirkt gleichfalls in dem Oele die Bildung einer eigenthümlichen Säure, die wir weiter unten beschreiben wollen und welche die Ursache ist, dass das Lakmuspapier durch dieses Oel ein wenig geröthet wird.

Der Siedepunct des römischen Kümmelöles ist durchaus nicht constant. Es fängt gegen 170° zu sieden an, das Thermometer steigt aber schnell bis über 230°. Diese Temperaturveränderungen beweisen, dass es kein gleichartiges Product ist.

Um uns von dieser Thatsache noch mehr zu überzeugen, analysirten wir die bei verschiedenen Temperaturen erhaltenen Producte der Destillation des zuvor über Chlorcalcium getrockneten Oeles. Folgendes sind die Resultate der Verbrennung mit Kupferoxyd.

- I. 0,300 Gr., bei 175° destillirt, gaben 0,971 Kohlensäure und 0,293 Wasser.
- II. 0,325 Gr., bei 0,190° destillirt, gaben 1,046 Kohlensäure und 0,318 Wasser.
- III. 0,348 Gr., bei 200° destillirt, gaben 1,110 Kohlensäure und 0,337 Wasser.
 - IV. 0,400 Gr., zwischen 205 und 210° destillirt, gaben 1,272 Kohlensäure und 0,368 Wasser.
 - V. 0,500 Gr., bei 5° in einem Strome von Kohlensäure destillirt und mit chlorsaurem Kali verbrannt, gaben 1,576 Kohlensäure und 0,471 Wasser.

Diese Resultate leiten auf folgende Zahlen:

	·	_	•		
	I. bei 175°.	II. bei 190°.	III. bei 200°.	IV. bei 210°.	V. bei 225°.
Kohlenstoff	88,27	87,77	86,98	86,72	85,88
Wasserstoff	10,85	10,87	10,76	10,22	10,46
Sauerstoff	0,88	1,36	2,26	3,06	3,66
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00.

Aus dieser Tabelle erhellt, dass die der Analyse unterworfene Substanz sich um so sauerstoffhaltiger zeigte, je höher die Temperatur war, bei der sie gesammelt wurde.

Unsere ersten Versuche, bei deren Berechnung wir das von Berzelius bestimmte Atomgewicht des Kohlenstoffes zu Grunde legten, führten uns in Irrthum, indem sie uns die Zusammensetzung eines Kohlenwasserstoffes gaben, und ohne die Untersuchungen von Dumas und Stass würden wir kaum den

Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele. 325 Schlüssel zu den Anomalien gefunden haben, welche wir zu bemerken glaubten.

Die Wirkung des schmelzenden Kali's auf das römische Kümmelöl zerstreute endlich die Zweisel, die durch unsere ersten Versuche bei uns veranlasst wurden, mehr, als alle Ana-Ein einziger, sehr einfacher Versuch klärte uns über seine wahre Natur auf. In der That, sobald man ein wenig Aetzkali in einer Retorte schmilzt, durch deren Tubulus eine kleine ausgezogene Röhre geht, so dass sie die Flüssigkeit, die man hineinbringen will, hindurchgehen lässt, so wird jeder Tropfen Oel beim Zusammentreffen mit dem Alkali fest, wähtend zugleich ein farbloses Oel von Citronengeruch sich in dem Recipienten der Retorte verdichtet. Dieses Oel, welches nur Kehlenstoff und Wasserstoff enthält, wie sich aus der Analyse ergab, präexistirt in dem Oele, denn man erhält mehr oder weniger davon, und man erhält sogar keins, je nachdem man die ersteren, die mittleren oder die letzteren durch die Destillation des Oeles erhaltenen Portionen dieser Behandlung unterwirft.

Der vom Kali zurückgehaltene sauerstoffhaltige Stoff bildet den Ausgangspunct einer Reihe sehr interessanter Verbindungen, welche eine grosse Analogie mit denen haben, auf welche die Untersuchung des Bittermandelöles in den letzteren Jahren geleitet hat. Wir wollen ihn Cuminol nennen.

Den diesen Stoff begleitenden Kohlenwasserstoff, welcher ungefähr den dritten Theil von dem Gewiehte des Oeles ausmacht, wollen wir unter dem Namen Cymen beschreiben.

Wir haben uns gleichfalls überzeugt, dass das römische Kümmelöl in den Körnern präexistirt und dass es nicht, wie das Senföl und Bittermandelöl, das Resultat der Wirkung des Wassers auf gewisse Bestandtheile des Samens ist. Die Samenhaut scheint der Sitz dieses ätherischen Oeles zu sein, wenigstens besitzt das Innere des Kornes nicht den reizenden und scharfen Geschmack der Hülse.

Wir behandelten römischen Kümmel, wie er im Handel zu haben war, in der Wärme mit wasserfreiem Alkohol. Der erhaltene Aufguss besass den widrigen Geruch des Oeles in einem hohen Grade. Nachdem wir ihn in einer Retorte abgedampft hatten, um den Ueberschuss von Alkohol daraus zu entfernen, setzten wir Wasser zu, wodurch er sogleich unter 326 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele.

Abscheidung einer merklichen Menge von ätherischem Oele getrübt wurde.

Es ist zu bemerken, dass das Oel von den Körnern des gemeinen Kümmels (Carum Carvi) keinen der so eben erwähnten beiden Stoffe enthält, obwohl dieselben von einer Psianze herkommen, die zu derselben Familie gehört wie die, aus der dieselben erhalten werden *).

1. Theil.

Cuminol, sauerstoffhaltiger Stoff des römischen Kümmelöles.

Um sich diesen Körper im Zustande vollkommener Reinheit zu verschaffen, destillirt man das Oel in einem bis zu 200° erhitzten Oelbade. Das schon bei 165° siedende Cymen geht ganz in den Recipienten über, indem es einen grossen Theil des Cuminols mit sich fortreisst, das man durch eine neue Destillation nicht völlig davon abscheiden kann. Der Rückstand enthält nur Cuminol, wenn die Operation gehörig geleitet und die Temperatur die ganze Zeit hindurch auf dem angegebenen Grade erhalten worden war. Man destillirt es schnell in einem Strome von Kohlensäure und sammelt das Product in einer gehörig verschlossenen Flasche. Die Veränderlichkeit des Cuminols macht diese Vorsichtsmaassregeln unerlässlich.

Das Product, über Chlorcalcium getrocknet und mit Kupferoxyd **) verbrannt, gab folgende Resultate:

- I. 0,350 Gr. gaben 1,036 Kohlensäure und 0,270 Wasser.
- II. 0,451 Gr. von einer andern Bereitung gaben 1,340 Kohlensäure und 0,341 Wasser.

III. 0,502 Gr. gaben 1,490 Kohlensäure und 0,380 Wasser. Diess macht in 100 Theilen;

^{*)} Während des Druckes dieser Abhandlung kam uns eine ßemerkung von Völkel (Ann. der Chem. u. Pharm. Bd. XXXV. S. 308) zu Gesicht, wodurch diese Thatsache völlig bestätigt wird. Das Oel des gemeinen Kümmels enthält zwei eigenthümliche Oele, die der Verfasser nicht zu trennen vermochte. Das flüchtigste scheint ein Kohlenwasserstoff zu sein.

^{**)} Fast bei allen unseren Analysen haben wir die Verbrennung vollständig dadurch bewirkt, dass wir vermittelst einiger Grammen von chlorsaurem Kali, welche in das Ende der Verbrennungsföhre gebracht worden waren, einen Strom von Sauerstoff entwickelten.

erhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele. 397

	I.	H.	III.
Kohlenstoff	80,72	81,02	80,94
Wasserstoff	8,55	8,40	8,41
Sauerstoff	10,73	10,58	10,65
-	100,00	100,00	100,00.

Folgendes sind die nach der Formel C₂₀H₂₄O₂ berechnen Resultate:

$$C_{20} = 1500,0$$
 81,08
 $H_{24} = 150,0$ 8,11
 $O_{3} = 200,0$ 10,81
 $1850,0$ 100,00.

Um diese Zusammensetzung zu controliren, suchten wir : Dichtigkeit von dem Dampfe des Cuminols auf. Folgendes id die Resultate dieses Versuches:

rwichtsüberschuss des mit Dampf angefüllten

Ballons		0,8 60 G r.
mperatur des Dampfes		254°
mperatur der Luft		15°
ftdruck		745 Mm.
uminhalt des Ballons	•	839 Cb. C.
rtickbleibende Luft		•
chtigkeit des Dampfes = 5,24.	•	•

Die Bechnung würde geben:

$$C_{20} = 16,520$$
 $H_{24} = 1,651$
 $O_{2} = 2,205$
 $\hline 20,376$
 $= 5,094$

Die durch den Versuch gefundene Zahl ist etwas zu hoch, konnte aber nicht anders sein, da sich die Substanz bei hor Temperatur etwas verändert.

Das Cuminol ist eine farblose oder etwas gelbliche Flüsgkeit von einem sehr starken und anhaltenden Kümmelgeruch ad von einem scharfen und brennenden Geschmack. Es macht af dem Papier, wie alle ätherische Oele, Flecken. Sein Sieepunct ist bei 220°.

Gegen den Zutritt der Lust geschätzt, geht es, ohne sich u verändern, über, besonders wenn man schnell zu Werke eht. Erhält man es aber beim Lustzutritte lange im Sieden,

328 Gerhardt u. Cahour's, üb. die ätherischen Oele.

so färbt es sich, indem es sich zum Theil verharzt. Zugleich wird es sauer.

Es zieht den Sauerstoff schon bei gewöhnlicher Temperatur an und wird, besonders bei Anwesenheit von Feuchtigkeit, sauer.

Die Umwandlung des Cuminols in eine eigenthümliche Säure, der wir den Namen Cuminsäure geben, erfolgt weit schneller, wenn man zugleich eine Basis anwendet, mit der sich diese Säure verbinden kann. Wenn man z. B. Cuminol mit einer Kaliauflösung kocht, oder noch besser, wenn man es tropfenweise auf schmelzendes Kali fallen lässt, so verwandelt es sich augenblicklich in cuminsaures Kali. Bei der Bildung dieses Körpers entwickelt sich zugleich Wasserstoff.

Ein Gemenge von doppeit-chromsaurem Kali und concentrirter Schwefelsäure wandelt das Cuminol gleichfalls in Cuminsäure um.

Feuchtes Chlor leistet dieselbe Wirkung. Im trocknen Zustande erzeugt es ein durch Substitution von demselben Typus abgeleitetes Product, welches sich durch die Wirkung des Wassers gleichfalls in Cuminsäure umwandeln kann.

Endlich verhält sich die Salpetersäure auf eine ähnliche Weise, je nach dem Grade ihrer Concentration und nach der Temperatur, bei der die Operation vorgenommen wird. So bilden sich, wenn man rauchende Säure anwendet, welche man nur tropfenweise zusetzt, indem man alle Erhitzung vermeidet und jedesmal wartet, bis die braune Färbung des Gemenges verschwunden ist, nach einiger Zeit, nachdem das Gemenge sich selbst überlassen worden war, völlig weisse Krystalle von Cominsäure. In der Hitze dagegen erhält man, selbst mit einer Säure von geringerer Concentration, eine grosse Menge Harz, so wie eine eigenthümliche Säure, welche stickstoffhaltig zu sein und zu der Cuminsäure in demselben Verhältnisse zu stehen scheint, welches zwischen der Benzoesäure und der Nitrobenzinsäure von Mulder besteht.

Brom verhält sich zum Cuminol auf dieselbe Weise wie das Chlor.

Concentrirte Schwefelsäure theilt ihm eine dunkelrothe Farbe mit. Beim Zusetzen von Wasser zu dem Gemenge scheidet sich eine klebrige Masse von schmuziger Farbe ab. Es gelang uns nicht, bei Anwendung von Nordhäuser Schweselsäure und indem wir jede Temperaturerhöhung vermieden, eine Weinsäure von der Art derjenigen zu bereiten, welche Mitscherlich mit Bittermandelöl erhielt. Das Cuminol löste sich völlig auf, aber das Wasser schied aus dem Gemenge eine braune und theerartige Masse ab. Dieser Charakter, so wie die Leichtigkeit, mit der das Cuminol in eine Säure übergeht, reicht hin, um es von dem Cymen und vielen anderen analogen Steffen zu unterscheiden.

Beim Abdampfen eines Gemenges von Chlorwasserstoffsäure und Cuminol erhält man als Bückstand ein Gemenge von Harz und Cuminsäure.

Trocknes Ammoniak, mit Cominol eine gewisse Zeit zusammengebracht, erzeugt einen weissen Körper, den wir noch
nicht hinreichend untersucht haben. Wahrscheinlich schliesst
sich dieses Product den so interessanten Verbindungen an, welche Laurent mit dem Bittermandelöl und dem Zimmtöl erhalten und die er Benzhydramid *) und Cinnhydramid **) genannt hat.

Endlich wollen wir, um das Verzeichniss der Charaktere des Cuminols zu schliessen, noch erwähnen, dass es unter dem Einflusse des Cyankaliums ein Product gegeben hat, welches wahrscheinlich dem Benzoïn von Robiquet und Boutron-Charlard ***) analog ist. Die Bereitung dieses neuen Körpers ist gewissen Bedingungen unterworfen, die wir noch nicht gehörig untersucht haben, und es ist uns selbst begegnet, indem wir es wieder zu erzeugen suchten, negative Resultate zu erhalten, obwohl es uns das erste Mal völlig gelungen war. Wir wollen diesen Punct später aufklären.

Cuminsäure.

Dieser Körper bildet sich, wie wir bereits erwähnt haben, in vielen Fällen durch die Oxydation des Cuminols.

^{*)} Ann. de Chim. et de Phys. LXVI. 181.

^{**)} Compt. rendus hebdomadaires des séances de VAcadémie, X. 581.

^{***)} Ann. de Chim. et de Phys. XLIV. 352.

330 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele.

Mali in einer Retorte schmilzt, in deren Tubulus eine kleine ausgezogene Röhre befestigt ist. Wenn das Alkali im Fluss ist, so bringt man das Kümmelöl tropfenweise hinein. Dieses wird sogleich fest. Jeder Tropfen, wenn er mit dem Kali zusammentrifft, wird roth und bald nachher weiss, wenn das Oel rein ist. Das Cymen wird nicht angegriffen und geht über.

Diese Umwandlung des Cuminols erfolgt so schnell, dass man leicht 1 Kilogr. Cuminsäure in weniger als einer Stunde bereiten kann, besonders wenn man das Cymen nicht sammeln will, denn alsdann kann man ohne Nachtheil die Operation in einer Schale vornehmen, wodurch dieselbe beträchtlich abgekürzt wird. Wenn alles Oel zersetzt ist, löst man die Masse in Wasser auf, entfernt vermittelst einer Pipette die gering Menge Cymen, welche sich nicht verflüchtigt hat und über de Flüssigkeit steht. Nachber setzt man einen geringen Ueberschuss von Salpetersäure zu, wodurch die ganze Cuminsäur 🗨 in weissen oder gelblichen Flocken, je nach der Beinheit des angewandten Oeles, gefällt wird. Man bringt den Niederschlage auf ein Filter und erwärmt ihn nach gehörigem Waschen in einer Schale, Auf diese Weise kommt die Säure in Fluss und verliert fast alles anhängende Wasser. Beim Erkalten gerinnt sie, und das Wasser kann leicht davon abgegossen werden. Wenn man nicht reines Cuminol angewandt hat, so enthält das Product immer ein wenig Harz. Um es in diesem Falle zu reinigen, braucht man es nur zu destilliren und es in Alkohol krystallisiren zu lassen.

Die auf diese Weise bereitete Cuminsäure zeigt sich in Gestalt prismatischer, vollkommen weisser Tafeln von seltener Schönheit. Ihr Geschmack ist ganz sauer, und ihr Geruch, obwohl schwach, erinnert an den der Wanzen.

Sie kommt bei 92° in Fluss und schwimmt auf siedendem Wasser als ein farbloses Oel, welches heim Erkalten gerinnt. Ihr Siedepunct ist über 250°, aber die Säure verslüchtigt sich weit unter dieser Temperatur, wenn man sie mit Wasser kocht. Ihr Dampf ist sauer und erstickend.

Sie lässt sich leicht und ohne sich zu verändern sublimiren, indem sie prächtige Nadeln giebt, welche oft mehr als 1 Zoll lang sind, wenn die Operation langsam geleitet wurde.

Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele. 331.

Folgendes sind die Resultate von der Verbrennung dieses Körpers:

I. 0,400 Gr. Säure gaben beim Sublimiren 1,072 Kohlensäure und 0,272 Wasser.

II. 0,400 Gr. in Alkohol krystallisirte Säure von einer andern Bereitung gaben 0,271 Wasser und 1,073 Kohlensäure.

III. 0,600 Gr. sublimirte Säure gaben 0,403 Wasser.

Diese Zahlen, in 100 Th. ausgedrückt, leiten auf folgende Zusammensetzung:

Kohlenstoff	73,09	73,15	
Wasserstoff	7,55	7,52	7,46
Sauerstoff	19,36 ·	19,33	,
	100,00	100,00.	-

Die sublimirte und die in Alkohol krystallisirte Säure zeigen daher dieselbe Zusammensetzung.

Die Formel C₂₀H₂₄O₄ giebt:

$$C_{20} = 1500,0$$
 73,17
 $H_{24} = 150,0$ 7,39
 $O_4 = 400,0$ 19,51
 $2050,0$ 100,00.

Man sicht, dass der Versuch völlig mit dieser Formel übereinstimmt.

Bei der Vergleichung der Zusammensetzung der Cuminsäure mit der des Cuminols bemerkt man, dass letzteres sich nur dadurch unterscheidet, dass es 2 At. Sauerstoff weniger enthält, woraus sich die Reaction hinreichend erklärt. Wirklich wird durch die Wirkung des Kalihydrates auf das Cuminol das Wasser zersetzt. Sein Sauerstoff verbindet sich mit den Elementen des Cuminols, während sein Wasserstoff in Freiheit gesetzt wird.

$$C_{20}H_{24}O_2 + H_4O_2 = C_{20}H_{24}O_4 + H_4.$$

2 At. Wasser treten daher bei der Bildung der Cuminsäure dazu. Die darin enthaltenen 4 At. Wasserstoff werden frei. Wirklich haben wir uns von der Entwickelung dieses Gases überzeugt.

Rücksichtlich ihrer Bildung reiht sich daher die Cuminsäure an die Benzoësäure, die Zimmtsäure und die Salicylsäure, deren meiste Eigenschaften sie theilt.

Sie ist in kaltem Wasser fast unlöslich. Siedendes Was-

332 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele

ser löst davon eine geringe Menge auf, welche beim Erkalten niederfällt. Sie löst sich besser in angesäuertem Wasser auf, deshalb muss man bei der Bereitung die Anwendung eines zu grossen Ueberschusses von Salpetersäure vermeiden.

Alkohol und Aether lösen sie mit Leichtigkeit auf und lassen sie beim Abdampfen in krystallisirter Gestalt zurück.

Concentrirte Schwefelsäure löst sie auf, ohne sich zu färben. Diese Reaction kann selbst dazu dienen, zu erkennen, oh die Cuminsäure rein ist. Im rohen Zustande, wie man sie durch Destillation erhält, hält sie immer eine geringe Menge öliger Substanz zurück, welche sich durch die Zersetzung harziger Substanzen bildet, womit sie verunreinigt ist und welche man nur durch Krystallisationen in Alkohol entziehen kann. Nur wird aber diese ölige Substanz durch concentrirte Schwefel—säure roth, so dass es leicht ist, ihre Anwesenheit zu erkennen

Rauchende Salpetersäure greift die Cuminsäure beim Sieden an. Es scheint sich in diesem Falle eine stickstoffhaltige Cuminsäure zu bilden, welche der Nitrobenzinsäure von Mulder analog ist und bei der 1 Aeq. Wasserstoff durch N₂ O₄ ersetzt wird.

Wird die Cuminsäure der trocknen Destillation mit einem Ueberschusse von Aetzbaryt unterworfen, so zersetzt sie sich in Kohlensäure, welche mit der Basis in Verbindung bleibt, und in Kohlenwasserstoff, welcher dem Benzen (Benzin) analog ist und den wir Cumen genannt haben. Wir wollen dieses letztere Product weiter unten untersuchen.

Cuminsaure Salze.

Die Cuminsäure ist eine ziemlich starke Säure. Sie ist eben so krästig wie die Benzoësäure.

Ihre Auflösung zersetzt die kohlensauren Alkalien.

Mit den Metalloxyden erzeugt sie gehörig charakterisirte Salze, welche man entweder direct oder durch doppelte Zersetzung erhält.

Wir haben einige derselben analysirt, um die Zusammensetzung der freien Säure controliren zu können.

Cuminsaurer Baryt. Dieses Salz wird in perlmutterartigen Flittern von einem glänzenden Weiss durch Zersetzung des kohlensauren Baryts vermittelst einer Auflösung der Cuminsäure

erhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele. 333

wendet, so fällt das Salz sogleich beim Filtriren nieder, und ler Krystall wirft, sobald er erscheint, das Licht sehr lebft zurück, indem es alle Nüancen des Spectrums zeigt.

I. 0,300 Gr. dieses Salzes, bei 100° getrocknet, gaben im anzen 0,565 Kohlensäure und 0,129 Wasser.

II. 0,350 Gr. desselben Salzes gaben 0,178 schwefelsaum Baryt.

Hieraus lassen sich folgende Zahlen ableiten:

Kohlenstoff 51,41 —
Wasserstoff 4,81 —
Baryum — 29,88.

Nach der Formel C₂₀H₂₂O₄ würde man haben:

$$C_{20} = 1500,0$$
 51,89
 $H_{22} = 137,5$ 4,75
 $Ba = 856,8$ 29,61
 $O_4 = 400,0$ 13,82
 $2894,3$ 100,00.

Der cuminsaure Baryt hat einen sehr bittern Geschmack.

1 löst sich leicht in Alkohol und Aether auf.

Cuminsaures Silberoxyd. Setzt man salpetersaures Silroxyd zu einer Auflösung von cuminsaurem Ammoniak, so tält man einen weissen käsigen Niederschlag, welcher am chte schnell schwarz wird.

I. 0,560 Gr., bei 100° getrocknet, gaben 0,209 Wasser d 0,908 Kohlensäure.

II. 0,420 Gr., bei 100° getrocknet, gaben 0,155 Wasser d 0,680 Kohlensäure.

III. 0,447 Gr., bei 100° getrocknet, gaben 0,163 Wasser.

IV. 0,400 Gr., bei 100° getrocknet, gaben 0,1605 metalches Silber.

V. 0,600 Gr., bei 100° getrocknet, gaben 0,240 metallihes Silber.

Diese Resultate leiten auf folgende Zahlen:

	I.	II.	III.	IV.	v.
Kohlenstoff	44,22	44,15			-
Wasserstoff	4,14	4,10	4,07	4-1990	-
Silber	-			40,19	40,00.

334 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele

Die Formel
$$C_{20}H_{22}O_4$$
 fordert folgende Zahlen:
 $C_{20}=1500,0$ 44,26
 $H_{22}=137,5$ 4,05
 $Ag=1351,6$ 39,88
 $O_4=400,0$ 11,81
 $3389,1$ 100,00.

Der Versuch trifft völlig mit der Berechnung überein. Wenn man das in diesem Salze enthaltene Silber bestimmen will, so ist es unerlässlich, es mitein wenig Salpetersäure zu glühen, denn sonst erhält man immer einen Rückstand von Kohlenstoffsilber, welcher der Wirkung der Wärme völlig widersteht. Dieses Kohlenstoffsilber, welches eine gelbe und matte Farbe besitzt, zeigt eine constante Zusammensetzung.

I. 0,170 Gr., welche von 0,400 Gr. cuminsaurem Silberoxyd herrührten, gaben 0,1605 metallisches Silber.

II. 0,254 Gr., welche von 0,600 Gr. cuminsaurem Silberoxyd herrührten, gaben 0,240 metallisches Silber.

Diess macht in 100 Theilen :

Die Fermel C Ag würde geben:

Dieses Kohlenstoffsilber giebt bei der Behandlung mit Salpetersäure einen reichlichen Absatz von Kohle.

Destillation, so zersetzt es sich in Cuminsäure, Kohlensäure, Kohlensäure, Kohlensäure, Kohlenstoffsilber und Kohle. Bei dieser Reaction erzeugt sich kein inflattatschles Gas. Aller Wasserstoff des Silbersalzes findet sich in der überdestillirenden Cuminsäure wieder. Nun ist es aber, weil die letztere 12 Acquivalente Wasserstoff enthält, während das dominsature Silberoxyd nur 11 enthält, klar, dass 12 Acquivalente cuminsaures Silberoxyd nur 11 Acquivalente Cuminsäure geben können. Der Usberschuss des Sauerstoffes entwinbett sich als Kohlensäure, und die überschüssige Kohle

Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Ocle. 335

bleibt entweder als Einfachkohlenstoffsilber oder im freien Zustande zurück. Folgende Gleichung giebt von dieser Reaction völlig Rechenschaft:

12 Aequivalente cuminsaures Silberoxyd

$$12 \begin{pmatrix} C_{20} H_{22} O_4 \\ Ag \end{pmatrix} = C_{240} H_{264} Ag_{12} O_{48}$$

geben

11 Aeq. Cuminsaure

$$11(C_{20}H_{24}O_4) = C_{220}H_{264}$$
 O_{44}

 2 — Kohlensaure
 $2(C_1 O_2) = C_3$
 O_4

 12 — Einfachkohlenstoffs. 12 (CAg)
 $= C_{12}$
 Ag_{12}

 6 — Kohlenstoff
 $6C$
 $= C_6$
 $C_{240}H_{264}Ag_{12}O_{48}$

Die Producte, welche man sammelt, finden sich so ziemlich n den hier angegebenen Verhältnissen vor. Wenn man jedoch las cuminsaure Silberoxyd lebhaft erhitzt, so erhält man ausserdem Cumen und ein wenig mehr Kohlensäure, in Folge der Zersetzung der Cuminsäure selbst. $C_{20}H_{24}O_4$ zersetzt sich wirklich in $C_{18}H_{24}+C_2O_4$.

Das cuminsaure Kali ist ein zersliessliches Salz und wird nicht in regelmässiger Gestalt erhalten.

Das cuminsaure Ammoniale, direct durch Cuminsaure und Aetzammoniak bereitet, zeigt sich in Gestalt zarter Büschel, welche an der Luft ihren Glanz Verlieren, indem sie wahrscheinlich Ammoniak verlieren und sich in saures Salz umwandeln.

Eine verdünnte Auflösung von cuminsaurem Ammewisk bewirkt weder in Kalkwasser und Batytwasser, noch in den mittelmässig concentrirten Auflösungen von Chlorbaryum und Chlorbaldum einen Niederschlag. Sie giebt mit den Sakzen des Einen senoxyds einen isabellfarbenen, und mit den Sakzen des Kupferoxyds einen heliblauen Niederschlag.

Cuminäther.

Um diesen Körper zu bereiten, sättigt man eine Auflösung der Cuminsäure in wasserfreiem Alkohel mit trocknem Chlor-wasserstoffgas. Sobald das Gas vicht mehr absorbirt wird, erbitzt man die Flüssigkeit im Wasserbade, um den Chlorwasserstoffäther, so wie den überschüssigen Alkohel auszutreffen. Nachher destillirt man den Rückstand an freiem Feuer, und, nach-

336 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele.

dem man das Product mit kohlensaurem Natron gewaschen hat, rectificirt man es über Massicot.

Auf diese Weise bereitet, zeigt sich der Cominather in Gestalt einer farblosen Flüssigkeit, die leichter als Wasser ist und einen sehr angenehmen Geruch nach Reinetten besitzt.

Er siedet bei 240°. Sein Dampf entzündet sich leicht and verbrennt mit einer bläulichen Flamme.

Er ist unlöslich in Wasser und löst sich in allen Verhältnissen in Alkohol und in den Aetherarten auf.

Mit einer wässrigen Auflösung von Kali erhitzt, erzeugt er Alkohol und Cuminsäure wieder.

I. 0,500 Gr. gaben 0,390 Wasser und 1,364 Kohlensäure.

II. 0,500 Gr. gaben 1,366 Koblensäure und 0,389 Wasser. Diese Resultate geben in 100 Theilen:

	I.	IJ.
Kohlenstoff	74,39	74,50
Wasserstoff	8,66	8,64
Sauerstoff	16,95	16,86
	100,00	100,00.

Die Rechnung giebt ziemlich dieselben Zahlen:

$$C_{24} = 1800,0$$
 75,00
 $H_{32} = 200,0$ 8,83
 $O_4 = 400,0$ 16,67
 $2400,0$ 100,00.

Die Formel C_{24} H_{32} O_4 , welche sich auf eine rationelle Weise darstellen lässt durch

 $C_{20} H_{22} O_3, C_4 H_{10} O,$

ist daher der aller durch die Sauerstoffsäuren gebildeten zusanmengesetzten Aetherarten analog.

Um die vorhergehende Formel mit mehr Gewissheit zu bestimmen, suchten wir die Dichtigkeit von dem Dampfe des Cuminäthers auf. Folgendes sind die Resultate, welche der Versuch uns gab:

Gewichtsüberschuss des Ballons 0,588 Gr.

Temperatur der Luft 6°
Temperatur des Dampfes 281°
Barometerstand 767 Mm.
Rauminhalt des Ballons 188 Cb. C.
zurückbleibende Luft 0

dezhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Ocle. 887

Gewicht des Litre Dampf

8,640 Gr.

Dichtigkeit des Dampses, verglichen mit der der Lust 6,65 - Die Rechnung würde geben:

$$C_{24} = 19,722$$
 $H_{32} = 2,201$
 $O_{4} = 4,410$
 $26,333$
 $= 6,583$.

Der Cuminäther zeigt daher dieselbe Art der Verdichtung wie der Bezuëäther, mit dem man ihn leicht verwechseln könnte. Sein Refractionsindex ist 1,504 und der des letzteren Aethers 1,511.

Kalium - Cuminol.

Wenn man ein Stück ganz trocknes Aetzkali in Cuminol bringt, so dass es ganz von der Flüssigkeit bedeckt ist, and man erwärmt gelinde, ohne sie zum Sieden kommen zu assen, so bildet sich um das Stück Kali eine Vegetation von gallertartigem Aussehen, welche zusehends zunimmt, ohne dass sich eine Gasentwickelung zeigt. Dieses blumenkohlartige Gewächs lässt sich leicht von dem innern Theile des Kali's, zu lem die Flüssigkeit nicht gedrungen ist, losmachen. Dieses neue Product, zwischen doppelten Lagen von Fliesspapier ausgepresst ind in Wasser aufgelöst, zersetzt sich in Cuminol, welches benauf steht, und in Kali, welches aufgelöst bleibt. Jedoch enthält etzteres zugleich eine grosse Menge von Cuminsäure, welche lurch die Säuren als weisse und krystallinische Flocken gefällt wird.

Die Bildung von Cuminsäure unter solchen Umständen, the Zersetzung von Wasser, lässt sich nur durch die Annahme erklären, dass durch die Wirkung des Kali's auf das Cuminol sich zuerst ein Körper bildet, von der Zusammensetzung

welcher dem Kaliumsalicylür analog und befähigt ist, sieh an der Luft zu oxydiren, wobei er sich in cuminsaures Kali umwandelt.

Indem wir von dieser Idee ausgingen, wurden wir noth-Journ. f. prakt. Chemie. XXIII. 6.

338 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele.

wendig darauf geleitet, die Art der Beaction des Kalium auf das Cominol zu untersuchen. In der Kälte scheint dieses Metall nicht zu reagiren, jedoch verliert es seinen Glanz und sehr kleine Gasblasen entweichen aus dem Innern der Flüssigkeit. Sobald man aber letztere etwas erwärmt hat, zeigt sich eine hestige Reaction, begleitet von einer reichlichen Entwickelung von Wasserstoff. Die Flüssigkeit entzündet sich sogar, wenn man die Operation nicht in einem Ballon mit langem Halse vornimmt.

Ist das Kalium im Verhältniss zum Cuminol in geringen Ueberschusse vorhanden, so wird letzteres ganz fest, indem se eine gallertartige Masse giebt, welche ganz dasselbe Aussehen wie das vorher erhaltene Product zeigt. Wasser zersetzt dieselbe augenblicklich in Cuminol und in Kali. Die Luft verwandelt sie allmählig in cuminsaures Kali, und diese Umwandlung ist schnell genug, um die Analyse der Substanz zu verhindera.

Cuminols $C_{20}H_{22}O_{2}$ gehörig dargethan, und man muss folglich zwei verschiedene Perioden bei der Bildung der Cuminsäure durch die Wirkung des Kali's auf das Cuminol annehmen. In der ersten tritt 1 Aequivalent Kalihydrat 1 Aequivalent Sauerstoff an 1 Aequivalent Wasserstoff des Cuminols ab, um Wasser zu bilden, während das Metall sich dem Wasserstoffe substituirt:

$$C_{20}H_{24}O_2+KO,H_2O=\frac{C_{20}H_{22}O_2}{K}+H_4O_2.$$

In der zweiten Periode bemächtigt sich das neue Product des Sauerstoffes der anwesenden 2 Atome Wasser und erzeugt auf diese Weise cuminsaures Kali und 4 Atome freien Wasserstoff:

$$\frac{C_{20}H_{22}O_{2}}{K} + H_{4}O_{2} = \frac{C_{20}H_{22}O_{4}}{K} + H_{4}.$$

Als Bestätigung dieser Thatsache setzen wir hinzu, dass man bei der Bereitung der Cuminsäure zuweilen keine Entwickelung von Wasserstoff bemerkt, und zwar besonders, wenn das schmelzende Kali nicht warm genug ist. Daher bewirkt das Kali bei einer niedrigen Temperatur nur die Bildung von Kalium-Cuminol, welches sich in cuminsaures Kali durch die Einerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele: 339

irkt daher nur ein, wenn die Reaction durch die Wärme beinstigt wird.

Wenn jedoch das Cuminol mit einer wässrigen Auslösung in Kali, so wie mit Wasser in freiem Zustande zugammentit, so zersetzt es dasselbe schon bei gewöhnlicher Temperat, und in diesem Falle entwickelt sich merkwürdiger Weiser Wasserstoff nicht, sondern bleibt mit einer gewissen Menge minol verbunden zurück und bildet damit einen neuen öligen brer. Die Kalilauge ist zugleich mit einer grossen Menge in Cuminsäure beladen, welche durch die Mineralsäuren in nem Zustande vollkommener Weisse daraus gefällt wird. Die ildung dieser Säure kann nicht der Wirkung der Lust beigetsen werden, denn bei dem von uns angestellten Versuche iste die atmosphärische Lust keinen Zutritt zu dem Gemenge habt, indem letzteres in einer Flasche mit eingeschlissenem öpsel enthalten war.

Chlor - Cuminol.

Wenn man am zerstreuten Lichte trocknes Chlor in gleichlis trocknes Cuminol leitet, so wird das Gas absorbirt, wähnd sich zugleich Chlorwasserstoffsäure entwickelt. Die Flüsskeit färbt sich anfangs unter Erhitzung roth, nachher verrt sie allmählig diese Farbe. Nach einigen Stunden wird in Chlor mehr absorbirt.

Wenn man hierauf den in dem Producte aufgelösten Uerschuss von Chlor und Chlorwasserstoffsäure durch einen rom von trockner Kohlensäure austreibt, so erhält man eine Ibliche Flüssigkeit, die schwerer ist als Wasser und einen sehr irken, von dem des Cuminols verschiedenen Geruch besitzt.

Dieses Product ändert sich ausserordentlich schnell an der ist, besonders bei Anwesenheit von Feuchtigkeit, so dass man sogleich in eine Flasche mit eingeschlissenem Stöpsel brinn muss. Beobachtet man aber auch diese Vorsichtsmaassrel, so ist es doch unmöglich, es vierundzwanzig Stunden lang fzubewahren, ohne dass es sich verändert. Denn die geringe istschicht, welche sich zwischen dem Stöpsel und der Flüsgkeit besindet, reicht hin, um die Zersetzung der letzteren rbeizusühren. Vielleicht zersetzt es sich auch von selbst, ohne

340 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele.

den Zutritt feuchter Luft, was wir jedoch nicht mit Gewissheit behaupten können.

Das Chlor-Cuminol zersetzt sich bei der Destillation in Chlorwasserstoffsäure, Kohle und ein eigentbümliches flüchtiges Oel.

Frisch bereitet, ist es fast farblos, es wird aber allmählig roth, indem es sich etwas trübt und unter Entwickelung reichlicher Dämpfe von Chlorwasserstoffsäure. Wir werden sogieich auf die Natur dieser Zersetzung zurückkommen.

Es war zu vermuthen, dass ein so veränderlicher Körper bei der Analyse nur annähernde Resultate geben würde, selbst wenn man ihn unmittelbar nach seiner Bereitung verbrenst. Dessenungeachtet gestatten die von uns erhaltenen Zahlen, seine Zusammensetzung auf eine ganz zuverlässige Weise zu bestimmen, besonders wenn man die Zersetzung, welche er unter dem Einflusse der Alkalien erleidet, betrachtet.

- I. 0,500 Gr. gaben 0,300 Wasser und 1,179 Kehlensäure.
- II. 0,534 Gr., in einem Strome von Sauerstoff verbrand, gaben 0,320 Wasser und 1,320 Kohlensäure.
- III. 0,745 Gr., mit einem Gemenge von Salpeter und kollensaurem Kali verbrannt, gaben 0,670 Chlorsisber.

Diese Resultate, auf hundert Theile gebracht, entsprechen folgender Zusammensetzung:

I.	II.	III.
Kohlenstoff 64,30	64,98	
Wasserstoff 6,66	6,42	67-0-A0
Chlor —		22,18.

Di Formel $C_{80}H_{22}O_{2}$ würde geben: C_{20} 1500,0 65,79 H_{22} 137,5 6,08 C_{12} 442,6 19,41 O_{2} 200,0 8,77 O_{2} 2280,1 100,00.

Der gefundene Kohlenstoff ist etwas zu gering, der Wasserstoff und das Chlor dagegen sind zu hoch angenommen, was aber nicht anders sein konnte, da das Chlor-Cuminol beständig

derhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele. 841 mit Chlorwasserstoffsäure beladen ist, welche von der eben erwähnten Zersetzung herrührt.

Das Cuminol verliert also unter dem Einslusse des trocknen Chlors und an dem zerstreuten Lichte 1 Aequivalent Wasserstoff und erhält dafür 1 Aequivalent Chlor, was der Theorie der Substitutionen vollkommen gemäss ist. Am directen Sonstenlichte bleibt diese Zersetzung nicht dabei stehen, sondern begreist wahrscheinlich eine grössere Anzahl von Aequivalentund vielleicht den ganzen Wasserstoff. Wir wollen später und vielleicht den ganzen Wasserstoff. Wir wollen später auf diese Thatsache zurückkommen und besonders untersuchen, die des verschiedenen ehlorhaltigen Körper nicht mit den ätzen- den Alkalien eigenthämliche Säuren geben.

Folgende Reaction bestätigt völlig die von uns für das Einfächehlereuminel angenommene Zusammensetzung. Wenn man diesen Körper einige Augenblicke mit Kalilauge kocht, so löst er sich ganz auf, und die Mineralsäuren fällen aus der Auflösung vollkommen reine Cuminsäure. Das salpetersaure Silberuxyd veranlasst darin gleichfalls einen reichlichen Nieder-schlag von Chlersiber. Es ist leicht durch folgende Gleichung davon Rechenschaft zu geben:

$$C_{20} \frac{H_{22} O_3}{Cl_2} + H_4 O_2 = C_{20} H_{24} O_4 + H_2 Cl_2$$

L.b. 1 Aeq. Chlor-Cuminol zersetzt sieh nebst 2 Aeq. Wasser, m 1 Aeq. Cuminsäure und 1 Aeq. Chlorwasserstoffsäure zu geben.

Das Wasser allein bewirkt schon diese Zersetzung, nur angsamer. So findet man, wenn man einen Tropfen Chlor-Luminol der seuchten Lust aussetzt, denselben den solgenden Fag in völlig weisse Krystalle von Cuminsäure umgewandeltset die Lust sehr mit Wasserdämpsen beladen, so erfolgt diese Imwandlung noch weit schneller, und um sich eine Vorstellung lavon zu machen, braucht man nur den Athem auf einen hangenden Tropsen von Chlor-Cuminol streichen zu lassen. Er rerliert alsdann seinen Glanz und entwickelt saure Dämpse,

Die Leichtigkeit, mit der das Chlor-Cuminol zu einer Säure wird, liess uns hoffen, den Cuminäther durch Chlor-Cuminol und wasserfreien Alkohol erzeugen zu können. Indessen führten inige in dieser Hinsicht gemachte Versuche kein Resultaf rerbei.

Wir sind nicht glücklicher gewesen bei dem Versuche,

Cuminamid durch Einwirkung des trocknen Ammoniaks auf Chlor-Cuminol zu erhalten. Es erfolgt in diesem Falle eine Zersetzung, die keine Analogie mit der zu haben scheint, welche das gechlorte Bittermandelöl unter denselben Umständen erleidet. In der That wird, wenn man trocknes Ammoniak in eine weingeistige Auflösung von Chlor Cuminol *) leitet, das Gas völlig absorbirt und es setzt sich sogleich eine grosse Menge von Salmiak ab. Wenn man nach beendigter Reaction das Gemenge auf ein Filter bringt, so geht eine bräunliche Flüssigkeit durch, welche beim Concentriren neue Mengen von Salmiak absetzt, ohne dass sich irgend ein andrer fester Körper zeigt. Das Wasser scheidet aber aus dieser Flüssigkeit ein gechlortes Oel ab, welches mit Kali Cuminanure giebt und durch die Wärme in Chlorwasserstoffsäure, Kohle und ein eigenthümliches flüchtiges Oel zersetzt wird. Es könnte demnach scheinen, als reagirte das Ammoniakgas nur auf die Chlorwasserstoffsäure, welche das Chlor-Cuminol, wenn es etwas alt ist, ausgelöst hält. Indessen schien uns die erzeugte Menge von Salmiak zu beträchtlich, als dass wir glauben konnten, das Chlor-Cuminol sei ganz und gar nicht angegriffen worden.

Concentrirte Schweselsäure löst das Chlor-Cuminol aus, wobei sie sich carmoisinroth färbt und Dämpse von Chlorwasserstoffsäure entwickelt. Setzt man das Gemenge der Lauft aus, so bemerkt man nach einigen Augenblicken Krystalle von Cuminsäure darin.

Endlich bemerken wir noch, dass, wenn man bei der Bereitung des Chlor-Cuminols nicht über geschmolzenem Chlorcaleium vollkommen getrocknetes Cuminol anwendet, sich eine grosse Menge von Cuminsäure bildet. Die Anwesenheit derselben lässt sich leicht durch Destillation eines Theiles von dem Producte entdecken. Wenn es keine enthält, so erhält man auf diese Weise nur Chlorwasserstoffsäure, Kohle und ein Oct. Enthält es dagegen Cuminsäure, so setzt sich diese in dem Halse der Retorte ab, so dass sie den Durchgang derselben sogar versperrt.

^{*)} Wenn man blos Chlor-Cuminol nimmt, so wird das Gemesge so dick, dass dadurch die Gasleitungsröhre verstopft wird.

Brom - Cuminol.

Was wir in Betreff der Reaction des Chlors auf das Cunol gesagt haben, läset sich gleichfalls auf das Brom anwenn, welches sich sowohl im trocknen als feuchten Zustande ganz
f dieselbe Weise verhält. Im ersteren Falle erzeugt sich
em-Cuminol, ein Oel, welches schwerer als Wasser ist und
n sich mit derselben Leichtigkeit, wie der entsprechende
ohlorte Körper, in Bromwasserstoffsäure und Cuminsäure
sactst.

Bei Anwendung von seuchtem Brom bildet sich ausserdem e gewisse Menge von Cuminsäure.

Wir glaubten, die Analyse des Brom-Cuminols unterlassen können, da die Zersetzung, welche dieser Körper unter dem nflusse des Wassers erleidet, hinreichend anzeigt, dass seine mel dargestellt werden muss durch

C₂₀ H₂₂ O₂ Br₂.

Cumen, erzeugt durch Zersetzung der Cuminsäure.

Die Cuminsäure hat, wie wir bereits gesehen haben, viele genschaften mit der Benzoësäure gemein, so dass man ohne Analyse sie mit einander verwechseln könnte. Diese Anapie findet man selbst auf eine auffallende Weise bei den Zerzungsproducten dieser beiden Körper.

Den Chemikern sind die Untersuchungen Mitscherlich's er das Benzen und die davon abgeleiteten Körper bekannt, siche einen hohen wissenschaftlichen Werth haben, denn sie ischeiden mit der möglichsten Bestimmtheit die theoretischen agen, welche jetzt die Geister solebhaft beschäftigen. In Deutschad, woher doch diese Untersuchungen gekommen sind, hat man sie mig zu schätzen gewusst, und zwar weil man sich allzu sehr von sichten leiten iiess, denen eben diese Versuche offenbar widerachen. Uns, die wir nicht mit blindem Glauben an ein System fesselt sind, dessen unzureichende Beschaffenheit durch viele atsachen bewiesen werden kann, haben diese Versuche eine leutende Hülfe gewährt, denn sie gestatteten uns, unsere eige-

344 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Ocie.

nen Resultate zu controliren und so der Theorie der Typen eine neue Stütze darzubieten *).

Nach dieser Theorie mussten wir, wenn wir die Cuminzäure in die nämlichen Umstände wie die Benzeesäure versetzten, eine dem Benzen analoge Verbindung erhalten. Unsere Vermuthungen sind völlig bestätigt worden.

Wir unterwarfen ein inniges Gemenge von 6 Theilen krystallisirter Cuminsäure und 24 Theilen Aetzbaryt der trocknen Destfilation. Eine völlig farblose Flüssigkeit begab sich in den Recipienten des Apparates und der Rückstand wurde gans und gar nicht schwarz. Er enthielt kohlensauren Baryt, gemengt mit einem Ueberschusse von Aetzbaryt. Wenn man die Wärme gehörig leitet und nicht mehr als 6 Gr. Cuminsäure auf einmal anwendet, so erhält man niemals andere Producte als die eben erwähnten, und selbst wenn man sich grosse Mengen der in Rede stehenden Flüssigkeit verschaffen will, ist es nicht vortheilhaft, viel Säure auf einmal zu destilliren. Hat man z. B. eine Unze dieses Körpers, so ist es bei weitem vorzüglicher, vier oder fünf Destillationen vorzunehmen. Auf diese Weise erhält man die ganze Menge von Cumen, welche die Säure geben kann.

Das Cumen ist völlig farblos und besitzt einen sehr angenehmen Wohlgeruch, welcher ganz dem des Benzens gleicht. Es bricht das Licht beträchtlich. Es ist flüchtig und destillirküber, ohne sich zu verändern. Sein Siedepunct ist constant bei 144°.

Folgendes sind die Resultate seiner Analyse:

- I. 0,400 Gr. gaben 0,358 Wasser und 1,315 Kohlensäure.
- II. 0,400 Gr. von einer andern Bereitung und mit chlorsaurem Kali verbrannt, gaben 0,405 Wasser und 1,484 Kohlensäure.

Diese Zahlen, auf 100 Theile gebracht, geben:

	I.	II.
Kohlenstoff	89,66	89,95
Wasserstoff	9,94	9,99
,	99,60	99,94.

^{*)} Es dürfte erlaubt sein, diese ganze Stelle als einen Scherz der Herren Verfasser zu betrachten. D. Red.

ethardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele. 345

Nach der Formel C₁₈ H₂₄ würde man haben:

 $C_{18} = 1350,0$ 90,00 $H_{34} = 150,0$ 10,00 100,00.

Der Versuch stimmt sehr gut mit der Berechnung überein.

m jedoch diese Zusammensetzung noch mehr zu bestätigen,

elten wir die Dichtigkeit von dem Dampfe des Comens auf,

m wegen der grossen Stabilität dieses Kürpers leicht gelang:

Folgendes sind die Data dieses Versuches:

" Gewichtsüberschuss des Ballons O,364 Gr.

Temperatur des Dampfes 184°
Temperatur der Luft 24°

Barometerstand 769 Mm.

Rauminhalt des Ballons 180 Cb. C.

zurückbleibende Luft 2 Cb. C.

Dichtigkeit des Dampfes = 3,96.

Nach der Formel C18 H24 wurde man haben:

$$C_{18} = 14,868$$
 $H_{24} = 1,651$
 $16,519.$
 $= 4,12.$

Die diesem Versuche unterworfene Flüssigkeit blieb vollmmen farbles.

The Bildung des Cumens lässt sich leicht erklären. In der sat werden, da die Cuminsäure durch C_{20} H_{24} O_4 därgestellt wird, O_4 , d. b. 2 Aeq. Kohlensäure, durch den Baryt zurückgehalt, während C_{18} H_{24} sich entwickeln:

$$C_{20} H_{24} O_4 = C_2 O_4 + C_8 H_{24}$$

th bo wie sich das Benzen aus der Benzoesäure bildet:

$$C_{14}H_{12}O_4 = C_2O_4 + C_{12}H_{13}$$

Wir werden weiter unten zeigen, dass die Zimmtsäure e Verbindung derselben Art erzeugt, durch folgende Relion:

$$C_{18} H_{16} O_4 = C_2 O_4 + C_{16} H_{16}.$$

Wir haben den Körper $C_{16}H_{16}$ Cinnamen genannt. Er ist t den Benzen isomerisch, besitzt aber nicht dieselbe Dichtigit. Die Formel, durch welche wir es ausdrücken, stellt 4
ium. Dampf wie die des Benzens und Cumens dar:

Das Cumen ist in Wasser unlöslich, sehr löslich dagegen

346 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Qele,

in Alkohol, Aether, Holzgeist und den ätherischen Oelen. Weder das aufgelöste, noch das schmelzende Kali äussert eine Wirkung auf dasselbe.

Salpetersäure verändert es nicht in der Kälte; in der Wärme aber erzengt sie in concentrirtem Zustande ein Oel, welches schwerer als Wasser ist und das dem Nitrobenzen von Mitscherlich analog zu sein scheint. Setzt man das Sieden mit sehr concentrirter Salpetersäure fort, so erhält man eine eigenthümliche krystallinische Säure, welche sich in Actzkali sehr gut auflöst und durch stärkere Säuren wieder daraus ge-ällt wird.

Sulfocumensäure.

Mit rauchender Schweselsäure und Cumen erhält man eine eigenthümliche Säure, welche der Sulsobenzensäure von Mitscherlich entspricht. Diese Säure, welche wir Sulsocumensäure nennen wollen, wird in Verbindung mit Baryt leicht bereitet.

Zu diesem Zwecke gieszt man ungefähr 1 Theil Cumen und 2 Theile Nordhäuser Schwefelsäure in ein Glas. Das Ganze wird mit einem gläsernen Stabe umgerührt, bis das Cumen in der Säure aufgelöst ist. Hat man es mit grossen Mengen zu thun, so kann man das Gemenge in einer zugestöpselten Flasche sich überlassen. Die Auflösung wird alsdam allmählig von selbst bewirkt.

Diese Auflösung besitzt eine dunkelbraune Farbe. Man giesst fast das Vierfache von ihrem Volumen Wasser zu, Die Färbung verschwindet alsdann ganz, und die neue Auflösung ist völlig farblos. Lässt man die beiden Körper lange genug beisammen, so bleibt das ganze Cumen in Auflösung.

Man sättigt nachher die Flüssigkeit mit sein gepulvertem kohlensaurem Baryt und kann während des Sättigens sogar etwas erwärmen, wenn die Flüssigkeit genug verdünst ist, ohne dass man Gesahr läust, das Product zu zersetzen. Wenn die Auslösung neutralisirt ist, filtrirt, man und dampst ab: Es ist von keinem Nachtheile, dieselbe sieden zu lassen, denn das erzeugte Salz widersteht vollkommen dieser Temperatur.

Beim Erkalten giebt die Auflösung Krystalle von sulfocumensaurem Baryt von grossem Glanze. Sie gerinnt, wenn

schardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele, 347

r concentrirt genug ist. Die Mutterlauge ist völlig farblos id giebt dasselbe Salz, so dass man die Auflösung, bis sie rinnt, abdampsen und nachher das Salz auf doppelten Lagen p Fliesspapier ausbreiten kann.

Der auf diese Weise erhaltene sulfocumensaure Baryt zeigt in Gestalt perlmutterartiger Blättchen von seltener Schönit und einem solchen Glanze, dass man sie für Fischschupn halten könnte.

Dieses Salz, bei 100° getrocknet, gab folgende Zusamensetzung:

- I. 0,499 Gr. gaben 0,193 Wasser und 0,730 Kohlensäure.
- II. 0,600 Gr. einer andern Bereitung gaben 0,235 Wasr und 0,880 Kohlensäure.
- III. 0,550 Gr., mit einem Gemenge von Salpeter und kohnsaurem Kali verbrannt, gaben 0,462 schwefelsauren Baryt.
 1. LV. 0,700 Gr., mit einem Gemenge von Salpetersäure und hwefelsäure geglüht, gaben 0,301 schwefelsauren Baryt.
- V. 0,508 Gr. gaben 0,225 schweselsauren Baryt,

 ... Aus diesen Analysen lässt sich solgende Zusammensetzung leiten:

,	I.	11.	III.	IV.	V.	
Kohlensäure	39,89	39,99	-	· , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	्र ी कर ा : :	
Wasserstoff	4,29	4,35		-		
Baryum .	-			95,45	26,08	
Schwefel	- margina	-	11,59	****	رده منجوري	:.

" Nach der Fermel $C_{18}H_{22}(80_2)80_3$, BaO würde man haben:

C_{18}	1350,0	40,33 , .
H ₂₂	137,5	4,10
82	402,3	12,02
Ba	856,8	25,64:
$0^{\mathbf{e}}$	600,0	17,91
	3346,6	100,00.

Die Zusammensetzung des sulfocumensauren Baryts ist dar der des sulfobenzensauren Baryts analog:

$$C_{12}H_{10}(SO_2)SO_3, BaO,$$

b. sie stellt Camen dar, in welchem 1 Aeq. Wasserstoff durch 2 ersetzt wird und welches mit 1 Aeq. schwefelsaurem Baryt rbunden ist.

Der sulfocumensaure Baryt ist sehr löslich in Wasser, bes-

348 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Gele.

ser jedoch in warmen als in kaltem. Er löst sich gleichfalls in Alkohol und in Aether auf.

Die anderen Salze der Sulfocumensäure sind gleichfalls sehr löslich. Daher erzeugt eine wässrige Auflösung von sulfocumensaurem Batyt keinen Niederschlag in den Auflösungen von Chlorculcium, essigsaurem Bleioxyd, Quecksilberchlorid, Chlorkupfer, Chlornickel, Chlorwismuth u. s. w.

Die Existenz der Schweselweinsäure und Kohlenweinsäure gestattet, eine Hypothese über die Constitution der Cuminsäure und Sulsocumensäure zu wagen, welche uns Interesse darzubieten scheiht. Wenn man darssehlt:

Die Schweselweinsäure durch und die Kohlenweinsäure durch und ihre Salze solgsich durch

bno

so hätte man für die Cuminsäure für die Sulfocumenkäure für die cuminsauren Salze

für die sulsocumensauren Salže

C₄ H₁₂O₂. S₂O₆
C₄ H₁₂O₂. C₂O₄
C₄ H₁₀O₂. S₂O₆
Ba
C₄ H₁₀O₂. C₂O₄,
Ba
C₁₈H₂₄. C₂O₄

 $C_{18}H_{24}$, $C_{2}U_{4}$ $C_{18}H_{24}$, $S_{3}U_{6}$ $C_{18}H_{22}$, $C_{2}U_{4}$ $C_{18}H_{23}$

C₁₈H₂₂. S₂O₆.

Nun aber sind die Weinsäuren des Alkohole direct durch Schweselsäure und Kottlensäure erzeugt worden. Die Sulsocumensäure wird direct durch Camen und Schweselsäure erzeugt. Es käme daher darauf an, auf dieselbe Weise die Kohlencumensäure zu erzeugen, welche sichts Anderes als Cuminsäure ist. Versuche, in dieses Hinsicht mit Benzen oder Cumen angestellt, würden wahrscheinlich auf interessante Resultate leiten. Da die Kohlensäure eine ziemlich schwache Säure ist, so müsste man zugleich eine Basis, z. B. Kali anwenden, wie es Du mas und Péligot bei der Bereitung des kohlenweinsauren Kali's gethan haben.

Sulforetinylsäure.

Die Zusammenactzung, welche wir für das Cumen fanden, ist ganz dieseibe, welche Pelletier und Walter *) den

^{*)} Ann. de Chim. et de Phys. LXVII. 269.

exhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele. 349

tinylen gaben, einem Kohlenwasserstoff, den sie durch Delation der Harze erhalten haben. Ausserdem kommen die Art r Verdichtung, der Siedepunct und die meisten Eigenschafi dieser beiden Körper so genau mit einander überein, dass man rsucht werden könnte, sie für einen und denselben Stoff zu hali. Die Formel C₁₈ H₃₄ stellt wirklich 4 Vel. Dampf für das imen und Retinylen dar. Der Siedepunct dieses letztern Körrs ist bei 150°, der des Cumens bei 144°. Der Unterschied ingt vielleicht davon ab, dass die Bestimmung des Siedepunci der beiden Körper bei verschiedenem Luftdrucke vorgenomen wurde.

Um zu sehen, ob diese beiden Körper wirklich identisch id, suchten wir das Retinylen mit Schweselsäure zu verbinnund das dem sulsocumensauren Baryt entsprechende Barytzu erzeugen. Pelletier und Walter batten die Güte, ne gewisse Menge ihres Productes zu unserer Verfügung stellen.

Das Retinylen verhält sich zur Nordhäuser Schweselsäure ie das Cumen, nur schien es von der Säure nicht so leicht gegriffen zu werden. Indessen löste sich das Retinylen darin it einer braunrothen Farbe aus. Das zu der Flüssigkeit zusetzte Wasser erzeugte eine vollkommen sarblose Auslösung, elche, in der Wärme oder in der Kälte mit kohlensaurem Batt gesättigt, ein lösliches Barytsakz gab.

Jedoch zeigt dieses Salz nicht ganz dieselben Charaktere is der sulfocuminsaure Baryt. Es ist weniger als das letztere iz löslich und seine Auflösung gerinnt beim Erkalten nicht, enn sie durch Abdampfen concentrirt wird, sondern sie setzt mählig krystallisirte Krusten ab, welche sich auf der Oberche ansammeln und durchaus nicht das perlmutterartige Auschen des erstern Salzes zeigen.

Um sich den sulforetinylsauren Baryt in einem zur Anase angemessenen Zustande zu verschaffen, dampft man seine
ässrige Auflösung bis zur Trockne ab und behandelt sie nacher mit Aether. Dieser zieht eine gewisse Menge einer hargen Substanz aus, womit das Salz verunreinigt ist. Jedoch
elingt es nicht immer vollständig, denn das Salz krystallisirt
hr schlecht, selbst in mit Wasser verdünntem Alkehol.

350 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele.

I. 0,650 Gr., bei 100° getrocknet, gaben 0,970 Kohlensäure und 0,253 Wasser.

II. 0,401 Gr., bei 100° getrocknet und mit einem Gemenge von Salpetersäure und Schwefelsäure geglüht, gaben 0,171 schwefelsauren Baryt.

III. 0,032 Gr., bei 100° getrocknet und mit einem Gemenge von Salpeter und kohlensaurem Natron geglüht, gaben 0,970 schwefelsauren Baryt.

Diese Zahlen, in 100 Th. ausgedrückt, leiten auf folgende Resultate:

Kohlenstoff	40,69 *)
Wasserstoff	4,32
Baryum	25,00
Schwefel	12 ,06.

Nach der Formel C₁₈ H₂₂ (SO₂) SO₃, BaO würde man haben:

C ₁₈	=	1350,0	40,33
H ₂₂	•	137,5	4,10
Ba	===	856,8	25,64
Sz	==	402,3	12,02
o _e	·==	600,0	17,91
·		3346,6	100,00.

Diese Analysen beweisen, dass der sulforetinylsaure Baryt mit dem sulfocumensauren Baryt isomerisch ist, aber die Atome sind wahrscheinlich anders darin gruppirt.

Der sulforetinylsaure Baryt ist in wasserfreiem Alkohol nicht sehr löslich, während der sulfocumensaure sich darin mit vieler Leichtigkeit auflöst.

Eine wässrige Auflösung von sulforetinylsaurem Baryt erzeugt in einer Auflösung von Chlorkalk, essigsaurem Bleioxyd, Quecksilberchlorid, Chlorkupfer u. s. w. keinen Niederschlag. Die Sulforetinylsäure bildet daher in Wasser lösliche Salze.

Einige Chemiker behaupten, dass in den Producten von der Destillation der Steinkohlen Benzen (das Phen von Laurent) enthalten sei. Es ist noch nicht zu unserer Kenntniss

^{*)} Der geringe Ueberschuss von Kohlenstoff rührt von der harzigen Substanz her, die wir durch Krystallisation nicht ganz hatten entfernen können.

erhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Ocle. 351

kommen, ob die Identität dieses Körpers durch Versuche gerig dargethan worden ist. Es ist möglich, dass es sich mit ser Identität eben so verhält wie mit der, die ums anfangs rischen dem Cumen und Retinylen zu bestehen schien.

Die Zersetzung, welche die Cuminsäure und die Benzoëure unter dem Einflusse eines Ueberschusses von Basis erlein und die offenbar identisch mit der ist, welche die Essigure und Chloressigsäure unter diesen Umständen erleiden, hat
s veranlasst, dieselbe Reaction bei der Zimmtsäure zu unrsuchen. Diese Säure gab uns, wie wir erwarteten, einen
genthümlichen Kohlenwasserstoff, welcher mit dem Cumen und
enzen viele Eigenschaften gemein hat.

Wir wollen jetzt die analytischen Besultate in Betreff die
s neuen Körpers angeben.

Cinnamen.

Wir geben diesen Namen einer farbiosen und flüchtigen üssigkeit, welche sich bildet, wenn man ein inniges Gemenge in 1 Th. Zimmtsäure und 4 Th. Baryt der Destillation unterirft. Der Rückstand wird beim gelinden Erwärmen nur wegeschwärzt, und ausser dieser Flüssigkeit bildet sich nur ohlensäure, welche mit dem Baryt in Verbindung bleibt.

0,310 Gr. Cinnamen, über Chlorcalcium getrocknet, gaben 215 Wasser und 1,050 Kohlensäure, oder in 100 Theilen:

Kohlenstoff 92,35 Wasserstoff 7,70.

Nach der Formel C₁₆H₁₆, d. h. C₁₈H₁₆O₄ weniger C₂O₄, 'ürde man haben:

$$C_{16} = 1200,0$$
 92,30
 $H_{16} = 100,0$ 7,70
 $1300,0$ 100,00.

Diese Zusammensetzung wird durch die Dichtigkeit von em Dampfe des Cinnamens bestätigt. Folgendes sind die Re-ultate des Versuches:

Temperatur der Luft 25°
Temperatur des Dampfes 182°
Gewichtsüberschuss des mit Dampf angefüllten Ballons 0,275 Gr.
Rauminhalt des Ballons 176 Cb. C.

35% Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele.

Luftdruck

zurückbleibende Luft

Dichtigkeit des Dampfes == 3,55.

Die Formel C₁₆ H₁₆ giebt:

C₁₆ == 13,184

H₁₆ == 1,101

 $\frac{14,285}{4} = 3,57.$

Das Cinnamen giebt daher 4 Vol. Dampf wie das Benzen $C_{13}H_{12}$, das Cumen $C_{18}H_{24}$ und das Sumpfgas $C_{2}H_{8}$. Es gehört in eine Reihe von isomerischen Koblenwasserstoffen, bei denen das Verhältniss der Kohlenstoffatome zu den Wasserstoffatomen sich wie 1:1 verhält. Das Benzen und Retinolen von Pelletier und Walter gehören auch zu dieser Reihe, wie aus folgender Tabelle erhellt:

 $C_8 H_8$ unbekannt, $C_{12}H_{12}$ Benzen = 4 Vol. Dampf, $C_{16}H_{16}$ Cinnamen = 4 Vol. Dampf, $C_{20}H_{20}$ unbekannt, $C_{24}H_{24}$ unbekannt, $C_{28}H_{28}$ unbekannt, $C_{32}H_{32}$ Retinolen = 4 Vol. Dampf.

Das Cinnamen besitzt einen dem Benzen sehr ähnlichen Geruch. Es ist an der Luft unveränderlich und kommt bei 140° in's Sieden. Kali ist ohne Wirkung auf dasselbe. Rauchende Schwefelsäure scheint mit ihm eine eigenthümliche Säure von der Gattung der Weinsäure zu bilden.

Chlor und Brom verbinden sich mit dem Cinnamen. Das letztere Agens erzeugt eine krystallisirte Verbindung, die in Wasser unlöslich, löslich in Alkohol und Aether ist. Wir geben ihr den Namen Bromeinnamen.

Salpetersäure wandelt es in einen krystallisirten Körper um, welcher Benzoësäure zu sein scheint.

Bromeinnamen.

Es krystallisirt in farblosen Nadeln, welche man leicht durch Zusammenbringen eines Ueberschusses von Brom mit Cinnamen erhält. Man presst sie zwischen Fliesspapier aus und lässt sie in Aether krystallisiren.

Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele. 353

0,500 Gr. gaben 0,670 Kohlensäure und 0,137 Wasser, was in 100 Theilen ausmacht:

Kohlenstoff 86,55

Wasserstoff 3,04.

Die Formel $C_{16}H_{16}$, Br_4 würde geben: $C_{16} = 1200,0$ 36,84 $H_{16} = 100,0$ 3,07 $Br_4 = 1956,6$ 60,09

3256,6 100,00.

Das Bromeinnamen wird durch eine Kaliauflösung angegriffen, es bildet sich Bromkalium und ein bromhaltiges Product,
welches wahrscheinlich $C_{16}H_{14}Br_2$ zur Formel hat. Diese Reaction würde alsdann identisch mit der sein, welche das Chlorbenzen unter denselben Umständen erleidet, weswegen man das
Bromeinnamen als einfach-bromhaltiges Bromwasserstoff-Cinnamen betrachten könnte.

Bei Gelegenheit einer Arbeit über den flüssigen Storax, der bekanntlich Zimmtsäure enthält, stellte E. Simon zu Berlin einige Versuche mit dieser Säure und einigen chemischen Reagentien an. Er hat dargethan, dass sie bei der Destillation mit einem Gemenge von doppelt-chromsaurem Kali und Schwefelsäure Bittermandelöl giebt. Eben so fand er, dass man bei Destillation derselben mit Kalk ein Oel erhält, welches die Zusammensetzung des Benzens zeigt und dem er den Namen Cinnamomin gegeben hat. Dieses Oel ist ohne Zweifel identisch mit dem, das wir mit Aetzbaryt erhielten, und wir sehen daher mit Vergnügen unsere Resultate bestätigt.

Bemerkungen über die Constitution des Cuminols und der von ihm abgeleiteten Körper.

Durch die vorhergehenden Analysen glauben wir die Zusammensetzung des Cuminols und der von ihm abgeleiteten Körper mit Bestimmtheit festgestellt zu haben. Es bleibt nur noch übrig, einige Worte über die Art beizufügen, wie man ihre Constitution betrachten muss.

Wir wollen die Formeln kurz wiederholen, zu denen wir gelangten. Man wird bei ihnen eine vollkommene Analogie mit den Formeln des Bittermandelöles oder des Salicylhydrürs, so wie mit denen ihrer Zersetzungsproducte finden.

354 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Gele.

$C_{20}H_{24}O_{2}$	Cuminol	$C_{14}H_{12}O_{2}$	Bittermandelöl
$C_{20}H_{24}O_4$	Cuminsäure	$C_{14}H_{13}O_{4}$	Benzoësäure
$C_{20}H_{22}O_{4}$	cuminsaures Sil-	$C_{14}H_{10}O_{2}$	benzoësaures Sil-
Ag	beroxyd	` Ag	beroxyd
$\mathbf{C_{20}H_{22}O_{2}}$ $\mathbf{Cl_{2}}$	Chlorcuminol	$C_{14}H_{19}O_{3}$ Cl_{3}	Chlorbenzoyl
$\mathbf{C_{20}H_{22}O_{2}}$ $\mathbf{Br_{2}}$	Bromcuminol	C ₁₄ H ₁₀ O ₂ Br ₂	Brombenzoyl
$C_{18}H_{24}$	Cumen	$C_{12}H_{12}$	Benzen
	Sulfocumensäure	$C_{12}H_{12},S_2O_6$	Sulfobenzensäure
C18H22, S2O	sulfocumensaurer	$C_{12}H_{10}, S_2O_6$	sulfobenzensaurer
Ва	Baryt	Ba	Baryt.

Die Vertheidiger der Theorie der Radicale können daher ein eigenthümliches Radical, das Cumyl $C_{20}H_{22}O_2 = Cm$, analog dem Benzoyl $C_{14}H_{10}O_2 = Bz$, annehmen und die vorhergehende Reihe auf diese Weise betrachten:

ÇmH2, Cumylbydrür, analog dem BzH2, Benzeylbydrür,

CmCk, Chlorcumyl — BzCl₂, Chlorbenzoyl,

CmBr₃, Bromcumyl — BzBr₂, Brombenzoyl,

CmO, wasserfrei angenommene BzO, wasserfrei angenommene

Cuminsäure, analog der Benzuesäure,

CmO+aq., krystal- BzO+aq., krystallisirte Ben-

Nisirte Cuminsaure zoësaure.

Es ist aber unmöglich, in diese Reihe das Cumen und die von ihm abgeleiteten Körper zu stellen. Der Theorie der Typen getreu, wollen wir daher diese Körper auf folgende Weise betrachten.

I. Aldehydtypus (Benzoylhydrür u. s. w.). Er bildet sich aus dem Alkoholtypus durch den Verlust von $\mathbf{H_4}$ ohne Substitution:

 $C_{20}H_{24}O_2$ Cuminol, $C_{20}H_{22}O_2$ Kaliumcuminol, $C_{20}H_{22}O_2$ Chlorcuminol, Cl_2 Chlorcuminol, $C_{20}H_{22}O_2$ Bromcuminol.

II. Essigsäuretypus (Benzoësäure, Ameisensäure u. s. w.). Er bildet sich aus dem vorigen Typus durch Aufnahme von O2, ohne etwas zu verlieren:

3

Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Ocie. 355

 $C_{20}H_{24}O_4$ krystallisirte Cuminsäure, $C_{20}H_{22}O_4$ cuminsaures Silberoxyd, Ag cuminsaurer Baryt.

III. Sumpfgastypus (Benzen, Cinnamen u. s. w.). Er bildet sich aus dem sauren Typus durch den Verlust von C_2O_4 ohne Substitution:

C₁₈H₂₄ Comen.

IV. Sulfobenzensäuretypus (Sulfonaphtalinsäure u. s. w.). Man kann ihn als durch directe Verbindung eines Kohlenwasserstoffes mit wasserfreier Schwefelsäure gebildet darstellen:

> C₁₈H₂₄, S₂O₆ Sulfocumensaure, C₁₈H₂₂, S₂O₆ sulfocumensaurer Baryt. Ba

Diese Art, das Cuminol und die von ihm abgeleiteten Körper darzustellen, hat den Vortheil, dass dadurch jede Art von hypothetischem Körper ausgeschlossen wird.

2. Theil.

Cymen, Kohlenwasserstoff des römischen Kummelöles.

Dieser das Cuminol in dem römischen Kümmelöle beständig begleitende Stoff kann durch blosse Destillation nicht in reimen Zustande davon abgeschieden werden. Obgleich er viel
litelitiger als der sauerstoffhaltige Bestandtheil dieses Oeles ist,
so reisst er doch immer eine gewisse Menge davon mit sich
fort, so dass man, um ihn abzuscheiden, seine Zuflucht zu eimen chemischen Mittel nehmen muss.

Dieses Mittel besteht, wie wir bereits gesagt haben, darin, dass man die ersten Portionen von der Destillation des röminchen Kümmelöles über schmelzendem Kali rectificirt. Das Kali als dann alles Cuminol als Cuminsäure zurück, und das Cynen geht völlig rein über.

Das auf diese Weise erhaltene Cymen zeigt sich in Gestalt iner farblosen Flüssigkeit, welche das Licht stark bricht und been sehr angenehmen Citronengeruch besitzt. Sein Siedepunct t beständig bei 165°. Es destillirt über, ohne sich zu ver-

356 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele.

ändern. Es ist im Allgemeinen constanter als das Cuminol, und die Luft ist ohne Wirkung auf dasselbe.

Es ist unlöslich in Wasser. Es löst sich dagegen mit Leichtigkeit in Alkohol, Aether und den ätherischen Oelen aut.

Concentrirte Schwefelsäure greift es nicht in der Kälte an. Rauchende Schwefelsäure löst es mit einer dunkelrothen Farbe und ohne Entwickelung von schwefliger Säure auf, wenn man die Erwärmung des Gemenges vermeidet. Es bildet sich alsdann eine wirkliche Verbindung zwischen Cymen und Schwefelsäure, welche alle Charaktere der Weinsäuren zeigt. Das Wasser löst sie auf, wobel die rothe Farbe verschwindet.

Salpetersäure von mittlerer Concentration greift das Cymen in der Kälte nicht an. Wenn man aber das Gemenge erwärmt, so entwickeln sich salpetrigsaure Dämpfe und das Cymen wandelt sich allmählig in eine eigenthümliche Säure um, welche beim Erkalten in Gestalt einer käsigen Masse niederfällt. Diese Säure ist ziemlich löslich in Wasser, Alkohol und Aether und krystallisirt nur sehr schwierig. Durch Wärme zersetzt sie sich zum Theil, zum Theil wird sie in Gestalt äusserst feiner und leichter Nadeln oder wolliger Flocken sublimirt.

Rauchende Salpetersäure greift das Cymen lebhast an, unter Bildung derselben Säure, so wie eines gelben Harzes.

Aetzkali, in welcher Gestalt man es auch anwendet, ist ohne Wirkung auf das Cymen.

Chlor und Brom greisen diesen Körper schon in der Kälte an, unter Entwickelung von Chlorwasserstoffsäure und Bromwasserstoffsäure und unter Bildung eines chlorhaltigen oder bromhaltigen Körpers, welcher sich beim Destilliren zersetzt.

Der Verbrennung mit Kupferoxyd unterworfen, zeigte das Cymen folgende Zusammensetzung:

- I. 0,516 Gr. gaben 1,690 Kohlensäure und 0,511 Wasser.
- 11. 0,400 Gr. einer andern Bereitung gaben 1,305 Kohlensäure und 0,380 Wasser.
- III. 0,500 Gr. einer neuen Bereitung gaben 1,630 Kohlensäure und 0,489 Wasser.

Diese Resultate, auf 100 Th. gebracht, leiten auf folgende Zahlen:

ferhardt u. Cahours, ub. die ätherischen Oele. 357

Die Rechnung würde geben:

$$C_{20} = 1500,0 89,5$$
 $H_{28} = 175,0 10,5$
 $1675,0 100,0.$

Diese Zusammensetzung stimmt sehr gut mit der Dichtigeit von dem Dampfe des Cymens überein. Folgendes sind die lesultate der beiden Bestimmungen:

I. Gewichtsüberschuss des Ballons	0,409 Gr.
Temperatur des Dampfes	222°
Temperatur der Luft	22°
Barometerstand	760 Mm.
Rauminhalt des Ballons	195 Cb. C.
zurückbleibende Luft	3 —
II. Gewichtsüberschuss des Ballons	0,700 Gr.
Temperatur des Dampfes	224°
Temperatur der Luft	16°
Barometerstand	762 Mm.
Rauminhalt des Ballons	320 Cb. C.
zurückbleibende Luft	0.
Der erste Versuch gab für die Dich	tigkeit = 4,59
der zweite	= 4,70
Mittel	$= \overline{4,64.}$

Die Formel C20 H28 würde geben:

$$C_{20} = 16,852$$
 $H_{28} = 1,926$
 $\frac{18,778}{4} = 4,69$

Das Cymen zeigt daher dieselbe Zusammensetzung und diebe Dichtigkeit wie das Camphen, welches durch die Reacn des Camphers und der wasserfreien Phosphorsäure erhalwurde. Es ist gleichfalls mit dem Körper isomerisch, den
ville kürzlich dadurch erhielt, dass er Terpentinöl bei eihohen Temperatur durch Schwefelsäure zersetzte.

Das Cymen theilt gleichfalls mit dem Camphen die Eigeniast, mit Schweselsäure eine Art Weinsäure zu bilden, deren
lze dieselbe Zusammensetzung wie die sulsocamphensauren

358 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele.

von Delalande haben. Wir können nicht sagen, ob diese Analogie auch bei anderen Reactionen fortdauert, da wir keine Gelegenheit hatten, diese beiden Körper mit einander zu vergleichen. Die Identität des Camphens und Cymens würde übrigens eine ziemlich merkwürdige Thatsache sein, die eines Tages für die Pflanzenphysiologie von Wichtigkeit werden könnte, denn sie würde gestatten, einige Schlüsse daraus über die Rolle zu ziehen, welche die Kohlenwasserstoffe in der Vegetation spielen, so wie über die Art, wie sie sich erzeugen. Man erinnere sich, dass das Baldrianöl einen Kohlenwasserstoff enthält, welcher sich durch die Wirkung der Salpetersäure in gewöhnlichen Campher umwandelt. Es würde daher merkwürdig sein, wenn sich derselbe Campher durch eine den Wasserstoff entziehende Wirkung in Kohlenwasserstoff umwandelte, der in dem römischen Kümmelöl enthalten ist.

Betrachtet man die Zusammensetzung des Cymens und des Cuminols, so könnte man glauben, dass diese beiden Körper sich gleichzeitig durch die Wirkung einer Wasserzersetzung bei Anwesenheit eines Stoffes C₂₀ H₂₄ gebildet hätten, welcher die Elemente des Wassers auf dieselbe Weise fixirt hätte, wie z. B. das Bittermandelöl nach den Versuchen von Frémy, wenn es beim Ausschluss der Luft der Wirkung des wässrigen Kali's unterworfen wird, sich der beiden Atome Wasser bemächtigt, um zu geben:

 $C_{14}H_{12}O_2 + H_4 = eigenthümliches Oel, und$ $<math>C_{14}H_{12}O_2 + O_3 = Benzoësäure.$

Man hätte daher gleichfalls

 $C_{20}H_{24} + H_4 = Cymen$, und $C_{20}H_{24} + O_2 = Cuminol$.

Man könnte selbst versucht werden, diese Körper als zu einer und derselben Reihe gehörig zu betrachten, denn C₂₀H₂₄0₂ ist, wie man gleich sieht, nichts Anderes als C₂₀H₂₈, in welchen 2 Aeq. Wasserstoff durch 2 Aeq. Sauerstoff ersetzt sind. Durch eine oxydirende Wirkung müsste man also das Cymen in Cuminol oder in Cuminsäure umwandeln können. Wir haben abet keinen der beiden Körper, weder durch Anwendung von Salpetersäure, noch durch Anwendung eines Gemenges von Schwefelsäure und doppelt-chromsaurem Kali erhalten.

Das . Cymen wird durch ein Gemenge von concentrirter

erhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele. 859

chweselsäure und doppelt-chromsaurem Kali lebhast angegrissen. s destillirt ein Oel über, aus welches das Aetzkali ohne Wirung ist.

Sulfocymensäure.

Diese Säure wird durch Auflösen des Cymens in Nordidser Schwefelsäure leicht erhalten. Die Auflösung erfolgt
hon bei gewöhnlicher Temperatur, und wenn man einen zu
ossen Ueberschuss von Schwefelsäure vermeidet und das
efäss, worin das Gemenge gemacht wird, kalt hält, so entickelt sich nicht eine Spur von schwefliger Säure, obwohl
e Flüssigkeit sich stark färbt. Wenn man nachher Wasser
isetzt, so verschwindet die Färbung und das Ganze löst sich
ine Rückstand auf. Wird die Auflösung einige Zeit sich selbst
berlassen, so scheidet sich eine geringe Menge einer dligen
ibstanz ab, deren Bildung man jedoch dadurch verhindern
im, dass man sogleich mit kohlensaurem Baryt sättigt.

Der kohlensaure Baryt erzeugt einen Absatz von schwelsaurem Baryt und ein lösliches Barytsalz. Dieses letztere
ird durch Concentrirung der Flüssigkeit in Gestalt perlmutteränzender Schuppen von grossem Glanze erhalten. Es kryallisirt selbst mit solcher Leichtigkeit, dass seine Auflösung
im Erkalten erstarrt, wenn sie gehörig concentrirt ist.

- I. 0,409 Gr., bei 100° getrocknet, gaben 0,635 Kehlenure und 0,175 Wasser.
- II. 0,500 Gr. einer andern Bereitung und bei derselben imperatur getrocknet, gaben 0,7705 Kohlensäure und 0,210 asser.
- III. 6,290 Gr., bei 100° getrocknet und mit einem Genge von Salpetersäure und Schweseisäure geglüht, gaben 18 schweselsauren Baryt.
- IV. 0,55% Gr. einer neuen Bereitung, bei 100° getrockgaben 0,225 schwefelsauren Baryt.
- V. 0,287 Gr. von einer andern Bereitung, bei 100° gecknet, gaben 0,118 schwefelsauren Baryt.
- VI. 0,600 Gr., mit einem Gemenge von kohlensaurem Kali A Salpeter geglüht, gaben 0,501 schweselsauren Baryt.

Diese Resultate geben in 100 Theilen:

360 Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele.

Nach der Formel $C_{20}H_{26}$ (SO₂). SO₃, BaO oder $C_{20}H_{26}S_{2}O_{6}$ würde man haben:

$$C_{20} = 1500,0$$
 42,6
 $H_{26} = 162,5$ 4,6
 $Ba = 856,8$ 24,3
 $S_{2} = 402,3$ 11,4
 $O_{6} = 600,0$ 17,1
 $3521,6$ 100,0.

Bei der gewöhnlichen Temperatur scheint dieses Salz 2 At. Wasser zurückzuhalten, denn:

I. 0,615 Gr. gaben 0,900 Kohlensäure und 0,308 Wasser. II. 0,714 Gr. desselben Salzes gaben 0,337 Wasser. Diess macht in 100 Theilen:

Die Formel $C_{20}H_{26}(SO_2)$. SO_3 , Ba O+2aq. würde geben: Kohlenstoff 40,0

Wasserstoff 5,0:

Der sulfocymensaure Baryt ist isomerisch mit dem sulfocamphensauren Baryt, welcher von Delalande erhalten wurde. Er ist, wie dieses Salz, sehr löslich in Wasser, Alkohol und Aether und zeigt einen bittern Geschmack nebst einem süsslichen und ekelhaften Nachgeschmack. Seine Auflösung kann bis zum Sieden gebracht werden, ohne sich zu zersetzen.

Um dieses Salz aus der eben angegebenen Verbindung zu erhalten, ist es unerlässlich, das Gemenge von Schwefelsäure und Sulfocymensäure gelinde zu erwärmen, während man es durch kohlensauren Baryt sättigt. Als wir zum ersten Male es zu erhalten suchten, hatten wir die Operation in der Kälte vorgenommen, indem wir auf diese Weise die Zersetzung des Productes verhindern wollten. Wir erhielten aber ein Salz, dessen Zusammensetzung und Löslichkeit ganz verschieden waren.

Gerhardt u. Cahours, üb. die ätherischen Oele. 361

Seine Auflösung gab, statt ganz bestimmte Krystalle zu liesern, nur eine verworrene Masse ohne regelmässiges Aussehen und bei weitem löslicher in Wasser und Alkohol als das in der Wärme bereitete Salz.

Wir nahmen zwei Bestimmungen des Baryts von dem in der Kälte auf diese Weise bereiteten Salze vor.

I. 0,371 Gr. gaben 0,098 schwefelsauren Baryt.

II. 0,600 Gr. gaben 0,163 schwefelsauren Baryt.

Die erste Bestimmung entspricht 15,5 p.C. Baryúm, die zweite 16 p.C. Diese Menge stimmt völlig mit der Formel $C_{40}H_{54}$ (SO₂). SO₃, BaO überein, oder:

welche 16,4 p.C. Baryum erfordert. Diese Formel ist von der des in der Wärme bereiteten Salzes dadurch verschieden, dass sie Cymen enthält, dessen Molecül beim Eingehen in eine Verbindung sich verdoppelt haben würde. Die Säure dieses Salzes liesse sich in der That durch $C_{40}H_{56}$. S_2 O_6 darstellen, worin $C_{40}H_{56} = 8$ Vol. Dampf sind, während die Säure des in der Wärme bereiteten Salzes $C_{20}H_{28}$. S_2 O_6 sein würde, worin $C_{20}H_{28} = 4$ Vol. Dampf sind.

Es ist zu bemerken, dass das in der Kälte bereitete Salz eben so constant ist wie das in der Wärme bereitete, und dass man es zum Sieden bringen kann, ohne dass es sich auf irgend eine Weise zersetzt.

Unglücklicher Weise hatten wir nicht genug in der Kälte bereitetes Salz, um damit eine Verbrennung vorzunehmen, und is wir es wieder erzeugen wollten, hatten wir nicht die Voricht gebraucht, es zu erwärmen, ehe es völlig gesättigt war, io dass sich das erstere Salz bildete. Wir wollen aber nächtens diese Lücke in einer andern Abhandlung ausfüllen, worin vir gleichfalls die eigenthümliche Säure beschreiben wollen, lie das Cymen unter dem Einflusse der Salpetersäure erzeugt.

Die sulfocymensauren Salze sind alle sehr löslich in Waser. Eine Auflösung des Barytsalzes, das in der Wärme oder
n der Kälte bereitet wurde, bewirkt in den Auflösungen des
essigsauren Bleioxyds, des Quecksilberchlorids, des salpetersauen Silberoxyds, des Eisenchlorids, des salpetersauren Kupferoxyds keinen Niederschlag.

362 Gerhardt a Cahours, üb. die ätherischen Oele.

Kurze Wiederholung und Schlüsse.

Folgendes ist eine kurze Zusammensassung der in dieser Abhandlung verzeichneten Thatsachen:

1) Das in dem römischen Kümmel präexistirende Oel ist ein Gemenge von zwei Bestandtheilen. Der eine, das Cuminol $C_{20}H_{24}O_2 = 4$ Vol. Dampf, kommt durch sein Verhalten dem Bittermandelöl und dem Salicylhydrür nahe.

Der andere, das Cymen C₂₀H₂₈ = 4 Vol. Dampf, ist ein Kohlenwasserstoff, dessen Reactionen einige Aehnlichkeit mit denen des Benzens, des Camphens und anderer künstlicher Kohlenwasserstoffe haben.

- 2) Das Cuminol verbindet sich mit dem Chlor, dem Brom, dem Kalium und bildet demselben Typus angehörige Verbindungen, welche statt 1 Aeq. Wasserstoff 1 Aeq. Chlor, Brom oder Kalium enthalten.
- 3) Die oxydirenden Körper, mit dem Cuminol zusammengebracht, wandeln es in Cuminsäure C₂₀H₂₄O₄ um. Die Charaktere dieser neuen Säure stimmen mit denen der Benzoësäure, der Zimmtsäure u. s. w. überein.
- 4) Die Cuminsäure bildet gehörig bestimmte Salze, deren allgemeine Formel sich ausdrücken lässt durch:

wobei M 1 Aeq. Metall ausdrückt,

- 5) Unter dem Einstasse eines Ueberschusses von Basis zersetzt sich die Cuminsäure in Kohlensäure C_2O_4 und in Cumen $C_{18}H_{24} = 4$ Vol. Dampf, einen dem Benzen von Mitscheflich analogen Kohlenwasserstoff.
- 6) Das Cumen verbindet sich mit Schweselsäure, indem es eine Säure bildet, deren Salze sich darstellen lassen durch:

7) Endlich bildet der Kohlenwasserstoff, welchen das römische Kümmelöl enthält, gleichfalls eine Reihe eigenthümlicher
Verbindungen. Die oxydirenden Körper wandeln ihn in eine
von der Cuminsäure verschiedene Säure um. Die Schwefelsäure verbindet sich mit ihm, indem sie eine Weinsäure giebt,
deren Salze sich ausdrücken lassen durch:

C₂₀ H₂₆, S₂ O₆

Die beiden Bestandtheile des römischen Kümmelöles erleim leicht eine Menge von merkwürdigen Umwandlungen. Die
metete, welche sie erzeugen, unterscheiden sich alle durch
e Bestimmtheit ihrer Form und Zusammensetzung, und wir
nd überzeugt, dass die Chemiker bei ihnen eine reiche Ernte
m Thatsachen erlangen werden, aus denen die Wissenschaft
nes Tages Vortheile ziehen wird.

Wir hätten noch andere Bemerkungen den von uns aufgeellten beifügen können. Da aber unsere Untersuchungen in dier Hinsicht noch unvollständig waren, so wollen wir lieber diealben zum Gegenstand einer besondern Abhandlung machen.

XLVIII.

Ueber die Pikrinsalpetersäure.

Von

R. F. MARCHAND.

Die Pikrinsalpetersäure (Kohlenstickstoffsäure) bildet sich i der Einwirkung der siedenden Salpetersäure auf viele ormische Verbindungen, und zwar nicht nur, wie man lange sit geglaubt hatte, auf stickstoffhaltige, sondern auch auf stickffreie. Braconnot hatte schon bemerkt, dass bei der Zerzung des Salicins, des Populins und anderer Stoffe mehr, durch lpetersäure, sich diese neue Säure bilde, diese Angabe jedoch rch keine Gründe weiter zu unterstützen gesucht. Beim loridzin bildet sich meist Phloretinsäure und nur wenig Piinsalpetersäure. Die Säure, welche auf diese Weise aus dem licin gewonnen wird, ist ausserordentlich rein, indem sie das zige zurückbleibende Product ist, welches sich dabei bildet, dass man keine Mühe mit dem Reinigen zu verlieren braucht, e es bei der aus dem Indigo dargestellten der Fall ist. usbeute ist ergiebig, doch bleibt diese Methode immer etwas stbar.

Ich überzeugte mich, wie die angesührten Analysen zei-

364 Marchand, üb. die Pikrinsalpetersäure.

gen werden, dass die aus dem Salicin bereitete Säure in der That Pikrinsalpetersäure sei.

Die Zusammensetzung, welche man in diesem Augenblicke für diese Säure annimmt, ist die, welche Dumas zuletzt angegeben hat, ohne indess das Detail seiner Untersuchung und die Gründe mitzutheilen, welche seine Ansicht unterstützten.

Dumas stellt als Formel für die freie und gebundene Säure $C_{12}H_4N_6O_{18}$ auf; Berzelius sucht dagegen zu zeigen, dass $C_{12}H_6N_6O_{14}$ die wahrscheinliche Formel für die freie Säure sei.

Die Analysen mit der aus dem Indigo dargestellten Säure sind schon vor drei Jahren ausgeführt worden, und zwar vom Prof. Erdmann und zum Theil in seiner Geschschaft von mir, als er seine umfassende Arbeit über die Zersetzungsproducte des Indigo's unternahm. Erdmann musste die Hoffnung aufgeben, bald diesen Theil der Untersuchung wieder aufnehmen zu können; er gestattete mir also, seine Resultate hier mitzutheilen und dieselben durch meine zu erweitern.

Pikrinsalpetersäure.

Die Eigenschaften der freien Säure sind hinlänglich bekannt; über die Producte, welche sich durch die Zersetzung durch fremde Körper bilden, werde ich unten in einem besondern Abschnitt sprechen.

Die aus dem Indigo sehr sorgfältig bereitete und häufig umkrystallisirte Säure wurde mit Kupferoxyd verbrannt *):

0,502 Gr. gaben 0,579 Gr. \ddot{C} und 0,062 Gr. aq. 31,45 $\frac{0}{0}$ C 1,37 $\frac{0}{0}$ H.

0,5885 Gr. gaben 0,683 Gr. C und 0,066 Gr. H. 31,65% C 1,24% H.

0,544 Gr gaben bei 18°C. 27" 7" B. 88 Cb.C. N. 18,49 N.

0,566 Gr. gaben bei 17°C. 27" 6" B. 91 Cb.C. N. 18,42% N.

^{*)} Atgw. des Kohlenstoffes zu 75 angenommen; in 100 Th. C daher 27,2727 Th. C. D. Red.

Diese Resultate stimmen mit der von Berzelius aufgealken Formel vollständig überein: $C_{12} H_6 N_6 O_{14}$.

	•	Erdm.	Erd. Md.	Dum.*)
IC=	900,00 = 31,37	31,65	31,45	31,8
H=	37,44 = 1,30	1,24	1,37	1,4
in=	531,19 = 18,59	18,42	18,49	18,5
10=	1400,00=48,81	48,69	48,69	48,3
	2868,56 100,00	100,00	100,00	100,0.

Bei der Analyse der aus Salicin dargestellten Säure erielt ich:

0,4785 Gr. gaben 0,550 Gr. C und 0,068 H. 31,34% C 1,57% H.

0,5075 Gr. gaben 0,585 Gr. C und 0,0715 Gr. H. 31,439 C 1,369 H.

0,534 Gr. gaben bei 10° C. 28" 1,75" B. 82 Cb.C. N. 18,51 n.

0,475 Gr. gaben bei 10,75°C. 28" 0,5" B. 72 Cb.C. N. 18,49% N.

Diess giebt ganz übereinstimmend mit jenen Analysen:

Verbindet sich die Säure mit Basen, so tritt sie gewöhnh ein Atom Wasser ab, z. B. mit Kali, Natron, Ammoik, Silberoxyd; mit anderen Basen geht sie Verbindungen ein
ter Wasseraufnahme. Mehrere Salze entbalten 5 At. Kryllwasser, z. B. das Baryt-, Strontian- und Kalkerde-Salz. Es
bt neutrale und basische Salze; letztere bilden sich z. B. mit
Baryterde, dem Bleioxyd. Saure Salze habe ich nicht berkt. Die Säure widersteht sehr kräftig der Einwirkung von
uren, Chlor, Brom u. s. w., wird aber leicht durch Alkalien
legt, unter Bildung neuer Producte, auf welche ich nachher
mmen werde.

^{*)} Nach dem alten Atgw., das indess fast keine Differenz herführt, == 81,4 n. d. n. A.

866 Marchand, üb. die Pikrinsalpetersäure.

Wenn wir die empirische Formel der Pikrinsalpetersäure betrachten, so tritt uns sogleich die Schwierigkeit entgegen, welche wir bei einer rationellen Deutung derselben zu überwinden haben. Wenn wir auch im Stande sind, die Formel C₁₂ H₄ N₆ O₁₃ mit der Formel des Indigblau's in Uebereinstinmung zu bringen *), so sehen wir doch die Säure aus anderen Stoffen entstehen, welche keine solche einfache Ableitung gestatten. Wenn wir uns auch von diesen Bemühungen lossagen wollen, so sind wir dennech nicht der Verlegenheit überhoben, welche Ansicht wir für die Anordnung der Elemente in der Säure selbst aufstelten sollen.

Berzelius ist geneigt, die Säure als eine zusammengesetzte zu betrachten, und zwar als eine salpetersaure Verbindung, in welcher 2 At. Salpetersäure mit einer stickstoffhaltigen organischen Verbindung, nach Art der Aetherschwefelsäure, vereinigt wären, also als 2 N+C₁₂ H₄ N₂ O₃ **). Ich glaube indessen, eine andere Ansicht vorschlagen zu dürfen, welche vielleicht mehr Wahrscheinlichkeit besitzen möchte. — Wir sind nicht im Stande, die Verbindung C₁₂ H₄ N₂ O₃ darzustellen, und wir kennen keine einzige Vereinigung, in der wir sie gleichfalls annehmen dürften. Durch Fritsehe sind wir mit einem merkwürdigen Zersetzungsproducte des Indige's bekannt geworden ***), mit dem Anilin, welches aus C₁₂ N₂ H₁₄ zusammengesetzt ist. Wenn wir in dieser künstlichen Basis die Existenz des Ammoniaks annehmen, so finden wir diess mit einem Kohlenwasserstoff verbunden, welcher aus C₁₂ H₈ besteht.

 $C_{12}H_8 + N_2H_6 = C_{12}N_2H_{14}$

Ich will diesen Kohlenwasserstoff, den man noch nicht hat isoliren können, nicht mit einem besondern Namen bezeichnen. Nehmen wir nun an, dass sich dieser ¹²/₈ CH mit Salpetersäure verbindet, so werden wir ohne Zweifel dieselben Erscheinungen wahrnehmen müssen, welche wir bei allen Vereinigungen der Art zu beobachten pflegen, eine Zerlegung der Säure und der organischen Verbindung, um Wasser zu bilden. Wie die Ben-

^{*)} Vgl. Journ. Bd. XX. S. 263.

^{**)} Lehrbuch Bd. VIII. S. 61.

^{***)} Journ. Bd. XX. S. 452.

insalpetersäure durch Wasserausscheidung entsteht, indem die liemente der beiden Körper zur Bildung desselben verwendet verden, so auch hier. Aus dem 12 /₈ CH wird Wasserstoff auseschieden, aus der Salpetersäure Sauerstoff. Da in der Pirinsalpetersäure N_8 enthalten sind, so müssen $3N_2O_5$ zu 12 /₈ CH etreten sein, $C_{12}H_8+N_6O_{15}$; aus 2 Atomen Salpetersäure 10 ausgetreten, um Wasser zu bilden, so dass wir $C_{12}H_8+N_6O_{15}+$

Es unterscheidet sich diese Verbindung von den anderen ieser Art dadurch, dass bier 3 At. Salpetersäure hinzugetreten ind, während sonst nur 2 At. in die Verbindung einzugehen siegen.

Dass jedech ein Kohlenwasserstoff in der That in der Pitrinsalpetersäure enthalten ist, wird sehr wahrscheinlich dadurch, lass sich die Endpuncte der Zersetzungsreactionen meist durch Bildung von Kohlenwasserstoffen auszuzeichnen pflegen.

Wenn man der Benzoësäure die Eigenschaft raubt, sich w verflüchtigen, indem man sie an eine Basis bindet, oder renn man sie in gasförmigem Zustande zu stark erhitzt, so zhält man den. Koblenwasserstoff 13/2 CH, das Benzin; einen janz ähnlich zusammengesetzten erhält man durch dieselban Ope-Mionen aus der Zimmtsäure; durch Destillation der Steinkohlen rhält man einen dritten Kohlenwasserstoff, der dieselbe procenische Zusammensetzung zeigt, Laurent's Phen; aus denselen Körpern und einer Unzahl von organischen Verbindungen whält man das Naphtalin. Ich will diese Classe von Kohlenvamerstoffen, zu denen endlich auch das Elayl gehört, nicht veiter aufzählen; ich wünsche nur darauf aufmerksam zu mahen, dass diese Körper immer als Endresultate auftreten und va sehr mächtig der fernern Umwandlung oder Zerstörung wierstehen, und dass sie durch die verschiedenartigsten Reactioen hervorgerufen. werden können. Das Elayl giebt dafür das chlagendste Beispiel. Eben so wie diese Kohlenwasserstoffe sich s Endproducte erzeugen, so auch der im Anilin, welcher nun auch urch die verschiedenartigsten Beactionen sich zu bilden vermag, nd, wie es scheint, aus den verschiedenartigsten Körpern. Un ver-Or ben stellte das Anilin durch blosse Bestillation des Indigo's dar; s bildete sich hier 12/8 CH nur durch Zersetzung der organischen erbindungen durch Hitze; gleichzeitig wird Ammoniak ge-

bildet, beide Körper vereinigen sich und erzeugen das Anilin: Fritsche stellt es durch starkes Erhitzen der Anthranilsäure dar *), und derselbe Kohlenwasserstoff bildet sich wahrscheinlich als letztes Product bei der Zersetzung des Indigo's, des Aloëharzes, der Seide, des Salicins u. s. w. durch Salpetersäure, aber hier in Verbindung mit der Salpetersäure tretend; vielleicht ist er auch in dem Chlorindatmit C₁₂ H₈ + Cl₆ O₂ enthalten. Säuren können ihn nicht weiter zerstören, gegen Hitze leistet er gleichfalls sehr hartnäckigen Widerstand (vergleiche die pikrinsalpetersaure Baryterde), und fast nur Alkalien sind im Stande, ihn zu vernichten, indem neue Verbindungen hervor-Man müsste indessen, sollte diese Annahme gerufen werden. gegründet sein, erwarten, dass durch Behandlung des Anilins mit Salpetersäure neben salpetersaurem Ammoniak auch Pikrinsalpetersäure entstände. Nach Fritsche bildet sich, wenigstens im ersten Augenblicke, eine andere Verbindung, aus der vielleicht später diese Säure entsteht; eben so müssten wir annehmen, das Anil vermuthlich auch aus anderen Körpern als aus dem Indigo erhalten zu können, und es wäre vielleicht möglich, dass einige der Unverdorben'schen Thierbasen auch Anilin als wesentlichen Bestandtheil enthielten.

Von den Salzen, welche ich in der Pikrinsalpetersäure untersucht habe, führe ich folgende an:

1) Pikrinsalpetersaures Kali.

Liebig, welcher dieses Salz ausführlich beschreibt (Poggend: Ann. Bd. XIII. S. 203) fand darin 16,218 K. Es muss bei dieser Bestimmung ein Verlust stattgefunden haben.

0,4585 Gr. wurden mit dem doppelte Gewichte Salmiak innig gemengt und geglüht, der Rückstand mit Chlorwasserstoffsäure benetzt und geglüht. Es blieben 0,125 Gr. Chlorkalium oder 17,25% KO. Atomgewicht der Säure = 2821.

0,482 Gr., mit chromsaurem Bleioxyd verbrannt, gaben 0,4825 Gr. C und 0,041 Gr. H oder 27,30% C 0,81% H.

0,537 Gr. gaben bei 19°C. 27" 10" 66,5 Cb.C. Noder 15,70 ${}_{1}^{1}$ N. Diess führt zu der Formel: $C_{12} H_{4} N_{6} O_{13} + KO$.

^{*)} Journ. Bd. XXIII. S. 79.

. • •		. ,	Erdm. Md.
12 C =	900,00	26,90	27,30
4H =	24,96	0,74	0,81
6 N ==	531,12	15,87	15,70
130=	1300,00	38,85	38,94
K0 =	589,91	17,64	17,25
-	3346,00	100,00	100,00.

Atomgewicht der wasserfreien Säure = 2773.

Liebig batte schon bemerkt, dass aus der verdünnten Aufläung des Salzes eine nicht gelb, sondern grün gefärbte Verbindung anschiesse. Erdmann, welcher diess Salz gleichfalls erbalten batte, analysiste es, sand es jedoch sast übereinstimmend mit dem eben angeführten zusammengesetzt. Ich werde unten auf dieses Salz noch einmal zurückkommen.

2) Pikrinsalpetersaures Natron.

Das Salz krystallisirt gewöhnlich in seinen gelben Nadeln, welche in der Hitze kein Wasser abgebon und beim Glühen ziemlich hestig detoniren.

0,349 Gr. gaben 0,081 Chlornatrium oder 12,359 Natron. Atgw. der Säure = 2773.

0,4765 Gr. gaben 0,111 Gr. Chlornatrium oder 12,418 Natron. Atgw. der Säure = 2760.

Demnach besteht das Salz aus:

1	₽t.	Säure =	275 6,08	87,57
1	At.	Natron ==	390,90	12,43
•		•	3146,98	100,00.

3) Pikrinsalpetersaures Ammoniak.

Wird die freie Pikrinsalpetersäure mit Ammoniak gesättigt, so erhält man auch aus der reinsten, sast sarblosen Säure eine gelb gesätte Flüssigkeit, welche bei einer Spur von Nitramarsäure *) indess sich der blutrothen Farbe nähert. Beim Abdampsen entweicht das überschüssige Ammoniak. Löst man den Rückstand in Wasser und dampst ihn ab, so krystallisirt

^{*)} Siehe in einem der nächsten Hefte des Journals meine Abhandlung über die Einwirkung der Salpetersäure auf den Indigo. Md.

das Salz in schönen gelben sechsseitigen Säulen, welche im Sonnenlichte prachtvoll alle Regenbogenfarben reflectiren. In gelinder Hitze schmilzt das Salz und verliert Ammoniak, während sich freie Säure sublimirt. Rasch erhitzt, brennt es mit schwacher Verpuffung ab.

Die Analyse des Salzes bietet eine Schwierigkeit dar, indem der grosse Stickstoffgehalt sehr leicht die Bildung von salpetriger Säure bewirkt. Ich habe den Strom von Sauerstoffgas nicht aufgeben wollen, da diese Methode nicht nur Bequemlichkeit, sondern auch grosse Sicherheit darbietet. Man kann indessen sehr leicht ¼ oder ⅓ der Röhre vorn mit metallischem Kupfer füllen, eine geringe Menge Sauerstoff hinzuströmen lassen und schnell etwas von der Substanz zersetzen, so dass der Sauerstoff selbst nicht das metallische Kupfer oxydiren kann; so ist man im Stande, die Verbrennung sehr sicher auszuführen. Zu Ende derselben kann man das ganze metallische Kupfer oxydiren, um alle Kohlensäure auszutreiben. Man kann auch statt des Sauerstoffes atmosphärische Luft anwenden. Alle folgenden Analysen sind auf diese Weise angestellt worden.

0,496 Gr. gaben 0,531 Gr. C und 0,111 Gr. H oder 29,47% C 2,49% II.

0,270 Gr. gaben bei 27" 6,5" B. 9° C. 50 Cb. C. Noder 22,40% N.

Daraus folgt:

	Ber.	Gef.
12 C = 900,00	29,20	29,47
19H = 74,87	2,42	2,49
8N = 708,16	22,96	22,40
140 = 1400,00	45,41	45,64
3083,03	100,00	100,00.

Die Säure war aus Salicin dargestellt.

4) Pikrinsalpetersaurer Baryt.

Beim langsamen Erkalten krystallisirt dieses Salz aus seiner Auflösung in schönen gelben Prismen, welche Krystallwasser enthalten. Erhitzt man es, so verliert es einen Theil desselben bei 100—120°.

2,287 Gr. verloren dabei 0,243 Gr. Wasser oder 10,628; stärker erhitzt, verliert es nur noch sehr wenig an Gewicht. Ich be es bis 350°C. erhitzen können, ohne dass es explodirte. e gelbe Farbe war dabei in eine braune umgewandelt.

1,109 Gr. hatten dabei 0,124 Gr. verloren = 11,18 $\frac{0}{0}$, 1,123 - - 0,125 - = 11,13 $\frac{0}{0}$.

Dieser Verlust bestand nicht allein aus Wasser, sondern hatte sich eine ganz geringe Menge von Säure sublimirt. im Wiederausbisen blieb eine Spur eines äusserst schwer lichen braunen Pulvers zurück. Die siltrirte und abgedampste üssigkeit gab das Salz mit der frühern Zusammensetzung und nen Eigenschaften wieder.

Wird das Salz schnell erhitzt, nachdem man das Krystallasser vorher ausgetrieben, so detonirt es ungemein heftig, mit llieuchtender, grüner, blendender Farbe abbrennend.

0,494 Gr. des krystallisirten Salzes wurden durch schwe-saures Ammoniak gefällt; es wurden dabei erhalten 0,168 Ba = 22,328 Ba.

0,4985 Gr. gaben 0,169 \begin{aligned}
\begin{

0,578 Gr. des bis 350°C. erhitzten und umkrystallisirten ilzes gaben 0,196 $\ddot{s}\ddot{b}a = 22,25\frac{0}{0}\ddot{b}a$.

Da es möglich war, in diesem Salze die Basis so sicher bestimmen, so wählte ich es, die Zusammensetzung der Säuzu bestätigen:

0,430 Gr. gaben 0,331 Gr. C und 0,084 Gr. H oder 20,99% C 2,17% H.

Diess stimmt genau mit der Formel überein:

C₁₂ H₄ N₆ O₁₃, Ba, 5aq. 21,05 20,99 12C = 900,002,04 2,17 14 H = 87,3512,42 6N = 531,12180 = 1800,0042,11 $\dot{B}a = 956,88$ 22,27 Mittel 22,38 4275,35 100,00 1 At. Baryt = 956,88 = 22,38 ler 1 At. Säure = 2756,08 = 5 At. Wasser = 562,40 = 13,15 4275,36 = 100,00.

Vier Atome Wasser hetragen 10,52f. Gef. 10,62f.

Das fünste Atom Wasser wird erst abgegeben, wenn das

372 Marchand, üb. die Pikrinsalpetersäure.

Salz sich mit Detonation zersetzt und, während wasserhalfige Säure vor der Detonation sublimitt, etwas basisches Salz gebildet wird. Liebig hat ein Salz untersucht, welches 1 At. Wasser enthielt; dieses besteht aus:

1 At. Ba = 956,88 = 25,01 1 — Säure = 2756,08 = 72,05 1 — Wasser = 112,48 = 2,94 3825,44 100,00.

Liebig erhielt aus 1,746 Gr. des Salzes 0,656 \ddot{S} Ba = 24,68 \dot{g} .

In dem bis 350°C. erhitzten Salze fand ich, dass 0,441 Gr. des Salzes 0,1684 SBa == 24,974 Ba gaben. Es war kaum eine Spur des basischen Salzes eingemengt.

Um dieses basische Salz zu erhalten, braucht man nur das mehrere Stunden bis auf 350°C. erhitzte Barytsalz in Wasser aufzulösen; es bleibt sedann als ein braunes, in Wasser met völlig uniösliches Pulver zurück, welches erhitzt mit grosser Gewalt detonirt. Die auf diese Weise gewonnenen Mengen sind indessen zu unbedeutend, als dass sie zu einer gründlichen Untersuchung hätten hinreichen können. Um mir es in grösserer Menge zu verschaffen, kochte ich das neutrale Barytsalz anhaltend mit einer verdünnten Auflösung von Aetzbaryt und wandelte auf diese Weise wirklich einen Theil des Salzes in das basische Salz um. Indessen da dieses in Wasser, selbst sicdendem, fast völlig unlöslich ist, so gelang es nicht, dasselbe von dem sich dabei bildenden kohlensauren Baryt, durch die Kohlensäure der Lust erzeugt, völlig zu befreien. Aus der abfiltrirten Flüssigkeit schossen sehr bald bräunlich gefärbte Krystalle an, welche indessen meistens aus dem neutralen Salz bestanden.

0,408 Gr. gaben 0,1465 Gr. SBa oder 23,19 Ba.

Nachdem das Kochen fortgesetzt worden war, wurde eine neue Portion absiltrirt.

0,299 Gr. von dieser gaben 0,108 BBa oder 23,26 Ba.

Eine dritte Menge gab endlich noch nach langem Kochen:

0,358 Gr. Substanz 0,131 BBa oder 23,64 Ba.

878

Es ist also zwar fortwährend von der Basis aufgenommen vorden, indessen entfernt sich die Zusammensetzung der dritten fortien nur wenig von dem neutralen wasserhaltigen Salze, welches 22,294 Ba enthält.

Es blieb somit nichts ührig, als eine grosse Quantität des seutralen Salzes eine sehr lange Zeit (14 Stunden) bei einer lemperatur von 350 — 370° zu erhalten und sodann aufzulö-en, und das basische Salz, welches sich durch Sublimation der säure (der wasserhaltigen) gebildet hatte, von dem noch unzersetzten neutralen durch Auflösung des letzteren abzuscheiden.

Das basische Salz bleibt als ein fast völlig uniösliches dunselbraunes Pulver zurück, welches, bis zum anfangenden Glüsen erhitzt, mit ganz ausserordentlicher Gewalt explodirt. Ich
sonnte mir nicht genug verschaffen, um die Zusammensetzung
er Säure in diesem Salze auszumitteln; ich musste mich dasit begnügen, den Gehalt an Baryterde darin zu bestimmen.
It folgte daraus, dass das Salz wasserfrei ist.

. 0,250 Gr. gaben, mit Schwefelsäure zersetzt, 0,155 Gr. hwefelsaure Baryterde oder 40,70 f.

Daraus folgt die Zusammensetzung:

2 At. Baryterde =
$$1913,76 = 40,98$$

1 At. Säure = $2756,08 = 59,02$
 $4669,84 = 100,00$.

Auf andrem Wege gelang es mir nicht, die basische Verndung so rein zu erhalten.

Es ist übrigens sehr bemerkenswerth, wie kräftig dieses ilz dem zersetzenden Einfluss der Hitze widersteht. Nach nigen oberflächlichen Versuchen schätze ich die zur Zersetzung thwendige Temperatur gegen 500 — 600° C.

5) Pikrinsalpetersaure Strontianerde.

Durch Kochen von kohlensaurer Strontianerde mit freier, Salicin bereiteter Säure wurde dieses Salz dargestellt, welten beim Erkalten der Lösung und beim Abdampfen in hart, sehr glänzenden Krystallen anschiesst. In Wasser, namenthin kochendem, ist es sehr leicht löslich; sehr schwer in chendem absolutem Alkohol. Dieser entzieht dem Salze zuerst Ystallwasser, wodurch die Krystalle trübe und undurchsichtig Irden. Zündet man den Alkohol an, so brennt er mit rother

sprühender Flamme. Das Salz selbst explodirt in der Hitze sehr lebhaft, im Dunkeln mit blendender purpurrother Flamme. Bei sehr hoher Temperatur giebt es, nachdem es Krystallwasser verloren hat, wie das Barytsalz, Säure ab, welche sublimirt, und hinterlässt ein Gemenge des basischen und des neutralen Salzes, welches noch 1 At. Krystallwasser enthält.

Von dem krystallisirten Salze gaben 0,710 Gr., durch Schwefelsäure zersetzt, 0,207 SSr = 16,43% Sr.

Demnach besteht das Salz aus:

1	At.	Strontian=	647,28	= 16,32
1	At.	Säure =	2756,08	= 69,50
5	At.	Wasser =	562,40	= 14,18
			3965,76	100,00.

0,565 Gr., bis auf 150° erhitzt, verloren 0,06375 Gr. Wasser = 11,29%. Diess entspricht 4 At. = 11,34% aq.

Wie das Barytsalz hinterlässt das stark erhitzte Strontiansalz ein unlösliches basisches Salz, welches braun gefärbt ist und gleichfalls mit sehr grosser Gewalt detonirt.

Auf dieselbe Weise wie bei dem Barytsalz erhielt ich von dem basischen Salze 0,305 Gr. Diese gaben, durch Schweselsäure zerlegt, 0,173 SSr oder 31,93% Sr O.

Daraus folgt die Zusammensetzung:

2 At. Strontianerde = 1294,56 = 31,96 1 At. Säure = 2756,08 = 68,04 4050,64 = 100,00.

6) Pikrinsalpetersaure Kalkerde.

Den beiden so eben beschriebenen Salzen ganz ähnlich verhält sich das Kalksalz. Es enthält gleichfalls fünf Atome Krystallwasser, welche mit derselben Hartnäckigkeit wie bei diesen zurückgehalten werden. Es unterscheidet sich von dem Baryt- und Strontiansalz durch leichtere Auflöslichkeit. Bei starkem Erhitzen liefert es ebenfalls ein basisches Salz. Ich habe nur die Menge der Kalkerde in dem krystallisirten Salze bestimmt.

0,852 Gr., durch oxalsaures Ammoniak gefällt, gaben hestig geglüht 0,0815 kaustische Kalkerde oder 9,568 Ca.

Daraus folgi:

1 At. Kalkerde= 356,02 = 9,69

1 At. Saure = 2756,08 = 75,01

5 At. Wasser = 562,40 = 15,30 = 3674,50 100,00.

7) Pikrinsalpetersaure Magnesia.

Leichter als alle diese erwähnten Salze löst sich das Magnesiasalz in Wasser auf; kochender Alkohol entzieht ihm gleichfalls zuerst das Krystallwasser und löst dann sehr wenig auf. Erhitzt verliert es zuerst das Wasser theilweise und detonirt sehr heftig. Auch dieses Salz scheint 5 At. Krystallwasser einzuschliessen.

(Fortsetzung folgt.)

XLIX.

Unterzuchungen über den Moder.

Von

R. HERMANN.

(Fortsetzung der Bd. XXII. S. 81 abgebrochenen Abhandlung.)

Bisher kannte man das Humusextract wohl nur dem Namen nach. Man bezeichnete damit die Substanz, die Wasser
was Ackererde, Torf und dergleichen Stoffen auszog. Aber
lieses sogenannte Humusextract konnte eben so gut aus humusmuren oder quellsauren Salzen bestehen, als aus einem eigenhümlichen Extractivstoffe. Ich wurde auf diese Substanz zuerst bei Gelegenheit meiner Untersuchung des Tschornasems
enfmerksam.

Als ich nämlich den absoluten Kohlegehalt des Tschornamems bestimmt hatte und davon den Kohlegehalt der abgeschielenen Wurzeln, des Humins, der Humussäure, der Quellsäure und der Quellsatzsäure abzog, so bekam ich eine bedeutende Differenz. Der Tschornasem musste daher eine organische Substanz enthalten, die in Wasser und Alkalien löslich war, aber weder durch freie Essigsäure, noch durch essigsaures Kupfervxyd, weder aus der sauren, noch aus der durch Natron neutralisirten Flüssigkeit abgeschieden wurde. Diese Substanz nannte ich Humusextract. Doch war der Tschornasem eine zu zusam-

mengesetzte Materie, um hoffen zu können, daraus reines Humusextract abzüscheiden. Ich suchte daher nach einem andern Körper, der Humusextract in einfacherer Verbindung enthielt, und fand denselben im faulen Holze, das blos aus Nitrolin, Holzhumussäure und Humusextract, ohne alle Beimengungen von Quellsätzendre besteht.

Zur Darstellung des Humusextractes bediente ich mich solgenden Versahrens:

kohlensaurem Natron ausgekocht, die Lösung filtrirt, mit verdännter Salpetersäure übersättigt und die Flüssigkeit von der ausgeschiedenen Holzhumusäure abfiltrirt. Diese braune Flüssigkeit giebt jetzt, nach Zusatz von salpetersaurem Bleioxyd und nach Uebersättigung mit Ammoniak, einen voluminösen Niederschlag von Humusextract-Bleioxyd. Dieser Niederschlag wurde ausgewaschen, noch feucht mit verdünnter Schwefelsäure angerührt, wobei man die Vorsicht brauchte, das Humusextract-Bleioxyd in Ueberschuss zu lassen, und endlich das Humusextract aus dem erzeugten schwefelsauren Bleioxyd mit Weingeist ausgezogen. Man erhielt dadurch eine braune Tinctur, die, im Wasserbade eingedampft, das Humusextract als einen kastanien-braunen, glänzenden, durchsichtigen Firniss zurückliess.

Das so dargestellte Humusextract hat einen zusammenziehenden bitterlichen Geschmack, der das Mittel hält zwischen dem Geschmacke mancher vegetabilischen Extracte und dem Gerbsteffe.

Weingeist von 80% löst das Humusextract leicht auf. Acther löst dasselbe ebenfalls auf. Eine concentrirte wässige Lösung des Humusextractes lässt sich mit viel Aether vermischen, ohne dass sich der Aether abscheidet. Setzt man aber sehr viel Acther zu der Lösung, so scheidet sich endlich der Ueberschuss des Aethers ab und erscheint dann von gelöstem Humusextract gelblich gefärbt, während die darunter befindliche Flüssigkeit viel Aether und den grössten Theil des Humusextractes zurückhält.

In Wasser ist das Humusextract leicht löslich. Diese Lésung erscheint jedoch gewöhnlich trübe von einem Extract- Absatz, der eine Art von Humussäure zu sein scheint, deren Natur noch auszumitteln ist, und der sich stets beim Eindampfen des Humusextractes erzeugt.

Kin Zusatz von verschiedenen Salzen und Säufen scheidet

das Humusextract aus seinen concentrirten wässrigen Lösungen als eine braune schmierige Substanz aus, die auf den ersten Blick grosse Achnlichkeit mit manchen Harzen hat. Verdünnte Lösungen des Humusextractes werden weder von jenen Salzen noch von Alkalien oder Säuren niedergeschlagen.

Mit den alkalischen Erden, namentlich mit Aetzbaryt und Aetzkalk, verbindet sich das Humusextract zu etwas schweröslichen braunen Verbindungen, die Achnlichkeit haben mit den sutsprechenden Salzen der Humussäuren.

Kocht man gepulvertes faules Holz oder auch gewöhnliche Gertenerde mit Aetzkalk, so bekommt man eine braune Lösung, die grösstentheils aus Humusextract-Kalk besteht. Beim Kin-kochen dieser Lösung scheidet sich der Humusextract-Kalk, gemischt mit etwas holzhumussaurem Kalk, in Häuten aus der Flüssigkeit aus, die sich bei weiterer Concentration der Flüssigkeit am Boden des Gefässes als ein braunes Pulver ansammeln.

Das Humusextract verhindert, wie viele organische Säuren, die Fällung des Eisenoxyds und anderer Metalloxyde durch Aelzammoniak.

Das Humusextract wird durch neutrale Metalisalze aus neuralen Flüssigkeiten nicht niedergeschlagen, namentlich aicht durch zeutrale Silber-, Kupfer-, Eisen- und Bleisalze.

Das Humusextract wird dagegen durch basische Bleisalze siedergeschlagen und durch schwefelsaures Kupferoxyd in dem lalle, wenn man der Flüssigkeit gleichzeitig Aetzammoniak zuetzt. Dagegen wird es nicht durch essigsaures Kupferoxyd effilit, selbst nicht dann, wenn man der Flüssigkeit gleichzeitig mmoniak in Ueberschuss zusetzt. Durch dieses Verhalten unrecheidet sich das Humusextract wesentlich von der Quellsäure, if der es sonst leicht verwechselt werden könnte.

Erhitzt man das Humusextract in einem Destillationsappate, so schmilzt es, giebt Wasser ab, schwillt auf, stösst weisse impfe aus, die sich in der Vorlage zu empyreumatischen Proecten verdichten, welche Humusextract enthalten, und verwanlt sich endlich in eine schwammige Kohle.

Das Humusextract gehört also zu den halbslüchtigen Subinzen, da sich ein Theil desselben bei der trocknen Destillain versüchtigt, der grössere Theil aber zersetzt wird. Diese eilweise Flüchtigkeit des Humusextractes erklärt sein Vorkommen im Russ, im Holztheer und im Holzessig, in welchen Substanzen von Braconnot und von Berzelius extractartige Materien nachgewiesen wurden, die offenbar Humusextract waren. Namentlich passt die Beschreibung von Berzelius des von ihm im Holztheer und Holzessig aufgefundenen Extractivatoffes vollkommen auf das Humusextract.

- Ich habe die Zusammensetzung des Humusextractes und seiner Verbindungen mit Bleioxyd und mit Kupferoxyd bestimmt.

Das Bleisalz wurde durch Fällung einer Auflösung von reinem Humusextract mit basisch - essigsaurem Bleioxyd dargestellt. Der Niederschlag war im seuchten Zustande nur wenig gefärbt. Beim Trocknen wurde er dunkler, umbrabraun. Die bei 80°B. getrocknete Verbindung zersiel beim Verbrennen in:

Humusextract 60,00 Bleioxyd 40,00 100,00.

Nimmt man an, dass diese Verbindung aus 2 Atomen Bleioxyd und 1 Atom Humusextract bestand, so wiegt das Atom Humusextract 4183,40.

Das Humusextract-Kupferoxyd wurde dargestellt durch Fällung einer Auflösung von Humusextract durch schwefelsaures Kupferoxyd und Ammoniak. Der Niederschlag wurde zur Trennung von etwas beigemengtem basisch- schwefelsaurem Kupferoxyd nochmals in schwacher Salzsäure gelöst und von Neuem niedergeschlagen, wobei man die Vorsicht brauchte, nur die zuerst niedergefallenen Portionen des Humusextract-Kupferoxyds aufzusammeln und zur Analyse zu verwenden.

Das Humusextract - Kupferoxyd bildet im frisch gefällten Zustande einen aufgequollenen graugrünen Präcipitat. Beim Eintrocknen sintert er stark zusammen und wird dunkler, nämlich grünlich-braun.

Das bei 80° R. getrocknete Humusextract-Kupferoxyd enthält noch Wasser. Bei der Analyse gaben 100 Theile:

Humusextract 49,23
Kupferoxyd 35,00
Wasser 15,77
100,09.

Diese Zusammensetzung entspricht einer Verbindung ans

l At. Humusextract, 6 At. Kupferoxyd und 12 At. Wasser, lenn eine solche Verbindung würde bestehen aus:

				In 100 Th.	
• •		•	Ber.	Gef.	
1 At.	Humusextract	= 4221,4	49,39	49,23	
. 6 -	Kupferoxyd	= 2974,2	34,80	35,00	
12 -	Wasser	= 1350,0	15,81	15,77	

1 At. Humusextract-Kupferoxyd == 8545,6 100,00 140,00.

Zur Analyse des Humusextractes selbst wurde das bei 80° B. getrocknete Humusextract - Bleioxyd verwandt. Man erhielt dabei für 100 Theile Humusextract:

Kohle 57,76

Wasserstoff 4,56

Sauerstoff 33,18

Stickstoff 4,50

100,00.

Diese Zusammensetzung entspricht folgender Formel:

			Ber.	Gef.
C_{32}	, === .	2444,8	57,91	57,76
H ₃₂	É	199,6	4,72	4,56
014	===	1400,0	33,18	33,18
$\dot{N_2}$		177,0	4,19	4,50

1 At. Humusextract = 4221,4 100,00 100,00.

Das Humusextract ist also nach demselben Typus zusam-, tengesetzt wie die Humussäuren.

9) Ueber das Nitrolin

Ich habe den Namen Nitrolin aus nitrogenium und lignum ebildet. Das Nitrolin bildet den Hauptbestandtheil des faulen lolzes. Man kann es daraus darstellen, wenn man recht müres faules Holz in einer hölzernen Reibschale zerreibt, das Puler in feine Leinwand bindet und hierauf in Wasser ausknetef. iese Operation hat zum Zweck, das Nitrolin von dem unzertzten Holze zu trennen, was möglicher Weise noch in dem ulen Holze vorhanden war. Das Pulver, welches sich im Vasser absetzt, wird hierauf mit einer Lauge aus kohlensauem Kali ausgekocht, wobei das Nitrolin ungelöst bleibt. Das o dargestellte Nitrolin ist eine geschmacklose, in Wasser, Säuen und Alkalien unlösliche nussbraune Substanz, die noch deutich die Structur des Holzes zeigt. Wenn man es trocknet, so

sistert es stark zusammen, nimmt eine hornartige Reschaffenheit an und haftet in diesem Zustande so stark am Papier, dass man es nicht davon trennen kann, weshalb man es auch niemals auf dem Filter trocknen darf. Das hornartige Nitrolin lässt sich schwer pulvern und nimmt beim Reiben Glanz an.

Rücksichtlich seiner elementären Zusammensetzung zeichnet sich das Nitrolin durch seinen bedeutenden Stickstofigehalt aus, der es der Zusammensetzung mancher Thierstoffe, namentlich der des Proteins, nähert. Dadurch unterscheidet sieh das Nitrolin auch auffahlend von dem Holze und dem Humin, Substanzen, mit denen das Nitrolin bisher verwechselt wurde.

Bei der Analyse gaben 100 Theile Nitrolin:

Kohle	57,70
Wasserstoff	6,82
Sauerstoff	24,28
Stickstoff	12,20
,. ·	100,00.

Ich vermuthe, dass das Nitrolin der Formel C₂₈H₄₀O₉N₅ entspricht und dass es nach folgender Gleichung entsteht:

Holz
$$12(C_3H_4O_2)+N_5+O_5=\begin{cases}
1(C_{28}H_{40}O_9N_5)=\text{Nitrolin,} \\
4(H_2O)=\text{Wasser,} \\
8(CO_3)=\text{Kohlensäure.}
\end{cases}$$

Hiernach würden also 12 At. Holz aus der Atmosphäre 5 At. Sauerstoff und 5 At. Stickstoff aufnehmen, dagegen 4 At. Wasser und 8 At. Kohlensäure abgeben und 1 At. Nitrolin erzeugen. Doch ist diese Ansicht noch nicht hinreichend begründet.

Anhang.

Ueber die Entstehung der Ackererde oder anderer moderhaltiger Erdgemenye und über ihre Befruchtung durch Düngun, Brache und Fruchtwechsel.

Wenn man Urerde, das ist verwittertes Gestein, namentlich aus einem Gemenge von Sand, Lehm, Thon, Mergel u. s. w. bestehend, mit organischen Substanzen mischt und diese Mischung der gleichzeitigen Einwirkung von Wärme, Luft und Wasser aussetzt, so verfaulen oder vermodern die organischen Substanzen. Sie erzeugen dabei Kehlensäure, Salpetersäure,

anzen, die man gewöhnlich mit der Benennung von Moder ler Humus umfasst und deren einzelne bis jetzt entdeckte Benandtheile ich in vorstehender Abhandlung aufgeführt habe. Es itsteht also bei diesem Processe ein phosphorsaure und salpersaure Salze enthaltendes Gemenge von Humus mit Sand und ehm, oder, was dasselbe bedeutet, Ackererde, Dammerde, Lanzenerde, Tschornasem. — Diens ist die eberflächliche Theorie M Matstehung der Ackererde. Jetzt wollen wir aber diesen trobes noch specieller in's Auge fassen. Bei der natürlichen ihlung von Dammerde spielen thierische Substanzen eine sehr ntergeordnete Rolle, Pflanzenreste dagegen die Hauptrolle. Weisten anzenreste?

Im Leben der Pfianze thut sich hauptsächlich eine Tenenz kund: die Samenbildung. Ist der Same gereift, so steren die Pfianzen entweder ganz ab oder beginnen wenigstens
en Winterschlaf. Nach der Samenbildung fallen also Wurelstöcke, Stengel, Blätter oder Helz der Erde, mithin der Hunsbildung naheim und bereiten dadurch dem Samen und der
araus bervorkeimenden neuen Generation Ruhestätte, Wurzelsam und Nabrung. — Es ist also hauptsächlich jene chemische
lindeit, die Holzfaser, welche dem Processe der Humusgähtug zur Grundlage dient; es ist daher für eine wissenschaftche Erklärung dieses Processes die erste Bedingung, die Proucte kennen zu lernen, die das Holz bei seiner Fäuleiss erzeugt.

Zur Fäulniss des Holzes gehört, eben so wie zur Moderildung, gleichzeitige Einwirkung von atmosphärischer Luft,
Vasser und Wärme. Unter diesen Umständen verändert eich
te Holz zuerst in eine braune zerreibliche Masse, das faule
thz, die grösstentheils aus Nitrolin besteht. Bei dieser Vertherung verliert das Holz etwas seines Kohlenstoffes als Kohteäure und etwas seines Wasserstoffes und Sauerstoffes als
Vasser und nimmt dagegen Stickstoff und Sauerstoff aus der
tit auf. Das Holz, welches ursprünglich in 100 Th. aus:

 Kohlenstoff
 50,48

 Wasserstoff
 5,49

 Sauerstoff
 44,03

 100,00

bestand, hat sich jetzt in Nitrolin verwandelt, einen Körper, der in 100 Th. besteht aus:

Kohlenstoff	57,20 .
Wasserstoff	6,32
Sauersloff	24,28
Stickstoff	12,20
•	100,00.

Diese Umwandlung des Holzes in Nitrolin ist in mehr als einer Hinsicht merkwürdig, besonders deshalb, weil sie ein ganz neues Licht auf die gleichzeitig befruchtende und düngende Wirkung der Pflanzenreste wirft. Beide Beziehungen werden aus nachfolgender Entwickelung der weiteren Veränderungen klar werden, die das Nitrolin bei seiner fortgesetzten Zersetzung erleidet. Bleibt nämlich das Nitrolin der fortdauernden Einwirkung von Luft, Wasser und Wärme ausgesetzt, so zerfällt es in Holzhumussäure, in Humusextract und in Ammoniak. verwandelt sich die Holzhumussäure einestheils durch Abgabe von Wasser in Quellsatzsäure und anderntheils durch Aufnahme von Sauerstoff in Quellsäure. Auf diese Weise erzeugt das Nitrolin während seiner Humusgährung alle Substanzen, die bisher in dem Moder nachgewiesen wurden und von denen es schon hinreichend erwiesen ist, dass sie die hauptsächlichste Wurzelnahrung der Psianzen ausmachen; auf diese Weise wirkt es befruchtend oder humusbildend auf diejenigen Bodenarten, denen es in seiner Grundform, als holzige Pflanzenreste, beigemengt wurde.

Das Nitrolin bildet aber nicht allein Humus, es wirkt auch düngend auf den Boden. Hier muss ich aber erst den Begriff erläutern, den ich mit dem Worte Düngung verbinde. Ich brauche dieses Wort gleichbedeutend mit humuslösend. Es giebt reiche Bodenarten, wie sogenannter erschöpfter Tschornasen, die noch eine grosse Menge von Humus enthalten, die aber doch nur kärgliche Ernten geben. Ein solcher Boden kann, wie ich mich selbst durch Analysen überzeugt habe, noch 100 Humu, mit allen denselben charakterisirenden Bestandtheilen wie Humussäuren, Humusextract, Quellsäuren und Quellsatzsäuren, enthalten und doch unfruchtbar sein. Was fehlt aber einem solchen Boden? Antwort: Lösungsmittel für den noch so reichlich darin enthaltenen Humus, Wird daher ein solcher Boden mit

Thierresten, Pflanzenresten oder Nitrolin, Pflanzenasche, Kalk, Gips u. s. w., mit einem Worte mit Alkalien oder mit solchen Körpern, die bei ihrer Zersetzung Alkalien erzeugen können, vermischt, so wird er wieder fruchtbar und zwar dadurch, dass die entweder unmittelbar beigemischten oder später aus den Thier- und Pflanzenresten entwickelten Alkalien den Humus löslich, d. i. von den Pflanzen absorbirbar machten *).

Alle Düngungsmittel sind also auch Lösungsmittel für den in der Erde schon angehäuften Humus. Doch zerfallen sie je nach der anderweitig abweichenden Art ihrer Wirkung in folgende Unterabtheilungen:

- 1) in animalische Düngungsmittel oder Thierreste; dieses sind solche, die bei gleichzeitiger Humusbildung vermöge ihrer bald und reichlich erfolgenden Ammoniak-Entwickelung auf den in dem Boden noch vorhandenen Humus kräftig lösend wirken und daher rasch, aber wenig anhaltend düngen;
- 2) in vegetabilische Düngungsmittel oder Pflanzenreste; dieses sind solche, die bei gleichzeitiger Humusbildung lang-samer Ammoniak entwickeln und daher weniger schnell, aber länger anhaltend düngen;
- 8) in mineralische Düngungsmittel oder Pflanzenasche, Kalk, Gips, Düngesalz u. s. w. Diese erzeugen keinen Humus, sondern sind reine Lösungsmittel für den in der Erde schon vorhandenen Humus.

Das Nitrolin wirkt also auf den Boden nicht allein humusbildend, sondern auch humuslösend, also ganz ähnlich wie animalische Substanzen. Diese gleiche Wirkungsart so heterogener Körper, wie Pflanzenstoffe und Thierstoffe, erklärt sich nur durch die merkwürdige Metamorphose, welche das Holz in Berührung mit Luft bei der Fäulniss erleidet, oder durch die bei der Nitrolinbildung stattfindende Stickstoff-Assimilation. Diese Erscheinung ist so eigenthümlicher Art und erlaubt einen so tiefen

^{*)} Ich bin im Stande, einen Versuch anzuführen, der diese Ansicht auf eine augenscheinliche Weise direct bestätigt. Mein verchrter-Freund, Hr. Schlippe, besäete erschöpften Tschornasem mit Hafer und erhielt dabei nur kümmerliche Pflanzen. Nachdem er aber denselben Tschornasem mit Aetzammoniak befruchtet hatte und dann besäete, erhielt er Pflanzen, die sich durch ihre kräftige Constitution auffallend von jenen unterschieden.

Blick in den bewunderungswürdigen Hausbalt der Natur, dass ich sie der Aufmerksamkeit der Naturforscher noch ganz besonders empfehlen möchte. — Nachdem das Nitrolin gebildet ist, gehen die Processe seiner Verwandlung ihren gewöhnlichen Gang und erklären sich aus der Aehnlichkeit der Zusammensetzung des Nitrolins mit Thierstoffen, namentlich mit der der Proteins, was aus einer Vergleichung der Zusammensetzung beider Körper anschaulicher werden wird. 100 Theile beider Körper bestehen aus:

	Nitrolin.	Proteïn	nach Mulder.
Kohlenstoff	57,20		55,20
Wasserstoff	6,32		7,00
Sauerstoff	24,28		21,80
Stickstoff	12,20		16,00
	100,00	1	100,00.

Nachdem ich in kurzen Zügen die Veränderungen geschildert habe, die das Holz bei der Fäulniss an der Lust erleidet, so müssen wir auch noch die Veränderungen in's Auge fassen, denen die Pflanzenreste bei der Fäulniss unter Wasser oder bei der Torfbildung unterworfen sind. Weil hierbei die Kinwitkang der atmosphärischen Luft durch das dazwischen lagernde Wasser beschränkt wird, so bildet sich hierbei kein Nitrollo. Die Pflanzenreste zerfallen dagegen unter Entwickelung von Kohlensäure und von Sumpfluft in eine Art von Quellantzent, die ich Torfsäure genannt habe, grösstentheils aber in Humio, eine Substanz, die in Alkalien unlöslich, mithin auch unfruchtbar ist. Da also bei der Torfbildung kein Nitrolin erzeugt wird, so kann sich dabei auch weder Humusextract noch Holzbuns-Diess ist der Grund, weshalb der Torf- oder säure bilden. jeder andere torfähnliche saure Sumpfboden unfruchtbar ist. Wenn man dagegen solchen Boden mit Erde oder mit Asche oder Alkalien mischt, oder ihn nach Ableitung des Wassets gut auflockert und ihn dadurch der Einwirkung der atmosphirischen Luft aussetzt, so kann er fruchtbar gemacht werden, und zwar dadurch, dass sich im erstern Falle torfsaure und torfquelisaure Alkalien und Erden bilden, die eine mässige Fruchtbarkeit zu besitzen scheinen, in dem andern Falle aber dadurch, dass die im Moorbeden stets reichlich enthaltenen, noch

mweränderten Pflanzenreste durch die Einwirkung der Luft Nirolin bilden, folglich später unter Ammoniakbildung in fruchtvaren Humusboden zerfallen.

Diess sind in der Kürze meine Erschrungen und Ausichten über die Entstehung des Humus und über den Unterschied zwischen sruchtbarer Ackererde und saurem Moorboden. Ich habe
denselben nur noch einige Bemerkungen über die Wirkungen
der Brache und des Fruchtwechsels auf die Beschassenheit der
Ackererde beizufügen.

Die Wirkungen der Brache zerfallen in 2 Momente, nämlich in die Wirkungen der Lust auf die in der brachliegenden Erde noch vorhandenen unzersetzten Pflanzenreste und in die Vermehrung dieser Pstanzenreste durch die wilde Vegetation. Die Brache ist also in mehreren Beziehungen eine natürliche Gründüngung. Sie wird um so wirksamer sein, je mehr der Bestandtheile enthält oder erzeugt, die der Nitrolinbildung vad Humusgährung fähig sind. Am kräftigsten wird also die Braché auf einen Boden wirken, der sich dabei mit einer zeithe Vegetation bekleidet. Dürrer Sandboden wird auch durch de langute Brache nicht fruchtbar gemacht werden können. Pagegen ist die Brache das beste Mittel, den Tschornasem zu behuchten. Sie ist für den Tschornasem sogar der Düngung mit Minalischen Stoffen vorzuziehen, weil derselbe bei seinem Reichthat an Humus mit dem aus den thierischen Stoffen zu schaeil und ** reichlich entwickelten Ammoniak eine zu üppige Vegetation er-201gt. Das Getreide schiesst daher auf dem mit anknalischen Sibilen gedüngten Tschornasem zu sehr in Halm und Blätter, best sich deshalb zu leicht und verfault daher nicht selten bei masen Witterang auf den Feldern. Doch wünsche ich bei die-Selegenheit noch darauf aufmerksam zu machen, dass der Poblornasem ausser der Brache auch noch durch die oben sub humangeführten und namentlich in Russland noch viel zu wenig migerandten mineralischen Düngungsmittel befruchtet werden ioante. Ich bin überzeugt, dass eine zweckmässig geleitete Lawendung von Gips, Asche, Düngesalz u. s. w. die Brache les Tschornasems ersetzen könnte. Gips ist ein in Russiand aufig vorkommendes Mineral und würde bei uns überall mit geringen Unkosten zu haben sein, und Asche wird nicht allein n allen Wirthschaften erzeugt, sondern könnte auch noch ausbrauchbaren Kartesselkrautes, so wie des Krautes von Haidengrütze und anderen Vegetabilien, erzeugt werden.

Jetzt noch eis Wert über die Wirkungen des Fruchtwechsels auf die Beschaffenheit der Ackererde. Jeder Landwirth kennt die positive Thatsache, dass ein Boden, der bei sortgesetztem Anbau einer und derselben Pflanzenart nur noch kümmerliche Ernten gab, eine andere Pflanzenart doch noch reichlich zu nähren vermag. Diese Thatsache, die zur Begründung der verschiedenen Fruchtweckselsystems Versalsssung gab, suchte man besonders durch die bekannte Hypothese von Decandelle zu erklären. Ich gestehe, dass ich nielt zu den unbedingten Anhängern dieser Theorie gehöre und dass ich den Einwürfen Dumas's, Schmalz's u. A. beistimme. Demnach scheint es mir, dass die günstigen Wirkungen des Fruchtwechsels keineswegs allein auf schädlichen oder nätzlichen Wirkungen hypothetischer Wurzelexcretionen heruhe, sondern dass dabei noch andere Umstände mitwirken. Als: Beimg zur Begründung einer neuen Ansicht über diesen Gegenstand erlaube ich mir noch, auf die grosse Verschiedenheit der im Moder enthaltenen Substanzen aufmerksam zu machen. Ist et nicht wahrscheinlich, dass verschiedene Psanzen: dem: Moder verschiedene Substanzen entziehen dürften? Demnach würde tine und dieselbe Pflanzenart, oft hinter einanden auf demselber Felde gebouf, den ihr zusagenden Moderbestandtheil verzehrt haben, mährend eine andere ihr folgende Pflammenart im des zunückbleibenden. Medersubstanzen noch Bestandtheile Andetiide sie zu nähren vermögen. Wenn sich diese Ansicht bestätigen soilte, so würde sich den landwirthschaftlichen Chemikern ein weiten Feld der Thätigkeit eröffnen, denn sie hätten dann dies Beziehungen der einzelnen Bestandtlielle des Modern zu der millein. Sie könnten dann, nach Beseitigung dieser Verarbis ton, auch umgekehrt: aus den Bestandtheilen eines gegebente Bodess auf die Pflanzenart schliessen, die derselbe am reich-Mohaten nähren würde.

. Veber die Einwirkung des Kali's auf Campher.

Von

DELALANDE.

(Ann. de Chim. et de Phys. Jan. 1841. p. 120.)

Indem ich von dem Gesichtspuncte ausging, der Dumag nd Stass bei ihren Untersuchungen über die Alkohole geleitet st, untersuchte ich, ob der Campber, welcher einige denen eser Classe von Körpern analoge Reactionen hat, sich eben so ten dom Kinflusse des Kali's verhichte. Zu diesem Zwecke itete ich einen Strom von Campherdampf über eine Säule eis Gemenges von Kali und Kalk, die zusammen geschmelzen, schher in kleine Stücke zerstossen und bei ungefähr 300 bis Mo exhitzt worden waren. Der Campher verband sich ganz it dem Kali, es entwickelte sich aber kein Gas. Das Geenge wurde mit siedendem Wasser behandelt. Die filtrirte üssigkeit wurde durch eine Säure gesättigt und setzte eine ure weisse krystallinische Substanz ab, welche nach dem saschen und Trocknen destillirt werden konnte, ohne einen ickstand zu lassen.

Das auf diese Weise erhaltene Product krystallisirt sehr it in Alkohol und besonders in einem Gemenge von Akohol de Asther. In diesem Zustande ist seine Consistenz mit der E Camphers vergleichlich. Diese Säure röthet das Lakmus-nier sehwach, sie sättigt die Basen ganz gut. Die Analysen, elche ich damit augestellt habe, leiteten mich auf die Formel 1913 d. Das ist die des Camphers nebst 2 Acq. Wasser. Ihr äussert das Kali auf den Campher nicht dieselbe Wirmus-nthümlichen Gruppe an, in die ohne Zweifel sich eine grosse pzahl von Körpern reihen wird, welche die grösste Analogie it ihm haben.

Die Campholsäure, denn so benenne ich diesen neuen Körer, bietet viel Interesse dar, nicht allein wegen der bei ihrer ildung vorkommenden Umstände, sondern auch wegen der ehr merkwürdigen Umwandlungen, die man sich davon verbrechen konnte. Unglücklicher Weise konnte ihre Untersuchung

388 Delalande, üb. die Einwirk. d. Kali's auf Campher.

nicht so vollständig sein wie ich es wünschte, da ihre Bereitung nicht so leicht war, als ich anfangs geglaubt hatte. In der That erfordert es viel Mübe, um die Campholsäure zu erhalten, indem man Campher auf kalihaltigen Kalk unter dem gewöhnlichen Luftdrucke reagiren lässt. Soll es gelingen, so sind sehr eigenthümliche Umstände der Temperatur dazu erforderlich. Nimmt man dagegen die Operation in einer verschlossenen Röhre vor, so erhält man die Reaction, durch welche die neue Säure erzeugt wird, weit leichter. Wenn man mehrere Male nach einander Campherdampf von einem Ende der Röhre zum audern gehen und ihn so auf das zuvor erhitzte alkalische Gemenge wirken lässt, so wird endlich ein beträchtlicher Theil der Substanz angegriffen und man darf hoffen, 5-6 Gr. gereinigte Säure von dem Inhalte einer Analysenröhre zu erhal-Es ist wohl einleuchtend, dass man besonders durch die Nothwendigkeit in Verlegenheit gesetzt wird, den Versuch mter starkem Drucke, welcher im Innern der Gefässe eintritt, vorzunehmen. Nicht immer kann man das Zerbersten derselben und das Herumschleudern der Producte verhüten.

Die Campholsäure kommt bei 80° in Fluss und siedet gegen 250°C., ohne sich zu verändern. Sie ist unlöslich in Wasser, dem sie dessenungeachtet einen geringen aromatischen Geruch ertheilt. Alkohol und Aether lösen sie dagegen in grosser Menge auf.

- I. 0,300 Gr. Campholsäure, durch blosses Fällen erhalten, gaben 0,288 Wasser und 0,768 Kohlensäure.
- 11. 9,300 Gr. derselben, die aber zuvor sublimirt waren, gaben 0,286 Wasser und 0,767 Kohlensäure.

III. 0,300 Gr. eines neuen Productes, welches nicht allein sublimirt, sondern auch aus Alkohol krystallisirt und nachber geschmolzen worden war, gaben 0,290 Wasser und 0,767 Kohlensäure.

Aus diesen drei Analysen lässt sich folgende Zusammensetzung ableiten:

The course of the contract	ſ.	II.	HE.
Kehlenstoff	70,83	70,74	70,74
Wasserstoff	10,63	10,58	10,73
Saverstoff	18,54	18,68	18,53
A Company of the Comp	190,00	100,00	100,00.

elalande, üb. die Einwirk. d. Kali's auf Campher. 389

Diese Verbindung, nach der Formel $C_{20}H_{32}O_3 + H_4O_3$ oder $_{20}H_{36}O_4$ berechnet, würde sein:

$$C_{20} = 1530,4$$
 71,09
 $H_{36} = 225,0$ 10,40
 $O_4 = 400,0$ 18,58
2155,4 190,00.

Campholsaures Silberoxyd. Dieses Salz, durch Zersezing des neutralen campholsauren Ammoniaks vermittelst des
miralen balpetersauren Silberoxyds erhalten, zeigt sich in Genit käsiger weisser Flocken, die sehr geneigt sind, salpetermres Silberoxyd einzuschliessen. Um es rein zu haben, muss
getrocknet, gepulvert und von Neuem gewaschen werden.

I. 0,316 Gr. dieses Salzes liessen 0,122 metallisches Silr beim Verbrennen.

II. 0,735 Gr. desseiben Salzes gaben 0,412 Wasser und ,159 Kohlensäure.

Man erhält daher:

Wenn man die Zusammensetzung dieses Salzes nach der Ormel CasH₃₄O₃, AgO berechnet, so erhält man:

$$C_{20} = 1530,4$$
 $43,78$
 $H_{34} = 212,5$ $6,00$
 $Ag = 1351,6$ $38,68$
 $O_4 = 400,0$ $11,54$
 $\hline 3494,5$ $100,00$

Campholsaurer Kalk. Dieses Salz ist schneeweiss, kry-allinisch, löslich in Wasser, weit mehr in der Kälte als in Wärme.

Man erhält ihn im Zustande der Reinheit, wenn man reine unpholsäure mit Ammoniak im Ueberschusse behandelt, nachr aber in die fast siedende Flüssigkeit eine Auflösung von ilorcalcium giesst.

Der campholsaure Kalk fällt in Gestalt eines krystalliniben Pulvers nieder. Man wäscht ihn mit siedendem Wasser d trocknet ihn bei 100°.

390 Delalande, üb. die Einwirk. d. Kali's auf Campbell.

0,4 Gr. mit der grössten Sorgfalt bereitetes Salz gaben 0,327 Wasser und 0,835 Kohlensäute. 1,204 Gr. gaben 0,415 schweselsauren Kalk.

Woraus sich ergiebt:

La graphics .

Wasserstoff 9,0

-knote to such put - Sauerstoff took, (1974) we treat quality

Wenn man den Kehlenstoff um die nöthige Menge vermehrt, nach der Annahme, dass der Kalk nach dem Verbrenmen ganz im Zustande von neutralem kohlensaurem Kalk zurückgeblieben ist, so erhält man:

Kohlenstoff Franko, 75

Wasserstoff 9,00 come of a most con-

has a part this assumented in all 1950 in the fact of

Die Formel C₂₀H₈₆Q₄, CaOl gieht r

C₂₀ = 1530,4 = 66,9

H₃₆ = 224,6 8,9

 $0_4 \implies 400,0 \quad 16,0$

CaO === 356,0 14,2

Die eben ängeführten verschiedenen Analysen berechtigen, wie man sieht, für die vom Campher abgeleitete neue Säure die Formel $C_{20}H_{34}O_3$, H_2O anzunehmen.

Wirklich würde man haben:

C20H34O3, H2O Campholsäure;

C₉₀H₃₄O₃, CaO, H₂O campholsaurer Kalk;

C20H84O3, AgO campholsaures Silberoxyd,

Ich unterwarf diese Resultate nochmals einer Controle, indem ich die Dichtigkeit des Dampfes von der Camphalsäure bestimmte. Folgendes sind die Resultate des Versuches:

Gewichtsüberschuss des Ballons 0,517 Gr.

Rauminhalt des Ballons

201 Cb. C.

in dem Ballon zurückgebliebene Luft 9

Temperatur des Bades, auf das

Lustthermometer reducirt 2870

windahide, ük die Einwirk. d. Kali's auf Campher. 221

Barometerstand

0,760 Mm.

Thermometerstand

14".

Hieraus ergiebt sich:

Gewicht des Litre Dampf 7,871 Gr.

Dichtigkeit

15.6 - 15

6,058.

Durch Becknung fiedet man:

) Vol. Kohlendsmpf. ≈ 16,864

Wansbrütoff = 8,477

- Sauerstoff = 4,410

23,751

Campholen.

Die Wickung, welche die wasserfreie Phosphorsäure auf e Campholsäure äussert, scheint mir eine besendere Erwähing zu verdienen. Wirklich:: weheint die wasserfable Phosiorsaure ber dicht dadurch zu reagiren, dass sie wich blos r Elemente des Wassers bemächtigt, wedurch ein akohlenasserstoff C20H28, das ist Camphogen, entstehen würde. Der ersuch bestätigte diese Vermuthung nicht.

Wenn man Campholanure über wasserfreier Phosphorsnure deillirt, so erhält man eine Flüssigkeit, welche, durch eine neue valillation gereinigt, bei der festen Temperatur von 135°C. bdet.

Folgendes sind die Resultate der Analysen dieses Körpers: 1. 0,212 Gr. gaben 0,248 Wasser und 0,668 Kohlensäure. II. 0,275 Gr. gaben 0,315 Wasser und 0,868 Kohlensäure. Woraus folgt:

•	I.	II.
Kohlenstoff	87,2	87,3
Wasserstoff	12,9	12,7
•	100,0	100,0.

Die analysirte Substanz ist offenbar ein Kohlenwasserstoff s Atomenverhältniss zwischen dem Kohlenstoff und dem Wasrstoff ist nicht einfach genug, als dass es aus den Analysen f eine ganz bestimmte Weise hervorgehen könnte.

$$C_4 = 306,08 87,5$$
 $H_7 = 43,75 12,5$
 $349,83 100,0.$

392 Delalande, üb. die Einwirk. d. Kali's auf Camphet

 $C_4 = 344,34$ **87,4** (1991) 131 $H_8 = 50,00 12,6$ 394,34 100,0

Aber die Dichtigkeit des Dampses dieser Flüssigkeit zeigt, dass dieses letztere Verhältniss das richtige ist, und leitet auf die Formel C₁₈H₃₂ für diesen neuen Köhlenwassetistoff.

Folgendes sind die Resultate des Versuches: 100 / 101

Gewichtsüberschuss des Ballons 19.**194 Gr. -** 46

Temperatur des Bades, antidas :: hereinset - 4

Lufthermometer reducirt 190°C.

Rauminhalt des Ballons 178 Cb. C.

Barometerstand 0,753 Mm.

17° C.

The in dem Ballon zurückgebliebene Luft 1 43/Cb. C.

All A Woraus sich ergiebt: - de trans des per receil quelle

Dichtigkeit was the state 4,353. and the state of

... Man hat bei der Berechnung:

11 18 Vol. Kohlendampf : == 15,1776

- Wasserstoff = 2,2016

berechnete Dichtigkeit 47,879 = 4,344.

Wenn man diese Formel mit der der Campholsaure vergleicht, erhält man die Gleichung

 $C_{20}H_{36}O_4 - H_4O_3 - C_2O_2 = C_{18}H_{32}$ um sich von der Bildung des erhaltenen Köhlen wasserstoffes Bechenschaft geben zu können.

Campholon.

Bei der Destillation des camphoisauren Kalkes wurde ein Oel gesammelt, das, nachdem es so sehr, als die geringe Menge von angewandter Substanz es gestattete, gereinigt worden war, Campholon zu sein schien.

0,263 Gr. gaben 0,275 Wasser und 0,787 Kohlensäure, woraus sich ergiebt:

Kohlenstoff 82,8 11,6 Wasserstoff Sauerstoff **_ 5,6** 100,0.

ose, üb. die Gährungsfähigkeit der Zuckerarten. 303

Das Campholon $C_{19}H_{84}O = C_{20}H_{84}O_8 - C_1O_2$ minute entaiten:

 $C_{19} = 1453,8$ 82,3 $H_{34} = 212,5$ 12,0 O = 100,0 5,7 1766,3 100,0.

Die von Fremy erhaltene Zusammensetzung des Camirons entfernt sich zu sehr von den zuvor angegebenen Zabn, als dass diese beiden Producte verwechselt werden könnn *).

LI. A lest the engineers with

Veber die Gährungsfähigkeit der Zuckerarten.

Von

the state of the s

(Aus den Ber. der Berl. Academie.)

Zwischen der Gährungsfähigkeit des Rohrzuckers und des raubenzuckers findet ein bedeutender Unterschied statt, den an bis jetzt ganz übersehen zu haben scheint; wenigstens wird keinem chemischen und technischen Lehrbuche desselben Erähnung gethan. Die Auflösung des Traubenzuckers gebraucht imlich, um in die geistige Gährung übergehen zu können, nur as sehr geringe Menge von Ferment, die des Rohrzuckers ngegen eine sehr bedeutende. Hat man gleiche Mengen von ohrzucker und von Traubenzucker in gleichen Mengen von stillirtem Wasser aufgelöst, so gehört wenigstens eine 8 mal össere Menge von demselben Ferment dazu, um die Auflöng des Rohrzuckers in die geistige Gährung zu versetzen, s nöthig ist, um in der des Traubenzuckers dieselbe Veränzung hervorzubringen.

(R. d. Ann. d. Chint.):

^{*)} Die Versuche von Delalande waren nach dem früher bei ganischen Analysen gebräuchlichen Verfahren angestellt worden. I hatte sie nach dem Atomgewichte des Kohlenstoffes von Berelius berechnet. Wir wollten an seiner Abhandlung nichts ännen, denn wir hegten keinen Zweisel an der Richtigkeit der von für die Campholsäure angenommenen Formel.

- Durch die Einwirkung der größern Menge von Ferment wird der Rohrzucker in Traubenzucker verwandelt, und dieser scheint daber von allen Substannen allein nur die Fähigkeit zu baben, durch Ferment in Kohlennfure und in Alkohol zu zerfallen.

Setzt man die Auflösung von Rohrzucker in Gährung und unterbricht dieselbe, lange bevor sie beendet ist, durch Hinzufügung einer bedeutenden Menge von starkem Alkohol, so findet man, dass der durch die Gährung noch unzersetzte Theil iei Zuckers in Traubenzucker verwandelt ist.

Die Gährungstänigkeit des Bohrzuckers beruht also auf denselben Gründen, aus welchen Stärkemehl, viele Gummiarten und Milchzucker unter gewissen Umständen der gelstigen Gährung unterworfen werden können. Sie verwandeln sich erst durch den Kinfigss verschiedener Stoffe in Traubenzucker. Aber von allen Pflanzensioffen, welche in Traubenzucker verwandelt werden können, ist unstreitig wohl der Bohrzucker der, bei dem diese Umwandlung am leichtesten und schuellsten geschieht. Deshalb wird die geistige Gährung durch ihn so leicht bedingt dass man ihn zu den gährungsfähigen Zuckerarten gerechtet hat. Er kann indessen auf den Namen einer Subatanz, die is die geistige Gährung übergehen kann, nicht mehr Ausprüch machen wie Stärkemehl, mehrere Gummiarten und Milchzucker.

LH.

Ueber das Theobromin.

Von.

A. WOSKRESSENSKY.

(Bullet. de l'Acad. de St. Petersbourg.)

Selt langer Zeit kannten die Chemiker zwei neutrale, schr attekstoffhaltige und mit besonderen Zigenschaften begabte Sabstatiten, das Caffein, welches men im Caffee untdeckte, and das Thein, das einen Bestandtheil des gewöhnlichen Thes's blidet; aber ihre Natur blieb unbekannt und erhielt erst 1837 ihre Würdigung, als Mulder und Jobst ihre Arheiten über desen Siegenstand veröffentlichten. Diese beiden Chemiker kance

Woskressensky, üb. das Theobremin.

st pa derselben Zeit auf das merkwürdige Resultat; idles ides iffein vollkommen identisch mit dem Thein sei und folgfich ser dieser Kötper aus der Wissenschaft verschwinden müssel

Nachdem die Anwesenheit des Casseins in beiden en verbledenen Pflanzen einmal erkannt war, lag es sehr nahe, mseiben Stoff oder wenigstens einen ähnlichen in der Choosthre an sucken, deren leicht bitteren Geschmack vollkommen i das Bitter des Caffelins erionert a und din ausserdem die rundeigenschaft des Caffen's, die aufregende Kraft, besitzt, clobe denselben so gesucht macht.

Zu diesem Ende behandelte ich die Cacaahahnen, wie sie Handel verkommen, mit destillirtem Wasser, digerizte sje ine Zeit lang im Wasserbade und liess dann das Decoct durch in Sieb laufen. Eine vorsichtig zugesetzte Auflösung von felzucker gab einen beträchtlichen Niederschlag, und die klare, urch ein Filter von demselben getrennte, dann vom überschüsigen Blei befreite Flüssigkeit lieferte nach dem Abdampfen ine weisse Substanz, die aber noch von den färbenden Stoffen er Mutterlauge nicht frei war.

Um sie zu reinigen, löst man sie wieder in siedendem Alohol auf, filtrirt die helsse Auflösung und erhält bei der Ab-Ihlung ein krystallinisches weisses, leicht röthliches Pulver, elches man von Neuem auf gleiche Weise mit Alkohol beandelt und dann den gesuchten Stoff ziemlich weiss und rein hält.

Beim ersten Anblick erkennt man leicht, dass diess kein affein ist, sondern ein anderer, ganz besonderer Körper, für n ich den Namen Theobronin vorschlage. Man erhält dasibe in Gestalt eines krystallinischen Pulvers, dessen Geschmack icht bitter und ganz dem des Caffeins und des Cacao selbst itsprechend ist; aber wegen der Unlöslichkeit des Stoffes ist er Geschmack nur langsam merkbar und von geringer Intenät. Der Luft ausgesetzt, verändert sich das Theobromin nicht; s 100°C. erhitzt, verliert es nur 0,81 p.C. seines Gewichs und wird nur bei einer Temperatur von 250°, wo es braun ı werden anfängt, umgeändert; zu einer höhern Temperatur etrieben, verstüchtigt es sich, giebt ein krystallinisches Subliat und hinterlässt etwas Kohle.

Das Theobromin ist wenig auflöslich in heissem Wasser;

396 Woskressensky, üb. das Theobromin.

beim Erkalten wird die Flüssigkeit ein wenig opalisirend, was beweist, dass es in kaltem Wasser noch minder auflöslich ist. Es löst sich auch in Alkohol und Aether, doch ist es darin weniger noch als in Wasser löslich, besonders in der Kälte. Säuren und Alkalien zersetzen es nicht und können sich nicht damit verbinden. Gerbsäure bildet mit diesem Körper eine Verbindung, die sich in einem Ueberschusse von Säure, in Alkohol und selbst in heissem Wasser auflöst.

Giesst man in die Auflösung desselben eine verdünnte Auflösung von Quecksilberchlorid, so entstebt ein welsser krystallinischer, schwer in Wasser und Alkohol löslicher Niederschlag, wahrscheinlich eine Verbindung von Quecksilberchlorid und der angewandten Substanz.

Die Elementaranalysen dieses Körpers gaben mir folgende Resultate:

I. 0,3754 Gr. Substanz gaben:

Kohlensäure 0,6410 Wasser 0,1533.

II. 0,2345 Gr. Substanz gaben:

Kohlensäure 0,3984 Wasser 0,0973.

III. 0,2451 Gr. Substanz gaben:

Kohlensäure 0,414 Wasser 0,0996.

IV. 0,2921 Substanz gaben:

1:

Stickstoff 82,5 Cb. C. bei einem Barometerdruck von 29,6" und einer Temperatur von 16,8° C.

Demnach wird das Theobromin folgendermaassen zusammengesetzt sein:

Kohlenstoff	=47,2141	46,9766	46,705
Wasserstoff	= 4,537	4,6103	4,5158
Stickstoff	= 35,381	35,381	35,381
Sauerstoff	= 12,8679	13,0321	13,3988
	100,000	100,000	100,000.

Und seine empirische Formel wird sein:

 $C_9H_{10}N_6O_2$

welche folgende Verhältnisse liesert:

$\mathbf{C_9}$	=	687,915	46,436
H ₁₀	===	62,3975	4,211
N ₆	=	5 31,120	35,853
0,	==	200,000	13,500

1 At. Theobromin = 1481,4325 100,000.

Es ist bemerkenswerth, dass die Stickstoffmenge im Theoomin grösser ist als selbst im Caffein, welches bis jetzt als e stickstoffreichste vegetabilische Substanz betrachtet wurde.

Wenn nun die nährende Krast der verschiedenen Stosse in Stickstosse, den sie enthalten, ihren Sitz hat, wenn diese leinung, die von den Herren Payen und Boussingault is allgemeines Gesetz ausgesprochen wurde, gegründet ist, so it es ganz natürlich, zu schliessen, dass das Theobromin eier der nährendsten Psianzenstosse ist.

LIII.

Ueber das Sarcocollahars.

Von

Prof. JOHNSTON.

(Athenäum No. 676. p. 799.)

Das im Handel vorkommende Sarcocollaharz wird durch Vasser in 3 Theile geschieden.

- 1) Kin Gummi (A), das sich in Wasser und in Alkohol cht auflöst, aber in grosser Masse durch das erstere Lösungstittel ausgewaschen wird.
- 2) Ein in Wasser unlöslicher, aber in Alkohol löslicher beil (B), der von harzigem Ansehen ist und durch $C_{40}H_{64}O_{14}$ isgedrückt wird. Das Hydrat besteht aus $C_{40}H_{64}O_{14}+3H_{7}$ enn es bei 60° getrocknet wird. Dieser Theil B wird durch asen in 2 oder mehrere organische Verbindungen zerlegt, intem die alkoholische Auflösung mit neutralem essigsaurem Bleityd ein Salz liefert, das einen organischen Bestandtheil von er Zusammensetzung $C_{40}H_{50}O_{16}$ enthält. Ammoniak schlägt is den gemengten Lösungen ein zweites Bleisalz nieder, desmoganischer Bestandtheil seiner Zusammensetzung nach noch icht untersucht worden ist.

398 Ueb. ein flüchtiges Gel aus den Aepseln.

- 3) Der vom Wasser aus dem rohen Sarcocolla aufgenommene Theil trennt sich, wenn er his zur Trockne adgedampst worden ist, durch Alkohol oder Aether in einen löslichen Theil (C) und einen unlöslichen (D).
- 4) Der lösliche Theit C, getrocknet bei 212°, gab nicht übereinstimmende Resultate, die sich der Formel $C_{40}H_{64}O_{18}$ näherten, lieferte aber, mit Basen behandelt, Salze, die organische Bestandtheile von verschiedener Zusammensetzung enthielten. Ein neutrales essigsaures Bleisalz schlägt ein Salz von der Formel PbO $+ C_{40}H_{46}O_{15}$ und der darauf folgende Zusatz von dreifach essigsaurem Bleioxyd ein Salz von der Formel PbO $+ C_{40}H_{64}O_{16}$ nieder.
- 5) Der in Alkohol unlösliche, in Wasser auflösliche Theil D besteht aus einem Gummi und einer Substanz, die durch neutrales essigsaures Bleioxyd in geronnenen Flocken niedergeschlagen wird. Die Untersuchung ist noch im Fortschreiten und die Resultate möge man als der Berichtigung fähig betrachten.

LIV

Ueber ein flüchtiges Oel aus den Aepfeln

Hr. Rossignon theilt eine Notiz in Bezug auf ein flüchtiges Oel mit, welches er aus verschiedenen Aepfelsorten gewonnen hat, die von einer Krankheit ergristen waren, welche er vorläufig Cellulostase nennt. Diese Krankheit, welche unter anderen Charakteren auch den hat, den Aepfeln einen sehr entschiedenen Moschusgeruch zu ertheilen, kann sich durch Inoculation von einer kranken Frucht auf eine gesunde fortplianzen.

Das slüchtige Oel, welches Hr. Rossignon mit dem Namen Majoil bezeichnet, fängt bei 109° an zu sieden und verflüchtigt sich bei dieser Temperatur sehr schnell. Bei Annäherung eines brennenden Körpers entzündet es sieh mit einer
schwachen Flamme und wenig Rauch, was sich durch den
geringen Köhlenstöfigehalt erklärt. Es zeigt folgende Zusammensetzung:

Kohlenstoff 63,15

Wasserstoff 20,65

Sauerstoff 15,15 (?)

Stickstoff 0,05.

Hr. Pelleuze fügt nach einer ihm vom Verf. gemachten itheilnug-folgende Nachrichten binzu:

Die Cellelostase befällt nicht blos die Aepfel, sie greift sh einige andere Früchte, aber mit etwas verschiedenen Charleteren an. So bewirkt sie in gewissen Rosinenkernen die becheidung eines flüchtigen Oeles, dessen Geruch ganz dem w Patchouly hnalog ist; in den gelben Pflaumen erzeugt sie w Och, das dem Bittermandelöl entsprieht.

(Compt. rend. 1841. Feor. p. 312)

LV.

Analyse des Chylus und der Lymphe.

Von

G. O. REES.

(Philosophical Magazine. Febr. 1841. p. 156.)

Die solgende Analyse von Chylus und Lymphe wurde durch im. Dr. Rees neuerdings angestellt, und zwar in der Ahcht, zu entscheiden, was jene Ingredienzen des Chylus sind, ie in der Lymphe verschwinden und solglich zur Ernährung is Körpers von grösster Bedeutung sind. Die Flüssigkeiten urden beide von einem Thiere gleich nach dem Tode genommen. In Gegenstand der Untersuchung war ein junger Esel, der durch nen Schlag auf den Kopf getödtet wurde, ungefähr 7 Stunn, nachdem er eine Menge Hafer- und Bohnenmehl genosten den ductus thoracicus treten, und war deshalb frei von mphe; die Lymphe war aus den unteren Extremitäten. Die salyse lieferte solgendes Product:

	Chylus.	Lymphe.
asser	90,237	96,536
weisstoff	3,516	1,200
serstoff	0,320	0,120
:oholisches Extract	0,332	0,240
issriges Extract	1,233	1,319
tige Materie	3,601	nur eine Spur
(Alkalien, Chloride, schwefelsaure)		•
lze (u. kohlensaure, Spuren von phos-	0,711	0,585
lze du. kohlensaure, Spuren von phos- phorsauren Salzen, Eisenexyd		
	100,000	100,000.

Bei Gelegenheit dieser Analysen macht Dr. Rees folgende markungen:

400 Bess, Analyse des Chylus u. der Lymphe.

Der vom Chylus erhaltene Kiweissstoff enthielt einen Körper eingemengt, der ihm eine matte weisse Farbe ertheike und der, wie Dr. Rees zu glauben geneigt ist, mit einem im Speiehel vorkommenden Stoffe identisch ist. Man erhält ihn aus beiden, dem Chylus und dem Speichel, wehn man sie mit Acther behandelt, dadurch, dass dieser besondere Stoff über der Unterlage von anderer Flüssigkeit schwimmt. Eisen fand sich in beträchtlicher Menge in dem wässrigen Katract des Chylas, und Dr. Rees spricht die Vermuthung aus, ob nicht diess in seiner Oertlichkeit besondere Vorkommen des Eisens in gewisser Beziehung zu der Abwesenheit des rothen Farbstoffes des Blutes stehen sollte. Die Farbe des Chylus hat man meistens geglaubt, der in ihm enthaltenen fettigen Materie zuschreiben zu müssen, Dr. Rees ist jedoch der Meinung, dass die oben als der im Speichel vorkommenden entsprechend erwähnte Materie einen bedeutenden Antheil an der Erzeugung des opaken mischigen Ansehens des Chylus habe.

Diese Analyse der Lymphe stimmt ziemlich genau mit der überein, welche ich vor einigen Jahren in Gemeinschaft mit Hrn. Collberg in Halle angestellt habe. Wir erhielten sie aus einer Wunde auf dem Fussrücken, ganz ähnlich wie Hr. Müller. Als ich sie untersuchte, war sie nicht mehr ganz frisch, woher es kommen mag, dass wir den Faserstoff etwas zu hoch und den Eiweissstoff etwas zu niedrig fanden. Folgendes ist das Resultat der Analyse, welches wir schon 1838 in Müller's Archiv mitgetheilt haben:

tor a vitoleso mugicinent hanch?	
Wasser	96,926
· Faserstoff	0,520
Eiweiss	0,434
extractartige Stoffe u. Verlust	0,312
fettes Oel' } krystallin. Fett	0,964
Chlornatriùm Chlorkalium	المراد المرا
kohlensaures, milchsaures Alkali schwefelsaure Kalkerde	1,544
phosphorsaure Kalkerde	TALL FOR BUILDING
Eisenoxyd	·
	410.00

LVI.

Ueber die Capillarität der flüssigen Körper bei verschiedenen Temperaturen.

Von

FRANKENHEIM und SONDHAUSS *).

Alle Erscheinungen, welche auf der Anziehung zwischen den Theilen eines flüssigen Körpers beruhen, können auf zwei Ursachen zurückgeführt werden, die Elasticität und die Synaphie, wie ich das Princip der zahlreichen Erscheinungen genannt habe, die sich bei Haarröhren, Adhäsionsplatten, Tropfen u. s. w. zeigen, wenn die Körper, welche die Flüssigkeit begrenzen, von ihr vollkommen benetzt sind. Die Elasticität wird bekanntlich gemessen, indem man die Flüssigkeit einem allseitig gleichen Drucke aussetzt. Die bis zum Jahre 1835 bekannt gewesenen Beobachtungen habe ich in meiner Cohäsionslehre S. 43 berechnet und zusammengestellt. Ihre Anzahl ist klein und hat sich seitdem nicht vermehrt. Aber sie gaben mir das sehr interessante Resultat, dass in den Flüssigkeiten die Cohäsion, so weit sie der Elasticität angehört, von derjenigen der festen Körper, die ihnen in ihren übrigen Eigenschaften nahe

^{*)} Ich glaubte, Hrn. Dr. Sondhauss als Mitverfasser nennen zu müssen, weil er einen grossen Antheil an den Versuchen über Wancer und Weingeist genommen hat. Auf meine Veranlassung hat or die Veränderungen, welche die Capillarhöhe durch die Temperatur erleidet, zu dem Gegenstande seiner Promotions - Arbeit ge-Withit and die von ihm theils allein, theils gemeinschaftlich mit mir Engestellten Beobachtungen in seiner Dissertation: "De vi quam caor habet in stuidorum capillaritatem. Breslau, Febr. 1841'' bekannt zemacht. Diese Beobachtungen habe ich auch für diese Abhandlung perechnet, und wenn meine Besultate hie und da etwas von denenigen abweichen, die Hr. Dr. Sondhauss in seiner Dissertation regeben hat, so rührt es theils von dem etwas abweichenden Verlahren her, das ich bei der Berechnung des Meniscus eingeschlagen habe, theils von Beobachtungen an Wasser und Weingeist, die ich erst mach der Beendigung von Hrn. Dr. Sondhauss's Arbeit angestellt habe. Hrn. Dr. Sondhauss's Abhandlung enthält auch einige interessante theoretische Bemerkungen über den Leidenfrost'schen Versuch und eine Beobachtung über die Synaphie des geschmolzenen Schwefels, auf die ich später zurückkommen werde.

stehen, nicht sehr verschieden ist. Das Quecksilber z.B. steht unter den nach der Stärke der Spannkraft geordacten Körpem zwischen dem Zinn und dem Blei; die Schweselsäure ist dem Gips an Spannkraft sogar beträchtlich überlegen. Noch geringer wird der Unterschied bei der specifischen Klasticität, d. h. der Spannkraft dividirt durch das spec. Gewicht. In der Regel haben nämlich Stoffe von einem höhern spec. Gewicht auch eine höhere Spannkraft; wenn man nun die Körper nach ihrer specifischen Elasticität ordnet, so kreuzen sich die Reihen für die flüssigen und die festen Körper an vielen Stellen. Also in der Krast der Elasticität, einem der wichtigsten Zweige der Cohasion, findet zwischen den beiden Körperclassen, den flüssigen und den festen, kein Unterschied statt (Cohäsionslehre S. 274).

Der Synaphie bei den flüssigen Körpern entspricht bei den festen die Cohärenz. So verschieden sie auch unter gewöhnlichen Umständen sind, so treten sie doch zuweilen unter Verhältnissen auf, die eine quantitative Vergleichung gestatten. Wenn man zwei Scheiben eines lesten Körpers durch eine sehr dunne Schicht eines ihn benetzenden flüssigen verbindet, so kann das zum Trennen der Scheiben eben hinreichende Gewicht nie grösser sein als der Widerstand, den zwei Theile der Flüssigkeit einer Trennung entgegenstellen, und dennoch zerreisst in solchen Fällen das kleine System nicht immer innerhalb der Flüsnigkeit, sondern zuweilen in einer der festen Scheiben, milst wenn diese aus einem so colisienten Körper, wie Glas, bestehel. Wenn man daher in den zahlreicheren und gewöhnlicheren Fällen, bei denen die wechselseitige Anziehung der flüssigen Theile von Kinsluss ist, die Theile eines slüssigen Körpers weit leichter von einander trennen kann als die Theile eines festen, so rührt dieses nicht von der Intensität der Coblicenz her, die is festen Körpern im Allgemeinen nicht grösser zu sein braucht als in flüssigen, sondern von derjenigen wesentlichen Eigenschaft der flüseigen Theile, nach welcher sie nach allen Seiten eine gleiche . Aazichung: erleiden tind sich daher ohne Hinderniss die Heri köllner, während in den festen Körpelu; we die Andehungskräfte in verschiedenen Richtungen hach einem gewissen Gesetz ungleich sind, sich nicht nur beim Trennen der Theile, sondern auch bei jeder Veränderung ihrer relativen Lage cie kräftiger Widerständ entwickeln muss. Later Council Declaration

der flüssigen Körper bei verschied. Temperaturen. 403

Ueber die Synaphie sind die Beobachtungen weit zahlreicher und, weil man eine grössere Auswahl unter den Methoden hatte, auch weit genauer als bei der Klasticität. Ich habe in meiner Cohäsionslehre S. 79 und vollständiger in Poggen d. Ann. XXXVII. 409 die Synaphie von einer grossen Anzahl von Körpern gegeben und manche Anknüpfungspuncte mit der Klasticität und anderen Eigenschaften der Flüssigkeiten nachgewiesen.

Eine Hauptfrage in diesem Gebiete ist aber bis jetzt kaum berührt, nämlich das Verhältniss der Temperatur zu der Man sagt gewöhnlich, die Wärme sei Grösse der Cohasion. der Gegensatz der Cohasion, und sucht dieses durch mehrere Beispiele zu erweisen. Man führt an, dass die Wärme beim Schmelzen, bei der Gasbildung latent werde, dass sie dem Raume eine grössere Menge Dampf, den lösenden Flüssigkeiten in der Regel eine grössere Menge Salz aufzunehmen gestatte. Aber in allen diesen Fällen ist die Cohasion entweder aufgehoben oder sie tritt auf eine so verdeckte Weise auf, dass es unmöglich ist, sie quantitativ zu bestimmen. Für die Erscheirungen, wo beide Kräfte, die Wärme und die Cohasion, sich messen lassen, ist bis jetzt fast noch nichts geschehen. festen Körpern weiss man, dass sie in höheren Temperaturen zuweilen biegsamer werden; aber bis jetzt existirt nicht eine einzige zuverlässige Beobachtung über das Verhältniss der Cohärenz oder der Elasticität zur Temperatur. Bei der Elasticiat der Flüssigkeiten ist eigentlich nur die einzige Beobachtung von Colladon und Sturm beim Aether vorhanden, nach welcher die Spannkraft bei 11,4° etwas kleiner ist als bei 0°. Selbst beim Wasser ist eine Abnahme der Elasticität mit dem Steigen der Temperatur noch nicht bekannt. Canton behauptet sie zwar, aber Oerstedt bestreitet sie und meint, die Elasticität sei unabhängig von der Temperatur.

Bei der Synaphie sind zwar einige Beobachtungen angestellt, aber die Zahl der zuverlässigen ist sehr klein. Achard's Versuche (Physisch-chemische Schriften S. 359) verdienen keine Berücksichtigung. Er war ein Mann von Geist, aber ein flüchtiger und unzuverlässiger Experimentator. Emmet, der (Phil. Mag. Ann. I. 116) einige Versuche bekannt gemacht hat, nimmt sie späterhin (p. 332) wieder zurück, und

mit Recht, da sie ganz ungenau sind. Laplace und Poisson nehmen bei ihren mathematischen Untersuchungen über die Capillarität auch auf die Wärme Rücksicht. Beide bringen die Höhe, zu welcher eine Flüssigkeit in den Haarröbren ansteigt, mit dem von der Temperatur abhängigen spec. Gewichte auf eine sehr einsache Weise in Verbindung. Laplace hatte aber wahrscheinlich gar keine Beobachtung vor Augen, als er die Vermuthung aussprach, dass das Gewicht der von einem Haarröhrchen gehobenen Flüssigkeitssäule, d.h. De nach der unten folgenden Bezeichnung, für alle Temperaturen constant bleibe, d. h. dass bei einer gegebenen Röhre und einer gegebenen Flüssigkelt die Höhe der Säule dem spec. Gew. (e) umgekehrt proportional sei und mit der Zunahme der Temperatur_in der Regel stelge. Poisson war entgegengesetzter Meinung; er sagt (Nouvelle théorie de l'action capillaire p. 107), es sei bei de ner Flüssigkeit die Höhe der Säule (D) in verschiedenen Temperaturen dem spec. Gew. proportional, also D:o eine constante Grösse, und er beruft sich dabei auf Versuche von Gay-Lussac. Aber von Gay-Lussac sind nur zwei hierher gehörige Beobachtungen vorhanden, nämlich an Wasser von 81/2° und von 11°C., wo sich die Capillarhöhen beinahe wie 151:150 verhalten. Dieses Verhältniss ist zwar, wenn man die Beobachtungsfehler am Thermometer und den Haarröhren berücksichtigt, von dem der spec. Gewichte bei diesen Temperatures nicht sehr verschieden, aber diese Versuche stehen einander viel zu nahe, um, ungeachtet der Sorgfalt, mit der Gay-Lussa c experimentirte, über die Wahrheit eines solchen Gesetzes zu entscheiden.

Ein weit grösseres Temperatur-Intervall nehmen meine Versuche ein. Ich beobachtete (Cohäsionslehre S. 86) das Wasser bei 0° und 16,5° C. *) und fand das Verhältniss der Capillarhöhen 1:0,970, während die spec. Gewichte um weniger als 0,001 von einander abweichen. Auch bei zwei Weingeistarten, die ich zwischen 20 und 70° untersuchte, fand ich in der Capillarhöhe, der Ansicht von Poisson entgegen, eine

^{*)} Durch einen sehr störenden, aber von mir angezeigten Druckfehler steht S. 79 meiner Cohäsionslehre 6,5° statt 16,5°. In derselben Zahl bat Hrn. Dr. Son dhauss's Abhandlung S. 25 den Druckfehler 10,5° statt 16,5°.

weit schnellere Abnahme als im spec. Gewicht. Obgleich nun diese Versuche, wie sich aus einer Vergleichung mit den unten folgenden ergiebt, ganz genau waren, so wünschte ich doch, das Verhältniss der Synaphie zu der Wärme mit einem genauern Apparate zu bestimmen, als mir damals zu Gebote stand. Dieses erschien mir aus zwei Ursachen wichtig, denn erstlich ist hier eine der seltenen Gelegenheiten, wo sich die Beziehung der Wärme zur Cohäsion genau messen liess, und zweitens durfte man hoffen, die Umstände aufzufinden, bei denen in einer höhern Temperatur die Benetzbarkeit ganz aufhört und die bekannte Erscheinung von Leidenfrost eintritt.

Um die Synaphie bei einer von der der Lust abweichenden Temperatur zu beobachten, konnte ich keine der gewöhnlichen Methoden anwenden, weil es unmöglich war, allen Theilen des Apparates dieselbe Temperatur zu geben. Ich schlug daher folgenden Weg ein. Die Flüssigkeit, deren Synaphie man bestimmen wollte, kam in ein heberförmiges Glasrohr, das aus zwei cylindrischen Röhren von ungleicher Weite bestand. weiten Röhren hatten 5-7 Mm. Radius, die engen Röhren 0,15 bis 0,40 Mm. Radius, so dass 4-5 Cb. C. Flüssigkeit zu einem Versuche hinreichten. Je enger die engeren der beiden Röhren waren, desto grösser war der Unterschied des Niveau's in beiden Röhren und desto höher schien auch die Genauigkeit des Resultates sein zu müssen; aber erstens war es schwerer, engere Röhren ganz cylindrisch zu erlangen, und wenn sie es waren, sich davon zu überzeugen, als bei weiteren; zweitens wird die Bewegung in engen Röhren um so langsamer, je enger sie sind, und zwar in einem weit rascheren Verhältnisse als die Halbmesser selbst, und das Gleichgewicht stellt sich wieder später ein und kleine in der Flüssigkeit schwimmende Theile wirken weit störender ein als in weiteren Röhren, so dass ich es oft vorzog, mich innerhalb jener Grenzen der weiteren Röhren zu bedienen. Die Weite des weitern Armes hat keinen so beträchtlichen Einfluss auf die Genauigkeit der Resultate, dass man darin durch Vermehrung derselben viel gewinnen könnte; dagegen war bei weiteren Röhren weit mehr Flüssigkeit nothwendig, und sie nahmen die Temperatur des die Glasröhre umgebenden Bades weit langsamer an. Es ist sogar zuweilen

406 Frankenheim u. Sondhauss, üb. d. Capillarität zweckmässig, selbst die weite Röhre nicht über 1—2 Mm. weit zu nehmen.

Bei der Calibrirung der weiten Röhren ist zwar eine ängstliche Genauigkeit unnöthig, da Febler selbst von 0,1 Mm. im Durchmesser von keinem den Beobachtungen nachtheiligen Einflusse waren, indessen betrug bei unseren Röhren der Irrthum gewiss nie 0,02 Mm. Bei engeren Böhren haben wir die Genauigkeit zu erreichen gesucht, welche man durch Auf- und Abführen eines etwa 20-30 Mm. langen Quecksilbersäulchens und wiederholtes Abwägen einer die Röhre beinahe füllenden Quecksilbersäule erlangen kann. Es wurden nur diejenigen Röhren beibehalten, welche innerhalb der wenigen Millimeter, zwischen denen das Niveau in der engen Röhre während einer ganzen Beobachtungsreihe zu schwanken pslegt, keinen merklichen Unterschied in ihrer Weite hatten und sich unter einer starken Loupe vollkommen kreisförmig verhielten. Das Verfahren, das ich bei der Reduction der einzelnen, bei der Calibrirung einer Röhre angestellten Beobachtungen angewandt habe, bietet einige Eigenthümlichkeiten dar, die ich bei einer anders Gelegenheit bekannt machen werde.

Die heberförmige Glasröhre wurde in dem Deckel einer Wanne so besestigt, dass die untere Krümmung 20—40 Mm. über dem Boden stand und die oberen Arme etwas aus dem Deckel hervorragten. Ansangs bediente ich mich einer hölzernen Wanne, die etwa 185 Mm. lang, 80 Mm. breit und 170 Mm. hoch war, also etwa 2½ Kilogr. Wasser saste. Auf den zwei grösseren Seiten waren zwei Fenster von Spiegelglas von etwa 94 Mm. Höhe und 68 Mm. Breite eingekittet. Diese Dimensionen waren nothwendig, weil man zwischen den Armen der Heberröhre ein Thermometer einstellen wollte, zwei andere an den beiden Seiten, und beides, Thermometer und Röhren, 30—40 Mm. von den Wänden der Wanne entsernt bleiben sollten. Durch die Fenster konnten selbst beim Wasser, das am höchsten aussteigt, die Oberstächen der Flüssigkeit in beiden Schenkeln übersehen werden.

Die Wanne wurde mit Wasser, oder für Temperaturen, die unter O° herabgingen, mit einer Salzlösung gefüllt, so dass die Röhre von der Flüssigkeit des Bades noch beträchtlich über das Niveau der Flüssigkeit in ihr selbst umgeben war.

Des Bad wer held kälter als die Luft, hald wurde helsses Wasser eingagossen. In beiden Fällen liess man das Wasser sich illmählig an der Luft, erwärmen oder abkählen. Bei der beitutenden Masse der. Flüssigkeit änderts sich die Temperatus, wenn die Bissenz zwischen den Temperaturen der Badelüssigkeit und der Luft gewisse Grenzen nicht überschritt, so langum. dags : man bequem heebachten kinnte. Durch einen fast bei jeden: Benbachtung :.in Besvegung gesetzten: Rühner ..wurde :die Fostpecatur der Flüssigkeit des Bades so gleichfürmig erhalten, des amen es hald unsöttig fand, mehr als ein Thermuneter mu bochachten. ... Der Rührer bestand in einem möglichet genaden hininantalan Blenbetreifen, der an zwei ehrke, derchiden Dockel gthander Dnibte: befestigt, war. The and the same of the test water ng dan siniges Fällen, we wis eine böhert Atmessatur all 100° man erreichen eränschten, bedienten! win una eines Budes was tool; shor die Oele, die uns zu Sebote standen, fürbten sich / bald ino stark; deed die Beebachtung äusserst bescharerläch wertedes loh: worde künftig. die restificirte Schweseleigure anwenden , die **Temporal in Acal ihrom : Siedopuboto naben Temporal uren : durch : ibaş** Ansdüngtungen lästig werden mag, aber für letwas niedsigere Samperaturen ein ganz passendes Bad bilden wird. 😅 🦠 🗀 🚈 Will You diesem Apparate, der uns bei allen Versuchen diente, weight Sondhauss in seiner Abhandlung sine Abbildung geleben unlich halte on für unnöthige diese hier wiederholdn zu biograficierali, ich mich späler "eines einfachers und zweckmäst igern Apparates bedient babe. : Statt der Holzwanne nicht ich inan i ractangularen i Kasten von Glas, der 130-170 Mm. hoch, Man. Sproit und stwa 50 Mm. tief war, ... Die beiden Haupts johon maren möglichet shen, die anderen Flächen und die Kainma: abgenundstad Die Atme, der Heberröhren werdn micht; mie p. dog bölzernen Wanne, 40-50 Mm. von einandebuentfennt, melasa dagan diebt an einander, was die Rechastungsmin mekkt sebor/Brziehung erleichterte, und mir verstetztes: mehrere Historplana zungleicher Zeit in das Bed zu stellens Bie Rühren bved seconder Construction, erhielt dia: Temperatur ateun mo gistoba ormica data man sich auf ein in der Mitto dets Deckels desects istes Phyropemeter beschränken konntel Diese Glaswanne mind preinam: Sandbade : welches: durab reina: Argand'schamWeint inistisumonerhitst words. A date apartomade sub axis with him

408 Frankenheim u. Sondhauss, üb. d. Capillarität

Die Thermemeter konnten zwar, da ihre Scalen von einem Slasrohre umgeben waren, nicht unmittelbar durch Abtrennen einer Quecksilbersäule calibrirt werden, ich hatte sie aber mit einem andern, bei dem dieses geschehen konnte, sorgfältig verglichen und Siede- und Gefrierpuncte von Zeit zu Zeit bestimmt.

'Der Stand der Flüssigkeit in den Heberröhren wurde gemessen durch einen perpendicular stehenden Maassetab, desses Nonius 0,01 Mm. abschätzen liess. Er befindet sich an einen mit Bleiloth und Stellschrauben versehenen Gestelle und wurde immer genau senkrecht gehalten. An dem Nonius war, zwischen zwei conischen Spitzen, ein kleines Fernrohr angebracht, das auf die etwa 200 Mm. entfernten Röhren eingestellt wurdt Indem man das Fernrohr etwas um die durch die Spitzen gehende Drehungsaxe bewegte, konnte man in dem alten Apparate auf beide, etwa 40-50 Mm. von einander entformte Arme des Heberrohres visiren, und in der Glaswanne nach und nach auf mebrere gleichzeitig im Bade befindliche Heberröhen. In dem ersten Falle musste eine nicht unbefrächtliche Correction von etwa 0,2 Mm. bei der Reduction der Beobachtungen mgewandt werden, weil sich des Fernrohr nicht genau is der horizontalen Ebene bewegte und daher die optische Axe desselben an den beiden Enden des Bogens, um die es gedreht wurde, auf böher und niedriger gelegene Puncte hinwies als in die Mitte. Diese Correction wurde vor jeder Versuchsreite durch einen kleinen Hülfsapparat bestimmt.

ħ

Dieser bestand in einer Glasplatte von etwa 150 Mm. Linge und 50 Mm. Breite, auf welcher, den langen Seiten parallel, mit dem Diamanten ein paar Linien gezogen waren, durch perpendiculare Linien in Stücke von 20 Mm. getheilt. Die Plate stand auf einem Fusse mit Stellschrauben, so dans die gresse Linien nahe herizontal gestellt werden konnten. Diese Schiebe wurde in dieselbe Entfernung vom Fernrohr gebracht, in welche in den Versuchen über die Synaphie die Heberröhren kommen schliten. Man las nun die Höhe zweier 40—80 Mm. entferster Puncte einer und derselben auf der Tafel gezogenen herizontalen Linie an dem perpendicularen Maaesstabe ab. Diese Höhen musten einander gleich sein, wenn die Linie genau horizontal wat und die Axe des Fernrohres sich in einer genau herizontalen

der flüssigen Körper bei verschied. Temperaturen. 409

Ebene bewegte. Um sich von der genauen Einstellung der berizontalen Linie zu überzeugen, drehte man das Glas um, so dass die bisher auf der vordern Seite der Scheibe befludlichen Linion jetzt durch das Glas hindurch auf der entgegengesetzten zu sehen waren, und stellte sie von Neuem mit Hülfe der Libelle ein. Waren die Linien vollkommen horizohtal, wenn der Fuss der Scheibe, auf dem die Libelle stand, genau eingestellt war, so mussten beide Stellungen dasselbe Resultat geben. Dieses war der Fall zwar nicht, aber zwei Beobachtungen auf der vordern und zwei auf der Rückseite waren hinlänglich, um sowohl die Abweichung der Linien von der horizontalen Bichtung, als die Abweichung der Axe des Fernrohres von der Mittelrichtung zu bestimmen. Jetzt wurde der Hülfsapparat weggenommen, die Wanne mit den Röhren an seine Stelle gesetzt tad die an dem Hülfsapparate gefundene Correction auf die Dimensionen der Röhren reducirt und bei jeder einzelnen Beobachtung angebracht.

Dieser Apparat war in den späteren Versuchen, wo die beiden Arme der Heberröhren sich berührten, zwar überflüssig, aber weil er doch noch in mehreren Versuchen benutzt wurde, und in anderen Untersuchungen, bei welchen der perpendiculare Maasestab mit seinem beweglichen Fernrohre dienen soll, nothwendig ist, habe ich ihn hier nicht übergehen wollen.

Die Anwendung der Heberröhren ist für Versuche, die in einem kaken eder warmen Bade angestellt werden sollen, unerlässlich. Aber auch bei der Temperatur der Lust hat sie bedeutende Vorzüge vor dem gewöhnlichen Verfähren bei Haarröhrehen. Dieses besteht bekanntlich darin, dass man die zu untersuchende Flüssigkeit in ein weites Geffes giesst, die Haarröhren hineinstellt, die Obersäche der Flüssigkeit in dem Ge-Mase, wie in einigen Gefässbarometern, mit einer durch eine Mikrometerschraube bewegten Spitze in Berührung bringt und dann die Höhe der Flüssigkeit in der Röhre durch eine passende Versichtung abmisst. Allein erstens bietet eine Spitze, die man an die Oberstäche einer ganz in Rube besindlichen Flüssigkeit bringen will, niemals die Genauigkeit dar, die man durch Ableson erreichen kann. Zweitens wird die Temperatur der Flüssigkeit im Haarröhrchen, das durch kein Bad geschützt ist, durch die Nähe des Beobachters verändert, und 0,1° C. bringt

her guten Begbachtungen schop einen merklichen Veterschied hervor. Auch hat unser Apparat den Vorzug, dass man mit siper weit kleinern Quantität Flüssigkeit arbeiten kaun und, wenn man die weite Böhre durch einen Kock leicht schliesst, salbst sehr leicht vandamplande oder sehr eterk riechende Flüssigkeiten lange Zeit hechenhen kann, ohne dass die Verdamplang stürend gewesen würs.

Bei allen in dieser Abbandlung mitzutheilenden: Wersuchen sollte nicht die Anzichung der Theile der Flüssigkeit zu deren des Gefägses, sonderp, ihre Symphie, d. h. die Anzichung der homogenen Theile gagen einender heetimmt werden. He was deher eige vollständige Benetzung, des Posässes unungönglich nothwoodig. Wolfe mon o. B. die Synaphie des: Wassers: he. stimmen, so musste man die Wände der Röhre, so weitunk auf das Wasser einwicken könner, mit Wasser arskleiden, und in dieser Wasserrühre steigt denn das Wasser auf und nimm die Gestalt an, die aus seiner Anziehung nicht zum Glass seiner dern zum Wasser selbst entspringt; Vollkommen neinem Glas und Metall beweizen sich sehr, leight mit Wasser, sher filet und Metall, dessen Oberskoha man mit dem Kinger berüht batte oder das selbst nur eine Zeit lang frei dem Einfuse der Atmosphüre unserer Zimmer eusgeseist war; hat seine leisbie Benetzbarkeit mehr oder weniger eingebüsst und kunn sie nur nach milhsamem Rejnigen durch chemische oder meghanischer Mittel wieder erlangen. Sie hat sich offenhar mit einer dünnen Schieht eines fremden Körpers hadeckt, die so stark, haltet; dass sie sieb night-durch bigsses Abwaschen mit Wasser optforgen Maste Sie ist weder mit dem Auge noch durch chemische Reagenties an erkennen, aber ihre Axistenz ist durch eine Mongo von Bischeinungen hinlänglich erwiesen. Hine micha Schicht ist Mi welche in dem Galuanismus sing so wichtigg. Bolla spielt, die Ladungaphänomene hervorbringt und die sogenannte Bassinie tät, indem sie das Kisen und andere Mstalle, von der Kinnikkung einiger Elüssigkeiten schützt, yon welchen ind wenn the Oberfläche ganz rein ist mit Kraft, angegriffen wird. ... Webs scheiglich führt such der Widerstand, den die Kitektnisität beit Unhergange zaviachan, pinam Metalla, und pines dannihe midt auflösenden flügsigkeit orfährt "unpreder Aildung: eiger molches signisht her a welche night soweld and die leitung homesal

wirkt, als dadurch, dass sie einen entgegengesetzten Strom hervorbringt. In diesen Fällen ist die Schicht sogar oft deutlich zu erkennen. Aber bei den Versuchen über Synaphie kann man bei der sorgfältigsten Betrachtung eines schon gebrauchten Stückchens Glas nicht sehen, was die Benetzung so sehr erschwert, während dasselbe Stück früher sich sehr leicht benetzte.

Man muss daher die Röhren sorgfältig vor jeder Verunreloigung bewahren und namentlich niemals mit dem Munde
hineinblasen, weil sich sonst das Innere der Röhre unvermeidlich mit einem fremden Körper verunreinigt. Man kann ferner
die Röhre nie ein zweites Mal anwenden, selbst wenn man dieselbe
Flüssigkeit bineinbringen will, ohne sie vorher sorgfältig gereinigt zu haben. Dieses ist aber nur bei der weiten Röhre möglich, die enge Röhre kann selten mehr als einmal gebraucht werden, und einige Male, wo ich die verhältnissmässig grosse Mühe,
welche das Calibriren der engen Röhren und die Bereitung der
Heberröhren verursacht, vermeiden wollte und eine dem Anscheine nach vollkommen reine Röhre zum zweiten Male anwandte,
wurden die Resultate so unregelmässig, dass ich mehrere, sonst
mit aller Sorgfalt angestellte Versuchsreihen gar nicht benuzzen konnte.

Bei Versuchen, die, wie es bei den unsrigen der Fall war, längere Zeit hindurch und bei höheren Temperaturen angestellt wurden, muss man die Flüssigkeit in den engen Röheren oft in Bewegung setzen, damit die ihrer Obersläche nahen Theile der Röhre immer gut benetzt sind, weil sie sonst hier austrocknen und dem Steigen der Flüssigkeit einen grossen Widerstand entgegensetzen würden. Dieses geschieht entweder dadurch, dass man die Röhre neigt, oder am einfachsten, indem man mit dem Finger auf die Obersläche der weiten Röhre drückt, wo dann die etwas comprimirte Luft die Flüssigkeit in der engen Röhre in die Höhe treibt.

Bei chemisch einfachen Flüssigkeiten, die als Ganzes verdampfen, wird durch die Verdampfung die ganze Flüssigkeitsmenge vermindert und das Niveau sinkt. Dieses geschicht aber selbst bei Temperaturen, die dem Siedepuncte nahe stehen, so langsam, dass die Beobachtungen darunter nicht leiden. Wenn die Flüssigkeit aber, wie es bei dem verdünnten Weingeiste, dem Kali und den Säuren der Fall war, gemischt ist und nicht

412 Frankenheim u. Sondhauss, üb. d. Capillarität

als Ganzes verdampft, so muss sich in den Röhren eine von der übrigen Masse in ihrer Zusammensetzung allmählig sich ändernde Schicht bilden, bei den Weingeistlösungen eine mehr verdünnte, bei den Salzlösungen u. dgl. eine mehr concentrirte. Dieses ist besonders bei der engen Röhre der Fall, wo die Flüssigkeitsschichten, selbst wenn sie dem spec. Gewicht entgegen gelagert sind, sich nicht mischen können. Ich habe bis Jetzt über die Veränderungen in der Capillarhöbe, die aus dieser Ursache entspringen können, keine directen Versuche angestellt, und auch die Mathematik hat sich bis jetzt noch sicht damit beschäftigt. Wenn man aber die Gesetze, welche bei der Uebereinanderlagerung von zwei nicht mischbaren Flüssigkeiten stattfinden, mit den nothwendigen Abänderungen auf den Fall überträgt, wo die Flüssigkeiten mischbar sind, ehe die Veränderungen im spec. Gewicht und die Synaphie alimählig eintreten, so dürste die Veränderung, welche durch die Verdampfung von Auflösungen in dem Werthe der mittlern Höhe eintreten kann, nicht sehr bedeutend sein. Um sie möglichst zu vermindern, muss man die Flüssigkeit in der engen Röhre östers auf und abführen, von Zeit zu Zeit einige Tropsen aus der Oeffnung der engen Röhre austreten lassen und dadurch die Oberfläche erneuern. Uebrigens kann man leicht durch Vergleichung der Versuche, die in einer und derselben Beobschtungsreihe und bei einer gewissen Temperatur theils bei der Erwärmung der Flüssigkeit, theils bei der Abkühlung angestellt sind, erfahren, ob die Verdampfung von bedeutendem Einflusse gewesen ist oder nicht.

Bei den gemischten Flüssigkeiten scheint noch eine andere Störung einzutreten, welche man nach der Analogie der bekannten Erscheinungen bei Gasgemischen Diffusion nennen könnte und bei Gips, Thon, Membranen, Spalten im Glase, kurz überall beobachtet hat, wo sich eine Flüssigkeit durch sehr enge Oefnungen bewegt, und die sich auch bis zu einem gewissen Grade bei jeder Oberfläche finden wird, über welche sich eine solche Flüssigkeit bewegen muss. Sie besteht in einer Trennung der Bestandtheile der Flüssigkeit, welche durch die Oeffnung in einem ganz andern Verhältnisse durchgehen, als sie ursprüsglich hatten, und zwar in allen bisher beobachteten Fällen, so dass die Flüssigkeit von grösserer Synaphie, als in den wässrigen

Lösungen das Wasser, in verhältnissmässig grösserer Quantität hindurchgeht als der Alkohol oder das Salz. (S. in meiner Cohäsionslehre den Abschnitt über Diffusion der Flüssigkeiten, S. 231 ff.) Etwas Aehnliches tritt nun auch allem Anscheine nach in Haarröhren ein, indem die dem Glase anhaftende und insbesondere die von der Obersläche aus an den Wänden sich hinanziehende Schicht sich in ihrer Zusammensetzung beträchtlich von der Hauptmasse der Flüssigkeit unterscheidet. Viele Erscheinungen, die ich schon früher (a. a. O. S. 79) beschrieben habe, deuten auf eine solche Ursache hin. Auch hier bleibt häufige Bewegung der Flüssigkeit das beste Mittel, die Zersetzung zu verhindern. Dasselbe gilt auch für die Flüssigkeiten, welche, wie z.B. Aetzkalilösung, eine chemische Veränderung an der Luft erleiden. Je nothwendiger aber die Bewegung der Flüssigkeit in der engen Röhre ist, desto weniger zweckmässig ist es, diese zu enge zu nehmen; man muss sich daber besonders bei schwer fliessenden und sich leicht zersetzenden Flüssigkeiten so weiter Röhren bedienen, als es die übrigen Bedingungen des Versuches zulassen.

Wenn die Flüssigkeit dem Siedepuncte nahe kommt, tritt eine andere Störung ein. Sie verdampft nämlich und schlägt sich in kleinen Tröpschen an dem obern kältern Theile der Röhre nieder. So lange die Röhre nicht verstopst ist, ist der Dampf der Beobachtung eher förderlich, weil er die Wände der Röhre beständig im feuchten Zustande erhält. Wenn aber die Temperatur steigt und die Verdampfung zunimmt, so sammeln sich die Tröpschen an einem ausserhalb des Bades liegenden Puncte zu einer kleinen Säule, welche die Röhre schliesst, die Lust zwischen ihr und der Hauptsäule absperrt und ihr, wenn diese steigt oder fällt, erlaubt, einen von der Temperatur der Zussern Luft abweichenden Druck anzunehmen. Diese Tropfen legen sich vorzüglich gern an kleine Unebenheiten im Glase und an Verunreinigungen an, die, so lange sie ganz ausserhalb der Flüssigkeit blieben, ganz ohne Nachtheil waren. Sie bilden sich auch um so leichter, je grösser das aus dem Bade heraustretende Stück der Röhre ist, und man muss diese daher so kurz machen wie möglich. Man kann nun die Tröpschen zwar, selbst wenn man sie nicht sieht, an der geringern Beweglichkeit der flüssigen Säule erkennen und dann leicht be-

414 Frankenheim u. Sondhauss, üb. d. Capillarität

seitigen, aber sie bilden sich dann bald an denselben Stellen wieder und machen es unmöglich, die Synaphie einer Flüssig-keit bis an ihren Siedepunct zu verfolgen.

In der hölzernen Wanne, wo sich das Bad allmählig an der Luft erwärmte oder abkühlte, wurde fast ununterbrochen beobachtet, so dass oft auf den Zwischenraum von 2 Graden mehrere Beobachtungen kamen. In dem Glasapparate waren die Beobachtungen weniger häufig, aber genau, indem ich durch Regulfrung des Feuers die Temperatur einige Minuten lang ganz constant zu erhalten suchte und dann bis auf einen andern Grad schnell abkühlen oder erwärmen liess. Indessen war, wie zu erwarten war, das Resultat in beiden Fällen im Allgemeinen dasselbe.

An der Heberröhre wurden gewöhnlich 3 Puncte abgelesen, die der concaven Durchschnitte der beiden Flüssigkeitssäulen mit den Axen des engen und des weiten Rohres, und der Kreis, in welchem die weite Röhre oben von der Flüssigkeit berührt wurde. Man erlangt also 3 Data, von denen je zwei hinreichten, die Grösse der Synaphie zu bestimmen. Aber in der Bestimmung des Meniscus war der Beobachtungsfehler, besonders in unseren alteren Versuchen, sehr bedeutend, indem beide Flächen lange nicht so scharf bestimmt werden konnten als in der engen Röhre. Die Berührungslinie zweier Oberslächen ist ihrer Natur nach nie so scharf abgeschnitten als die Oberstäche gegen die Luft, und dann bietet das Licht, welches durch die Glastöhre und den Meniscus in einer perpendicular auf der Axe stehenden Richtung geht, so eigenthümliche Erscheinungen dar, dass man bei der Beobachtung die eigentlichen Grenzen des Meniscus leicht verfehlte, selbst wenn man durch ein mattes Glas die falschen Bilder der äusseren Gegenstände vermieden hatte. Diese Störungen, welche bei aller Sorgfalt nicht ganz zu beseitigen sind, haben jedoch nur einen geringen Einfluss, wenn man die Synaphie aus der Disserenz der Flüssigkeitssäulen ableitet.

Hierbei wurde vorausgesetzt, dass beide Röhren vollkommen cylindrisch sind, eine Bedingung, welche weder bei den weiten noch bei den engen Röhren vollkommen erreicht sein kann. Bei den weiten Röhren konnte jede Abweichung, welche auf die Beobachtungen von Einstuss sein konnte, leicht vermie-

ded worden. Von den eigen Röhren waren zwar nur solche, tagewantly bot denen sich, wenn mab sie unter einer statken Loupe um ihre Axe drehte, keine Abweichung von der Cylinderivertalt suffinden fless; es kouste aber recht wahl ein Ubterschied bleiben, der, ohne durch die Loupe kenntlich zu sein; dennech auf die Beobichtungen einen merklichen Einstes übte. Für alle Untersuchungen über dem absoluten Wetth der Synnphie sind daher die Haurröhrchen, wenn man sieht nicht unter einem guten, mit Mikrometer versehenen Mikronkops: von ihrer Cylinderform überzeugt oder die Eresse der Abweichung kennen gelernt hat, nicht zu empitehten, seinst meine sorgfältig ausgewählten Röhren zeigten beim Wasser Unterschiede, die bis auf 601 des Ganzen stiegen: Da Adliksionsplatten nicht nu empfehlen sind, so könnte man entweder das ven Gauss vergeschlugene Verfahren anwenden Princip, generi Cheoriae fulderist pi 53), mimlich die Messung von grossen Duftbiesen invelnent mit einem beinahet flachen Deckel geschlossenen Geralie, went man nur die Schwierigkellen, welche hier wie bei der Bestimmung des Meniscus eintreten; ganz zu beseitigen wells; eder man komite die Phisbigkeit zwischen Zwel vollhominen behetzten Plangläsern aufsteigen lassen deren Entform nung mani durch eine angemessene meellasische Vorrichtung Bensit messer und nach Belieben sbändern kann. 6 Wenn man justoth blos die relative Grösse der Synaphie Anden will, se bieten gehörig ausgewähke Haarröhren eine grosse Bequemlichkelt und auch wohl grössere Genauigkeit dar als jeder and dére Apparat. Hat man-z. B. den Stand des Wassers in ches Röhre beobachtet, so kann man, du das Wasser sich leicht entfernen lässi, ohne die Röhre für spälere Versuche unbrauchbar zu michen, eine andere Plüssigkeit nehmen und ihre Quani titet do wählen, dass sie ungefähr zu derselben Höhe aufstelgt Wie das Wasser. In diesem Falle lernt man aus dem Unterschiede des Niveau's die relative Synaphie der Müssigkeiten im Verhältnisse zum Wusser kennen, und ist auf eine der oben angegebenen Verfahrungsarien die absolute Synaphie des Wasstribatekunt, sv. kann mun die der anderen Flüssigkeiten darand bereeknen'.

Bei unserer Arbeit wollten wir nun nicht die absulute, studern dur die relative Symphie einer Plansigkeit in verschieden

416 Frankenheim u. Sondhauss, üb. d. Capillarität

nen Temperaturen bestimmen, und obgleich wir, um die Reductionen richtig anwenden zu können, die Durchmesser der Röhren annähernd kennen mussten, so hatte doch eine geringe Abweichung der engen Rühre von der Form eines Cylinders gar keinen Einfluss auf die Richtigkeit der Resultate.

Wenn eine cylindrische Röhre von dem Radius r in einem so weiten Gefässe steht, dass man die Capillarität desselben vermachlässigen kann, und a ist die mittlere Höhe der Flüssigkeit, so ist bekanntlich

D = ar

eine von der Weite der Röhre unabhängige Grösse.

Aber diese mittlere Höhe ist nicht die Höhe eines der Beobachtung unmittelbar zugänglichen Punctes, sondern kann nur
durch Rechnung gefunden werden. Es ist nämlich die Höhe
eines Cylinders, dessen Gewicht dem der wirklich vorhandenen
Säule gleich ist. Diese Säule besteht aus einem Cylinder und
einem Meniscus, d. h. dem Theile der Säule, welcher von sinem den niedrigsten Punct der Oberstäche berührenden herisentales Querschnitt begrenzt wird.

Des Volumen und die Gestalt des Menisous ist im Algemeinen eine Function von dem Halbmesser (r) und der Sysphie (D). Diese Function beruht aber auf einer sehr schwistigen Integral-Gleichung, welche die Mathematiker bis jetzt zu in den beiden einfachsten Fällen aufgelöst haben, erstens wens die Röhre sehr eng, eine sogenannte Haarröhre ist, so dass zu die zweite Potenz ihres Halbmessers gegen die erste vernachlässigen kann, oder zweitens, wenn sie so weit ist, dass ihr Querschnitt sehr gross wird im Verhältsisse zu D.

In dem ersten Kalle, bei engen Röhren, kann man die Oberstäche für eine Halbkugel nehmen. Das Gewicht des Meniscus ist daher gleich dem einer Säule, deren Basis dem Querschnitt der Säule gleich ist und deren Höhe $= \frac{1}{8} r$ ist. Seist man nur die Höhe des niedrigsten Punctes der Oberstäche = h, so ist die mittlere Höhe $= h + \frac{1}{8} r$ und

 $D = r(h + \frac{1}{8}r).$

In dem zweiten Falle ist die Function weit verwickelter. Die von Laplace (Supplem. à la théorie de l'action capillaire p. 66) und nach ihm, jedoch ohne etwas Neues hinzuzusügen, von Poisson (Neuvelle théorie de l'action es-

r flüssigen Körper bei verschied. Temperaturen. 417

laire, p., 224) gegebenen Formeln habe ich in folgende für "Rechnung möglichst bequeme Form gebracht.

m Niveau in einem weiten Gefässe.

K die Höhe des Berührungskreises der Röhre und der üssigkeit.

Also M = K - H die Höhe des Meniscus.

R der Radius der Röhre.

m und a zwei Hülfsgrüssen, so dass

 $a = \sqrt{D}$

m = 1,414.a + R,

ist

K = a + 0,305. a^2 : R,

* Eog. H=0,579 + Log. a + Log. m - 1,228.

"Ich habe diese Formeln für eine Beihe von Werthen von und D berechnet und gefunden, dass sie keineawegs immer t den Beobachtungen übereinstimmen. In Röbren von 5-6 Mm. dius ist der Unterschied zwar bei den Flüssigkeiten, deren naphie klein ist, nicht sehr bedeutend; aber bei dem Wasser icht die Rechnung von den Beobachtungen weit mehr ab, als Beobachtungsfehler betragen können, und dieses war zu warten, weil hier die Bedingung, auf welcher die Kormeln raben, nämlich der hohe Werth von D im Verhältniss zum ierschnitt, am wenigsten erfüllt wird. Ich habe daher Benken getragen, die Correction nach den Laplace sehenken getragen, die Correction nach den Laplace sehenrahren einzuschlagen, das nach den Original – Beobachtunn; verhessert, werden kann, sobald die Mathematik ihre Aufben gelöst, haben wird.

Eine andere Lücke in der mathematischen Entwickelung trifft die Neigung, der weiten Röhre. Die mittlere Höhe ist var von der Neigung unabhängig, aber die Gestalt des Meteus hängt von dem Neigungswinkel in hohem Grade ab, und würde die Beobachtung in mehreren Fällen sehr erleichtern, ein die Correction, die dann anzuwenden ist, genau bekannt äre.

Bei der Reduction der Beobachtungen verfuhr ich folgenermaassen: Gewöhnlich waren mehrere Beobachtungen inner Journ. f. prakt. Chemie. XXIII. 7. 27

418 Frankenheim u. Sondhauss, üb. d. Capillatität

balb eines kleinen Temperatur-Intervalis, z. B. von 1°C., angestellt; aus diesen nog ich das Medium und betrachtete sie als eine Beobachtung. Ich berechnete dann aus den Ablesungen an der weiten Röbre die Höhe des Meniscus (M), wobei ich berücksichtigen musste, dass die Beobachtungsfehler fast ausschliesslich in einer Verminderung seiner Höhe bestehen; ich nahm dann seine krumme Oberfüsche als halbes Sphäroid, das die Wände der Röhre tangirte und von der wahren Gestalt nur sehr wenig abweichen kennte, und setzte daher:

$$D = \frac{rR}{R-r} (h - H + \frac{1}{8}r - \frac{1}{8}M)$$

$$= \frac{rR}{R-r} (h - K + \frac{1}{8}r + \frac{2}{8}M),$$

4

: M

1

10

je nachdem die untere oder die obere Grenze des Meniscus genauer beóbachtet zu sein schien.

Bie einzelnen Werthe von D wurden dann in einem hinlänglich grossen Maassstabe auf ein Netz gezelchnet, so dass die Temperatur (1) die Abschsen und D die Ordinaten bildete. Biese gebrochene Linie wurde dann durch Beseitigung der schrofen Uebergänge in eine stellge Curve verwandelt, wobel jedoch auf den Werth der einzelnen Beobachtungen, ob sie z. B. nur auf einer Ablesung beruhten oder das Medium mehrerer waren, die gebührende Rücksicht genommen war. Biese graphische Methode glaubte ich hier, wie in mehreren anderen Beobachtungsreihen, z. B. denen, die zur Calibrirung einer Röhre die wen, dem gewöhnlichen Verfahren vorziehen zu Türfen, wo mat ingend eine Interpolationsformel, etwa

D=A+Bt+Ct2+Df3,

kleinsten Quadrate, oder gar, was zwar ganz verwerslich is, aber dennoch oft geschieht, aus einzeln willkührlich herausewählten Beubschtungen berechnet. Nur wo das Gesetz bereit bekannt ist, die Formel also nicht blos eine mathematische Retion ist, wie z.B. bei der Bereehmung einer Kometenbahn, blete jehes Versahren eine höhere Wahrscheinlichkeit dar, obgleich wich hier die graphische Methode als erste Amaherung von Nutzen ist. Aber wo gar kein Gesetz vorhanden ist, wie bei der Calibrirung von Röhren, oder wo man das Gesetz erst sinden will und man nichts von ihm kennt als eine Anzahl Be-

der flüssigen Körper bei verschied. Temperaturen. 419

obachtungen, deren Fehler eine gewisse Grenze nicht leicht überschreiten können, und dass es keine plötzlichen Uebergänge zulässt, wie es bei dem Einflusse der Wärme auf das spec. Gewicht, die Elasticität des Dampfes, die Synaphie der Fall ist, da bringt man durch eine solche aus 3 oder 4 Gliedern bestehende Formel nur constante Fehler in die Beobachtungen kinein. Dass übrigens einige Physiker solche Interpolationsformeln für den mathematischen Ausdruck eines Naturgesetzes halten und gar Maxima und Minima herausrechnen, die weit über die Grenzen der Beobachtung hinausgehen, darüber muss men sich wirklich verwundern.

Waren der Beobachtungsreihen mehrere, und dieses war fast immer der Fall, so construirte ich die jeder einzelnen Reihe angehörige Curve und nahm aus allen die mittlere Richtung, indem ich wiederum auf die Güte der Beobachtungen Rücksicht nahm, was sich hier eben so leicht und vielleicht noch etwas weniger willkührlich thun lässt als bei der üblichen Rechnungsweise. Auf diese Art erhält man für jede untersuchte Flüssigkeit eine Ourve, aus der ich die Werthe von D für die solgenden Tabel-len unmittelbar abgelesen habe.

In den Tabellen habe ich folgende Grössen berücksichtigt, welche mir für die Cohäsion der Flüssigkeiten von Interesse zu sehr schienen.

- (Ann. de Chim. et de Phys. 1839. LXX.), für Alkohol, Acther, Schwefelsäure, Schwefelkohlenstoff nach Muncke (Mémoires prisent. à l'Académie de Petersb. T. I. II.). Für die übrigen von mir untersuchten Flüssigkeiten fand ich keine Beobachtungen über die Veränderungen, welche das spec. Gew. durch die Wärme erleidet, vor. Ich hoffe, diese Lücke bald durch sine in meinem Laboratorium ausgeführte Arbeit ausfüllen zu köngen.
- 2) D ist die schon öfter angeführte Constante. Sie dräckt die mittlere Höhe der Flüssigkeit in einer Röhre von 1 Mm. Radius aus. Für jede andere Röhre von dem Radius $= \tau$ ist die mittlere Höhe $= D:\tau$.
 - 3) $N = \sqrt{2D}$ ist die mittlere Dicke der Schicht Flüssigkeit, welche im Moment des Abreissens an der Adhäsionsplatte

420 Frankenheim u. Sondhauss, üb. d. Capillarität hängt, hat also einen interessanten physikalischen Werth, der von der Grösse der Platte ganz unabhängig ist.

4) $M = \frac{Q}{m} \sqrt{2D}$ ist das, was ich (Cohäsionslehre S. 70) Gewichts-Synaphie genannt habe. Es ist das mittlere Gewicht, das die Adhäsionsplatte tragen kann, der Druck der Atmosphäre als Einheit genommen. Der absolute Werth des Gewichtes ist zwar der Grösse der Platte nicht genau proportional, indem durch die concave Obersläche der Flüssigkeit an dem äussern Umfange der Platte eine Correction nöthig wird; aber wie bei Haarröhren die Correction bei sehr engen Röhren immer mehr verschwindet, so wird die Correction bei den Platten immer

m ist = 10313 Mgr., der Druck einer Atmosphäre von 760 Mm. auf ein Quadratmillimeter.

der Grösse der Platte.

. .

kleiner, je grösser der Durchmesser wird. Das mittlere Ge-

wicht ist aber, auf Atmosphärendruck reducirt, unabhängig von

 $m: \varrho$ ist also die Hühe der Flüssigkeitssäule, deren Druck dem atmosphärischen gleich ist, und $M = \frac{\varrho}{i\hbar}N$.

Die Einheit von N ist also eine Linie, die von D eine Fläche, die von M eine blosse Zahl. Q ist eigentlich die Zahl der Milligr., welche ein Cubikmillim. der Flüssigkeit wiegt, also ein Gewicht.

Indessen habe ich von diesen drei Grüssen, ê, N, M, nicht den absoluten Werth bestimmt, sondern nur den relativen, wenn man den Werth bei 0°C.=1 setzt. Der absolute Werth wird zwar durch das von mir eingesehlagene Verfahren antiähend bestimmt, allein so lange die Correction, welche der Meniscus und die nie ganz fehlende Ellipticität der Röhre nöthig macht, nicht genau bekannt ist, kann man den Werth nicht so genau berechnen, als es die Ablesungen selbst gestatten würden. Auf die relativen Werthe bei verschiedenen Temperaturen hahen diese Correctionen aber nur einen sehr untergeordneten Kinduss. Diese relativen Werthe bezeichne ich nun durch e, D, Nu. M.

r flüssigen Körper bei verschied. Temperaturen. 1424:

I. Destillirtes Wasser.

Bei 0° ist $\rho = 1,0000$, D = etwa 15,42 bei 0°.

Memp 1	۷ - ۲	· •	74.7	7./		
Temp. (1,0000	D . 1,0000	<i>N</i> . 1,0000	<i>M</i> .		
5	1,0000	0,9876	0,9940	0,9940		
10	0,9999	773	886	886		
15	99 93	672	833	826		
20	9983	587	790	· 784		
25	9972	504	748	721		
30	953 .	417	703	663		
35	942	326	656	601		
40	9 25 :	288	612	539		
45	904	150	565 . ·			
i 50 :	882	_	517	406		
55	859		4.40	335 4: 344		
60	834	•		W 4 260 0000 0436		
65	808	768 :	•	54 54 183 654 4 51		
70	781	670	311	107		
75 . 75 .	751	565	255	1026 A 101		
89	721	470	202	0,8945 :: 1. 1. 1.		
85	. 689	375	152	3 - 867 mm. La		
···· · · · · 90	657	281	. 099			
194 to 194 95 is	624 .	185	047	5 206 m 100		
365 100	588 :	. : 090	: 8999	d. 624. od A 13		
973 Rochach	tet worde e	vizigobon	9 50 and -	-93,4°C., aber der		
				ormig, dass ich die		
• -			•			
ibelle bis 100 fortgesetzt habe, und zwar mehrmals wieder- k von Hrn. Dr. Sondhauss und mir, nur an den äusseren Gren-						
e der Temperaturen nicht öfter und daher etwas minden zu-						
rlässig. Die Tabelle ist unmittelbar den Beobachtungen enti-						
mmen und hat daher auch einige kleine Anomalien, die ich cht entfernen wollte.						
mc Tchilhaben aus begreiclichen Gründen die Temperaturen in:						
r Nähe des Maximums mit vorzüglichen Sorgfalt beobachtet;						
di theile da	ber die R	esultate vo	n Grad zu	Grad-mit. i ()		

प्रकार कर्णालक के किया है। जिस्सार का अस्ति के किया के किया के किया है। किया के किया के किया किया के किया के क

422 Frankenheim u. Sondhauss, üb. d. Capillarität

Tem	D.	· , N .	
- 2,8	5° 1,011	4 1,005	5
2,0	07	9 03	9
1,0	038	2 01	6
0,0	00	0 00	0
+ 1,0	0,996	8 .0,998	4
2	94	5 97	2
3 .	. 92	3 96	1.
4.	90	Q 95	0 .
5	87	8 94	0
6	85	8 91	9 .
7	. 83	8 91	7
8	81	5 9.0	6
9	79	š 89	T
10	. 77	88	ti.

Die Anomalie im spec. Gewicht wiederholt sich also in der Synaphie nicht. Diese nimmt stetig ab von der niedrigsten, selbst unterhalb des Gefrierpunctes gehenden Temperatur bis in die Nähe des Siedepunctes hinauf. Ja, die Zunahme der Synaphie mit dem Fallen der Temperatur scheint sogar unter 0° in einem sehr beschleunigten Maasse zuzunehmen. Indersen sind die Beobachtungen in dieser Temperatur nicht zahlreich genug, um über so kleine Dissernzen entscheiden zu können. Dass jedoch die Synaphie sich in niedrigen Temperaturen etwas rescher veränsert als in höheren, d. h. die Curve der D nach der Abscissenlinie hin atwas convex ist, geht aus den Beobachtungen mit grosser Wahrscheinlichkeit hervor. In höheren Temperaturen ist sie nahe geradlinig.

Die Curve der M dagegen hat eine schwache Cencavität nach der Abscissenlinie him.

Die Curve der Wist zwar der D nicht parallel, folgt aber allen ihren Krümmungen.

Das spec. Gew. ändert sich selbst in den höchsten Temperaturen der Tabelle langsamer als D, M und N. — Aber N tritt ihr: in raschem Verhältniss um so näher, je mehr die Temperatur steigt, und da die Synaphie der Temperatur nahe proportional ist, das spec. Gew. aber sich mit zunehmender Temperatur schnell verändert, so werden vermuthlich in einer die

insigen Körper bei verschied. Temperaturen. 428:

itze nicht sehr überschreitenden Temperatus die Werthe nicht stärker abseitzen als des space Gew.

II. Alkohol.

pec. Gew. == 0,8208 gegen Wasser im Maximum, etwa == 6,05 bei 0°.

1	emp. C	. e.	' D.	N.	. M.	· •
	06	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	,
		-	",	0,9954	•	•
	10	902	818	4: 908 .	811	•
	15	854	718	858	707	4.
	20	. 799	612	804	607) ·
	25	748	497	745	499	.*
		_		680		
	35	645	245	614	273	-
	40	598	118	545	156	:
	45	539	0,8974	473	028	
, .	50	486				
	55	434		317	•	
	60					in the second
	65	324				the month one
•• 7	70	268	259	087	423	in sin . But
	75	213	119		300.	, 2 s -

on Hrn. Sondhauss und mir, mehrere gut stimmende ntungsreihen zwischen Wund 76%, die über den Heppter Curven keinen Zweisel übrig lassen. Die Curve der der geraden Linie sehr nahe, doch scheint in höherer atur eine kleine Beschlausigung in der Abnahme von Deten.

ich M hat eine schwache Beschleunigung in seiner Abin höherer Temperatur.

berall, selbst in N, ist die Ahnahme der Synaphie stärdie des spec. Cowichtes.

III. Weingeist.

ec. Gew. = 0,9274 bei 0° gegen Wasser im Maximum, etwa = 6,70 bei 0°.

Temp. C. Q. D. N. M.

0° 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000
5 0,9956 0,9966 0,9858 0,9998

424 Frankenheim u. Sondhaws, ab. d. Capillahitat

```
on the Temp. Comerge well Distributed in the administration of the later
       10° 0,9913 0,9813 0,9906 0,9820
             870 718 858
828 625 811
                               730
       15
                               643
       20
    ** " 25 " " 784 " 1 530 " E768 " - 350 " 1 . 10 " 18
                   436 . 725 60,473 8775 8
             739
       30
           694 / 341 4 672 · 376:444
       35
       45
           10,601311 (154101)(56$5111 (1856)
       50 556
                   06413 5195 097 3
       55 510 0,8966 469 005
        605(4) 465 3 874 3 419 0,8915
        650 417 778 36917 823
        70 369 686 318 732
        75% 329 592 268 36 640 5
        80 275 506 2180 548.
```

Die Beobachtungen gehen voh 2° bis 76° und weisen ziemlich genau auf eine gerade Linie bin, d. h. die Veränderung der Synaphie ist der Temperatur nahe proportional. Indessen war diese Reihe von mehreren, die ich mit Weingeist von einem dem ebigen hahe stehenden spec. Gewichte angestellt habe, die regelmässigste.

```
sommers be sen species IV, Wringeister done & .ord on to
    -igispec. Gew. - 0,9867 bei 60,000 seins and de
 7365 D' tha = 8,80 bel Off Thom? welled now the land
    received treliping design also read Nin Maister of the
    0,998 0,989 0,995 0,992
    - 1 1/2 louise ut Occardina 998 at 1/48 a 1/988 at 1/989 at 1/2
                                                                               15
    anion obligation of the color o
                                                                                986 89 39 dol 969 ... 985 sob eth ... 12
                                               25
                                                                                982.5.42.27 .1963
                                               30
                                                                                                                                                          946
   mum on A at 35 and a
                                                                               979 - 17 d 1958 0 937 - 100 000
                                                                                                             06 co 953 07.929 avin
                                               40
                                                                                975
                                               45
                                                                                972 0,8971 948 981 grade
                                                                            1968 1 0900,194806 914°8
                                               RO(10) 1:
                                               5 909,99560,9480 0,4880 0.846
```

lingen Körper bei verschied Temperaturen 428

unis**Telip,** we disposite disposite din an ilmilar seid al cançei disposite de constitue de cons

Curven der Synaphie geben eine stürkere Cenvexität ie der Temperaturen, als bei irgene einer ahdern der runtersuchten Flüssigkeiten. Allein die einzelnen Bengen zeigten zu grosse Anomalien, als dass ich dieser einen andern als annähernden Werth zusprechen möchte. ie Veränderungen des spec. Gewichtes in höherer Tempeind bei den verdüngten Weingeisten nicht zuverlässig

```
obachtet ist zwischen, 1° und 76
             V. Essignther. 138
                                     () <u>{</u>
                     205
                                     CI.
ec. Gew. = 0.866,
                             705
                                     G:
= 6,10 bei 0 eiwa. 1188,0 $80
                                     6.3
                                     30
                                      35
                          Recharklet von - - 22 Dis
frei von Viese
                                            a !kohol.
15 9541 9768

ман ов м курэ тург мой мой ээрв ввО

20 9384 9687
            25 200 1980 ROTH 1 1
                   9045 9510 jed wold work
            30
            35
                          9419 o isd 01,6 :== 0
           ...40 /8704... 9328...
                                  Temp.
         10.45 800.853810,192860,1 °a
         vo 50 00 8318)
                          9118
         0,999(e8),9999(68,995 880~:
                                   で十
            \mathbf{60}_{-06}
                                   10
                   753
                                   15
               6.0
```

eobachtet wurde von —8,5° bis 264°.

zwei gut immensen Bedbachtongen war die stärkste ung der Gurve ber etwa 50°, Mdem die Abnahme der

486: Frankankcim w Sandhauss, üb.d. Capillarität

Synaphie hier schaell in eine bentichtlich grössere überging. Von hier aus näherte sich die Aurys sowohd bei der steigenden als der fallenden Temperatur einer geradengLinie. Indessen müssen die Einzelheiten an der Gestalt der Eurve einer neuen Untersuchung vorbehalten bleiben.

Die Veränderunges des spec. Gewichtes durch die Wärme sind beim Essigsther noch micht unteraucht und die Rubriken q und M fahlen daher. and the great angles Table 1991 -

VI. Aether.

Spec. Gew. = 0,737 bel.0°.

D etwa = 5,40 bel 0°.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Temp.	0e •	D.	N. 1	M.	• .
· ·	-5	1,0074	1,0221	1,0109	1,0189	:
	0	000	. , 000	000	000	
	+5	0,9924	0,9768	0,9883	0,9809	. • .
	10	851	534	766	620	
	. 15	777	305	645	430	
,	20	705	074	526	245	•
	25	632	0,8841	402	055	·
	30	559	608	277	0,8867	
•	35	480	379	154	678.	

Beobachtet von —6 bis 35°, Er war frei von Wasser und Alkohol.

Die Reihe weicht pur sehr wenig von der geraden Linie ab, und dieses sowohl hei D als hei M.

Das spec. Gew. ändert sich nur etwa 3/3 so stark als N.

VII: Schwefelkohlenstoff.

Spec. Gew. bei $0^{\circ} = 1,79,0^{\circ}$ D = 5.10 bei $0^{\circ} = 1,79,0^{\circ}$ D = 5,10 bei $0^{\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}$ 5° 1,006 1,016 1,005 1,010 0 00 00 00 00 +5 0,994 0,990 **0**,995 **2,**989 90 gir 10 80 75 79 15 **68** 80 ^{&8} 58 **20** 72 :id 75' obiger bildinger 25 wei gar 74 imaa 200 a 200 in 200 in 1824 in 1820 a car in last contract of the car in

artic militar de **35** art **60** art **31** graft 65 a co**260** articles.

obachtet von -5° bis 36°.

e unmittelbaren Broknehtungen mind weniger regelmässig anderen Fitissigkriten gewesen, indessen ohne Tendenz r bedeutenden Abweichung von der geraden Linie. Ich iher nur 3 Decimalstellen und in Nund Meine gleich-Abnahme angenommen. Der Schwefplkeblenstoff ist en von mir bis jetzt untersuchten Körpera der einzige, i das spec. Gew. sehneller abnimmt als der Werth von N.

VIII. Essigsäure.

ce. Gew. == 1,0468 bei 19,3°.

nige Versuche ergaben eine Abnahma in den Westben

und N, die derjenigen des Schweselhohlenatossen nahe

kam.

sch die Amelsensäure bat eine beträchtliche Ahnahme der

le durch die Temperatur. Vollständige Eshellen über

äuren werde ich späterhin bekannt machen.

632 613 703 877 1 858 517 754 616 **391** 689 802 264 625 **748 0,8999 486** 718 849 692 698. 326 238 0,8929 , . . . 055, 202. 041 0,8966 **561 9,7867** ; **879**.

498 Frankenheim u. Sondhauss, ib. d. Capillaritat.

Die Bestachtungen fallen blos zwischen 12 und 90°, daher die niedrigsten und höchsten Grade nicht ganz sieher sind.
"Das spec. Gew. dieser Säure konnte durch ein Versehen
nicht genau bestimmt werden; es war indessen von 1.84 nicht
sehr verschieden. Die Veränderungen des spec. Gewichtes durch
Wärme sind nach Muncke's Versuchen bei einer Säure von

1,886 bei 12º berechnend onis naugro siauras onis and surprise de discontrata de la compensature de la concava nach unten, d. h. die Synaphie nimutiin het heren Températuren in beschleunigsem: Verbittaids viu, doch ist der Unterschied nicht bedoutend: in angel onis de discontrata de la concava nach unterschied nicht bedoutend: in again de discontrata de la concava nach unterschied nicht bedoutend: in again de discontrata de la concava nach unterschied nicht bedoutend: in again de discontrata de la concava nach unterschied nicht bedoutend: in again de discontrata de la concava nach unterschied nicht bedoutend: in again de discontrata de la concava nach unterschied nicht bedoutend: in again de la concava nach unterschied nicht

X. Verdünnte Schwefelsäure.

Spec. Gew. = 1,5138 bei 16,3° gegen Wasser im Maximum. Ich habe nur zwischen 30 und 47° beebachtet. Die Synaphie nahm ab und, wie zu erwätten, in einem Verhältniss, das etwas stärker war als beim Wasser und etwas kleiner als bei der concentricten Sääre.

XI. Kalilösung. 334

Spec. Gew. 41,2336 bei 16,34 gegen Wasser im Maximum,

D	etwa	= 7,7	bei 0°.			383	68
		ę, 27 9	Temp.	D. N	•	862	Com
			0° 1,	000 1,0	00	100	OH
		1 / k	5 0	977 0,9	89	90e	₹.4.
		468	10	55	77		O.
		717	15	32000	65		• . •
		* 1 1	20 H.	09(*)	53	4.5	1=0
		15#ty	25 0.	887885	42	12 (PB) 12	
	•	112.19	30 °	67	31	665	60
		ं ग्रह	35	50	22	863	<i>(</i>)
		965	40	35%00	14	118	95
		\$ 1.7°	45	01122	06	783	4.3
		484		107637			60

n:Manigen Körper bei verschied Temperaturent 499

Zwei gut stimmende Reihen zwischen 12 und 97°.

Die Curve von D ist nach unten venvex, also die Ahnahme resymphie wird in häharen Temperaturen etwas verzögert. Die zwe scheint aus 2 hyperbelischen Armen zu, bestehen, die sich wa bei 50° vereinigen und bei grösseren und kleineren Temperaten allmählig in eine gerade Linie übergehen. Man wird dabei die Anomalie erinnert, welche in der Auslöslichkeit mehrerer ize in Wasser stattfindet und wobel, wie man wehl jetzt anhmen darf, allezeit ein chemischer Process in der Elüssigkeit atfindet, nämlich die Ausscheidung von abemisch gebundenem asser. Indessen reichen die Beobachtungen nicht hin, um er so seine Unterschiede zu entscheiden.

M kann nicht bestimmt werden, da das Gesetz der Verderung von e noch unbekannt ist.

He. Dr. Sondhauss theilt auch (S. 38) sinige Versnehe
t, die er am Schwefel zwischen 111 und 129° angestellt hat.
e geben bei 111° etwa D = 4,2 und eine sehr schnelle och hme mit dem Steigen der Temperatur. Ich werde bei einer rtsetzung dieser Arbeit auch genaue Beobachtungen am Schwemittheilen, der in höheren Temperaturen so viele intereste Erscheinungen darbietet.

Um die Intensität der Abnahme der Symphie mit dem Steina der Temperatur für verschiedene Körper mit einander werzichen zu können, will ich aus den Beobachtungen noch zwei stein zusammenstellen, in welchen die Flüssigkeiten nach der haeligkeit, mit der die Werthe von Daude die von Mahhaeligkeit, mit der die Werthe von Daude die von Mahhaen, geordnet sind. Die Werthe von Nachen zo zusammenzüstellen, ist unnöthig, da N, welches V Deproportional ist,

460 Frankenkeim u. Sondhause, üb. 4. Capillanität

denselben Gang befolgt, nur etwa halb so rasch. Am Schlusse dieser ganzen Arbeit, welche eine weit grössere Anzahl von Körpern umfassen wird, werde ich eine graphische Darstellung geben, aus welcher man sehen wird, dass die Abweichung von der geraden Linie bei allen genau untersuchten Körpern nur durch eine Zeichnung in ziemlich grossem Maassstabe-bemerklich gemacht werden kann:

Tabelle über die Werthe von D.

Aether. Kali. Essig- Alkohol Schwe- Schwe- Wein- Was- Temp. äther. 0,8209. felsäure felkoh- geist ser. 1,92. lenstoff. 0,9274.
-10° - 1,0393 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (1)
24 5 1,5991 For the 169 or the country 1,010 country to a
0 0 1,000 1,000 1,0000 1,0000 000 1,0000 1,0000
14-51-0,9768 0,977 0,9849 0,9811 0,99 22 0,990 0,9906 0,89 76
10 534 55 699 818 888 90 813 779
75 305 32 541 718 741 70 748 673
20 074 09 384 612 632 61 685 587

30 608 67 045 373 394 41 486 5 48
mys. 44 379 - 500;8874 \$45 - 464 - 31 344 366
m40 - 35 - 704 112 138 22 249 - 488
45 22 539·0,8974 0,8999 - 454 10160
-50 - 10 316 834 834 1 849 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
55 00 0,7921 668 698 777 , 6,8966 0,8966
3688-10 7 312 03794 - 3538 - 541 586 65 - 874 867
.indgilotena i 188 ' 149 i 1400 - 11 366 i 1114 i 1186
-dy oilen os to yatar 854 8080- 1 6060
1078 for all in 657 in 2419 100041 to be the 588 of 1566
-98606 am 107 1670 - 1 104 16 10 10 10 15 1500 1410
*** 1 objects 49 said to jacobi consultation of the said and said and said the said and said the said
90 40 John 480 an Carrier 1961
195 A. D. F. a. C. (\$6 17. 12.)
-190 2 danielo 1987, per o min de 099 a deteginal des 098.
is the Weingelst von 10,3667 habe ich nicht mit aufgesem-
men, west some selfe stark gekrümmte Curve mehrere andre
Ereuzt and dieses wahrscheinlich von zufälligen Umständen her-
rührt. Bei den übrigen Flüssigkliten ist die Beihefolge M
dans uttentechteten oder gekreuzt, went iste einander nehrmite

der mesigen Körper bei verschied. Temperaturen. 431

stehen. Aether and Kali, beides busische Körper, sind in niedrigen Temperaturen simender fast gleich, doch behauptet des Kali immer eine geringere Abnahme del Synaphie als Aether und entfernt sich in höheren Temperaturen immer weiter von ihm. Der Essigather ist dach beiden Seiten hin schaff gesondert. Dagegen stehen der Alkohol und die Behweleisäure einander wieder sehr nahe und die Curve des Alkohols scheint sogar in boheren Temperaturen die der Säure zu kreuzen, jedoch entfornen sie sich nie weit von einahder. Die Stelle des Schwefelkohlenstoffer ist nicht ganz sichet. In niedrigen Temperaturen Tallt er beinahe mit dem Alkohol zusammen, in höheres Temperaturen trennen sie sich; ob sich dieses bei Beobachtungen mit ganz reinem Schweselkohlenstoff bestätigen wird, muss einer spätern Untersuchung vorbehalten werden. Beim Wasser **Ent**ert sich in niederen Temperaturen der Werth von D etwas tangsamer als bei dem Alkohof und der Schwefelsäure. Aber in hohen Temperaturen, wo die Unterschiede grösser und daher zuverlässiger werden, tritt es entschieden gegen das Bude der Reihe und nur seine Stellung gegen den Weingeist von 0,9274 wird ungewiss, da sich hier der Werth noch etwas langsamer zu verändern scheint als im Wasser. Aber, wie schon Wähnt, hat diese Reihe nicht die Zuverlässigkeit, welche ich Reihen über Wasser und einige andere Flüssigkelten geben komme.

Seheh wir von dem verdünnten Weingeiste und dem Schweleikohlenstoffe ab, zu ist die Reiheteige der Körper nich der
Geschwindigkeit der Abnähme von D' oder der Stellheit der
Curve: Aether und Kall, Esstyäther, Alkohol und Schloefelnäure, Wasser. Der Aether hat unter den genannlen Körpern
den kleinsten absoluten Werth von D, etwa 5,4, und das Waszer den grösslen, etwa 15,4; Indessen ist es nicht wahrscheinlich, dass die Synaphie, wo sie kleiner ist, jedesmal auch soluteller absolute.

1432 Frankenheim n. Sondhauss, üb. d. Capillarität

-boil Taballe über die Werthe von M. 331 Temp. Acther. Schwefel- Alkohel. Weingeist :Schwefel- Wasser. fing the state of 1,46° 1,0182 1,010 1 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 _45 _0,9809, _0,989 ____0,9906 ___0,9908____ 0,9934___, 0,9940 -110 - 121620, 121 79 m. 12.811, 2710820, 211 863, -13, 886 **20** 345 31 58 31 607 33 643 3 703 703 499 11 15 055 11 18 1 15 499 11 11 550 15 11 12 616 15 11 1721 _A9: 0,8867: ... 37 ... 386 ... 473 ... 5526 ... 663 r35m in 678, 10d 26min fini273, in 376 in fon 434 from 691 280 gara 956 em BoilVR establishen best 61200 wird, Larry 06-EAO 1 1 11 11 11 11 11 0.8915 11 097 11 141 11 110406 1.55. Alexander 19. 1.1.791. 1005. 10. 039. 1. 335 160 topato le 161 targes 418 ... 732 mi ... 706 ... 107 300 640 596, + 026 ne Omiting work of the first interior in time , 480 g. 0,8945 185 ... in . W. agia and to a X with Advise entired owner 356 . In 1867 095 ... 706 95 400 m 1 16 fest at a page 7/ noteni. Lov mais no 0,7960 dec. 624. Die übrigen Flüssigkeiten konnte ich nicht mit aufführen, weil, bei, ihnen die, Veränderungen des auso. Gewichten durch 173976 Pie Curven, welche aus der Construction, dieser Tabelle hopvorgehen, saind in der Regel et was weniger steil ala die _Corven der Du weil ensich weniger rauch verändert als Y.D. _pder N. Aber sig; zeigen einen; etwas böhern Grad von Regelmässigkeit. Aether steht entschieden an dem einen Kade der Reihe, dann haben Alkohol und Schwefelkohlenstoff und wiederum Weingeist und Schwefelsäure einen fast gleichen Gang. Weit von den übrigen getrennt ist das Wasser, welches zu gleicher Zeit die stärkste absolute Synaphie sowohl in den Werthe von D als von N hat und, wenigstens in niedriges Temperaturen, die kleinste Veränderung des spec. Gewichtes. Die der flüssigen Körper bei verschied. Temperaturen. 438

Reihefolge ist also: Aether, Alkohol und Schwefelkohlenstoff, Weingeist und Schwefelsäure, Wasser.

Wenn man die Werthe von N eben so zusammenstellt, wie ich es bei denen von D und M gethan habe, und die Curven construirt, so findet man, wie natürlich, die Veränderungen weit kleiner als bei D und M und gewöhnlich nicht viel grösser als bei dem spec. Gew.; ja, bei dem Schwefelkohlenstoffe scheint das spec. Gewicht sogar etwas schneller vorzuschreiten als N. $N:\varrho$ oder $D:\varrho\varrho$ sind daher beinahe constant; indessen sind die Veränderungen von $N:\varrho$ noch sehr deutlich wahrzunehmen.

Zwischen der Synaphie und dem spec. Gew. lässt sich also für jetzt noch kein bestimmter Zusammenhang nachweisen. Aber beide, so wie die Elasticität, wurzeln in derselben Kraft, nämlich der Cohasion der flüssigen Theile, und es ist nicht wahrscheinlich, dass die Einflüsse, welche die Wärme auf sie übt, ganz von einander unabhängigen Gesetzen folgen sollten. Aber dieses zu finden, dazu reichen die vorhandenen Mittel nicht aus, und wenn die Speculation uns den Weg nicht abkürzt, so werden wir das Ziel nur auf dem langsamen Wege des Experiments erreichen können, indem man in einer langen Röhre jene drei Haupteigenschaften der verschiedensten Körper untersucht, nămlich das spec. Gewicht, die Synaphie und die Elasticität, sowohl in ihren absoluten Werthen bei der gewöhnlichen Tem-: peratur, als in den Veränderungen, welche sie nach der Höhe der Temperatur erleiden. Es wäre wohl zu wünschen, dass diese mühsamen und wenig populären, aber für den physischen Zustand der Körper sehr wichtigen Untersuchungen die Physiker mehr beschäftigen möchten, als es bisher der Fall war.

Alle meine Versuche zeigen also eine Abnahme der Synaphie, die dem Steigen der Temperatur nahe proportional ist, und dieser Gang setzt sich, wie die Versuche am Wasser darthun, selbst unterhalb des Frostpunctes fort, wenn die Flüssigkeit durch die Entfernung störender Ursachen vor dem Erstarten geschützt ist *). Die Synaphie setzt sich auch über den

^{*)} Es ist eine paradoxe Behauptung, die aber durch die vorhandenen Beobachtungen nicht widerlegt wird, dass die Ursache des Erstarrens, d. h. Krystallisirens einer Flüssigkeit nie in ihr selbst liege, sondern dass dazu stets das Hinzutreten eines fremden, in der

434 Frankenheim u. Sondhauss, üb. d. Capillarität

Siedepunct hinaus ohne Zweifel auf ähnliche Weise fort, und wenn man nicht überzeugt sein könnte, dass der Siedenunct, der von Ursachen abhängt, die der Natur der Flüssigkeiten ganz fremd sind, keinen kritischen Punct in den Eigenschaften der Flüssigkeiten bilden kann, so könnte man die Synaphie sogar mehrere Grade über den Siedepunct binaus beobachten, wenn man die beiden unten zusammengeschmolzenen Böhren auch oben mit einander verbände. Wenn man annehmen dürfte, dass die Synaphie sich über den Siedepunct hinaus ungefähr eben # verändert wie zwischen 0° und dem Siedepunct, so liesse sich die Temperatur berechnen, wo D=0 wird. Er fiele bei Wasser auf 520°, bei Alkohol auf 400°, bei Aether und Essigäther auf 220° etwa. Indessen ist diese Annahme zuverlässig falsch; die Temperatur, wo D=0 wird, kann viele Grade niedriger und Hunderte von Graden höber liegen, ja vielleicht existirt er gar nicht und die Synaphie nimmt mit dem Steigen der Temperatur asymptotisch ab.

Ist dieses Letzte der Fall nicht und ist wirklich ein Punck vorhanden, wo D und N und M=0 werden, und der Gang der Synaphie im Verhältnisse zur Temperatur scheint dafür

Regel festen Körpers nöthig sei, der die Flüssigkeit vorhin nicht berührt hatte. Frostpunct ist die Temperatur, bei welcher der feste Körper schmilzt; aber keine Flüssigkeit erstarrt bei dieser Temperatur, wenn sie nicht mit dem gleichartigen festen Körper in Berührung kommt, sondern bleibt noch mehrere Grade unterhalb füssig, 10, 20, ja oft 100° und darüber. Irgend ein Zufall führt dann früher oder später das Erstarren herbei. Aber dieser Zufall besteht wahrscheinlich gewöhnlich nur in der Berührung mit; einem der zahlosen in der Luft schwebenden Theile oder mit einem andern unberührt geweienen festen Körper. Eine eingeschlossene Flüssigkeit erstart, wenn sie geschüttelt wird, indem sie einen bisker freien Theil von der innern Wand des Gefässes berührt. Unter allen Körpern, die man In dieser Beziehung untersucht hat, läest sich das Wasser an wenigsten unter seinen Frostpunct abkühlen, nach höchstens.8 bis 10° erstarrt es selbst in Thermometerkugeln. Aber das Wasser dehn sich von +4° an aus, wenn es sich abkühlt; es muss daber durch seine Afkühlung mit einer bisher freien Oberfläche in Berührung konmen. Schwefel, Phosphor und einige leichtsüssige Salze können bei einiger Vorsicht bei der grössten Winterkälte flüssig erhalten werden. — Ganz dasselbe gilt von übersättigten Salzlösungen.

sprechen, so würde die Flüssigkeit als solche aufhören existiren, und men darf sich an die zuerst von Cagniardatour beobachtete, aber von ihm, wie selbst von Laplace, richtig gedeutete Erscheinung erinnern (Ann. de Chim. et de 192. XXI. 178), wo die Flüssigkeit, deren spec. Gew. impre mehr abnimmt, bei einer gewissen hohen Temperatur nicht mehr solche existiren kann, weil ihr Dampf, dessen Temperatur Maximum mit der Temperatur im raschen Verhältnisse steigt, i eben so grosses spec. Gew. erlangt hat wie die Flüssigkeit bet. Vielleicht entdeckt man einmal eine Flüssigkeit, bei ficher dieser Uebergangspunct bei geringeren, leicht zugänghren Compressionen stattfindet.

Dem Gegenstande unserer Arbeit nahe verwandt ist die scheinung im Leiden frost'schen Versuche. Sie ist, aller mühungen ungeachtet, noch nicht ganz aufgeklärt, und alle rsuche, die man seit 6 Jahren gemacht hat, so zahlreich sind, haben nichts von Belang dem hinzugefügt, was ich ils nach Anderer, theils nach eigenen Beobachtungen meiner Cohäsionslehre S. 123 zusammengestellt habe. Die zt herrschende Ansicht, dass bei der Temperatur der heis-1 Unterlage, auf welcher der Tropfen ruht, keine Benetzung ittfindet, gewinnt durch die schnelle Abnahme der Synaphie F dem Zunehmen der Temperatur eine neue Stütze. Um jech hier mit einer grössern Sicherheit versahren zu können, es nothwendig, auch die Veränderungen kennen zu lernen, siche bei der Anziehung zwischen heterogenen Flüssigkeiten Mindet, z. B. zwischen Quecksilber und Wasser oder einem ile. Die Versuche, welche darüber in einem, dem oben für mogene Flüssigkeiten beschriebenen ganz ähnlichen Appate angestellt werden können, werde ich in einer Fortsetzung mor Abhandlung bekannt machen. -

LVII.

Rechtfertigung der Volumentheorie gegen Löwig's Bemerkungen.

(Bd. XXII. Heft 4. S. 244 246 dies. Journ.)

Von H. SCHRÖDER.

§. 1.

Löwig's Bemerkungen gegen die Volumentheorie haben im Allgemeinen den doppelten Zweck: 1) zu zeigen, dass die Betrachtung und Bezeichnung der Zusammensetzung eines Körpers nach Atomvolumen seiner Bestandtheile rein der Willkühr überlassen sei und dass daher aus solchen Betrachtungen schlechterdings nichts über die wahre Constitution chemischer Verbindungen geschlossen werden könne; und 2) die ältere Ansicht von den Sauerstoffsäuren und Sauerstoffsalzen gegen die aus der Volumentheorie wider dieselbe beigebrachten Gründe zu rechtfertigen.

Ich habe daher zu zeigen, dass die Volumentheorie auf unbestreitbaren Thatsachen beruht und eine willkührliche Anwendung auf gegebene Verbindungen überall da nicht zuläss, wo hinreichende Beobachtungen vorliegen, — und zweitens, die Gründe zu rechtfertigen, die ich aus der Volumentheorie gegen die ältere Ansicht von den Säuren und Sauerstoffsalzen geltend gemacht habe.

Zugegeben zunächst, dass es viele Reihen von Verbindungen giebt, auf welche die Volumentheorie wegen der Mangelhaftigkeit der bisher vorliegenden Beobachtungen noch nicht mit Glück angewandt werden kann, — zugegeben, dass von der Angaben über die Zusammensetzung der Körper nach Atomvolumen, welche sich in meinem ersten Versuche einer Begründung der Volumentheorie finden, manche noch den Charakter der Willkühr an sich tragen und nothwendig an sich tragen müssen, wenn der Versuch, dieselben aufzustellen, schon jetzt gemacht werden sollte, was ich deshalb für ungefährlich hielt, weil solche Angaben jedenfalls der Anlass zu weiteren Untersuchungen werden, weil der Weg vorgezeichnet ist, auf welchem dieselben bestätigt oder berichtigt werden können, — diess Alles zugegeben, bleibt dennoch gewiss, dass für man-

Schröder, Rechtfertigung der Volumentheorie etc. 437

che Reihen von chemischen Verbindungen ihre Zusammensezzung nach Atomvolumen ihrer Bestandtheile sich schon jetzt mit
Sicherheit angeben lässt, und dass die Volumentheorie, wie ich
sie aufgestellt habe, in sich selbst das Kriterium der Wahrheit
enthält und jede Willkühr ausschliesst, sobald nur die von ihr
geforderten Beobachtungen vorliegen. Es bleibt eben so nichtslestoweniger wahr, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe,
schon jetzt zu sehr vielen gültigen Schlüssen über die Zusam;
nensetzung gewisser Körperclassen geführt hat.

S. 2. .

.115

Ich will diess in einigen Beispielen zeigen.

Setzen wir nichts voraus und lassen wir die Thatsachen für sich reden.

- 1) Berechnen wir die Atomvolumen von Kupferoxyd, Zinkoxyd, Cadmiumoxyd, Bleioxyd und Quecksilberoxyd nach den
 besten, von Karsten, Boullay, Kupffer und le Royer und
 Dumas gegebenen Bestimmungen des spec. Gewichtes dieser.
 Oxyde von der Form RO; ziehen wir von jedem dieser Oxyde
 das Atomvolumen des Metalles ab, so bleibt jedesmal sehr nahe
 derselbe Rest, nämlich 33. Diess ist die erste Thatsache.
- 2) Berechnen wir ferner eben so die Atomvolumen von Kehaltoxyd, Eisenoxyd, Antimonoxyd, Wismuthoxyd und rothem Bleisuperoxyd, ebenfalls nach den Messungen genannter. Beobachter und von Mohs; ziehen wir von jedem dieser Oxydo von der Form R₀O₃ das doppelte Atomvolumen des Metalles. ab, so bleibt jedesmal wieder sehr nahe ganz der gleiche Rest, nämlich 3×33. Diess ist die zweite Thatsache.
- Berechnen wir das Atomvolumen von Eisenoxydoxydul, Fe₃ O₄, nach der besten vorhandenen Messung von Boullay und ziehen wir das dreifache Atomvolumen des Eisens ab, so bleibt der Best 4×33.
- 4) Ziehen wir von dem Atomvolumen des Wassers, H₂O, 1×33 ab, und von dem Atomvolumen des Wasserstoffsuperoxyds, H₂O₂, nach der Messung von Thénard berechnet, 2×33, so bleibt wieder jedesmal sehr nahe der gleiche Rest, nämlich 2×39. Diess ist die fünste Thatsache.

Diese von aller Willkühr freien Beobachtungen erlauben den Schluss, dass 1 At. Sauerstoff in all diesen Oxyden mit dem Volumen 38 enthalten sei, 1 At. Wasserstoff im Wasser und Wasserstoffsuperoxyd mit dem Volumen 39, und die betreffenden Metalle in den genannten Oxyden mit dem Volumen, welches ihnen im isolirten Zustande zukemmt. Sollte die Gültigkeit dieses Schlusses noch bezweifelt werden, so ist derselbe von anderer Seite vollkommen bekräftigt. Ich habe nämlich gezeigt, dass die spec. Wärme des Atoms zusammengesetzter Körper die Summe der spec. Wärmen der Bestandtheile ist, wenn diese mit gleichen Condensationen in den Verbindungen enthalten sind.

Regnault hat in neuerer Zeit sehr ausgezeichnete Messungen über die spec. Wärme zusammengesetzter Körper bekannt gemacht. Vergleichen wir die spec. Wärmen der genannten Oxyde nach Regnault's Messungen. (Man vergleiche meine dahin gehörige Arbeit: Pogg. Ann. Bd. LII. Stück 2. S. 269—281.)

- 1) Ziehen wir von der spec. Wärme des Atoms der genannten Oxyde von der Form RO die spec. Wärme des Atoms der Metalle ab, so bleibt jedesmal sehr nahe der gleiche Best für die spec. Wärme des Atoms O, nämlich 30.
- 2) Ziehen wir von der spec. Wärme des Atoms der genannten Oxyde von der Form R₂O₃ die doppekte spec. Wärme des Atoms Metall ab, so bleibt wieder jedesmal sehr nahe der gleiche Rest, nämlich 3×30, also für das Atom Sauerstoff wieder 30.
- 3) Ziehen wir von der spec. Wärme von R₃ O₄ die dreifache spec. Wärme des Atoms Eisen ab, so bleibt als Best 4×30, also wieder dieselbe spec. Wärme für das Atom O.

Durch diese doppelte Bekrästigung der Darsteslung von der Zusammensetzung der genannten Oxyde, die ich gegeben habe, ist daher der Wissenschaft eine Thatsache gewonnen, die an Erwiesenheit keiner andern chemischen Thatsache nachsteht. Gleichwohl glaubt Löwig, etwas cavalièrement, die ganze Volumentheorie als reine Wilkühr in Bausch und Bogen abfertigen zu können, blos deshalb, weil es allerdings Jadem steil

sht, die Velamentheorie zu gebrauchen, um rein wilkührliche estellungen über die Zusammensetzung der Körper daraus ablekten, woven in jenem Aufsatze Löwig's sehr treffende Beiiele gegeben sind.

S. 4.

5. .

Versuchen wir dieselben Betrachtungen auf einige Oxyde m der Form BO2 und R2O auszudehnen. Ziehen wir von m Atomvelumen des Zinnoxyds und der antimonigen Säure, sh den Beobachtungen von Neumann, Boullay und Kareb, die Atomvolumen der Metalle ab, so bleibt als Rest jemmal sehr nahe 33. Diese Beobachtung macht wahrschein-Ir, dass in diesen Oxyden das Atom Sauerstoff mit der Hälfte « Volumens enthalten sei, wie in den früher betrachteten, woch diese Oxyde zu bezeichnen wären als SnO; und SbO; eilich lassen sich diese Oxyde, wie Kopp in seiner Kritik r Volumentheorie (Poggend. Ann. Bd. LII. St. 2. S. 249) meigt hat, eben so gut auch betrachten als Sn²/₃O² und Sh²/₃O², emoh das Atom O wieder mit dem Volumen 38 in denselm enthalten wäre, das Atom des Metalles aber eine Condention auf 1/2 seines Volumens erlitten hätte. So länge nun cht durch eine Beihe analoger Verbindungen ermittelt werm kann, welche von beiden Ansichten die richtige ist, tiben beide nur mehr oder weniger wahrscheinlich, meitwogen willkührlich. Aber jedenfalls ist die gegebene Besekung; so wie die beobachtete spec. Warme dieser Oxyde mofern entscheidend, dass die Klemente dieser Oxyde in ganz Moser Weise, nämlich nicht ohne Condensation, mit einander Verbindung getreten sind wie in den früher betrachteten zyden, und schon diess ist eine der Wissenschaft gewonnene batsache.

S. 5.

Wenden wir dieseibe Betrachtung auf Kupferoxydul und Silrodyd an. Wenn wir vom Atom des Kupferoxyduls, nach den essungen von Karsten, le Royer d. Dumas, Boullay Mohs, das deppelte Atomvolumen des Kupfers abziehen. ribleibt im Mittel als Rest 60,5; bei dem Silberoxyd im Mittel 3.4. Die Bechachtung kann vermutien lassen, dass in diesetr

440 Schröder, Rechtfertigung der Volumentheorie

Oxyden das Atom Sauerstoff mit dem doppelten Volumen, nämlich mit 2×33 enthalten ist, wonach dieselben zu bezeichnen wären als $\operatorname{Cu}_2^2 \operatorname{O}_2^1$ und $\operatorname{Ag}_2^2 \operatorname{O}_2^1$. Diese Ansieht von der Constitution dieser Oxyde kann irrig sein, sie wird jedenfalls erst noch durch eine Reihe anderweitiger Beobachtungen bestätigt werden müssen; aber sicher ist, dass das Silberoxyd sich nicht betrachten lässt als zusammengesetzt aus 2 Volumen Silber plus 1 At. Sauerstoff mit dem Volumen 33. Die Elemente, oder das eine oder andere Element, sind in diesen Oxyden jedenfalls in einem andern Condensationszustande enthalten als in den Oxyden von der Form R O und $\operatorname{R}_2\operatorname{O}_3$ etc., die wir betrachtet haben. Auch diess ist eine der Wissenschaft durch die Velumentheorie gewonnene Thatsache. Gleichwohl nimmt Löwig an, das Silberoxyd sei $\operatorname{Ag}_2^2\operatorname{O}_1^1$, um seine Ansieht von den Sauerstoffstlzen zu unterstützen.

§. 6.

Gehen wir nun zur Betrachtung einiger Selze über. Karsten hat ausgezeichnete Messungen des spec. Gewichtes einger Salze gegeben. Alle Beobachtungen, die ich den folgenden Betrachtungen zu Grunde lege, sied von ihm. Berechnen wir die Atomvolumen von schweselsaurem Kupferoxyd, schwefelsaurem Zinkoxyd und schwefelsaurem Silberoxyd, ziehen wir die Volumen der Metalle hiervon ab, so erhalten wir nach det Reihe die Reste: 233,8, 237,1 und 236,1, also jedesmal der gleichen Rest; im Mittel 236. Nun hat aber das Atom Schwefel für sich das Volumen 101, das Atom O, wie wir gemben haben, in einer Reihe von Oxyden das Volumen 33; 4×33 -101 ist jedoch 233. Es folgt also daraus, dass in den genannten schwefelsauren Salzen das Metall und der Schwefel mit dem Volumen enthalten sind, welches sie im isolieten Zastande haben, das Atom Sauerstoff aber wieder mit dem Volu-Diese Beobachtung ist im Zusammenhange mit den men 33. früheren so lehrreich und interessant, sie ergiebt sich so sehr frei von jeder willkührlichen Auslegung, dass sie sicherlich als ein Gewinn für die Wissenschaft zu betrachten ist. Wir haben nun aber gesehen, dass im Silberoxyd die Blemente indere Condensationszustände haben, folglich ist das Silbersulfanid nicht schweselsaures Silberoxyd. Eben so wenig lassen sich die schweiskauren Salze von Baryt, Strontian, Kalk und Magnasa ala Verbindungen von SQ mit den Qxyden von Baryum, Stronttum, Calcium und Magnium, betrachten, In den anhweislenum ten Salzen der genannten Körper haben die Klemente andere Condensationen als in den Oxyden dersplben, Ganz, das Gleiche gilt von den salpetersauren und kohlensauren Salzen dieser Kärz per. Diese Alles sind Thatsachen in Betreff der chemischen Constitution der Körper, welche zuerst durch die Volumentheorie gefunden worden sind.

6. 7.

Ich will pur noch ein Beispiel in Betreff des Kaliums und Natriume ansihren. Ziehen wir von dem Alomvolumen den Kalija 38 für des Atom O ab, so bleibt 189; ziehen wir ehen so von dem Atomyolumen des schwefelsauren Kali's 233, nam, lich das Volumen des Sulfans, wie wir es oben gefunden, b so bleibt 183, also nabe derselbe Werth. Nun ist nach Gay Lussac, and Thénard das Atomyolomen des Kaliums = 566,45 der dritte Theil davon ist aber 188; ein Werth, der mit dem vorigen, nämlich 189 und 183, so gut übereinstimmt, dass man es als sehr wahrscheinliche Thatsache hetrachten kann, dass das Kalium im Kali und Sulfankalium auf 1/8 seines Volumens condensirt ist. Das Gleiche gilt vom Natrium. Ziehen wir vom Atomvolumen des Natrons 38 und vom Atomvolumen des Wil-Annatriums 233 ab, so bleibt im ersten Falle 106, im anders eben so 196. Nach Davy ist aber das Volumen des Afonts Natrium 311. Der dritte Theil davon ist 104; also sehr gettät der vorige Best. Es ist daher wahrscheinich, dass das National im Natron und Sulfannatrium auf 1/3 seines Volumens condensitt ist. Weitere Beobachtungen werden diese Ansieht bestätigen. Hiernach könnte man zwar die schwefelsauren Balze des Kallums und Natriums als Verbindungen von S. 03 mit den Oxyden jed ner Metalle betrachten, Reineswegs aller ist dieselbe Betrach tung bei mehreren anderen Salzen dieser Körper statthaft. ration radiance in the court of the court and the confidence of the court and consistence and the confidence of the court and consistence and the confidence of the confidence

The state of the control of the state of the

Ich glaube durch diese Belspiele deutlich gemacht zu baben, dass die Volumentheorie eine grosse Reihe von Thatsachen in Betreff der chemischen Constitution der Köfper wirk-

Noh bereits enthalt, dass selebe Thatsachen sich mit der Vermehrung der Anzahl brauchbarer Boobschlungen ebenfalls vermehren werden, und dass nichts vergeblicher sein wird als der Versuch, die Entdeckung so allgemeiner Beziehungen wis diejenigen, auf weiche die Volumentheorie sich gründet, mit einigen kurzen Worten absertigen zu wollen.

LVIA.

Control of the Contro

Entwickelung einer zehr einfachen Formel, besonders zum Gebrauch für Anfänger der krystallographischen Studiums geeignet, nach weicher, schon aus jeder krystullographischen Grundform, die grösstmöglich ste Anzahl gleichartiger Flächen sich bestimmen lässt, die in den respectiven Systemen vorkommen können.

Von

Dr. L. ELSNER.

Betrachtet man zuerst die Anzahl der Seiten der einzelnen congruenten N. Koke, welche eine einfache Korm von der gröntmäglichsten Anzahl gleichartiger Flächen begrenzen sellen, so ist sogleich klar dass diese Figuren pur solche N Ecke sein kösnanti die sich nicht weiter in andere, von ihnen durch eine geringere Anzahl der Seiten unterschiedene verwandeln lassen. Dasjenige NEck also, welches sich nicht mehr in ein N-1 Eck verwandeln lässt, ist als das Grenzglied anzuschen; das jenige NEck aber, welches sich nicht weiter in ein N-1 Eck zerlegen läggt, ist das Dreieck. Dieses Dreieck mass aber wiederum von der Beschaffenheit sein, dass au ihm eine weitere Veränderung rücksichtlich seiner Seiten nicht mehr vergenommen werden kann; solch ein Dreieck ist aber ungleichseitige. Da nun aber unter einer einfachen Form mit der grösstmöglichsten Anzahl Flächen, unter einander gleiche und ähnliche verstanden werden, so felgt hieraus, dass die Begrenzungsehenen bei selchen Körpern nur congruente ungleickseitige Dreiceke sein können. He dieser Schluss aber gant algemein richtig ist, so gilt er auch für jedes einzelne Erystelbe system, und die einfachen Formen der einzelnen Krystallaystemu, von der grösstmöglichsten Anzahl gleichertiger Flächen um schlessen, sind von Songruppten ungleichseitigen Dreicelben begrenzt.

Ks ist jetzt nachzuweisen, wie aus jeder Grundsorm det einzelnen Krystallsysteme sich solche neue Formen, von congruepten ungleichseitigen Preiecken begranzt, ableiten lassen. Bevor dieses geschieht, mögen einige Worts nach hier Platz finden, über die Wahl derjenigen Körper, die als Grundsormen für die einzelnen Krystallsysteme auszustellen sind.

Man thut hier am besten, solche Körper als Grundformen zu wählen, die von Ebenen gleicher Gestalt begrenzt werden, wodurch eine Gleichförmigkeit der Auffassung für alle Krystallsysteme gewonnen wird. Da nun Dreiecke gleiche Gestalt haben und zugleich auch die einfachsten Figuren sind, so müssen zu Grundformen Körper gewählt werden, welche von Dreiecken begrefizit sind, und solche Körper sind das reguläre Octaeder, das Quadrat-Octaeder, das Rhomben - Octaeder und das Dihexaeder, daher diese Körper als Grundformen für die einzelnen Systeme zu betrachten sind. Denn wollte man die einfachsten stereometrischen Körper als Grundformen wählen, so wären die Grundkörper für das reguläre, quadratische und eine und eine zige Byu stem die verschiedenen Tetraëder, für das diltexaëdrische Systein aber das Bhomboëder; demnach in den ersteren Systemes Kärper als Grandformen von Breiseken umsehlossen, in dem letst teren din Körper von Rhomben begrenzt. Daher ist es bedaes; die dhen geneenten Körper als Grundformen, und die anderen als aus den ersteren durch Hemiëdsie entständene zu betrachten.

Est hit also jetzt zu zeigen, wie aus der Beschaffenheit der Grundkörper der einzelnen vier Haupt – Krystallsysteme zich ableiten lasse, welches die größstmöglichste Anzahl gleichartigen Flächen zei, welche an einer einfachen Ferm den respectiven Systems auftreten könne.

Da es überhaupt auf ungleichseitige Dreincke sein können, welche als Begrenzungsflächen einfacher Formen mit der grössensglichsten Anzahl gleichartiger Flächen auftreten können, so wird derjenige Körper, der nur von ungleichseitigen congruenten Dreiecken umschlossen wird und sich aus der Grundferm

des in Rede stehenden Systems construiren lässt, zugleich derjenige Körper mit der größtmöglichsten Auzahl gleichartiger
Flächen sein, der eben in dem respectiven System vorkemmen
kann. Es wird demanch nur darauf ankommen, aus der Grundform neue Körper, von congruenten angleichseltigen Dreicken
begrenzt, zu donsfruiren.

Bá nun aber

das reguläre Ociaëder als Grundform des regulären Systems, das quadratische Octaëder als Grundform des quadratisches Systems,

das Rhombenoctaëder als Grundsorm des ein- und einaxigen Systems

und das Dihexaëder als Grundform, des drei- und einaxigen Systems

auftritt, so werden Körper, die in den genannten Systemen vorkommen und nur von congruenten ungleichseitigen Dreiseken begrenzt, demnach einfache Formen sind, zugleich die Körper mit der grösstmöglichsten Anzahl gleichartiger. Flächen sein, welche in den genannten Systemen überhaupt nur vorkommen können.

Das gleichseitige Dreieck wird aber durch seine drei in einem Puncte sich schneidenden Mittellinien in sechs congruente ungleichseitige Dreiecke zerlegt; das reguläre Octaeder wird sber von acht gleichseitigen Dreiecken begrenzt, und daher wisderholt sich diese Theilung jedes einzelnen in seehs congruente ungleichseitige achtmal, und im Ganzen sind 8>< 5=48 ungleichseitige congruente Dreiseke eingezeichnet worden. Denti man sich statt der Mittellinien körperliche Kanten, so erhebes sich über jeder Octaëderstäche: sechs neue Flächen mit dreierlei Kanten, und es ist der Achtundvierzigstächner aus dem Octaöder entstanden. Da nun seine Begrenzungsebenen congruente ungleiebseitige Dreiecke sind und deren Auftreten die Anseigt ist, dass man einen einfachen Körper mit der grösstmöglichstes Anzahl gleichartiger Flächen vor sich habe, so ist auch die Zahl 48 diejenige, welche im regulären System an einer einfaches Form mit der grösstmöglichsten Anzahl Flächen gleicher Art nur vorkommen kann; denn wenn gleich jedes dieser ungleichseitigen Dreiecke sich wiederum durch Mittellinien theilen lässt;

sind doch die auf's Neue entstehenden Dreicoke nicht mehr er einander congruent, was also gegen die Voraussetzung ire.

Da durch eine ähnliche einfache Theilung der gleichschenken Dreiecke der Grundformen im quadratischen und dibexaëschen System nur Körper entstehen können, die, wie im
idratischen System, von 16 ungleichseitigen congruenten Dreicen und im dibexaëdrischen von 24 ungleichseitigen congrueni Dreiecken begrenzt werden, so folgt eben so wie beim reguen System, dass die einfache Form mit der grösstmöglichsten
zahl gleichartiger Flächen im qundratischen System von 16
d im dibexaëdrischen System von 24 ungleichseitigen Dreiecken
schlossen wird. Es ist diese Form im zwei- und einaxigen
stem aber der Vier- und Vierkantner und im dibexaëdrischen
stem der Sechs- und Sechskantner.

Im ein- und einaxigen Krystallsystem ist die Grundform a Rhombenoctaëder, begrenzt von acht ungleichseitigen een necht gerundform zugleich diejenige einfache Form mit der grösstbiglichsten Anzahl Flächen gleicher Art, die in diesem System akommen kann. Denn es lässt sich aus dem Rhombenoctaëder in neuer Körper construiren, der ebenfalls von congruenten gleichseitigen Dreiecken umschlossen, wäre. Es ist folglich p Zahl acht diejenige, welche auf als die grösstmöglichste nzahl von Flächen auftreten kann in diesem System.

Vergleicht man die Anzahl der ungleichseitigen congruenn Dreiecke, welche durch die oben angegebene Theilung durch
ittellinien auf den Ebenen der Grundformen entstehen, so findet
an, dass ihre Anzahl doppelt so gross ist als die Anzahl
r Ecken, aus denen man diese Mittellinien zieht. Beim
eichseitigen Dreieck ist es demnach die Zahl sechs, beim gleichhenkligen die Zahl zwei. Beim regulären Octaëder liegen aber
den drei Eckpuncten der Octaëderstäche zugleich die drei Eckmote der drei gleichartigen Ecken, diesen drei Ecken liegen aber wen des Parallelismus der Flächen drei andere gleichartige Ecken
genüber, und es ist daher die Anzahl der gleicher Kanten geldet werden, gleich der Anzahl der congruenten ungleichseitim Dreiecke, welche durch die angegebene Theilung durch

Mittellinion enteteten kõnnen. Ganz enmelbe gilt für ele von gleichen Kenten gebildeten Ecken des Quadratoctacders und der Dihexaëders, und man kann daher statt der Anzahl der congracutes ungleichseitigen Dreibeke, die eben mittelst einer Theilung durch bilttellinien auf einer prepränglichen gleichseitige oder gleichschenkligen Dreicckeffäche des Grandkörpers entitehen können, die Anachi der von gleichen Kanten gebildeten Ecken der Grundform setzen, um so durch Multiplication denseben mit der Anzahl der Begrenzungeflächen den Grundkörpen jedes respectives Krystalbystems sogleich in dem daraus bervorgehondes Product zu finden, welches die gröselmöglichste Anzell vos Flackes gleicher Art überhaupt sel, welche in dem in Rede stahondon System an einer einfachen Form vorkommen können. Bedeutet nun genn aligemein A die grösstmöglichste Auzahl gielchartiger Flächen, E die Aazahl der von gleichen Kanten gebildeten Moken der Grundform, F die Anzahl der Flächen der Grundform, so bet die allgemeine Formel, welche für alle Grundfetmen der 4: Haupt-Krystallisationssysteme gilt, om aus ihnes 🕪 gloich abauleiten die grössimöglichste Auzahl von gleichertiger Flächen, weiche an einer einfachen Form der respectiver Systome auftrotes kõstie: -

 $A \Longrightarrow BF$,

d. h. inde multiplielet die Anzahl der von gleichen Matei gebildeten Ecken der Grundform mit der Anzahl der Michiel derselben, um sehr leicht die Einl A zu finden.

- Wird eleme Formel auf die Grandkörper der einzelden Krystallsysteme augewandt, so ergiebt sich folgender Ueberblick:

\$ \$ 1°			ACMINISTRA 2
	Anzahl daFlä- ohen.	Anzabi di von gleichen Kan- ten gebilde-	Abandi om graester File chen, die sie aus d. Grand-körp. construiten lances L. weiche eine neue einsiche Form begrenten.
Beim regulären Octaöder Beim Quadratoctaöder Beim Dibexaöder	* 8 19	8	8×6=66 8×2=10 12×2=24
Beim Rhembenectnöder	8	F 19	8 ×0 = 0.

Roge, Lichierscheinungen bei d. Krystallbildung. 447

Da nun aus der so eben gegebenen Formel, welche auf allgemein richtigen Sätzen beruht, kein neuer Körper sich weiter aus dem Rhombenoctaäder ableiten läset, so folgt daraus, dans der Grundkörper zugleich derjenige mit der grösstmöglichsten Anzahl von Flächen gleicher Art ist, der in diesem System, vorkommen kann.

LIX.

Ueber die Lichterscheinungen bei der Krystallbildung.

Ven

H. ROSB.

(Aus den Ber. der Berl. Acad.)

Vor längerer Zeit fand ich, dass das Krystalisiren der glasartigen avsenigen Säure durch's Krkalten ihrer heissen: gesättigten Auflösung in Chlorwasserstoffsäure mit einer starken Lichterscheinung begleitet sei. Ich fand, dass weder die porcellanartige Modification der arsenigen Säure, welche durch längeren Liegen sich bildet, noch die Krystalle, welche man durch'n Erkalten einer gesättigten chlorwasserstoffsauren Auflösung der glasartigen oder porcellanartigen Säure in ihrer Auflösung in Chlorwasserstoffsäure erhält, unter ähnlichen Umständen eine Lichterscheinung hervorbringen können.

Ich schloss hieraus, dass das Leuchten beim Anschlessen ler Krystalle der arsenigen Säure dadurch entstehe, dass aus ler Auflösung der glasartigen Säure dieselbe sich beim Krytallinien in porcellanartige verwandle. Die erhaltenen Krytalle gehören der porcellanartigen Modification au, und das Porcellanartigwerden der glasigen Säure besteht in nichts Anlerem als darin, dass die Säure aus einem welltemmen unkrytallinischen in einen krystallinischen Zustand übergeht.

Man hatte schon srüher beim Anschiessen von Krystallen nehrerer Seize ein Leuchten bemerkt, aber immer war diese Erscheinung nur eine zufällige gewesen, nie kondte man sie willkührlich hervorrusen. Das Leuchten beim Krystatlisiren der arsenigen Säure unterschied sich daher wesentlich von dem an-

448 Rose, Lichterscheinungen bei d. Krystallbildung.

derer Substanzen, als man es willkührlich und zu jeder Zeit hervorzubringen im Stande ist.

Das Leuchten beim Krystallisiren der arsenigen Säure ist vielleicht einer der einfachsten Fälle unter den Lichterscheinungen, welche gewisse Krystalle bei ihrer Bildung zeigen. Man hat schon früher bisweilen Lichtentwickelung beim Anschiessen des schwefelsauren Kali's beobachtet. Ich habe meine Untersuchungen besonders mit dlesem Salze angestellt; aber erst nach vielen vergeblichen Bemühungen ist es mir gelungen, die Lichterscheinung beim Krystallisiren des schwefelsauren Kali's willkührlich hervorzubringen. Die Ursache dieser Erscheinung ist verwickelter, und man hat auch mehr Vorsichtsmaassregeln zu beobachten, wenn man sie erzeugen will, als diess bei der Hervorbringung der Lichtentwickelung beim Krystallisiren der arsenigen Säure der Fall ist *).

Schwefelsaures Kali. — Weder wenn Krystalle des schwefelsauren Kali's, noch wenn geschmolzenes schwefelsaures Kali in heissem Wasser aufgelöst werden, konnten Lichterscheinungen beobachtet werden, obgleich die Versuche mannigfaltig modificirt wurden. Aber sie konnten nicht füglich erwartet werden, auch nicht beim geschmolzenen Salze, da dasselbe vollkommen krystallinisch ist und dieselben Blätterdurchgänge wie das aus wässrigen Auflösungen krystallisirte Salz zeigt.

Man erhält das schweselsaure Kali in einem geschmolzenen amorphen glasartigen Zustande, wenn man es mit schweselsaurem Natron mengt und das Gemenge schmilzt. Das Gemenge ist aussallend leichter schmelzbar als jedes der einzelnen Salze, aus denen es besteht.

Gleiche Atomgewichte beider Salze gaben, im Platinfiegel geschmolzen, eine glasartige Masse, die aber beim Erkalten unzählige Risse bekommt, zerspringt und bröcklich wird. Man könnte sie für krystallinisch halten, aber sie ist es nicht; nur durch ungleiche Zusammenziehung beim Erkalten entsteht die

^{*)} Werner (Journ. Bd. XIV. S. 249) bemerkte ein starkes Leuchten beim Zusammenwerfen von Krystallen von salpetersaurer Baryterde, wie diess auch bei dem sauren schwefelsauren Kali sich zeigt; es wäre wohl möglich, dass auch dieses Salz bei der Krystallisation eine ähnliche Erscheinung hervorbrächte. (D. Bed.)

große Menge von Sprüngen, welche beim ersten Anblicke für Blätterdurchgunge gehalten werden können.

Wird das geschmolzene Salzgemenge mit Wasser gekocht, die gesättigte Auflösung möglichst heins filtrirt, und lässt man dieselbe sehr längsam erkalten, so finden im Dunkeln bei den Krystallisation dieselben Lichterscheinungen statt wie bei den Krystallisation der glasartigen arsenigen Säure. Die Bildung von jedem Krystalle ist mit einem Lichtfunken begleitet.

auf dieselbe Weise behandelt, so bemerkt; man bei der Krystallbildung die eine Lichterscheinung.

Bie uster Lichtentwickelung ausgeschiedenen Krystalle des Salzes phosphoresoiren, wenn man sie aus der Flüssigkeit nimmt und reibt oder auch nur stark berührt. Das Licht, welches danch's Reiben entsteht, ist aber bedeutend schwächer als das, welches sich hei der Krystallisation gezeigt hat. Nach einigen Stunden zeigen aber auch durch's Reiben die Krystalle kein phusphoresoirendes Licht mehr. Die Krystalle der arsonigen Sänze, welche sich aus der chlorwasserstoffsauren Auflüsung der glasartigen Modification unter Lichterscheinung abgeschierten haben, behalten die Kigenschaft, durch's Reiben ein phusphoresoirendes Licht hervorzubringen, weit länger.

Pewöhnlichen schweselsauren Kali's. Die Liebterscheinung schweselsauren bedingt zu zein wie die ind., wolche hei der Krystallisation der glasartigen arsenigen Berre; etatisischen. Durch des Schmelzen mit schweselsaurem; Natroebist das schweselsaure Kali, in den glasartigen Zustand, vonzustat worden; wird das geschmelzene Salz in Wasser ausgen bet ju so scheidet es sich beim Erkelten in krystallieirten Zustande in den

Die Lichterscheinung bei der Krystellisation des schwesels aufren Kali'n kann aber in vielen Fällen nicht mit der Bestimmts heit hervergebracht werden wie die bei der Krystellisation der propigen Säure. Es ersorderte eine grosse Beibe von Versuschen, um die verschiedenen Ursachen des Nichtgelingens dies ser Erscheinung unter scheinbar gleichen Umständen auszusinden; ein Das geschmelzene Salzgemenge muss bald, einige Stunden nach dem Erkalten, mit Wasser behandelt werden, wenn die

450 Bose, Lichterscheinungen bei d. Krystallbildungst

Lichterscheihung bei der Krystallisation stattsaden sell. Lässt man es 24 Stunden liegen, se zeigt sich bei der Krystallisation nur bei der Bildung weniger Krystalle ein Leuchten, und lässt man sie noch längere Zeit, einige Tage, liegen, so ist bei der Krystallisation gar keine Lichterscheinung zu bemerken. Burch's Liegen scheint die geschmolzene Masse aus dem glasartigen Zostande in den krystallinischen überzugehen.

Wehn die Lichterscheinung beim Krystallistren der geschmolzenen Masse sich nicht zeigle; so kennte mah deutlich schen; dass die Krystallisation des Salzes eine andere war als die, wenn die Lichterscheinung stattgefunden hatte. "Im letztern Falle, war kein waszerhaltiges schwefelsadres Natros mit seiner bekannten Form herauskrystallisirt, eder nur wenig daver und diess erst spät. War aber! die Lichterscheinung nicht bemerkt worden, so hatte nebeh den Krystallen des schwefelszuren Kali's eich eine grosse Menge von wasserhaltigem schwefelsaurem Nation durch's Erkalten abgeschieden. - - - Control · Vielfältige Untersuchungen zeitgten; dass die unter Mehtig erscheinung ausgeschiedenen Krystalle wicht aus schweschung rem Kali bestehen, sondern ein Boppelsals aus schwefelsauren Kali und schwefelsaurem Natren, letzteres im wieserfreien 20 stande, sind, das nicht nur vollkommen die Krystalfform des reinen schwefelsauren Kali's bat, sendern auch das Mussere Anschen und viele semer Eigenschaften mit ihm theilt. Sinilation 2 Bei mehreren Analysen wurde das Doppelstiz zins Sak sohwefelsaurem Kali und 1 At. schwefelsaurem Nation bestehend gefunden. Me scheinen indessen die Veiden näheren Si-nach hnderen Analysen achien das Poppelskie aus & At. von sthwefelsaurem Kall und 3 des schwefelsauren Rutrons zu bestehen. Ich lasse es unentschieden, ob das Salz, welches un ter Lichterscheinung kryställisht, mach vinem besträchten Verhältniss musammengesetzt sei; und dass die verschiedelen nosultate der Analysen daven herrühren; dass disselbe, mit fieles schweleleuurem Mah gemengt; sich abgeschieden hat . oger w in dem Doppelsatze die naheren Bestandibeile, als isemerph, net in mannigfaltigen Verhältnissen verbinden konnekanalissen il in "Die Lichtentwickelang" betrider Erystanisansin ward also in dibsem Falle didnitch! bedings dass VintiBoppeling lus schwe

Bane d'Aichterscheinungen bei d, Krystallhildung 451

fshaukem: Keli; hind schweselsaurem Natron, night; reines schwer felsanres Kali, in einem geschmolzenen glasartigen Zustande auf gelöst wird und, aus diesem Lustande in den krystellisirten ühergeht, Die Lichtentwickelung findet also unter gleichen Umständen statt wie die bei der Krystallisation der ersenigen Säure. Abaride die nüberen Bestandtheile des Doppelsalzes nicht durch starke Verwandtschaft gehunden sind, so scheiden sich offijn der Auflösung : dieselben .von einander, ... und die Salze, aus denen jenes Doppelsalz besteht, krystallisiren dann einzeln, des sine als wasserhaltiges Salz. Wennindians, sher der Fall, ist , so findet bei der Krystellisation descripted Salze keing Lichtontwinkelung statt. Diess ist der Grund wechelb, diese Lichterscheinung hisweilen, wenn manı siçi yıjılkührkich heryogrusen will, nicht stattünket, was hei der die der arsonigen Saure sich zoigt, nicht der Fall ist. d. a.In, früheren Zeiten wurde hei vielen technisch-chemischen Processon solves of alsource Keli in so grossen Massen als Nehapproductigewonnen, dass die Kabricanten, wegen der zweckt mässigen Anwendung dieses Salzes in Verlegenheit kamen. Nach der allemeinen: Anwendung des in Chili vorkommenden salpgigrance, Natrons ist indessen das schweselszure. Kali so bedeutend im: Preise gestiegen, dass dieser Umstand, namentlich hai den Alayafabrication, von grosser Wichtigkeit geworden ist. Nach dieser Zeit habe ich beständig das im Handel vorkommondo Salz gehr, natronhaltig gefunden. Das käufliche Salz hette dann kolikommen die Form des anhweselsauren Kali's and epthielt dag: Natron als wasserfreies sohwefelsauree Natron. Has känfliche, fols enthielt also das heschriebene Doppelsals mini In disamp Doppelsalze ist /das Kali, mit dam Natron isomorph, was appar nicht dor Fall ist, deup auch das in der Natur yarkommende avasserfrais schwafelsaure Natron (Thenardit) . hat night die Form des sohweselsauren Kali's. Es scheint dass, wenn nein: Kalisalz mit, einem nantsprechenden Natronselze verbunden: ist, die Verhindung in den Fällen die Form des Kalisalzes annimmt, wenn in derselben, mehr Atome des Kalisalzes Alone des Nationsaktes, enthalter sind it will the said

meinen Feldenethen, such nelbet im Adular, Natron enthalten istelless also diese "Reldenathe eigentlich Verbiedungen von Ke-

452 Bose, Lichterscheinungen bei d. Krystallbildung.

nicht Atome des erstern als des letztern enthalten sind, so haben sie die Form des Kalifeldspaths und nicht die des Albita.

Das Doppelsalz aus schwefelsaurem Kali und schwefelsaurem Natron entsteht, ausser durch unmittelbares Zusammenschmelzen beider näheren Bestandtheile, noch auf mannigfaltige andere Weise, und immer wird die Krystallisation aus einer heissen Auflösung des geschmolzenen Doppelsalzes mit einer Lichterscheinung begleitet.

Es entsteht besonders, wenn schweselsaures Kali mit Chlormatrium zusammengeschmolzen wird. Es scheint sogar, als
wenn das Doppelsalz aus diesem geschmolzenen Gemenge besiser entstehe als aus dem aus schweselsaurem Kall und schwestellieation erfolgt wenigstens regelmässiger und es scheiden sich
nicht Krystalle von wasserhaltigem schweselsaurem Natron ab.

Auch durch's Zusammenschmelzen von schweselsaurem Kali
mit kohlensaurem Natron, so wie von Chlorkalium mit schweselsaurem Natron, und Auslösung der geschmolzenen Massen erhält man
tiel der Krystallisation das Doppelsalz unter starker Lichterscheinung.

Durch vielfältige Versuche habe ich mich überzeugt, dass das schweselsaure Kali bei der Krystallisation nie eine Lichterscheinung giebt, wenn es mit Salzen, welche nicht Nation ent balten, zusammengeschmolzen wird.

Chromsaures Koli. — Gleiche Atomgewichte von neutralem chromsaurem Kali und wasserfreiem schwefelsaurem Natron
gaben beim Zusammenschmelzen eine Masse, welche der durch
Schmelzen von schwefelsaurem Kali und schwefelsaurem Natron
erhaltenen ähnlich war. Mit Wasser gekocht, erhielt ich beim
Erkälten, unter starker Lichterscheinung, Krystalle von geller
Farbe und von der Form des chromsauren Kali's, welche bekanntlich der des schwefelsauren Kali's gleich ist. Bei der Amlyse zeigte es sich, dass sie aus Schwefelsaure, Chromsaure,
Kall und Natron bestanden. Die Basen enthielten ein Dritttheil
von dem Sauerstoffe der Säuren.

Indessen auch das reine Doppelsalz aus ohromsaurem Kallund chromsaurem Natron zeigt, auch wenn es nichts von schwefelsauren Salzen enthält, bei der Krystaliisation unter denselben Bedingungen wie das schwefelsaure Boppelsalz eine starke Liebtcracheinung. Man erhält jenes Salz am besten durch's Zusamin menschmelzen von doppelt-chromsaurem Kali mit kohlensaurem Neiten. Das unter Lichtentwickelung krystaliisiste Doppelsalz weigte, ganz die Form des schwofelsauren Kali's und fand sichterch eine Analyse aus 1 At. chromsaurem Natron und 3 At. chromsaurem Kali bestebend.

Scienceares Kali. — Der hohe Preis des Seleus verhinderte, die Versuche mit diesem Salze auf so mannigfaltige Weise, au wiederholen, wie es bei den schwefelsauren und chromeanten Salzen gescheben ist.

Reines selensaures Kali, dessen Krystalle vollkommen die Form des schweselsauren Kali's hatten, gab bei der Krystallisation chen so wenig eine Lichterscheinung wie reines schweselsaures Kali.

Es wurden gleiche Atomgewichte von selensaurem Kali und schweselsaurem Natron zusammengeschmolzen. Die geschmolzene Masse gab, mit Wasser gekocht, unter starker Lichterz scheinung Krystalle von der Form des schweselsauren Kali's, Sie bestanden aus Schweselsäure, Selensäure, Kali und Natron Mangel an Selen verhinderte, selensaures Kali mit selenz saurem Natron zusammenzuschmelzen, um das selensaure Doppelsalz stei von schweselsaurem Salze zu erhalten. Unstreitig aber würde es unter denselben Bedingungen wie das schwesselsauren und ehromsaure Doppelsalz bei der Krystallisation eine Lichterscheinung gezeigt haben.

Die Lichterscheinungen, welche sich beim Krystallisiren gewisser Körper zeigen, werden, wie sich aus dem Verbiergeheuden ergiebt, dadurch bedingt, dass das Salz aus einem Zich stunde in einen andern, isomeren, übergeht. Ein solcher Uebern gang ist häufig mit Erscheinungen begleitet, welche von ähnd licher Natur zu sein scheinen wie das Leuchten bei der Kryustaffisation einiger Salze.

Die bekannteste Erscheinung dieser Art ist das plötzliche Reglübes gewisser Oxyde, wie das des Chromoxyds, der Tiutansäure u. s. w., so wie auch einiger Mineralien, wie das des Gadolinits. Vor dem Erglüben sind dieselben leicht in Säuren löslich oder durch dieselben zersetzbar, nach demselben sind

sie entweder in denselben anfäslich eider iste che Wenigstens sehr schwer föslich und wersetzburg mon im dengab und unschuten eine Bei den beiden isomwischen Ebstählich ubr arsenigen Säure zeigen eich Verschiefenheiten im speb. Gewichte und in der Adlieslichkeit in Wusser. ... Auch bei den erwähnten Mineralien findet ein Unterschied im spec. Gewichte derselben vor und nuch dem Erglitten stätt. Påsselbe ist nach der Pouerersebeinung aber Micht immer and with wermathen seller greeker his ver derselben, studern biswellen auch leichter. Dieser Umstandigh mir Veranlassung, zu untersuchen, obeisdwihfebei der Licke entwickelung bei der Krystallsation, wis wuch bei der Federerscheining, welche gewäse Oxylo und Mineralien zeigen, Wärne frei wird *). Durch wannigfaktige Versuche konnte weder w der Lichterscheinung beim Krystallisiren der glasarfigen attemgen Saure, noth bei der Feuererscheinung, welche dus Chronoxyd beim Einitzen zeigt, eine beitierkbare Warnicontwickelung währgenommen werden. Beide Lichtentwickelingen, Weltlie viellescht stein in scheinen, scheinen nicht in einem Verhaltnisse zu der Veränderung zu stehen, welche jehe Schstanzen vor und nach der Krysfallisation und dem Erhitzen keigen. ราย (การ เอาการเทียว) (การ์ม ฮายา (เมื่อ) การ์ยการ์มเกษายนสมบาท มายทางศา (ครั้ง) grante of the annie to the Artist Randon define the wife here. า พระกรรง พระการการกระทุกยาฐเมลิก**นั้น**สูง พระกรรก **กระส**า เดื ยะเรื่องการก

Teber die Verdampfung ungleich flücktiger gemischter Flüssigketten:

Von ---

R. F. MARCHAND.

Rin ausgezeichneter Physiker bet, den Verschlag gemacht, sich des Psychrometers als eines Alkaholomaters zu bedienen abne jedoch Versuche über diesep Gegenstand angestellt zu beden. Er glauhte, was auch geog einleuchtent und augar nothwendig zu sein scheint, ein starker Alkohol würde schneller verdampfen als ein verdünnter und auf diese Weins eine habet tenders Abküblung herverbringen; aus der Temperaturpraiedrigung des einen Psychrometer-Thermometers gagen das andere, die

The state of the second of the second second

^{*)} Vgi. Scheerer'in dies. Journ. Bd. XXII. s. 479.

ifftemperatur anzeigende, könnte man vielleicht unmittelhar die ärke des Alkohols berechnen.

Einige Versuche, welche ich hierüber ausgeführt habe, zeign mir, dass es nicht möglich sei, diess Instrument hierzu zu
nntzen; indessen machte ich bei dieser Gelegenheit einige Benchtungen, die inh hier der Aufmerksamkeit der Physiker
d. Chemiter übergeben will. Ich benutzte zu dieser Unternhung ein vertrefflich gearbeitetes Augustisches Psychrotar, walches von Hrn. F. A. Greiner in Berlin *) mit
esser Getauigkeit augefertigt worden war. Die beiden Thermeter, welche von — 10° bis + 45° R. reichten, stimmten
ling überein und gestatteten eine Beobachtung von ¼ eines
stantheilgrades.

In den folgenden Tabellen bezeichnet t die Temperatur des mitmers, t die des Phychrometers, welches mit Wasser betat war, und t' die des mit dem zu untersuchenden Weinist befenchteten. Die Stärke des Alkohols wurde mit einem namen Alkoholometer bestimmt (nach Richter).

Erste, Versuchsreike.

Alkehol 96° R. Alk. 85° B. Alk. 75° R. Alk. 69° R. $t = 13.8^{\circ}$ $t = 13.8^{\circ}$ $t = 13.8^{\circ}$ $t = 13.8^{\circ}$ $t' = 10.6^{\circ}$ $t' = 10.6^{\circ}$ $t' = 10.6^{\circ}$ $t' = 7.4^{\circ}$ $t' = 7.4^{\circ}$ $t' = 7.4^{\circ}$ $t' = 7.5^{\circ}$ $t' = 7.8^{\circ}$ 5. 8. Alk. 60° R. Alk. 51° R. Alk. 46° R. Alk. 40° R. $t = 13.8^{\circ}$ $t = 13.8^{\circ}$ $t = 13.8^{\circ}$ $t = 13.8^{\circ}$ $t' = 10.6^{\circ}$ $t' = 10.6^{\circ}$ $t' = 10.7^{\circ}$ $t' = 8.00^{\circ}$ $t' = 8.4^{\circ}$ $t'' = 8.5^{\circ}$.

^{*)} Hr. F. A. Greiner in Berlin (Leipziger Strasse No. 43) vertigt diese Instrumente und alle anderen meteorologischen und cheschen Apparate, welche von den Glasbläsern geliefert werden, mit sgezeichneter Geschicklichkeit. Da sich derselbe zu gleicher Zeit rch seine grosse Gefälligkeit, seine möglichst niedrigen Preise und Schnelligkeit auszeichnet, mit welcher er alle Bestellungen auszirt, so fühle ich mich verpflichtet, das wissenschaftliche Publicum in diesen vortreffichen Künstler besonders aufmerksam zu machen. R. F. Md.

456 Marchand, üb. die Verdampfung ungleich

Diese acht Beobachtungen zeigen, dass Alkobel, welcher 40 Wasser enthält, genau dieselbe Verdampfungskälte hervorbringt als der, welcher mit 15% Wasser, und fast dieselbe als der, welcher mit 25g Wasser verdünnt ist; ferner, dass nur ein unbedeutender Unterschied sich zeigt bei Alkohol von 60° B. und 51°R., dass aber bei grösserer Verdünnung eine bedeutendere Differenz eintrete. Bei 75°R. trat die erste Verschiedenheit ein; um zu sehen, ob dieselbe schon früher stattfände, wurde cine andere Versuchsreihe angestellt, welche sich diesem Puncte langsam näherte und den Uebergangsgrad genau bestimmen solke. Ich hatte bemerkt, dass die Zeit, welche nothwendig war, un das Thermometer auf die möglichst niedrige Temperatur fallen zu sehen, eine nicht unbedeutende war. Es wurden gewöhnlich 10-12 Minuten zu jeder Bestimmung erfordert; ich fürchtete daher, es möchte namentlich die Temperatur, welche durch -Verdunsten des starken Alkohols hervorgebracht worden war, nicht richtig beobachtet worden sein. Sehr leicht konnte der Alkohol Wasser aus der Luft während des Versuches angezogen haben und nun nicht so schnell verdampft sein und eine so starke Temperaturerniedrigung hervorgebracht haben, als er an und für sich im Stande sei; oder ich konnte auch die Beobachtung zu früh unterbrochen haben, ehe der niedrigste Temperaturgrad eingetreten war; es wurde daher zuerst mit dem 96° B. starken Alkohol eine neue Versuchsreihe angestelk.

Zweite Versuchsreihe.

1. June

1. 2. 3. 4. Alk. 96°R. Alk. 96°R. Alk. 96°R. Alk, 96°R. $t = 13,05^{\circ}$ $t = 13,1^{\circ}$ $t = 13,00^{\circ}$ $t = 13,05^{\circ}$ $t' = 10,80^{\circ}$ $t' = 10,15^{\circ}$ $t' = 10,00^{\circ}$ $t' = 10,80^{\circ}$ $t' = 7,4^{\circ}$ $t'' = 7,42^{\circ}$ $t'' = 7,35^{\circ}$ $t'' = 7,4^{\circ}$.

Diese vier Versuche sind unter den verschiedensten Umständen angestellt worden. Bei 1) ist das Gefäss, in welchen sich der Alkohol befand, gar nicht bedeckt gewesen, bei 2) wurde es sehr sorgfältig bedeckt, bei 3) wurde der Alkohol von Zeit zu Zeit aus einer Flasche auf die Thermometerkugel (welche mit doppelten Mousselin umgeben und mit einem wollenen Docht umschlungen war, der in ein unterstehendes Gefäss reichte)

Variable 22 to 23 to an abdomedia

fgetröpfelt, und 4) war endlich die Wiederholung vom zweir Verseehe. Jede einzelne Beobachtung währte 20 Minuten, hon mach 10 Minutes war der tiefste Punct erreicht; nur bei , we der Alkohol nach 15-16 Minuten grossentheils vermpft war, fand ungefähr nach 18 Minuten ein Steigen des iermemeters statt; sonst war die angegebene Temperatur constant.

unit is determined. It in it is in the interest in the contraction of the contraction of

ar in order from the

The state of the s Alk. 96°R. Alk. 84°R. Alk. 77°R. Alk. 76°R. $t = 13,05^{\circ}$ $t = 13,05^{\circ}$ $t = 13,00^{\circ}$ $t = 13,05^{\circ}$ $t' = 10.8^{\circ}$ $t' = 10.80^{\circ}$ $t' = 10.85^{\circ}$ $t' = 10.80^{\circ}$ $t''=7,41^{\circ}$ $t''=7,40^{\circ}$ $t''=7,40^{\circ}$ 6. **5.** Alk. 74°R. Alk. 71°R. Alk. 69°R. Alk. 65°R. $t = 13,05^{\circ}$ $t = 13,05^{\circ}$ $t = 13,05^{\circ}$ $t' = 10,80^{\circ}$ $t' = 10,80^{\circ}$ $t' = 10,80^{\circ}$ $t' = 10,80^{\circ}$ $t''=7,60^{\circ}$ $t''=7,80^{\circ}$ $t''=7,80^{\circ}$ $t''=7,85^{\circ}$ 10. 11. Alk. 63° R. Alk. 60° R. Alk. 58° R. Alk. 56° R. $t = 13,05^{\circ}$ $t = 13,05^{\circ}$ $t = 13,05^{\circ}$ $t' = 10,80^{\circ} \ t' = 10,80^{\circ} \ t' = 10,80^{\circ} \ t' = 10,80^{\circ}$ $t''=7,80^{\circ} t''=7,80^{\circ} t''=7,80^{\circ} t''=7,825^{\circ}$.

Diese dritte Reihe zeigt sogleich, dass die erste Disferenz i Alkohol von 75°R. eintreten muss, die zweite schon zwihen 74 und 71°. Hierbei hält sich die Zahl fest bis auf Man wird finden, dass stärkere Verdünnungen jetzt irkere Unterschiede hervorbringen. Es ist zu bemerken, dass vierte Reihe, welche sich auf schwächern Alkohol bezieht, einer niedrigern Lufttemperatur angestellt worden ist.

Vierte Versuchsreihe.

3. 2. 4. 4. 4. dist. 11 Alk. 96° R. Alk. 44° R. Alk. 38° R. Alk. 34° R. $t = 19,6^{\circ}$ $t = 12,6^{\circ}$ $t = 12,6^{\circ}$ $t = 13,6^{\circ}$ $t' = 10.3^{\circ} \quad t' = 10.3^{\circ$ $t''=6,6^{\circ}$ $t''=7,2^{\circ}$ $t''=7,7^{\circ}$ $t''=8,2^{\circ}$

Alk. 1879 B. Alku 240 B. Alk. 188 B. Alk. 189 B. Alk.

Recorded to a self-oral filmin'ng,20 ion alicht, the armet Live oralis states where from 10,600 to 12.000 to 12.000 The oral self-off all all all 10,500 the

Ich habe noch gegen 60 Beobachtungen angestellt, welche jene Thatsachen nur beweisen, so dass ich sie füglich übergehen kann. Es geht, hieraus deutlich hervor, dass 1) das Psychrometer durchaus nicht als Alkoholometer angewandt werden kann, da es bei sehr verschiedenen Alkoholgehalten der Flüssigkeit durchaus gleiche Temperaturen zeigt; 2) dass die Verschiedenheiten in den Abkühlungen sich bei geringeren Alkoholgehalts- Diffarenzen stärker zeigeh, wenn die Verdünnung sehr stark ist; 3) dass sich hier Rescheinungen zeigen, welche einige Alfalogie mit denen bei der Bestillation das verdünnten Alkohols haben.

Da der Aether eine so wehr viel greenere Flünktigkelt best wie der Alkohel, so hoffte ich hier eine undere Art von
scheinungen anzutreffen und wurd in der That von dem Erge des Versuebes übertascht. Gewöhnlicher käuflicher Aeir, welcher wasserhaltig und alkohelhaltig war, warde und
Peychrometerkugel getropft.

ultring special filter of the order of the 18,5° for the land, with the following special and the contraction of the contractio

Die Temperaturerniedrigung war sehr bedeutend, und ich te eine ähnliche zu finden, wenn ich Alkohol, mit Aether mischt ahwendete. Ich glaubte, namentlich dieses Mittel bezen zu können, um den Alkohol auf Aethergehalt zu untershen.

Vor einiger Zeit habe ich aus einer Handlung sogenannten soluten Alkohol bezogen, welcher wirklich das spec. Gew. Alkohols im wasserfreien Zustande besass. Der etwas ätherige Geruch machte mir das Fabricat verdächtig und ich fand genauer Untersuchung in der That ungefähr 1/30 Aether in mselben. Ich glaubte, künftig solche Prüfungen augenblickhait dem Psychrometer ausführen zu können. Ich mischte shalb den 96° starken Alkohol mit 1/30 käuflichem Aether d stellte mit beiden Flüssigkeiten den Versuch an.

Alkohol von 96°R. Aetherhaltiger Alkohol. $t = 13.5^{\circ}$ $t = 13.5^{\circ}$ $t'' = 7.45^{\circ}$ $t'' = 7.6^{\circ}$.

Dieses überraschende Resultat wurde noch einige Male erlten. Ich bereitete jetzt eine Mischung von 40 Th. Alkohol 4 1 Th. Aether:

Alkohol von 96°R. Aetherhaltiger Alkohol. $t = 13,55^{\circ}$ $t'' = 7,50^{\circ}$ $t'' = 7,82^{\circ}$

Hadlich wurde eine Mischung von 8 Th. Alkohol und 1. Aether genommen; diese gab:
Alkohol von 96°R. Aetherhakiger Alkohol.

 $t'' = 13.5^{\circ}$, $t'' = 13.5^{\circ}$ $t'' = 7.44^{\circ}$ $t'' = 6.0^{\circ}$.

Der Aether hat hier die Temperatur erniedrigt, während sie früher erhöhte. Da der Aether selbst eine starke Kälte

beim Verdampfen erzeugt, so muss er auch nothwendig, in grösserer Menge dem Alkehol beigemischt, dieser Mischung eine grössere. Verdampfungskälte ertheilen, als der Alkebol; für sich allein henitzt. Ich habe aber oben angegeben, dass die Zeit, welche erfordert wird, dass das Thermometer auf den möglichet niedrigen Punct falle, nicht unbedeutend sei. Ist nun der Aethergehalt der Flüssigkeit nur gering, so verdampst aller Aether, ehe er noch binreichend auf das Thermometer einwirken kann. Mit dem Aetherdampse wird noch Alkoholdamps fortgerissen, so dass ein Alkohol zurückbleibt, welcher mehr wasserhaltig ist als der ursprünglich angewandte; dazu kommt nun noch das Wasser, welches der Aether selbst enthalten hat und das er zurückgelassen, so dass ein sehr wasserhaltiger Alkohol auf diese Weise entsteht. Es wäre also wohl möglich, gerade durch diese Temperaturerhöhung den Aethergehalt des Alkohols zu entdecken und nicht durch eine Temperaturerniedrigung. Soll diese eintreten, so muss eine so grosse Menge Aether im Alkohol enthalten sein, dass man über seine Anwesenheft keinen Augenblick in Zweifel sein kann.

LXI.

Ueber die Entstehung der Abstumpfungsflächen bei den Krystallen.

Von

R. F. MARCHAND.

(Nebst einer Kupfertafel.)

Durch Ehrenberg's mikroskopische Untersuchungen über die Entstehung der Krystalle *) wurde ich veranischt; eine Anzahl von Beobachtungen anzustellen, welche ich nach der Entdeckung der prachtvollen Erscheinung bei dem chlorisatinsauren Bleioxyd und Kupferoxyd durch Erdmann, wester ausschnte, als ich anfangs beabsichtigen konnte.

Meine Aufmerksamkeit wurde jedoch baid durch eine Erscheinung gesesselt, welche ich hier kurz beschreiben will, da

Test of the compatible of the

ball by Poggendi Ann. Bd. XXXVI. S. 937. And here produced

sie, se viel mir bekannt, noch nicht beobacitet oder wenigetens noch nicht beschiet worden ist. Ich meine die Entstehung der Abstumpfungsflichen an den Krystallen.

Enter der grossen Auzahl von Salzen, welche ich mikreskopisch untersucht habe, fand ich das saure chromsente Kalt am geeignetsten zu den Beobachtungen über die Entstehning der Krystalle, sowohl wegen der Schwerlöslichkeit dieses Salzes, also auch seiner leichten Krystallisirbarkeit, wie auch seiner intensiven Farbe und endlich der einfachen Form wegen, welche die eine seiner Projectionen zeigt. Kochsalz und schwerfelmures Eupferexyd eignen sich gleichfülle dazu, indessen verhindet keines dieser Salze alle die Vorzüge, welche dem sauren chromsburen Kali eigen sind.

... Ont soure chromsaure Kall erscheint, wenn die Krystelle voliständig ausgebildet sind, als rechtwinklige vierseltige Twfuin , weishe sohr unregelmässig nach den beiden Dimensionen being edebat sind. Bald sind sie völlig quadratisch, bald ausserordentlich in die Länge gezogen, so dass sie selbst nadelformig auftreten können. Diese geschicht besonders, wenn die Krystallisation schr schnell vor sich geht; und man beobachtet bands, dass die Nadeln in eine starke Bewegung gerathen und sich heftig einander anziehen, sich aber ohne eine scheinbare Udsetsinässigkeit neben einander gruppiren. Geht die Krystal-Madion langsamer von Statten, so sicht man des Salz in bretten oder schmalen langen Krystallen anschlessen, deren Form ein Quadrat oder ein rechtwinkliges langes schmales Viereck dur? stellt (Fig. 1: 2). Neben diesen regelmässigen einfächen Fil guren erscheinen complicirtere, gebildet durch Abstumpfungen. welche auf die Deken unter Winkeln von 135° oder seiten von 46° universetzt sind (Fig. 3. 4). Antangs vermuthete ich', wie auch andere Personen dieser Meinung sind, diese Abstumpfünwin entitlisien aus der treprünglichen Grundform in Folge diwer wiglefehmässigen Ausdahnung der einzelnen Beiten, so etwa, chis ob in Fig. 5 die Seite a sich ausdehnte, die Seke b gleich-This is and a indessen thre Dimensionen beibebielten und and durch der Seite e die Entstehung geben müssten, welche sich muturilen immer unter einem constanten Winkel gegen et und c entwickeln mussle. - Diese Volkteilting war mit solbet se gelächig, dass fehrlich

Benhaghtung, wolchermishervom: Gegentheile : Therrette. an-Langs, kein "Antrauen zu schenken igeneigt, war-, Bai können in der That auf diese Weise fast alle Anstumpfungen ventstehen nur würde die, welche in Eig. A dergestellt ist; niemels zu Standen kommen, können, under night kann sig sehr leicht he obachtet merden, Manskönnta spia indegsen shhich zvie Fig. deuten, pur müsste die Ansdehausg von 4 gegen gi so augselordantlich gross wavesen seinen des der Kenetall, haarförnig lang prantice of mod dedunch a morvissermanagen so workummen sein indepantage gight der Beschaubtung grantlicht entage ein minim -161 Botrachtetuman, jedoch zaufmerkenm, die Bildung der Kry stalle in ab gadetumabilachi indea indea indea indea indea indea in ealight mehr wachsenden Krystall eine Abstumpfung hemarkt: indiese supply yam; Anfange anusia agewayen istanidass sich sogar die Krystalia gawöbalich mit. Abstumpfungan bilden welcha: meh and mach rerachwinden. . So entatebt. Fig. . 2 ganz growingish ans, Fig. 6. Dian Soite a list hier, wienes might moltan sich zeigt, night als eine gerade. Linie entwickelte sondern gertyeder durch sirgend sine mechanische Ursache darin gestört worden ader abolich wie in Fig. 7. ausgehildet, bur mit kleineren und öfferen i Wiederholungen, molche idahar das: Appehan einer kum menalinie hanvoransen, dois . and. ank abharate gived dois _i,, _vloh glauhe:picht_, dese diese "zusammengesetzten: Kesmer einem: ginzigen Krystelle asspränglich angehören evielmehr habe ich aft baobaphtet, wie swei oder auch drei Krystallausich vareipigtan, und aufodiese Weise soloha. Kannon darstellen ivis sie Rig., 7 ... Keigt. Fig. S., wird davon ein deptliches Beispiel geben , i., _ :: Ala Beispiele, yan bönüg austrefandan. Neränderungen: bah das Hugulertfache vermahren, jedech; bieten die ferneren Modi-Bestionen mur manig: Kigosthümliches, der zu nudu beis dan Leiche tigkeit der Beabschtung, welche seban ein mittelmännigen Mi kroskop gestattet...halte: jeh jes für igpaügend, auf die Arschein nand and water and semantic and paper of the first dass eine Vergrässerung von ungefähr 309im 400mal (linear) eine sehr gute Bechachtung gestallating ein volles vie dernich o fari Die Afrecheidungen and Aleben ich in ebant beschrieben: habs sind wahrscheinlich schon früher von Ehrenberte worden Lat. and designed anner beinder Krysinilisation desigkoch-

palatean altach. ditaes anh Ehrand e regular, des Abstumpfangen lds .. quad ratisghein (Infela: sugret i anachitistan), .. welche geleb : est land in die gewöhnliche Kurm des Moshankes um werdelien. Kileindubeche neigh inicht den illeinung und, halti seide edigendelt inco Enfalmedia von Mittecherlinh sheobachistani und abbo bhabbanens Mostishinhydgatkayataligy / walaban sidb bal: pigdain rak: Tamperatur: hilden; .: Ibeho glashei, dieine sandene inlandie sebad Eine Liebert weglich eren gemeinen gelechten gebreite enter ish idebothinstitumend mit diesen Bachuthungen nind ginige Mrs. februagen qui welche mie Br. Prof./Ganite vi Rie se mitsathisis sie obaskten im iliva ida führen zick apführen im iliva ida john salaksi in iliva ida john salaksi iliva ida john salaksi iliva ida john salaksi iliva iliva ida john salaksi iliva ida john salaksi iliva a:['i' Bulmpdt: iman neitie: Saladösungy: and bastens von Kapfafülltrick aly Miss and Heneuguing der (Kryatalle) nineat alias banted sign Bilddag: grebsen: enleges sickapter - Ekemplairb: helansi zinib : higtisie iandia: jetzt ganz cancestrirte. abgegedene Salziësung; sa ikadh manidan skraft ünglichen: Klystall süngemain vergeösserti. - Wenk der Mayetull fan fliagliche eine i hazatil wini Abitumpfuilgeit weigte, swister and diese nach and natheversplantaden and der Kryw etalbositicheintosenstich üns deriegung einfachen Britm. Mennstinian kingeren igteieli kafangis éinéil/einfachen kifyataka iso kada mán thin mail das Capaul und Mehrfache nongrassern : abaçı idade et jezzik jetzt abgestumpite. Phichen izeigen avica. ... West die Abstampenig i nick: interriber règélmissigen: Borm i mater i elsélés parisib wirds die in diesem Walle dothweidig zu Standerkommen in üssen.("Feite amai indexden: jetst givnellipyktall; mailist ou freino glasz rolle: Weisejgnun gungefähr in der Richtung ausg in welcher sich dub Abstrupfoquiliache watestreb bann, ina findet iban şuirban man desidiry with live itier was been diset, disete make and michg wisgethides the kie versichtet wird und der regelmässigen Blüchle sie with above the orbidebart his dear chieffa lutteran site ::: h Ech::kultife::hierhn::noch::einige Bemerkungen über-die iligastubung der / Krystafle aus den dem osphen Niederschlägbe, dille interbokannti, ledasse idio empressen Niederschlige emmendem Mihibhide ja der Rorm vonlikktisch Mügehahin erscheinenche man bei der Thonerde unter andern recht deutlich wahrnehmen kann. Sehr häufig sieht man diese Kügelchen sich perischnurförmige aufreibenge ab. ein Benbachter, der erganischen Natur, wenn er wichtzwüsste, was ensicht eine Zweifel irgend eine organisirie Bubstanz, ein Thier ader eine Manze,

zu sehen glauben würde. Fig. 18 stellt einen solchen Niederschlag dar, wie man ihn mit der grössten Leichtigkeit beobachten kann. Wir können uns hier die Frage auswerfen, sind diese Kügelehen in der That amorph? Sind es wirklich Kägelchen eder erscheinen sie uns nur als solche? Ich habe mich überzeugt, dass die stärkste Vergrösserung, welche man im Stade ist anzuwenden, was nicht irgend eine krystallinische Form zeigt Eine Linearvergrösserung von 2400mal: (also eine Blächenvergrösserung von 5,760,000), bei der man freilich, selbst hei den vierzüglichsten Sehiek'schen Mikreakopen, kasten noch zu beobachten im Stande ist, zeigte den Niederschlag immer nech Als : Kügeleben. Bs ist kaum zu entscheiden, ob in der That die Kugelforin hier existirt, feder db: vielieicht der kieine Krystall durch eine Unzahl von Abstumpfungen abgerundet erscheint. Dan Letztere möchte an Wahrscheinlichkeit gewinnen, wenn man bei der Betrachtung irgend eines pulverförmigen Niederschlags augenblicklich die deutliche Krystaliform entdeckt... Wiene wir mit einer jeden. Vermuthung enthalten, iso müssen wir den Niederachlag als kuglig betrachten, wofür wir auch in der That eimige Analogien auffinden *). Wir haben bei Körpern, welche leicht krystallisiren können und die sich langsam bilden edet auscheiden, z. B. bei der Harnsäure, die man unter gewisse Umständen in schönen mikroskopischen: Krystallen erhalten kann, in ihren concentuisch gebildeten i Kügnithen; wie im in den Schnocken vorksimmen, keine: Apur von Krystallimion (**). ... ii :: Zaweilen geschicht es inun, dass diegenamorphes Niedermahläge sich nach und nach krystallinisch gruppirens die Kagelehen: verschwinden und vereinigen nich zu Arystellen. Die Meabachtung dieser Erscheinung, bistet viele Schwierigkeiten der, sie wird aber sehr erleichtert bei dem chlorisationauren Alst--azyd 本本本). Am besten bereitet: man:/diosas Salz .unter den Mikroskope selbst, indem men eine verdünnte Auflösung von dbiorisatinzaurem Kali durch eine gleichfalls recht: verdüsste Auflösung von esnigsaurem Bleibnyd... zenseizt. zo Augeablicklich -read and the read to the control of the rest of the r

^{-22. *)} Vgl. Whrenberg in the Gont. KKl. 957. This in dies. John & 1997. This in dies. John & 1997. This in dies. John & 1997. This is dies.

erscheint der gelbe Niederschlag, welcher aus kleinen Kügelchen (Fig. 12) besteht. Nach einiger Zeit tritt die von Erdmann beschriebene Reaction ein *), die gelben Körperchen verschwinden und gruppiren sich zu hochrothen prachtvollen, meist dendritischen Krystallen, welche sich nun nicht weiter verändern. Fig. 13. 14. Das Kupfersalz erleidet ähnliche Veränderungen, welche jedoch schwieriger zu untersuchen sind. Mit der grössten Aufmerksamkeit ist man nicht im Stande, während dieser krystallinischen Bildung eine Bewegung in den Körnchen wahrzunehmen, wie auch Ehrenberg diese nie sehen konnte. An irgend einer Stelle bildet sich ein rother Punct und alsbaid sieht man ihn umgeben von einer Zone eines scheinbar leeren Raumes. Diese Zone erweitert sich gleichmässig mit dem Wachsen des Krystalls; ausserhalb derselben verschwinden Körnchen, doch so plötzlich, dass man sie kaum verschwinden sieht, und gleichzeitig vergrössert sich der Krystali mit grosser Schnelligkeit. Fig. 15.

Diese räthselhafte Erscheinung würde eine Art von Erklärung finden, wollte man annehmen, dass die amorphen Körnchen (Ehrenberg's Morpholithen oder Krystalloide) sich in der Flässigkeit erst wieder auflösten und sodann sich in der neuen Form ansetzten. Diesem widerspricht jedoch durchaus die Thatsache, dass diese Verbindung in der That ganz unlöslich ist und dass unmöglich die Form, ein rein mechanischer Zustand, die chemischen Eigenschaften eines Körpers verändern und aufheben kann. Auf eine gleiche Weise hat man die Umwandlung des Arragonit in Kalkspath, welche von G. Rose zuerst richtig aufgefasst worden ist **), zu erklären gesucht, jedoch gewiss nicht mit Recht. Es ist ohne Zweisel hier wie bei dem Quecksilberjodid, welches, fertig gebildet, durch mechanische Rinflüsse plötzlich seine Form und damit seine Farbe ändert ***). Eine ganz ähnliche Erscheinung bietet auch der Schwesel dar, wie ich in Gemeinschaft mit Hrn. Dr. R. Scheerer gefunden habe, Verhältnisse, welche wir sehr bald ausführlich beschreiben werden.

^{*)} Dies. Journ. XIX. 344.

^{**)} Dies. Journ. XIII. 8.

^{***)} Vgl. Mitscherlich in Poggend. Ann. XXVIII. 116.

LXII.

Beitrag zur Galvanoplustik.

Von

R. F. MARCHAND.

Um Stahlstiche zu vervielfältigen, kann man mit sehr gutem Erfolge von der Originalplatte einen erhabenen Abdruck im Rose'schen Metall nehmen und auf diesen sodann die Kupferplatte niederschlagen. Ist die Platte sehr gross, so hat das Abklatschen einige Schwierigkeiten; man umgeht sie, wenn man das eben erstarrende Metall mit der Stahlplatte unter eine starke Presse bringt und es unter dieser erkalten lässt. Auch von Kupferplatten, welche man durch die Behandlung im Apparat zu verderben fürchtet, kann man auf diese Weise sich einen Abklatsch verschaffen. Den Stich in Blei abzupressen, ist nicht so zu empfehlen. Der Abdruck wird nicht eben so scharf. Zum Pressen selbst wendet man am vortheilhaftesten einen verticalen Druck und keine Walze an.

Das Anhaften des Kupferniederschlages auf der Originalplatte ist bei Rose'schem Metall nicht zu fürchten, wehl aber bei Kupferplatten, namentlich wenn mit ihnen noch nicht gedruckt ist. Es ist nicht etwa ein Anhaften in den eingegrabenen Zügen, sondern namentlich auf der ganz glatten Kupferplatte, welche gar nicht gravirt ist. Ich habe es auch bei geätzten Platten gefunden. Ein sehr feiner Ueberzug mit Oel, der sorgfältig wieder abgerieben wird, und eine mehrmalige solche Behandlung schützt gegen diesen Uebelstand *).

^{*)} Vgl. Max. Herzog v. Leuchtenberg in dies. Bde. 142.

LXIII.

Auszug aus der "Oversigt over det Kongelige danske Videnskabernes Selskab's Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aaret 1840."

I. Jacobson, über die Chromsäure.

Als Fertsetzung der Untersuchungen über die chemischen und therapeutischen Eigenschaften des Chroms, womit sich Prof. Jacobson seit mehreren Jahren beschäftigt hat, theilte er der Gesellschaft einige Beobachtungen über die Chromsäure mit.

Bie Chromsdure verliert mit grosser Leichtigkeit ihren Sauerstoff, so dass Quecksilber, welches mit der concentrirten oder verdünsten Säure geschüttelt wird, sehnell sich in Oxyd verwandelt. Dasselbe geschieht, wenn man statt der Chrommannet eine concentrirte Auflösung von saurem chromsaurem Kali minnit; auch mit dem neutralen Salze zeigt sich diese Reaction, aber langsamer.

Rine gleiche Kinwirkung zeigt die Chromsäure auf Phosphor, wobei sich ein schön smaragdgrünes phosphorsaures Chromaniz bildet, welches an der Luft zersliesst. — Der Phosphor decemponirt die Säure auch in dem sauren und neutralen chromanuren Kali und scheidet verschiedene Oxydationsstusen des Chroms ab.

Wegen dieser Eigenschaft, Sauerstoff leicht abzugeben, zerstört die Chromsäure auch die blauen und rothen Psianzen-farben beinahe in gleichem Grade wie das Chlor.

Die Säure kann deshalb auch die Hydrojodinsäure decomponiren, und Prof. Jacobson hat sie benutzt bei Untersuchungen des Urins von Patienten, die Jodsalze brauchten, und hat sie hierzu bequemer gefunden als Chlor.

In vegetabilischen Substanzen, die durchdrungen sind von concentrirter oder verdünnter Chromsäure, entsteht, wenn sie angezündet werden, ein starkes und anhaltendes Glühen, welches jedoch nicht so stark und gleichmässig ist wie das, welches das neutrale chromsaure Kali hervorbringt.

Die Chromsäure zeigt eine bedeutende Einwirkung auf Alkohel, die jedoch noch nicht hinlänglich untersucht worden ist.

Wird die concentrirte Säure zu Alkohol gesetzt, so ent-

steht ein starke Wärmeentwickelung und es bildet sich ein voluminöses Magma.

Wenn die Säure durch vorsichtiges Abdampsen, damit sie dadurch nicht zersetzt werde, in Pulversorm gebracht wird, so bringt sie, wenn sie in Alkohol geworsen wird, eine so starke Wärme hervor, dass sich Alkoholdämpse entwickeln. Diese Beobachtung ist von Hrn. Apotheker Wolf gemacht, der sich zugleich davon überzeugt hat, dass kein Aether bei diesem Processe gebildet werde *).

Die Chromsäure hat mit dem chromsauren Kali die Rigenschaft gemein, die Verwesung von animalischen Substanzen zu verhüten, und kann daher in sehr verdünntem Zustande mit Vortheil bei anatomischen Untersuchungen angewandt werden und um längere Zeit anatomische Gegenstände darin aufzubewahren. Aber da die Säure eine Verbindung eingeht mit den sibrösen und albuminösen Bestandtheilen der thierischen Organe, so macht sie dieselben etwas härter. Diese Eigenschaft hat Prof. Jacobson benutzt bei anatomischen Untersuchungen weicher Organe und besonders der Augen. Diese Organe erhalten dadurch, dass man sie eine Zeit lang in der verdünnten Säure liegen lässt, eine solche Consistenz, dass man das ganze Auge durchschneiden und deswegen besser als bis jetzt die Lage und Verbindungen der verschiedenen Theile untersuchen kann ‡*). -Bei längerer Aufbewahrung thierischer Substanzen in Chromsäure oder Auflösungen von Chromsalzen hat Prof. Jacobson gefunden, dass die Knochensubstanz sich bläulich färbt, welches von einer Decomposition der Chromsäure herrührt. Da die Farbe derjenigen des Türkis gleicht oder vielmehr des Kossils, welchem man auch diesen Namen giebt (Turquoise odontelilhe), und du sich diess besonders in einigen Gegenden findet, wo Chrom vorkommt, so leitet Prof. Jacobson die Aufmerksamkeit der Chemiker auf diesen Gegenstand.

^{*)} Ueber die Einwirkung der Chromsäure auf den Alkohol babe ich eine ausführliche Untersuchung angestellt, welche ich in einem der nächsten Heste dieses Journals mittheilen werde. R. F. Md.

^{**)} Um die Theile zu präpariren, die unter dem Mikroskope untersucht werden sollten, ist diess Verfahren mit Nutzen von Dr. Harnover angewandt worden. J. Müller, Archiv f. Anat. u. Physiol. 1840. S. 549.

Was die therapeutischen Eigenschaften der Chrom-äure abetrifft, so hat Prof. Jacobson gefunden, dass dieselbe, auserlich angewandt, theils ein vertheilendes, theils ein corrodiendes Mittel ist, welches er mit Glück bei mehreren Arten von nsammationen, Geschwüren und schlimmen Wunden anwendet.

Innerlich kann sie in grösserer Dosis gegeben werden als as neutrale chromsaure Kali; sie verursacht Uebelkeit, zuweien Erbrechen, aber greift nicht den Magen an und zeigt sich ls ein stärkendes Mittel, welches bei Schwäche des Verdauingsorgane, bei Nervenschwäche und bei einem hektischen Zutande angewandt werden kann.

II. Jerichau, über eine besondere Art von Schwingungen.

Der polytechnische Candidat Jerich au hat der Gesellschaft rerschiedene Untersuchungen mitgetheilt, welche der Belokrung mit der goldenen Medaille für würdig befunden wurden.

Die eine von diesen Untersuchungen betrifft eine eigene Classe von Schwingungen. Der Grundversuch besteht darin, lass eine Taschenuhr, auf die gehörige Weise aufgehängt, durch lie Bewegungen seiner eigenen Unruhe in Schwingungen geetst werden kann. Er hängte z. B. eine Uhr an 2 Fäden auf, so dass dieselbe in einer Ebene schwingen konnte, die parallel war mit dem Schwingrad der Unruhe. Die Fäden waren an zinom dicken Stahldraht befestigt, so dass er durch Umdrehen ie leicht verkürzen und wieder verlängern konnte. Wenn nun lie Fäden eine solche Länge hatten, dass die Uhr allein durch hre Masse mit einer Geschwindigkeit schwingen würde, zicht sehr verschieden wäre von derjenigen der Unruhe, so kam lie Uhr in regelmässige Schwingungen, er mochte nun die Uhr werst in Ruhe gebracht oder sie zuerst in eine mehr oder weniger starke Schwingung versetzt haben. Da die Pendelschwinrungen der Uhr und die Schwingungen der Unruhe gegenseitig ut einander wirken, so werden in diesem Falle die Schwintungen gleichzeitig. Eine Veränderung von einigen Procenten n den Aufhängefäden stört dieses Verhalten nicht; wird aber ie Veränderung über gewisse Grenzen binausgeführt, so hört ie anhaltende Gleichmässigkeit der Schwingungen auf. Die E

Durch fortwährend wachsende Veränderungen wurden peiodische Schwisgungen hervorgebracht, welche von Null. bis zu einem gewissen Maximum wuchsen, darauf bis zu Null ahnahmen und so wiederholt wuchsen und abnahmen. Wenn die Veränderung der Länge über eine gewisse Grenze hinausging, so hörten diese bestimmten Perioden auf und eine merkliche Unregelmässigkeit entstand, worin man jedoch mehr verwickelte Gesetze entdeckt.

Achnliche Gesetze hat er gefunden, indem er die Uhr Drehungsschwingungen aussetzte. Er hängte vermittelst eines Metalldrahtes eine Art von Steighügel auf, wo er eine Uhr hineinlegte, so dass die Schwingungsebene der Unruhe parallel war
mit der der Drehungsschwingungen. Man kann noch hiermit die
Pendelschwingungen vereinigen, so dass alle 3 Arten von Schwingungen zu gleicher Zeit zugegen sind. Wenn sie alle gleichzeitig sind, unterstützen sie einander se, dass die Schwingungen der Uhr nicht durch äussere Kinwirkungen, ausser durch
sehr gewaltsame, verändert werden können.

III. Jerichau, über einen neuen Wärmemesser.

Die andere von Jerichau's Mittheilungen betrifft einen Wärmemesser von ganz neuer Einrichtung. Diese beruht auf Newton's berühmten Entdeckungen über die farbigen Ringe. Wie bekannt, führte er den grössten Theil seiner Versuche aus mit einem Convexglase, welches auf eine andere Linse oder auf eine ebene Glasscheibe gelegt wurde, wodurch man eine Menge farbiger Ringe entstehen sieht. Indem er die Durchmesser dieser farbigen Ringe mass und darnach die Dicke der Lustschicht, worin jede Farbe sich zeigte, berechnete, war er im Stande, die Hauptgesetze für diese Erscheinung anzugeben. Die Untersuchungen der neuern Zeit haben Newton's Messusgen bestätigt, so dass wir jetzt mit Sicherheit von einem Verhältnisse der Farben auf eine gewisse Dicke der Lustlamelle, also auf den Abstand der beiden Flächen, zwischen welchen diese liegt, achliessen können. Man hat deshalb auch schon lange Tafeln gehabt über die Dicke der Lustschicht, welche zu jeder Farbe gehört.

Es war noch Niemandem eingefallen, diese Thatsachen so Längenmessungen zu benutzen, bis Hr. Je rich an diesen Plan fasste. Diess musste schon, sobald es ausgesprochen war, für einen glücklichen Gedanken erkannt werden, denn man muste auf diese Art sehr feine Messungen ausführen können, da die Verschiedenheit zwischen der Dicke zweier Luftschichten, die doch ganz merklich verschiedene Farben zeigen, selten bis zu einem Zweimillionentheil einer Linie steigt. Um nun diese Erscheinungen zur Wärmemessung zu benutzen, stellte Jerich auseinen dünnen, ungefähr 1½ Zoll langen Zinkstreifen aufrecht, über welchem sich eine kleine Glaslinse befindet und über dieser in grosser Nähe eine kleine Glasplatte. Wird nun der Zinkstreifen erwärmt, wenn auch noch so wenig, so dehnt sich derselbe doch hinlänglich aus, so dass die Annäherung der Linse an die Glasscheibe durch Farbenveränderungen sehr merklich wird.

Kine kurze Beschreibung des Instrumentes möchte nicht überfüssig sein. Das Instrument ist verfertigt aus Messing. Auf einem Fusse von ungefähr 4 Zoll Höbe steht der Zinkstreifen in einem Rahmen von Messing; dieser Zinkstreisen trägt die Glaslinse, welche durch eine Feder heruntergedrückt wird, und darüber besindet sich die Glasplatte, mit welcher die Linse nicht in Berührung kommt, wenn nicht die Zinkstange dieselbe so hoch emporhebt. Die Ringe werden durch ein kleines bewegliches Schrobr betrachtet, welches mit einem Gradbogen verbunden ist. Auf die Glasplatte fällt kein anderes Licht als das, welches durch eine kleine Oeffnung in einer Metaliplatte fällt, welche mit dem Sehrohre und dem Gradbogen sich bewegt. Wenn die Entfernung der Linse von der Glasplatte dieselbe bleibt, so sieht man andere Farbenverhältnisse, je nachdem man die Stellung des Sehrohres verändert; und umgekehrt, wenn die Dicke der Luftlamelle sich verändert, muss auch die Stellung des Schrohres verändert werden, wenn man dieselben Farben in derselben Ordnung durch dasselbe erblicken will. Ebe man den Zinkstreisen der Kinwirkung der Wärme aussetzt, stellt man das Schrobr so, dass ein gewisses, sehr in die Augen fallendes Farbenverhältniss, z. B. das Rothe dritter Ordnung, im Mittelpuncte steht, und man bemerkt sich den zu dieser Stellung gehörenden Grad auf dem eingetheilten Bogen und dessen Nonius. Nachdem man die Wärme hat auf den Zinkstreifen einwirken lassen, stellt man das Schrohr wieder auf dieselbe Fathe und liest wiederum den Grad auf dem Bogen ab. Aus der Verschiedenheit der Grade kann die Veränderung in der Dicke der Luttlamelle oder die der Länge des Zinkstreifens leicht berechnet werden, und es liesse sich leicht eine Tafel einrichten, worauf man die Wärmeveränderungen sogleich ablesen könnte. Man hat durch vergleichende Versuche gefunden, dass dieses Instrument wenigstens eben so feine Wärmeveränderungen angeben kann als Melloni's berühmter thermo-elektrischer Wär-Aber Jerichau's Wärmemesser ist auch passend zu mannigsaltigen Versuchen, wozu Melloni's, welcher jedoch für gewisse Zwecke der passendste sein möchte, sich nicht eignet. Man wird mit Hülfe dieses Instrumentes sehr bequem die Ausdehnung der Körper durch die Wärme messen können, selbst wenn man nur kleine Stücke von denselben sich verschaffen kann. Man wird auch mit demselben die Ausdehnung der Krystalle nach den verschiedenen Richtungen messen können, und Mitscherlich's Entdeckungen über die ungleiche Ausdehnung der verschiedenen Krystallaxen, welche er auf eine weniger bequem anwendbare Weise machte, werden so leicht auf eine zahlreiche Menge von Körpern sich ausdehnen lassen.

Es lassen sich nicht leicht alle Folgen voraussehen, wozu ein solches Hülfsmittel, wie dieser neue Wärmemesser, führen kann, aber die Andeutungen, welche wir hier gemacht haben, sind schon hinlänglich, um dessen Wichtigkeit darzulegen. Der Entdecker ist noch beschäftigt, um verschiedene Verbesserungen bei diesem Instrumente anzubringen.

IV. Oersted, über Capillarität.

Die experimentellen Untersuchungen über die Wirkungen der Haarröhrenkraft sind bis jetzt in sehr enge Grenzen eingeschränkt gewesen, da man beinahe ausschliesslich nur Röhren oder Platten von Glas benutzt hat, ungeachtet es wichtig sein würde, die Haarröhrenwirkung auch mit Hinsight auf undurchsichtige Körper und namentlich auf Metalle prüfen zu können. Conferenzrath H. C. Oersted hat eine Vorrichtung vergeschlagen, wedurch diese Einschränkung wegfällt. Er geht aus von der Thatsache, dass die Höhe, wezu eine Haarröhre eine Flüssigkeit hebt, nur auf dem Durchmesser der Röhre auch der Stelle beruht, wezu die Oberfläche der Flüssigkeit gehoben wird, und durchaus nicht auf der Weite der Röhre in niedriger belegenen Theile. Er gebraucht deshalb zu der Un-

tersuchung eine weite Glasröhre, deren oberes Ende mit einer durchbohrten Platte desjenigen Körpers bedeckt ist, dessen Haurröhrenkrast untersucht werden soll. Wenn man sieh eine solche Glasrübre denkt, bedeckt mit einer durchbohrten Platte und angefüllt mit einer Flüssigkeit, mit ihrem offenen Ende in eine Flüssigkeit von derselben Beschaffenheit gestellt, so wird das in die Deckplatte gebohrte Loch der Sitz sein für die Hautröhrenkraft, welche die Flüssigkeit in der Röhre höher hältals ausserhalb derselben. Durch allmähliges Ausschöpten der Flüssigkeit, welche sich ausserhalb der Röhre befindet, kann man den Punct treffen, wo die Haarröbrenkraft nicht länger im Stande ist, die Säule der Flüssigkeit in der Röhre zu tragen. Der Abstand der Deckplatte von der ausserhalb sich befindenden Flüssigkeit in dem Augenblicke der Trennung ist dann das Maass für die Haarröhrenkraft in dem gegebenen Falle. sicht leicht, dass diese Art von Versuchen auf verschiedene Weise ausgeführt werden kann. — Dersted hat es für passond gefunden, von dieser, beim ersten Anscheine natürlichsten Kinrichtung abzuweichen, so nämlich, dass er die Röhre unten eine Biegung machen und in Verbindung mit einer andern Röbre stehen lässt, in welcher die Oberstäche der Flüssigkeit nicht unter einem merklichen Kinflusse der Haartöhrenkraft steht. Diese beiden Röhren setzt er noch in Verbindung mit einer drittent worin eine Art von Stempel die Flüssigkeit: zum Steigen oder, Fallen bringen kann. Die ganze Einrichtung besteht also in 3 mit einander verbundenen Röhren: eine mit der durchbohrten: Deckplatte, welche niedriger ist als die anderen, eine Vergleichungsröhre, worin man sieht, wie hoch die Flüssigkeit ohne Haarröhrenkrast stehen würde, --- und eine Röhre mit dem Stempel, wodurch man die Flüssigkeit in der Wergleichungsrölire zum Steigen oder Fallen bringen kann. Man beginnt den Versuch, nachdem man die Platte auf die erste Rühre gelegt hat, damit, dass man die Flüssigkeit in die Höhe treibt, so dass dieselbe durch die enge Oeffnung in der Platte hindurchdringte Die Kraft, welche die Flüssigkeit überzulaufen hindert, kann durch die Höhe der Wassersäule in der Vergleichungsröhre gemessen werden. Wenn man darauf die Flüssigkeit in der Vergleichungsröhre sinken läset, bo wird auch die Flüssigkeit in der-Ooknung der Deckplatte sich senken and in dem Augen-

474 Oersted, üb. eine neue elektrische Wage.

blicke, wo sie sich ven derselben losreissen will, hängt sie an dem untersten Rande dieser Oeffnung. Es versteht sich, dass die Dicke der Platte sowohl als der Burchmesser der Oeffnung in derselben genau gemessen ist und dass man eine Kinrichtung hat, um das Steigen und Fallen in der Vergleichungsröhre zu messen. Der Stempel besteht bles in einem Glascylinder, welcher mit Leichtigkeit auf und nieder bewegt werden kann in der Röbre, woris er sich besindet, und dadurch die Höhe der Flüssigkeit verändern. Bis jetzt hat Oersted noch nicht Gelegesheit gehabt, recht zahlreiche Versuche nach dieser Methode auszuführen, doch bat er eine ziemlich bedeutende Anzahl von Versuchen mit Wasser und mit Quecksilber angestellt und dabei Oeffnungen von ziemlich ungleichem Durchmesser gebraucht, so wie auch Platten von verschiedenen Körpern, namentlich von Metallen und von Glas. Gleiche Oeffnungen in Deckplatten von amalgamirtem Kupfer und von Glas hoben das Wasser zu einer gleichen Höhe empor. Quecksilber wurde von durchbohrten Platten von amalgamirtem Kupfer ungefähr 3/4 so bech wie Wasser gehoben, woraus folgt, dass die Haarröhrenkraft ein über 10 mai so grosses Gewicht von Quecksilber trägt als von Wasser. Da Oersted für's Erste nicht Gelegenheit erhalten wird, alle die Anwendungen von dieser neuen Einrichtung zu machen, welche er beabsichtigte, so würde es ihm angenehm sein, wenn er dieselbe von anderen Physikern angewandt sähe. Oersted hatte die hier beschriebene Einrichtung achon vor 2 Jahren sich ausgedächt, und er zeigte im Jahre 1839 Versuche mit derselben bei der Versammlung der skandinavischen Naturforscher in Götheborg. Aber das Instrument war damels soch nicht zur gehörigen Vollkommenheit gebracht worden. In der Versammlung zu Copenhagen im Jahre 1840 zeigte er zweitverschiedene neue Ausführungen von diesem Instrumente, eine für Wasser und eine andere für Quecksilber, welche jedoch in ihren wesentlichen Theilen nicht von einander Beide bat er auch vorgezeigt in der Gesellschaft abwichen. der Wissenschaften.

Oersted hat gleichfalls der Gesellschaft eine neue Einrichtung der elektrischen Wage vorgezeigt, bestimmt für sehr

V. Oersted, über eine neue elektrische Wage.

schwache Grade der Elektricität. Die Wagestange besteht hi einem dünnen Messingdraht, welcher an einem Faden aus dem Seidenwurmgespinnst hängt. Um ihm eine bestimmtere Richtungskraft zu geben als die ist, welche er von der Drebungskraft eines einzigen Seidenfadens erhalten kann, ist er vermittelst eines kleinen Stabildrahtes, dem man einen ganz schwachen Magaetismus mitgetheilt hat, an dem Seidenfaden befestigt; Die Wagestange hängt in einem Glascylinder, durch dessen Deckel ein gebogener Metalldraht geht, isolirt von demselben durch Gummilack und Glasröhren, und dessen Enden auf solche Art mit der Wagestange in Berührung kommen, dass das eine dieselbe auf der rechten Seite berührt, das andere auf der linken. Indem also der Metalidraht Blektricität annimmt, geht diese sogleich über in die Wagestange und bringt eine Drehung hervor. Wenn die magnetische Richtungskraft so gering ist, dass sie kaum bemerkt wird, zeigt diess Elektrometer eine ausserordentliche Feinheit. Um sehr schwache elektrische Wirkungen zu entdecken, theilt man zuerst eine Elektricität der Wagestange mit, welche diese um einige Grade dreht. Ein Körper, welcher dieselbe Art Elektricität besitzt, bringt dank; wenn er genähert wird, eine sehr bedeutende Vergrösserung in der Abweichung hervor. Die Elektricität, welche isolirte Zinkund Kupferplatten nach der Berührung und Trennung zeigen, wird auf diese Art sehr kenntlich, ohne Hülfe des Condensators. Um desto bequemer auch die kleinsten Grade der Abe weichung sehen zu können, kann man die eine Spitze der Wagestange durch ein Mikroskop betrachten, worin ein Seidonfaden senkrecht angebracht ist.

A CARLES LXIV.

Ueber die bei der Verbrennung des Diamants zurückbleibende Asche.

Von

Dr. A. PETZHOLDT.

Bekanntlich verbrannten Erdmann und Marchand Behufs der genauern Feststellung des Atomgewichtes des Kohlenstoffes Diamanten und erhielten dabei, eben so wie die Herren Dumas und Stass, gewisse Rückstände, von ihnen "Asche" genannt. Ein Theil dieser Rückstände nun wurde mir zur sernerweitigen Untersuchung überlassen, deren Resultat ich mir in Folgendem mitzutheilen erlaube, um so lieber, als der Gegenstand nicht allein vermöge seiner Neuheit und Seltenheit Interesse darbietet, sondern auch des Außschlusses wegen, den er in Betreff der einstigen Bildung der Diamanten aus dem Organischen vielleicht zu geben vermag.

Schon in der ersten Mittheilung ihrer Versuche (s. dieses Journ. Bd. XXIII. H. 3. S. 168) sagen die oben genannten Herren von diesen Aschenresten, dass sie sehr gering und bei kleinen Diamantstücken kaum wahrnehmbar waren und dass sie aus einer röthlichen Substanz bestanden, deren Theile bisweilen eine glänzende Obersläche zeigen, so, als ob sie bereits gebildet in den Rissen des verbrannten Minerals eingeschlossen gewesen wären. Ich habe dieser vorläufigen Notiz nur hinzuzufügen, dass die Masse dieses Rückstandes allerdings nur sehr gering war, indem von 5,6344 Gr. Diamant nur 0,0072 Gr. erhalten wurden, und dass die röthliche Substanz desselben der Hauptsache nach sich als eine Unzahl der kleinsten Schuppen, Blätter und Splitter auswies, denen nur höchst selten derbere und mehr rundliche Stückchen beigemengt waren, wie auch, dass die Farbe dieser in Masse beisammen liegenden, verschiedenartig gestalteten Körper wohl mehr eine dunkelrothbraune genannt zu werden verdient.

Auf einer Glasplatte ausgebreitet und unter dem zusammengesetzten Mikroskope betrachtet, erkannte man genau die se
eben angedeutete Verschiedenheit der Form dieser Körper (Schoppen, Blätter, Splitter u. s. w.) eben so wie auch nur erst auf
diese Weise klar wurde, wie der eine schwarz und undurchsichtig, der andere schwarz, in's Braune und Durchscheinende
übergehend, der dritte durchsichtig, hellbraun und in's Gelbe
schweifend, der vierte gelb und wieder andere ganz weiss waren. Nur wenige zeigten eine matte Obersläche, die meisten
dagegen glänzten ziemlich stark, am stärksten einige schwarze
und undurchsichtige.

Langend, an erschien dieselbe ebenfalls verschieden, obwohl in niner solchen Weise, dass man keineswegs die eine Structur

m den gelben Splittern und eine andere etwa den schwarzen ler braunen als ihnen eigenthümlich erkennen konnte, vielehr machten sich die Structurverschiedenheiten an allen ohne nterschied bemerkbar. Vermisst wurde sie nur aus begreifzhen Gründen an den vollkommen undurchsichtigen; körnig er-:bien sie am häufigsten bei den durchsichtigen weissen, streifig, ie gefaltet, bei den gelben. Hin und wieder lagen schwarze lassen, wie Körner und Klumpen, in der Substanz der durchchtigen Splitter und Blätter zerstreut und gaben dem Ganzen a braunes Ansehen, wenn man sie ohne Mikroskop betrachte. Der vor Allem wichtigste Umstand war jedoch unstreitig er, dass an nicht wenigen solcher Körper ein feines schwaren oder dunkelbraunes Netzwerk nicht zu verkennen war, mit schsseitigen Maschen, bisweilen mehrfach übereinander liegend, enau wie man es bei der mikroskopischen Untersuchung des sanzenparenchyms zu sehen gewohnt ist. Nicht selten erschien s in einem der Auflösung naben oder darin begriffenen Zuande, so dass einzelne Theile dieses Netzwerkes anfloges, urch Ineinanderslieseen zu verschwimmen und undeutlich zu rerden, während es an denselben Stücken in einiger Entferung davon noch sehr deutlich erhalten war. Ich gestehe, dass etz des Befremdenden ich mich des Gedankens nicht habe entchlagen können, es seien diese Netzwerke und die damit in Verindung stehenden schwarzen Substanzen nichts weiter als veetabilische kohlige Reste, deren Verbrennung, gleichzeitig mit er des Diamants, nur dadurch verhindert werden konnte, dass e von einem der Verbrennung unfähigen Körper umschlossen raren.

Die vermittelst des Löthrohres angestellte mikrochemische Intersuchung eines Theiles dieser Diamantenrückstände ergablieselerde mit Spuren von Eisen, denn von der Soda wurden ie unter Brausen vollständig gelöst und mit Borax erhielt ih eine klare, schwach grün gefärbte Perle. Die mit Soda rhaltenen unklaren Perlen *) wurden mit Salzsäure behandelt,

^{*)} Es verdient erwähnt zu werden, dass es mir mit Soda nicht hicken wollte, eine Perle zu erhalten, die bei der Abkühlung klar lieb; immer hatte ich Ueberschuss an Soda, und die Versuche so oft

welche dieselben unter Brausen und Abscheidung von Kieselerde löste; sie färbte sich dabei gelb und liess einen Gehalt an Kisen durch die bekannten Reagentien auch auf nassem Wege deutlich erkennen.

Wenn endlich Erdmann und Marchand die Meinung aussprechen, dass es ihnen geschienen hätte, als ob die beschriebenen Körper bereits gebildet in den Rissen der zu verbrennenden Diamanten (die der Mehrzahl nach gelblich oder rauchgrau gefärbt waren) eingeschlossen gewesen wären, muss ich dieser Ansicht nur beistimmen. Zwar habe ich die verbrannten Diamanten, denen die vorliegenden Reste angehören, vor ihrer Verbrennung nicht untersucht, allein ich habe, nachträglich auf diesen Umstand aufmerksam gemacht, die Diemanten des Dresduer grünen Gewölbes und die kleineren der Dresdner königl. Mineraliensammlung untersucht und in mehreren geman dieselben Splitter und Blätter (wohl zu unterscheiden von Rissen und Sprüngen) entdeckt, wie solche nach der Verbrennong zurückblieben. Namentlich zeigt der unter No. 17 aufgeführte blaue und der unter No. 16 eingetragene braune Diamant des grünen Gewölbes diese Erscheinungen, obwohl wegen der Grösse der Steine eine genaue mikroskopische Untersuchung unmöglich ist; allein der in der königl. Mineraliensammlung unter No. 22 im Katalog eingetragene kleine nelkenbraune Diamant lässt in dieser Beziehung nichts zu wüsschen übrig. Er ist von mir einer genauen mikroskopischen Untersuchung unterworfen worden, und in seiner Mitte liegt ein kleines braunes durchsichtiges dreieckiges Blätteben, an welchem sogar Theile jenes oben erwähnten Netzwerkes, obwohl schon im Zustande der Auflösung begriffen, erkannt werden können. Es dürste angemessen erscheinen, dass auch von Anderen, denen sich Gelegenheit darbietet, Diamanten zu untersuchen dieser Gegenstand schärfer in's Auge gefasst würde, vielleicht, dass sich noch Wichtiges herausstellt. Namentlich wäre es interessant,

zu wiederholen, bis ich das gewünschte Resultat erhalten hätte, hielt ich für unthunlich, da mir so sehr wenig Substanz zur Untersuchung zu Gebote stand, wovon ich den grüssten Theil zu schonen versprochen hatte, damit auch Andere später mikroskopische Untersuchungen daran vornehmen können.

B. s. W. Brandes, Beiträge zur Kenntniss etc. 479

is ermitteln, wo jene zwei russischen Diamanten sich besinden bgen, von denen Parrot in einer Notiz: "Ueber Biamanten is Uralgebirges" (wenn ich nicht irre in Froriep's Notizen) richt, die ihm um deswillen besonders merkwürdig waren, eil sie im Innern schwärzliche Flecke besassen, von denen arrot meint, es sei wahrscheinlich Kohlenstoff gewesen. Er it dieselben nicht mikroskopisch untersucht und sagt nur, es base (ob Kohlenstoff oder nicht) blosse Vermuthung bleiben, es nicht erlaubt würde, die Diamanten zu zerbrechen.

Die Entstehung des Diamants anlangend, ist vorliegende ntersuchung wohl im Stande, eine anderweitige Stütze der Entehung des Diamants aus dem Organischen zu begründen, für welche ch Liebig in seiner Organ. Chemie auf S. 286 folgenderassen ausspricht: "Die Wissenschaft bietet in allen Erfahrunn, die man kennt, ausser dem Processe der Verwesung, keine nalogien für die Bildung und Entstehung des Diamants dar. In weiss gewiss, dass er seine Entstehung nicht dem Feuer rrdankt, denn hohe Temperatur und Gegenwart von Sauerstoff nd mit seiner Verbrennlichkeit nicht vereinbar; man hat im sgentheil überzeugende Gründe, dass er auf nassem Wege, iss er in einer Flüssigkeit sich gebildet hat, und der Veresungsprocess allein giebt eine bis zu einem gewissen Grade friedigende Vorstellung über seine Entstehungsweise."

LXV.

eiträge zur mineralogischen Kenntnist des Teutoburger Waldes und des Weseryebirges.

Von

RUDOLPH BRANDES und WILHELM BRANDES.
ortsetzung der Abhandlungen in den Bdn. XIX. u. XX. dies. Journ.)

Der Gegenstand der gegenwärtigen Abhandlung betrifft die here Untersuchung einiger Gesteine aus der Gryphitenformann der in Rede stehenden Gebirge, worin diese Formation sehr rbreitet ist. Wir führen darüber nur einige einzelne Belege . An der Quadersandsteinkette des Teutoburger Waldes zieht

480 . R. u. W. Brandes, Beiträge zur Kenntniss

sie, mehr oder weniger ausgebreitet, als ein schmaler Saum hin und wieder zu Tage stehend, fort. Durch den Zangenbach bei Horn z. B. ist die Reihefolge vom Muschelkalk durch den Keuper und Lias bis zum Quadersandstein deutlich aufgeschlossen. In dem Wesergebirge findet sich in unserer Gegend die Gryphitenformation nicht auf den Höhen der Keupergebirge, sondern an mehreren Stellen an den Bergabhängen und in Thälern und Schluchten sich herabziehend; so namentlich bei Falkenhagen im Silbergrunde, bei Meinberg am Stinkebrink, wo die Schwefelquelle sich findet. Es kommen hin und wieder in diesen Ablagerungen schwache Schwefelquellen vor, so beim Ringe unweit Lemgo und bei Bexten im Amte Schöttmar. Der Schwefelgehalt dieser Wässer ist aber unbedeutend und veränderlich. Sehr wahrscheinlich rührt er von dem Schwefelkies her, der in den Gesteinen dieser Formation sehr verbreitet ist.

Im Thale zwischen Detmold und Meinberg steht diese Formation in der Nähe des Schanzenberges, bei Barntrup und Schönemark, zu Tage; im Begathale am Thronsbache und der Maibolte, und bildet den Hügel zwischen beiden; ferner bei Schwelentrup. Noch findet sie sich nordöstlich von den Sternberger Bergen und verbreitet sich in ziemlicher Ausdehnung bis Bösingfeld. Am ausgedehntesten erscheint sie in der Ebene von Enger, Spenge, Herford und oberhalb Herford, im Lippeschen, in dem Schaara – und Begathale, in den Bauerschaften Lockhausen und Aspe im Amte Schöttmar.

Von den Gesteinmassen, welche die Gryphitenformation bilden, kommen in den hier angezeigten Terrains Schieferthon mit häufigen Thoneisensteinnieren, schwarze bituminöse Mergel mit hin und wieder bedeutenderen Kalkausscheidungen und Schwefelkiesmassen vor. Bleiglanz und Aluminit findet man seltener eingesprengt. Aluminit haben wir in der Gegend der Maibolte bei Lemgo darin gefunden und einzelne grössere Bleiglanzausscheidungen bei Bexten im Amte Schöttmar; am Zangenbach bei Horn kommt Bleiglanz in feineren Einsprengungen darin vor.

In Folgendem wollen wir einzelne dieser Verhältnisse näher untersuchen.

Der Liasschiefer bei Herford.

Dieser Schiefer bildet einen bedeutenden Hügel, als eine Fortsetzung des sogenannten Herforder Berges. Er besteht aus

ារ ។១១

mehr oder weniger dünnen Schichten, zerbröckelt leicht in unbestimmt eckige Stücke, hat eine schmuzig-bräunliche, an manchen Stellen in's Aschgraue übergehende Farbe, und auf den Klussflächen ist er meist dunkelbraun, an den Kanten undurchsichtig. Er klebt etwas an der Zunge und zeigt beim Anhauchen Thongeruch. Spec. Gew. 2,99.

Parallel mit den Schichten sind theils lagenweise, theils einzeln vertheilt, platte elliptische Massen abgelagert, auf welche wir speciell zurückkommen werden.

Uebrigens enthält der Schiefer selbst viele kleine Partikeln Schweselkies eingesprengt.

Analyse.

- a) 2 Gr. des seingepulverten Schiesers wurden im Platiqtiegel mit kaustischem Kali ausgeschlossen, die Masse in Wasser ausgeweicht, mit Chlorwasserstoffsäure behandelt, die Auslösung zur Trockne verdampst und der Rückstand mit salzsaurem Wasser digerirt, worauf Kieselerde zurückblieb, deren
 Menge 0,998 Gr. betrug.
- b) Die von der Kieselerde absiltrirte Masse gab durch Uebersättigung mit Ammoniak einen Niederschlag, der in 0,331 Gr. Thonerde und 0,364 Gr. Eisenoxyd mit Spuren von Manganoxyd zerlegt wurde.
- c) Die zur fernern Analyse noch gehörige Flüssigkeit aus b gab durch oxalsaures Kali so wenig als durch phosphorsaures Ammoniak eine Trübung.
- d) 2,0 Gr. des gepulverten Minerals wurden mit Wasser ausgekocht und das Filtrat mit Chlorbaryum versetzt; es wurde dadurch eine Trübung erzeugt, die eine Spur Schwefelsäure anzeigte.
- e) 1 Gr. des Minerals verlor durch Glühen 0,147 Gr. Der untersuchte Liasschiefer besteht hiernach in 100 Th. aus:

	00 967
basischem schwefelsaurem Eisenoxyd	Spuren
Wasser	14,700
Thonerde	16,550
Eisenoxyd	18,217
Kieselerde	49,960

482 R. u. W. Brandes, Beiträge zur Kenntniss

Schaliger Thoneisenslein, Eisenniere.

Wir haben oben der ellipsoïdischen Massen gedacht, die man in dem Liasschiefer eingelagert findet und die wesentlich als schaliger Thoneisenstein oder Eisenniere erscheinen. Diese ellipsoïdischen Massen bestehen aus einem mehr oder weniger festen Kern und einer Umhüllung, die beim Anschlagen in mehr oder weniger dünnen Schalen sich ablöst.

Diese schalige Masse hat eine ähnliche Farbe wie das schiefrige Gestein, worin die Nieren eingelagert sind, nur ist sie dunkler und zeigt viele gelbbraune und dunkelbraune Flekken, namentlich auf den Ablösungsslächen; im Innern der Masse bemerkt man diese weniger. Ohne Zweisel rühren diese Flekken von zersetztem Schweselkies her. In der äussern wie in der innern Masse ist nämlich hin und wieder Schweselkies in sehr seinen Partikeln eingesprengt.

Der feste Kern besteht meistens auch aus zwei verschiedenen Lagen, von denen die innere eine blaulich-graue Farbe hat und einen graulich-weissen Strich giebt. Der Bruch im Kleinen ist mehr oder weniger dicht, in's Feinsplittrige, im Grossen flachmuschlig, mit scharfkantigen Bruchstücken.

Die Farbe der äussern Masse des Kerns ist stellenweise dieselbe wie die der schaligen Absonderung, stellenweise mehr die der innern Masse, auch hinsichtlich der Härte hält sie die Mitte zwischen beiden. Auch an demselben Stück hat sie eine verschiedene Dicke.

Beim Anschlagen mit dem Hammer springt diese äussere Hülle stellenweise bis auf den innersten blaugrauen Kern weg, während an anderen Stellen eine Partie stehen bleibt. Die Grenze zwischen den beiden Lagen des Kerns ist meist scharf bezeichnet und bildet auf dem Querbruche eine deutlich bezeichnete Linie, auch wenn, wie diess vorkommt, die äussere Masse in die innere tiefer eingreift. Spec. Gew. der innersten Kernmasse = 3,10.

Wenn man die äusserste Schale, wie den Kern, jedes für sich, mit Chlorwasserstoffsäure kocht, so giebt die erhaltene Auflösung des Kerns durch Ammoniak einen grünlich-weissen Nicderschlag, der nach einiger Zeit sich dunkler färbt und braun wird, während die Auflösung der Schale durch Ammoniak so-

.

eder auch einige dunkelgrünliche Stellen unterscheidet. Es also klar, dass das Eisen in der Schale und in dem Kerne zwei verschiedenen Oxydationsstufen sich befindet und dass bei Verwitterung zu der schaligen Absonderung das Eisen hör oxydirt wird.

Sowohl die Kernmasse wie die schalige Absonderung urde einer Analyse unterworfen.

1) Die innere Masse.

- a) 50 Gr. des Minerals wurden im Platintiegel mit kaustinem Kali aufgeschlossen, die geglühte Masse in Wasser aufweicht, mit Chlorwasserstoffsäure behandelt und die Auflörung
 r Trockne abgeraucht, worauf, nach Auswaschen des Rückndes in salzsaurem Wasser, 13,6 Gran Kieselerde zurückeben.
- b) Die von der Kieselerde in a absiltrirte Auflösung gabrech Uebersättigen mit Ammoniak einen Niederschlag, der in ,11 Eisenoxyd = 19,88 Gr. Eisenoxydul, 10,52 Gr. Thonle und 0,25 Gr. Manganoxyd zerlegt wurde.
- c) Die ammoniakalische Flüssigkeit aus b wurde durch alsaures Kali kaum merklich getrübt; durch phosphorsaures nmoniak aber gab sie einen Niederschlag, der 10 Gr. wog d nach dem Glühen, bis sein Gewicht sich nicht mehr verderte, 4,5 Gr. phosphorsaure Talkerde hinterliess, die 1,65. Talkerde anzeigen.
- d) Ein bestimmter Theil des Minerals wurde auf Kohlenare geprüft, aber nur eine Spur derselben bemerkt.
- e) 20 Gr. des Minerals verloren durch Glühen 1,7 Gr. e Zusammensetzung des innern Kerns dieser Eisenniere ist ernach:

Eisenoxydul	39,76
Kieselerde	27,20
Thonerde	21,04
Talkerde	3,30
Manganoxyd	0,50
Wasser	8,50
	100,30.

484 R. u. W. Brandes, Beiträge zur Kenntniss

2) Die äussere Masse.

- tischem Kali behandelt, und nach Zersetzen mit Chlorwasseratoffsäure u. s. w. 20,25 Gr. Kieselerde erhalten.
- gung mit Ammoniak einen Niederschlag, der in 12,50 Gr. Eisenoxyd, 10,25 Gr. Thonerde und 9,20 Gr. Manganoxyd zerlegt wurde.
- c) Oxalsaures Kali gab in der aus b erhaltenen Flüssigkeit keinen Gehalt an Kalk zu erkennen; phosphorsaures Ammoniak aber brachte einen Niederschlag darin hervor, der 8 Gr. wog und nach dem Glühen 4 Gr. phosphorsaure Talkerde hinterliera, die 1,46 Gr. Talkerde entsprechen.
- d) In einem Versuche auf Kohlensäure ergab sich, dass -50 Gr. des Mimerals 0,4 Gr. Kohlensäure enthielten.
 - e) 25 Gr. des Minerals gaben 2,125 Gr. Wasser.

Die Zusammensetzung der äussern oder schaligen Masse dieser Eisennieren ist sonach:

Éisenoxyd	25,00
Kieselerde	40,50
Thonerde	20,50
Manganoxyd	0,40
Talkerde	2,92
Kohlensäure	0,80
Wasser	9,50
•	99,62.

Die vorstehenden Analysen des Liasschiefers und der darin vorkommenden ellipsoldischen Nieren, dieser in Bezug ihrer innern Kernmasse und der schaligen Umhüllung derselben, zeigen, dass alle drei zwar wesentlich dieselben Bestandtheile enthalten, aber in sehr verschiedenen Verhältnissen. Auffallend ist zuerst die Differenz in dem Gehalte an Kieselerde, welcher in dem Liasschiefer 50, in der schaligen Masse der Nieren 40, in der Kernmasse derselben 27 p.C. beträgt. Die Differenzen in dem Gehalte an Thonerde sind weniger in die Augen fallend. Der Schiefer enthält gegen 17, die Schale der Nieren 20, der Kern derselben 21 p.C. Thonerde. Bedeutender ist die Differenz in dem Gehalte an Eisen. Der Schiefer enthält 18, die schalige

Masse der Nieren 25 p.C. Eisenoxyd, die innere Kernmasse 39,76 Eisenoxydul. Die innere Masse der Nieren bietet sonach, auch abgesehen von ihrem Gehalte an Taikerde, eine merkliche Verschiedenheit von der Schiefermasse dar, so dass diese nicht altein durch eine aussere, von der Einwirkung von Luft und Wasser abhängige Veränderung von der innern Substanz der Nieren verschieden ist, sondern ihrem ganzen Wesen nach em anderes Verhältniss ihrer Bestandtheile darbietet. Dagegen zeigt die Schale, welche den Kern der Nieren umschließt, eine Zusammensetzung, als wäre sie gewissermaassen ein Gemisch der Kernmasse der Nieren mit der Substanz des Schiefers. Ausserdem ist es ersichtlich, dass die innere und äussere Masse der Nieren dadurch sich unterscheiden, dass die äussere Masse durch Zersetzung von Schwefelkies und höhere Oxydirung des Eisens verändert worden ist, während die innere diese Veränderung nicht erlitten hat. Es möchten die Differenzen in dem Gehalte der Kieselerde, des Eisens und der Thonerde zwischen der Masse des Kerns und der äussern schaligen Absonderung der Nieren und des Gebirgsgesteins darauf hindeuten, dass die innere Masse eine reinere Abscheidung, die schalige ein Gemenge der Kernmasse mit dem Gebirgsgestein sei.

Zinkblende.

In der Substanz der Nieren des Liasschiefers von Herford haben wir ein paarmal ein Mineral eingesprengt gefunden, welches in seiner gelblichen Farbe, dem Diamantglanze, dem blättrigen Bruche und dem Durchgange der Blätter nach, der Blende ganz ähnlich ist. Da wir in unserem Gebirge Zinkblende nur selten, namentlich im Dolomit des Hollenhagen, gefunden haben, so erregte das obige Vorkommen um so mehr unsere Aufmerksamkelt. Leider war die Menge des Minerals so unbedeutend, dass wir nur einige wenige chemische Versuche damit anstellen konnten, um uns zu überzeugen, ob wir wirklich Zinkblende vor uns hatten.

Etwas von dem Mineral wurde auf der Kohle vor dem Löthrohre behandelt, es decrepitirte stark, schmolz nicht und erlitt keine merkliche Veränderung. Mit Soda geglüht, löste es sich nach und nach darin auf, indem die Kohle mit Zinkrauch sich belegte Man erhielt eine braune Leber, die, in Wasser gegeben, durch Chlorwasserstoffsäure Schwefelwasserstoff entwik-

486 R. u. W. Brandes, Beiträge zur Kenntniss

kelte, der auf Bleipapier sogleich eine dunkelbraume Färbung hervorbrachte. Die chlorwasserstoffsaure Auflösung gab durch kohlensaures Natron kohlensaures Zinkoxyd.

Vielleicht ist es möglich, dass in der Folge grössere Mengen dieses Minerals in gedachtem Gebirge aufgefunden werden. Vorläufig müssen wir uns begnügen, das Dasein desselben darie anzuzeigen.

Versteinerungsmasse eines Ammoniten.

Dieses Exemplar war ein faustgrosses Bruchstück einer beträchtlich grossen Ammonitenversteinerung aus dem Liasschiefer am Zangenbach bei Horn. Die Masse hatte im Innern ganz das Ansehen von thonigem Sphärosiderit, von hellbräunlicher und bräunlich grauer Farbe, mit einem ziemlich ebenen und flachmuschligen Bruch und eckig-körnigen Absonderungen. Eine 1—2 Linien dicke Schicht einer bräunlich grauen krystallinischen Masse bildete um den Haupttheil einen Ueberzug, der mit vielen kleinen glänzenden krystallinischen Blättehen von Schwefelkies durchzogen war.

Die innere Masse, wie die des äussern Ueberzuges, wurden, jede für sich, untersucht.

A) Die innere Masse.

- a) 25 Gr. des Mineralpulvers verloren durch gelindes Erhitzen über der Spirituslampe 0,25 Gr.
- b) 25 Gr. des Mineralpulvers verloren durch starkes Glühen 2,25 Gr.
- c) Durch Chlorwasserstoffsäure entwickelten die schwach geglühten 25 Gr. aus a noch 7,75 Gr. Kohlensäure.
- d) Auf dieselbe Weise gaben die in b stark geglühten 25 Gr. noch 5,75 Gr. Kohlensäure.
- e) 50 Gr. des ungeglühten Mineralpulvers gaben durch Behandeln mit Chlorwasserstoffsäure 15,75 Gr. Kohlensäure.

Der Verlust aus a und c beträgt 32 p.C., der aus b und d ebenfalls 32 p.C. Der Verlust in e zeigt 31,50 p.C. Kohlensäure an. Es würden dann 0,5 p.C. für Wasser überbleiben.

f) Das stark geglühte Pulver gab beim Uebergiessen mit Chlorwasserstoffsäure einen deutlichen Geruch nach Schweselwasserstoff zu erkennen. 30 Gr. des Minerals wurden in einer Glassöhre über der Spirituslampe erhitzt. Die Röhre war mit einem rechtwinklig gebogenen Röhrchen verbunden, worin sich etwas Feuchtigkeit verdichtete, die zwar farblos war, aber doch alkalisch reagirte und an einem mit Salzsäure beseuchteten, datüber gehaltenen Glasstabe Nebel bildete.

- g) Wurde das Mineralpulver mit etwas kaustischer Kali-, lauge angerieben, so war auch in diesem Falle Entwickelung, von Ammoniak zu beobachten.
- h) 50 Gr. des Minerals wurden mit kaustischem Kali geglüht, die geglühte Masse besass eine sehr dunkelgrüne Farbe.
 Nach Behandeln mit Chlorwasserstoffsäure u. s. w. auf bekannte
 Weise wurden daraus 3,25 Gr. Kieselerde erhalten.
- i) Die von der Kieselerde in h absiltrirte Auflösung gab Burch Ammoniak einen Niederschlag, aus welchem durch kaustisches Kali 1,75 Gr. Thonerde erhalten wurden, und es blieb Risenoxyd zurück, dessen Menge, getrocknet, 10,5 Gr. wog. Aus der Hälfte dieses Niederschlages wurde durch Glühen die Menge des wasserleeren Oxyds bestimmt, die auf das Ganze 8,40 Gr. ausmachte. Dieser Theil wurde in Chlorwasserstoff-Bäure aufgelöst, die Auflösung mit Ammoniak neutralisirt und dann mit benzoësaurem Natron das Eisen daraus abgeschieden. Die von dem benzoësauren Eisenoxyd abfiltrirte Flüssigkeit gab, auf das Ganze berechnet, 6,30 Gr. kohlensaures Manganoxydul, die 3,90 Gr. Manganoxydul entsprechen. Werden diese von dem oben zu 8,40 Gr. bestimmten Eisenoxyd abgezogen, so bleiben ` 4,50 Gr. Eisenoxyd. Das Eisenoxyd wurde mit kaustischem Kali einer starken Glühhitze ausgesetzt und nachher die geglübte Masse in Wasser aufgenommen und die Auflösung filtrirt, das Filtrat mit Essigsäure gesättigt und mit essigsaurem Bleioxyd versetzt. Hierdurch wurde ein Niederschlag von phosphorsaurem Blei erhalten, der auf das Ganze 1,57 Gr. betrug, die 0,37 Gr. Phosphorsäure anzeigen und 0,63 Gr. phosphorsaurem Eisenoxyd entsprechen, worin 0,62 Gr. Eisenoxyd enthalten.

Zichen wir dieses Eisenoxyd von der Gesammtmasse, von 4,50 Gr. Eisenoxyd ab, so bleiben 4,24 Gr. Eisenoxyd übrig, diese aber entsprechen 3,81 Gr. Eisenoxydul.

k) Die in i von dem Thon-Eisenoxydgemenge abfiltrirte Flüs-is sigkeit wurde mit oxalsaurem Kali gefällt, wodurch ein Nie-derschlag erhalten wurde, der 45 Gr. wog. 10 Gr. dieses

488 R. u. W. Brandes, Beiträge zur Kenntniss

Niederschlages gaben durch Brennen im Platintiegel mit Schwefelsäure 9,50 Gr. schwefelsauren Kalk. Hieraach berechnen
sich für die ganze Menge des oxalsauren Kalkes 17,74 Gr.
Kalk, die 31,51 Gr. kohlensauren Kalk anzeigen.

1) Aus der vom exalsauren Kalke absiltrirten Flüssigkeit. wurde durch phosphorsaures Ammoniak die Talkerde gefällt; der Niederschlag betrug, geglüht, 6,52 Gr., die 2,39 Gr. Talkerde enthalten und 4,94 Gr. kohlensaurer Bittererde entsprechen.

Die Bestandtheile dieser Masse sind sonach:

Kohlensaurer Kalk	63 02
kohlensaure Bittererde	9,80
phosphorsaures Eisenoxyd	1,26
Eisenoxydul	7,62
Manganoxydul	7,80
Kieselerde	6,50
Thonerde	3,50
Wasser	1,00
Ammoniakverbindung) organische Substanz	Spuren
· ·	100,50.

Wir glaubten anfangs, dass auch das Eisen und Mangan an Kohlensäure gebunden seien, indessen ist in dem Versuche e der Kohlensäuregehalt nur 31,5 p.C. Die gefundenen 63,02 kohlensaurer Kalk enthalten 26,54 Kohlensäure, und die 9,80 p.C. kohlensaure Bittererde enthalten 5,08 Kohlensäure, was zusammen 31,62 p.C. Kohlensäure ausmacht und genau mit der Bestimmung der Kohlensäure in e übereinstimmt.

B) Die äussere Masse.

Diese äussere Schale der Versteinerung bestand, wie bereits bemerkt, aus einer krystallinisch fasrigen Substanz.

- a) Ein bestimmtes Gewicht der Substanz wurde in einer kleinen Röhre erhitzt und die Feuchtigkeit in einem damit verbundenen Röhrehen aufgefangen. Sie war zu unbedeutend, um dem Gewichte nach bestimmt zu werden.
- b) 25 Gr. des Mineralpulvers gaben durch Behandeln mit Chlorwasserstoffsäure 10,5 Gr. Kohlensäure zu erkennen.
- c) 25 Gr. des Mineralpulvers wurden mit Chlorwasserstoffsture behandelt, worin sich dasselbe, bis auf einen geringen

Rückstand, auflöste. Ungelöst blieben einige metallisch glänzende Flitterchen, die sich gut absetzten. Die träbe Flüssigkeit, die einen darin sein vertheilten Stoff suspendirt hielt, wurde von jenem Absatze abgegossen, dieser abgespült und endlich in einem Porcellanschälchen getrocknet. Unter der Loupe ergab sich dieser Absatz deutlich als ein Gemenge von kleinen Quarzkörnern und Schwefelkies zu erkennen, welches 0,75 Gr. weg. Durch Behandeln mit Salpetersäure erhielt man unter Entwikkeln rother Dämpse eine Auslösung, die von den ungelösten Quarzkörnern getrennt wurde, die jetzt 0,25 Gr. wogen. Is der Auslösung zeigte Chlorbaryum Schwefelsäure an und Ammoniak schlug Eisen daraus nieuer. Der Schwefelkies beträgt demnach 0,5 Gr.

- d) Die von dem Schweselkies und den Quarzkörnern getrennte trübe Flüssigkeit wurde siltrirt und hinterliess aus dem Filter eine bräunlich schwarz gesärbte schlammige Substanz, die 0,5 Gr. wog und sich im Platintiegel weiss brannte. Sie bestand aus kohlehaltiger Kieselerde.
- e) Aus der salzsauren Auflösung aus d wurde durch Ammoniak ein Niederschlag erhalten, der aus 0,75 Gr. Eisenoxyd und 0,25 Gr. Thonerde bestand.
- f) Die ammeniakalische Flüssigkeit aus e wurde in zwei Hälften getheilt. In der einen Hälfte brachte weder Chlorbaryum noch Schweselwasserstoff eine Veränderung hervor. Die andere Hälfte wurde durch oxalsaures Kali gefällt und ein Niederschlag von oxalsaurem Kalk erhalten, der, getrocknet, 17 Gr. wog und durch Brennen mit Schweselsäure 15,57 Gr. schweselsauren Kalk gab, die 6,47 Gr. Kalk enthalten, auf die ganze Menge also 12,94 Gr. Kalk, die 22,99 Gr. kohlensaurem Kalk entsprechen.
- g) In der von dem oxalsauren Kalke abfiltrirten Flüssigkeit wurde durch phosphorsaures Ammoniak keine Veränderung her-vorgebracht.

Die Bestandtheile dieser Mineralmasse sind sonach:

Kohlensaurer Kalk	91,96
Eisenoxyd	3,00
Thonerde	1,00
Kieselerde, mit kohliger Substanz	2,00
Latus	97,96

90 R.u. W. Brandes, Beiträge uur Kenntniss etc.

ľ

Ŋ

ŁIEI

Ħ,

'35

4,6

d y

Ä

::•	v 2	Transport	97,9 6
•	• . :	Schwefelkies	9,00
		Quarzkörner	1,00
		organische Substanz	Sparen
			100.96.

Die äussere Schale dieser Versteinerung ist also wesentlich von der innern verschieden. Diese ist in Bezug auf die Bestandtheile der Hauptmasse nach dolomitisch, mit Silicaten gemengt, erstere aber besteht wesentlich aus Kalkspath, dem Quarzkörner, Schwefelkies und Silicate in sehr geringen Mongen beigemischt sind; in beiden zeigt sich organische Substanz, in der äussern Schale aber verhältnissmässig mehr.

Kalkstein aus den Liasmergeln der Mergelgrube bei Stukenbrok im Amte Schöttmar.

Dieser Kalkstein findet sich in den schwarzen bituminöse Liasmergeln bei Stukenbrok. Er hat eine braunschwarze, graudlich – schwarze und rauchgraue Farhe; auf dem Bruche ist er splittrig und körnig, mit Anlage zum Flachmuschligen. Er ist mit Adern von dichtem Kalkspath durchzogen und enthält bäuft. Schwefelkies, mehr oder weniger sein eingesprengt. Die Ansachuse dieses Minerals wurde solgendermaassen angestellt.

- a) 35 Gr. des Minerals, in einem geeigneten Apparate exbitzt, gaben nur Spuren von Wasser zu erkennen.
- b) 50 Gr. des Mineralpulvers wurden nach und nach in Chlorwasserstoffsäure aufgelöst, wobei 20,75 Gr. Kohlensäure entwickelt wurden.
- c) Die Auslösung aus a liess ein mit Schweselkies gemengtes Pulver zurück, welches von der Auslösung getrennt wurde. Dieses Pulver wurde abgeschlämmt und so der Schweselkies rein erhalten, der in einem Schälchen getrocknet wurde und 0,5 Gr. wog. Das davon abgeschlämmte schwarze Pulver wog, getrocknet, 2,5 Gr.; etwas davon, in einer Glasröhre erhitzt, gab sarbloses, sauer reagirendes Wasser unter Verbreitung eines schwachen Geruches nach Schweselsäure; es war also noch eine Spur Schweselkies eingemengt. Die ganze Masse wurde in einem Platinlössel geglüht, wodurch sie sich weiss branzte und 1,5 Gr. Kieselerde hinterliess; es war also 1 Gr. Kohle verbrannt.

- d) Die salzsaure Auflösung aus e gab durch Uebersättigen mit Ammoniak einen Niederschlag, der aus 1,25 Gr. Thonerde und 0,25 Gr. Eisenoxyd bestand.
- e) Aus der abfiltrirten Flüssigkeit aus d wurde durch oxalsaures Kali ein Niederschlag von 77,5 Gr. oxalsaurem Kalk erhalsen, der durch Behandeln mit Schwefelsäure 59,2 Gr. schwestelsauren Kalk lieferte, die 24,58 Gr. Kalk enthalten, mithis 43,66 Gr. kohlensauren Kalk anzeigen.
- f) Die Salzstüssigkeit aus e gab durch phosphorsaures Ammoniak einen Niederschlag, der 4,5 Gr. wog, und nach dem Glühen 2,25 Gr. Dieser Menge phosphorsaurer Talkerde entspricht 0,82 Talkerde oder 1,71 kohlensaure Talkerde.

Der untersuchte Kalkstein besteht sonach aus:

Kohlensaurem Kalk	87,32
kohlensaurer Talkerde	3,42
Thonerde	2,50
Eisenoxyd -	0,50
Kieselerde	3,00
Kohle	2,00
Schwefelkies	1,00
organischer Substanz	Spuren
•	99,74.

(Fortsetzung folgt.)

LXVI.

Ueber die Quecksilberoxydulsalze.

Von

H. ROSE.

(Aus den Ber. der Berl. Acad.)

Man hat von jeher, und mit Recht, die seuerbeständigen Alkalien für die stärksten aller Basen gehalten. Sie zeigen, neben ihrer Eigenschast als starke Basen auszutreten, noch andere Eigenschasten, welche mit dieser in keinem Zusammenhange stehen; aber lange glaubte man, dass sie nothwendig allen stärkeren Basen eigenthümlich sein müssten, und zwar aus keinem andern Grunde als aus dem, dass man sie bei den Alkalien wahrgenommen hatte.

In den Alkalien ist der Sauerstoff mit grosser Verwandtschaft an das Metali gebunden. Lange hielt man es für eine wesentliche Eigenschaft der stärkeren Basen, dass das Metall in ihnen schwer reducirt werden könne. Nur spät und nach langem Widerstreben konnten sich die Chemiker entschliessen, das Silberoxyd für eine starke Base zu halten, und nur deshalb, weil Bilber und Sauerstoff im Oxyde nicht mit starker Verwandtschaft verbunden sind. Die Eigenschaften der Oxyde aber, starke und schwache Basen zu bilden und den Sauerstoff stark oder schwach gebunden zu enthalten, scheinen in keinem Zusammenhange zu stehen. In einer grossen Anzahl von Oxyden, wie in vielen Erden, kann der Sauerstoff nur mit der grössten Schwierigkeit und bisweilen nur unvollkommen vom Metall getrennt werden, und dech gehören diese Oxyde oft zu den schwächsten aller Basen

Die Eigenschaft der Oxyde, starke oder schwache Basen zu bilden, hängt am meisten von der Zahl der Sauerstoffatome ab, mit denen sich ein Atom des Metalles verbindet. Die basischen Eigenschaften eines Oxyds sind um so stärker, je geringer die Zahl der Atome des Sauerstoffes gegen die des Metalles ist, das mit ihm verbunden ist. Von dieser Regel scheinen nur das Kupferoxydul und das Quecksilberoxydul Ausnahmen zu machen, die man ziemlich allgemein zu den schwächeren Basen zu rechnen scheint. Diese Ausnahmen sind indessen nur scheinbare, denn diese beiden Oxyde besitzen eigenthümliche Eigenschaften, welche mit ihrer Eigenschaft als Basen nichts gemein haben, welche aber Ursache sind, dass man sie für schwächere Basen hält als sie in der That sind.

Schon vor sehr langer Zeit suchte ich zu zeigen, dass das Silberoxyd als aus 1 At. Sauerstoff, verbunden mit 2 At. Metall, angesehen werden müsse. In neuerer Zeit hat Regnauft bei seinen Untersuchungen über die spec. Wärme einfacher und zusammengesetzter Körper diese Annahme bestätigt und zugleich gefunden, dass auch die feuerbeständigen Alkalien; aus denselben Gründen wie das Silberoxyd, aus 2 At. Metalbund 1 At. Sauerstoff zusammengesetzt sein müssen, etwas, das auch aus der von Mitscherlich gefundenen Thatsache folgte, dass mehrere Silberoxydsalze mit den entsprechenden Natronsalzen isomorph sind.

In den Alkalien und dem Silberoxyd müssen wir also dieselbe Zusammensetzung annehmen wie im Quecksilberoxydul und im Kupferoxydul, welche letztere daher zu den stärksten Basen gebören müssten, obgleich man sie bisher für schwache gehalten hat.

Es wird allgemein in den Lehrbüchern der Chemie angegeben, dass das salpetersaure Quecksilberoxydul durch Wasser in ein basisches Salz zersetzt werde. Wäre diess wirklich der Fall, so müsste unbedenklich das Quecksilberoxydul zu den schwachen Basen gerechnet werden, denn das Wasser kann aur schwache Basen aus den Salzen ausscheiden, indem es dahn selbst als Base auftritt und schwächere Basen, als es selbst ist, als Oxyd oder als basisches Salz fällt. Nur besonders Bases. die aus einem Doppelatom Metall, verbunden mit 3 At. Sauerstoff, bestehen, werden aus ihren Salzen durch Wasser abgeschieden, und von der grossen Reihe von Oxyden, welche aus 1 At. Metall, verbunden mit 1 At. Sauerstoff, bestehen, zeigt nur das Quecksilberoxyd, das offenbar unter diesen Oxyden die schwächste Base ist, die Eigenschaft, durch Wasser zersetzt zu werden. Dem Quecksilberoxydul ist diese Eigenschaft mir scheinbar eigen.

Man weiss schon seit langer Zeit, dass das Kupferoxydul und das Quecksilberoxydul die Eigenschaft haben, durch Einfluss von mehreren Reagentien in Metall und in ein höheres Oxyd zu zerfallen. Diese Eigenschaft, so wie die, durch den Sauerstoff der Luft höher oxydirt werden zu können, Eigenschaften, welche mit der, als Base aufzutreten, in gar keinem Zusammenhange zu stehen scheinen, sind es, da diese Oxydule dieselben auch in ihren Salzen behalten, durch welche Erscheinungen hervorgebracht werden, die zu dem Irrthume geführt haben, dass die Quecksilberoxydulsalze durch Wasser, wie die Salze schwacher Basen, zersetzt werden.

Es ist eine schon alte Bemerkung, dass bei der Bereitung des Kupfervitriols vermittelst Röstung des Kupfers mit Schwefel und Auslaugung der calcinirten Masse mit Wasser, neben schwefelsaurem Kupferoxyd auch schwefelsaures Kupferoxydul aufgelöst werde, welches letztere sich langsam in der Auflösung in schwefelsaures Kupferoxyd und in metallisches Kupfer

zersetzt, von welchem in den Kupfervitriolwerken sehr bedeutende zusammenhängende Massen erhalten werden können.

Kine ähnliche Zersetzung wie beim schwefelsauren Kupferoxydul findet bei allen Quecksilberoxydulsalzen, nur in einem
verschiedenen Grade, statt. Man erhält, wenn man sie mit
Wasser behandelt, metallisches Quecksilber, welches sich mit
dem unzersetzten Salze, das in den meisten Fällen schwer- oder
unlöslich ist, mengt, und ein Oxydsalz. Aber letzteres wird
wiederum durch's Wasser zersetzt und erzeugt oft ein basisches
Salz. Wird salpetersaures Quecksilberoxydul mit vielem warmen
Wasser gekocht, so scheidet sich, ausser metallischem Quecksilber, ein schwerlösliches krystallinisches Salz von citronengelber Farbe ab, das durch Kochen mit mehr Wasser wiederum zersetzt wird und das theils für salpetrigsaures, theils
für basisch-salpetersaures Quecksilberoxydul gehalten worden
ist; es ist indessen ein Doppelsalz aus salpetersaurem Quecksilberoxyd mit salpetersaurem Quecksilberoxydul.

Dass das Quecksilberoxydul zu den starken Basen gehört, ergiebt sich daraus, dass es mit Kohlensäure ein wasserfreies neutrales, freilich dabei sehr leicht zersetzbares Salz bildet, eine Eigenschaft, die nur sehr starken Basen gemein ist, dass es überhaupt mit Säuren, auch mit sehr schwachen, bestimmtere Verbindungen bildet, als sonst Basen, die man zu den stärkeren rechnet. Die Verbindungen des Quecksilberoxyduls mit den meisten organischen Säuren haben viel Aehnlichkeit mit denen, welche das Silberoxyd mit denselben bildet; sie gehören bisweilen zu den schwerlöslichsten Salzen, doch sind die des Quecksilberoxyduls noch schwerlöslicher als die des Silberoxyds.

LXVII.

Ueber das Atomgewicht des Urans.

Von

EUGEN PÉLIGOT.

(Compt. rend. Avril 1841. p. 735.)

Obgleich das Uran seit länger als' einem halben Jahrbundert bekannt ist, so ist es doch bis jetzt nur Gegenstand einer kleinen Anzahl von Untersuchungen gewesen. Die Eigenschaften dieses Metalles sind ungenau bestimmt, und doch zeigt es verschiedene Eigenthümlichkeiten, die wohi werth wären, die Aufmerksamkeit der Chemiker zu fesseln.

Da ich mich im Besitze einer ziemlich bedeutenden Menge von Uranit fand, so unternahm ich das Studium der hauptsächlichsten Verbindungen, die dieser Körper liefern kann. Man weiss, dass der Uranit von Autun ein phosphorsaures Doppelsalz von Uran und Kalk ist und durch seine so einfache Zusammensetzung sich mehr als jedes andere Naturproduct zur Gewinnung dieses Metalles eignet.

Nach den Versuchen von Arfwedson, die von Berzen lius bestätigt wurden, wird das Atomgewicht des Urans durch die Zahl 2711,3 dargestellt. "Diess Mctall," sagt Berzelius, "hat zwei Oxyde, in welchen die Multipla des Sauerstoffes 3, "und 3 sind. Man hat allen Grund, diese Oxyde als U + O, "und 2U+3O zu betrachten, weil das Uran, obgleich von "unbedeutendem spec. Gewicht, doch ein sehr hohes Atomge"wicht hat."

Da diess Atomgewicht festgesetzt ist, ohne dass man die Analyse eines einzigen der durch diess Metall gebildeten Salse zu Rathe gezogen hätte, so hielt ich es für nothwendig, beim Anfange dieser Untersuchungen die Elementarzusammensetzung einiger unter ihnen zu bestimmen.

Das essigsaure Uranoxyd schien mir die Bedingungen zu erfüllen, die man von einem zur Bestimmung des Atomgewichles ausersehenen Salze fordert. Dieses Salz krystallisirt in kleinen isolirten durchscheinenden Prismen, die leicht von ihrer
Mutterlauge gesäubert werden können; seine physikalischen Charaktere lassen keinen Zweifel an seiner Homogeneität aufkommen. Die Analyse dieses Salzes gab *):

Erste Analyse.

2,000 essigeaures Uranoxyd

0.433 Wasser

0.827 Kohlensäure

0,854 essigsaures Uranoxyd

0,575 gelbes Oxyd.

Zweite Analyse.

1,413 essignaures Uranoxyd,

. .)

٠.;

0,586 Kohlensäure

0,309 Wasser.

^{*)} Folgendes sind die Ergebnisse der Analysen:

496 Péligot, üb. das Atomgew. des Urans.

	1. Versuch.	2.	Versuch.
Kohlenstoff	11,27		11,30
Wasser	21,60	•	21,16.
Uranoxyd	67.30.		·

Zur Bestimmung von Kohlenstoff und Wasser wurden die von den Herren Dumas und Stass zur genauern Bestimmung organischer Elemente angegebenen Verfahrungsweisen angewandt. Nimmt man nun an, dass das analysirte Salz 1 Aeq. Essigsäure und 2 Aeq. Wasser enthält, und geht man von dem durch Dumas und Stass aufgestellten Atomgewicht der Kohle aus, um durch Rechnung das Atomgewicht des Uranoxyds zu finden, so wird sich ergeben, dass diess Gewicht durch die Zahl 1800 bezeichnet werden kann, wie es die folgende Formel ausdrückt:

$\mathbf{C_4}$	===	300,0	11,26	
H ₁₀		62,5	04.00	
05	==	500,0	21,09	
Uranoxyd=		1800,0	67,65	
	_	2662,5	100,00.	

Da es nach Analogien sehr wahrscheinlich ist, dass dieses essignance Salz eine Basis mit 100 Th. Sauerstoff enthält, so müsste, wenn diese Versuche genau sind, das Atomgewicht des Urans für die Folge durch 1700 ausgedrückt werden. Die Formel des analysirten Salzes würde sein:

 $C_4H_6O_3, UO, 2HO,$

während sie nach Berzelius folgendermaassen geschrieben wird: $3(C_4H_\mu O_3, 2HO)U_2O_3$.

Ich muss übrigens bemerken, dass diese letzte Formel bedingt, dass 100 Th. Salz 68,8 Uranoxyd, 10,8 Kohle und 21,4 Wasser geben, welche Zahlen aber zu sehr von den durch directen Versuch erhaltenen abweichen, als dass es möglich wäre, sie anzunehmen, ohne Gründe beizubringen, die in der Wirklichkeit nicht da sind. Die Analyse des salpetersauren Uranoxyds würde zu denselben Schlüssen führen; die Zusammensetzung dieses Salzes, dessen Stickstoffgehalt, Wasser und Uranoxyd ich direct bestimmt habe, würde durch folgende Formel ausgedrückt werden:

NO₅, UO, 6HO.

Wenn Uranoxyd UO ist, wird das Oxydul wahrscheiulich

U₂O sein. Das Uran würde alse in seinen Oxydationsatufen dieselben Verkältnisse wie das Kupfer zeigen.

Die Zusammensetzung des Oxyduls, die durch Arfweilson direct bestimmt worden ist durch eine Reduction dieses
Dxyds mit Wasserstoff, stimmt freilich mit dieser Vermuthung
nicht überein. Dieser Chemiker fand, dass darin 100 Th. Uran
nit 3,55 Th. Sauerstoff verbunden sind, während nach dem
lurch oben erwähnte Analysen erhaltenen Atomgewichte 100 Th.
Uran 2,90 Th. Sauerstoff aufnehmen müssten.

Arfwedson aber bemerkt selbst, dass seine Versuche viel zu wünschen übrig lassen; es ist nicht wahrscheinlich, dass lieser Chemiker das reine Uranoxydul erhalten haben solke, denn dieser Körper zeigt eine grosse Nelgung, sich weiter zu oxydiren, und es scheint nicht, dass Arfwedson diesen Umstand in Erwägung gezogen hätte.

Ausserdem stimmt die Zusammensetzung, welche dieser Chemiker dem Uranexyd zugeschrieben hat, recht gut mit der, welche aus der von mir vorgeschlagenen Modification des Atom-gewichtes dieses Metalles resultirt. Es sind nämlich 100 Th. Uran mit 5,53 Th. Sauerstoff im Oxyd verbunden, wenn man das alte Atomgewicht lässt; nach dem neuen verbinden sich 100 Th. Uran mit 5,80 Th. Sauerstoff, um denselben Körper zu bilden.

Uebrigens hoffe ich, der Academie bald eine Arbeit über das Uran vorzulegen, in welcher diese verschiedenen Fragen auf directem Wege ihre Lösung finden sollen.

Nachschrift. Seit der Entdeckung des Vanadins wurde es wahrscheinlich, dass das Atomgewicht des Urans ein anderes sei als es die Versuche von Arfwedson und Berzelius bestimmt hatten. Die Regnault'sche Untersuchung über die spec. Wärme der Metalle zeigte bekanntlich eine Abweichung von der Regel, welche auf dieselbe Ursache hinzudeuten schien. Auf Berzelius's Veranlassung hat Hr. Plantamour in dieser Beziehung Versuche angestellt (Journ. Bd. XXIII. S. 230), welche ganz zu denselben Resultaten geführt haben, die ich bei ähnlichen Versuchen erhielt. Ich babe meine Untersuchungen über das Uran nichtsdestoweniger in einer andern Rich-

32

Journ. f. prakt. Chemie. XXIII. 8.

tung verfolgt und habe Thatsachen aufgefunden, welche ich bald mittheilen werde. Hier will ich nur in Beziehung auf die Reduction des Uranoxyduls bemerken, dass Arfwedson's Versuche genau sind. Dieser fand in 100 Th. Oxydul 3,557 Sauerstoff. Dieselbe Menge wurde von 96,440 Th. Metall beim Verhrennen aufgenommen.

Ich fand, dass 1,4815 Gr. Oxydul bei der Reduction durch . Wasserstoffgas 1,4285 Gr. Metall hinterliessen, also 3,57% Sauerstoff enthielten; ferner, dass 1,4428 Gr. Oxydol 1,3905 Gr. Me. tall kinterliessen, also 3,6249 Sauerstoff enthalten hatten. Beim Verbrennen wurden daraus wieder 1,4415 Gr. Oxydul erhalten, also waren 3,607f Sauerstoff aufgenommen worden. Dass diese : Reductionen durch Einmengung einer höhern Oxydationsstufe -falsohe Resultate gegeben haben sollten, ist nicht richtig; es ist jedoch ein anderer Umstand, welcher sie leicht etwas fehler-: haft machen kann, nämlich eine gewisse Menge von condensirtem Wasscratoffgase, welche in dem reducirten Metallpulver zurückbleibt und die man sehr leicht entdeckt, wenn man das ... reducirte Metall durch Sauerstoff verbrennt. Aus der Menge ades gebildeten Wassers kann man keine Correction herleiten, da man nicht weiss, in welcher Gestalt der Wasserstoff in dem Metallpulver enthalten ist. Dieser Umstand, welcher bei allen Reductionen der Metalloxyde, bei denen das Metall nicht schmilzt, meintritt, ist bei der Bestimmung der Atomgewichte auf diese : Weise nicht ohne Einfluss; ob er so gross ist, dass die Zahl 5422,72 == 2 Ur nach dem alten Atomgewicht, in 5100,00 == 3 Ur nach dem neuen Atomgew. umgeändert werden muss, wird eine vollständige Untersuchung der Salze dieses Metalles uns bald zeigen. B. F. Md.

- if it is a first of the second of the seco

LXVIII.

Bemerkungen über die Zerselzung des Ammoniaks durch die Verbindungen von Stickstoff mit Sauerstoff.

Von

J. PELOUZE.

(Compt. rend. Avril 1841. p. 599.)

Setzt man bei gewöhnlicher Temperatur Schweselsäure in Berührung mit salpetersaurem Ammoniak, so löst sich dieses Salz nach und nach, und die Flüssigkeit zeigt keine irgend unvorhergesehene Erscheinung, mag das Verhältniss oder die Concentration dieser Körper sein wie sie wollen, d. h. mögen die Reagentien Schweselsäure oder Ammoniak oder Salpetersäure im Ueberschusse anzeigen.

Enthält das Gemisch Wasser und man unterwirst es einer Destillation, so gewinnt man einerseits alle Salpetersäure, andererseits die ganze Menge von schweselsaurem Ammoniak, welche die Theorie angiebt.

Ist dagegen das salpetersaure Ammoniak durch die Hitze all seines Wassers beraubt worden, das es ohne Zersetzung verlieren kann, und man erhitzt es nun in einem sehr grossen Ueberschusse von concentrirter Schwefelsäure, z. B. in seinem 50 fachen Gewichte, so verhält sich Alles ganz anders. Das Gemenge entwickelt bei 150° eine sehr beträchtliche Menge von Stickstoffoxydul; es bildet sich Wasser, das mit der Schwefelsäure zusammentritt, und man findet in den Producten dieser merkwürdigen Zersetzung weder Ammoniak noch Salpetersäure wieder. Das salpetersaure Ammoniak verhält sich unter diesen Umständen nicht weniger merkwürdig als unter dem blossen Einflusse der Wärme und liefert das einzige Beispiel einer salpetersauren Verbindung, welche durch Schwefelsäure keine Salpetersäure verliert und zugleich ihre Basis dieser viel beständigern und kräftigern Säure nicht abtritt.

Vermindert man die Menge der concentrirten Schwefelsäure sehr bedeutend und arbeitet z. B. mit 10 Th. Säure und
1 Th. Salz, so zersetzen sich 75 Hunderttheile des Salzes in
Salpetersäure und Ammoniak, die 25 anderen in Stickstoffoxydul
und Wasser. Vermindert man allmäblig die Menge der Schwe-

500 Pelouze, üb. die Zersetzung des Ammoniaks

felsäure, so kommt man endlich dahin, kein oder sehr wenig Stickstoffoxydul zu erhalten, so dass mit 1 Aeq. salpetersauren Ammoniak und 2 Aeq. Schweselsäure die Erscheinungen nicht mehr von den gewöhnlichen Regeln der Zersetzung eines Salzes durch eine Säure abweichen. Diese Regeln bleiben auch, , wenn man, statt das Gemenge von salpetersaurem Ammoniak nit einem grossen Ueberschusse sehr concentrirter Schwefelsaure bis 160° zu erwärmen, dasselbe auf einer Temperatur zwischen 90 und 120° erhält. Diese Temperatur, hinreicht, um die Umsetzung des salpetersauren Ammoniaks in Wasser und Stickstoffoxydul zu bedingen, ist dennoch hoch genug, um die durch Schwefelsäure verdrängte Salpetersäure abzudestilliren, und man sieht sie in die Vorlagen kommen, ohne von Stickstoffoxydul begleitet zu sein. Aus den vorhergehenden Thatsachen geht hervor, dass je nach den relativen Mengen von salpetersaurem Ammoniak und Schwefelsäure, je nach der Temperatur des Gemenges, je nachdem es mehr oder weniger Wasser enthält, die Zersetzungsproducte sehr verschieden sind.

Die Analogie liess vermuthen, dass das salpetrigsaure Ammoniak sich auf eine entsprechende Weise verhalten müssle. "Der Versuch hat diese Vermuthung bestätigt. Dieses Salz zersetzt sich durch eine grosse Menge concentrirter Schwefelsäure, 'wie unter dem Einflusse der Wärme, in Wasser und Stickstoff. Stickstoffoxyd schien sich zu ähnlichen Reactionen we-'niger zu eignen; nichtsdestoweniger gelang es mir, dasselbe mit der grössten Leichtigkeit durch Ammoniak zu zersetzen, indem ich mich noch des Mittels einer concentrirten Schwesel-"saure bediente. — Ich benutzte die neuerdings von Hrn. Adolph Rose gemachte Beobachtung, dass sich die Schwefelsäure, welche 1 At. Wasser enthält, direct mit dem Stickstoffoxyd verbindet und sehr bedeutende Mengen dieses Gases absorbirt. Ich bereitete mir diese Verbindung, löste in derselben schwefelsaures Ammoniak auf und unterwarf das Gemenge einer Temperatur von 160°. Es entwickelte sich daraus ein ganz reines - Stickstoffgas, ohne die mindeste Beimengung von Stickstoffoxyd der Stickstoffoxydul.

Ich stellte den Versuch noch anders an und liess Stickstoffexyd in concentriste Schwefelsäure treten, die mit schwefelsaurem Ammoniak gemengt und zu 150—200° erhitzt war. Das durch die Verbindungen von Stickstoff u. Sauersteff. 501

Sticksteffoxyd wurde zersetzt wie im vorigen Falle, und es entwickelte sich reines Stickstoffgas. Diess Gas ist nur in dem Maasse mit Stickstoffoxyd verunreinigt, als der Strom desseiben zu rasch gewesen ist.

Die Zersetzung des Ammoniaks durch Stickstoffoxyd in Anwesenheit der Schweselsäure ist so leicht, das gewonnene Stickstoffgas so rein und entwickelt sich aus dem Gemenge so regelmässig, dass ich nicht daran zweisle, dass diese Einwirkung von den Chemikern künstig zum Behus der Bereitung dieses Gases angewandt werden wird. Diess neue Versahren ist übrigens von grösster Einsachheit, denn man braucht das Stickstoffgans von käuslicher Schweselsäure absorbiren zu lassen, lann, wenn man Stickstoff bereiten will, diese Mischung zu nehmen (mit der man sich im Voraus versehen kann), schwesselsaures Ammoniak hinzuzusetzen und das Gemisch zu einer gelinden Temperatur zu erwärmen. Diese Reaction ist vollkommen bequem und lässt als Bereitungsmethode des Stickstoffes nichts zu wünschen übrig.

Was das Oxydul betrifft, das sich entwickelt, wenn man einen Ueberschuss von concentrirter Schweselsäure mit salpetersaurem Ammoniak erhitzt, so ist es nicht rein; es enthäkt regelmässig Stickstoff und ist auch bisweilen mit einigen Spurren rother Dämpse gemengt. Auch ereignet es sich, dass eine sehr kleine Menge Salpetersäure aus dem Gemenge entweicht und sich so durch ihre Flüchtigkeit der weltern Einwirkung des Ammoniaks entzieht. Jedensalls ist die Hauptreaction, die, welche entschieden alle anderen beherrscht, die Umwandlung des salpetersauren Ammoniaks in Stickstoffoxydul und in Wasser.

Ich habe oben gesagt, dass das salpetersaure Ammoniak, mit seinem 10fachen Gewichte concentrirter Schwefelsäure erhitzt, mir Salpetersäure in solcher Menge lieferte, dass nur ¼ der angewandten Säure zerstört sein musste. Da ich bei dieser Reaction viel Stickstoffoxydul, dagegen nur eine unbedeutende Menge von rothen Dämpfen bemerkt hatte, so brachte mich diese zum Zweifel an der völligen Genauigkeit einer Thatsache, die man in allen Lehrbüchern der Chemie angegeben findet, nämlich dass die Schwefelsäure in concentrirtem Zustande die Salpetersäure in Wasser, dessen sie sich bemächtigt, in Sauerstoff und in salpetrige Salpetersäure zerlege. Dieser Zwei-

502 Pelouze, üb. die Zersetzung des Ammoniaks

fel wurde zur Gewissheit, als ich sah, dass die Salpetersäure sich entwickelte, wenn ein Gemenge von salpetersaurem Ammoniak und einem ungeheuren Ueberschusse an concentrister Schwefelsäure auf 100° erhitzt wurde. Ich vermischte 509 Gr. sehr concentrirter Schweselsäure mit 100 Th. Salpetersäure von der Dichtigkeit 1,448. Diess Gemenge destillirte ich langsam und gewann daraus 88 Gr. Salpetersäure von 1,520 Dichtigkeit. Letztere, durch gelinde Wärme des grössten Theils der rothen Dämpfe, welche dieselben gelblich färbten, entledigt, wurde mit ihrem 6½ fachen Gewichte sehr concentrirter Schwefelsäure gemengt, ohne dass eine merkliche Temperaturerhöhung eintrat. Diess Gemenge war farblos und verbreitete au der Luft einen sehr dichten weissen Rauch von Salpetersäure. Bei einer Temperatur, die sich nicht über 150° erhob und die man lange Zeit so nahe als möglich an 100° gebalten hatte, destillitten daraus 82 Gr. Salpetersäure über, deren Dichtigkeit noch 1,520 war und deren Siedepunct zwischen 86 und 88° lag. Kine dritte Rectification über Schwefelsäure änderte gar nichts in den Eigenschaften, der Dichtigkeit oder der Farbe der Salpetersäure.

: Ich bin zu der Ansicht gekommen, dass man der eigenen Einwirkung der Schwefelsäure viel weniger als der des Lichtes und der Wärme insbesondere den geringen Verlust zuschreiben muss, den man bei der wiederholten Destillation der Salpetersäure über Schwefelsäure erhält. Gewiss ist aber diess, dass man merklich denselben Verlust erleidet, wenn man Salpetersäure mit 1 At. Wasser allein oder über Schweselsäure destillirt, und dass in beiden Fällen die Menge der rothen Dämple dieselbe ist. Die ersten Hydrate der Schweselsäure und der Salpetersäure scheinen mir ohne Wirkung auf einander zu sein, sie zeigen keine Temperaturerhöhung, wenn man sie vermischt. Nichts beweist, dass eins dieser Hydrate mehr Verwandtschaft zum Wasser hat als das andere, denn wenn die concentrirte Schweselsäure der schwachen Salpetersäure das Wasser entzieht, was dieselbe mehr als 1 Aeq. bat, so kann ihrerseits auch die Salpetersäure der wässrigen Schwefelsäure das Wasser mehmen.

Die vorstebenden Beobachtungen lehrten mich, mit Vortheil die Schweselsäure anzuwenden, um Salpetersäure zu concentriten. Um letztere Säure sehr concentrist zu erhalten, ist es bin-

durch die Verbindungen von Stickstoff u. Sauerstoff. 503-

reichend, die käufliche Säure zwei- oder dreimal über Schwefelsäure gewöhnlicher Güte zu rectificiren, mit der einzigen
Vorsicht, dass man das Gemenge nicht über 140—150° erwärmt. Ein leichtes Kochen und zuletzt einige Spuren von
braunem Bleisuperoxyd (oxide puce), die man zu der destillirten und abgekühlten Säure bringt, reichen hin, derselben die
salpetrige Salpetersäure zu entziehen, welche sie enthalten könnte.
Uebrigens bleibt in der so geklärten Säure nicht die kleinste
Menge von Blei.

Die Eigenschaft des Ammoniaks, durch seinen Wasserstoff die verschiedenen Sauerstoffverbindungen des Stickstoffes, die in ' Schweselsäure aufgelöst sind, zu zersetzen, ist einer sehr wichtigen Anwendung zur Reinigung der käuflichen Schwefelsäure fähig. Diese Säure ist häusig mit Stickstoffoxyd und Salpeter-. säure verunreinigt, deren Anwesenheit in vielen Fällen nachtheilig ist. Man kennt bis jetzt kein schnelles und vortheilhaftes Verfahren, um die Schwefelsäure von diesen Stickstoffverbindungen zu befreien. Schwefelblumen und Kienruss zerstören dieselben, aber ihre Anwendung ist mit solchen Unbequemlichkeiten verbunden, dass man sie verlassen hat. Das schweselsaure Eisenoxydul hat guten Erfolg, allein man muss die Säure destilliren oder eine beträchtliche Menge von schwefelsaurem Eisenoxyd darin lassen. Das Ammoniak, oder vielmehr das schwefelsaure Ammoniak, vereint alle Vortheile, die bei der Reinigung erwünscht sein können. Die Säuren, welche übervoll von Stickstoffverbindungen sind, werden völlig davon befreit durch ein Halbprocent ihres Gewichtes an schwefelsaurem Ammoniak, und in den meisten Fällen sind 1-2 Tausendtheile hinreichend. Eine schnelle und leichte Probe gestattet die Entfernung der kleinsten Menge von Ammoniak in der gereinigten Säure und die genaue Bestimmung der zur Reinigung der Säure nöthigen Menge von schwefelsaurem Ammoniak. Andass eine Spur von Ammoniak in der genommen nun auch, Säure zurückbliebe, so würde diess keinen Nachtheil haben. Bei dem jetzigen Preise des schwefelsauren Ammoniaks würde die Reinigung von 100 Kilogr. käuflicher Schwefelsäure nicht über 12-15 Centimes zu stehen kommen. Uebrigens braucht man in dem gewöhnlichen Gange der Fabrication und Concentration dieser Säure gar nichts zu ändern; man braucht nur in die

504 Péligot, üb d. salpet. Salpetersäure u. d. salpet. Saure.

bleiernen Schalen, worin man die Säure concentrirt, die 2 oder 3 Tausendtheile ihres Gewichtes an schweselsaurem Ammoniak hineinzuschütten. Diess Salz löst sich auf und die Operation geht wie gewöhnlich vor sich.

Die Stickstoffverbindungen, mit denen die käufliche Schwefelsäure verunreinigt ist, sind Hauptursache der Verschlechterung der Concentrirgefässe aus Platina. Der Anwesenheit dieser Verbindungen muss man die Aenderung des Indigo's zuschreiben, dessen Lösung in Schwefelsäure mit gelben Stoffen untermengt ist, die in gereinigter Säure nicht entstehen. Auch die Reinigung der Oele gelingt, wie man sagt, weniger gut mit Schwefelsäure, die Salpetersäure enthält.

Die Chlorwasserstoffsäure, welche man gewinnt, wenn man Seesalz mit dieser Säure zersetzt, enthält nothwendig Chlor oder Königswasser, was eine Ursache von vielen Unannehmlichkeiten ist. Diese und andere Nachtheile, welche ich stillschweigend übergehe, werden nicht mehr sein, wenn man sich der neuen Reinigungsmethode, die ich vorschlage, bedienen wird.

LXIX.

Untersuchungen über die salpetrige Salpetersäure und die salpetrige Säure (l'acide hypoazotique et l'acide azoteux).

Von E. PÉLIGOT.

(Compt. rend. Avril 1841. p. 606.)

Unter den Verbindungen, die aus der Vereinigung von Stickstoff und Sauerstoff entstehen, giebt es zwei, die salpetrige Salpetersäure und die salpetrige Säure, die, ungeachtet der bedeutenden Arbeiten, deren Gegenstand sie gewesen sind, noch heute einen unbestimmten Charakter und widersprechende Eigenschaften zeigen. Forscht man nun, gestützt auf jene Arbeiten, ob die Existenz beider Säuren im isolirten Zustande angenommen werden darf, fragt man sich, welcher Natur die salpetrigen Dämpfe sind, so ist man genöthigt, einzugestehen, dass die über diese Körper angestellten Versuche nicht genügend sind, um diese Fragen mit Bestimmtheit zu beantworten.

Péligot, üb. d. salpet. Salpetersäure u. d. salpet. Säure. 505

Die zu Rathe gezogenen Schriststeller geben sehr abweischende Erklärungen der beobachteten Thatsachen. Die einen nehmen an, dass die salpetrige Salpetersäure, d. h. die Säure, die aus 2 Vol. Stickstoff und 4 Vol. Sauerstoff zusammengesetzt ist, die einzige sei, die man isolirt erhalten habe; die anderen meinen, dass die salpetrige Säure aus 2 Vol. Stickstoff und 3 Vol. Sauerstoff gleicher Weise sich im isolirten Zustande vorfinde.

Man weiss, dass die salpetrige Salpetersäure, deren Entdeckung Dulong angehört, durch Erhitzen des salpetersauren
Bleioxyds und nach diesem berühmten Chemiker auch durch
Zusammentreten von 2 Vol. Stickstoffoxyd und 1 Vol. Sauerstoff entsteht.

Nach Hrn. Mitscherlich kann man durch eine solche Einwirkung eines Doppelvolumens von Stickstoffoxyd salpetrige Säure bereiten und mittelst der Kälte in Gestalt einer grünen, äusserst flüchtigen Flüssigkeit condensiren.

Nach Hrn. Ettling entsteht diese Flüssigkeit durch Berührung einer Salpetersäure von 1,3 mit Stärke *). Bei dem vergleichenden Studium, das ich über die auf so verschiedene Weise erhaltenen Säuren anstellte, musste ich so viel als möglich den zersetzenden Einfluss des Wassers auf diese Producte vermeiden. Man weiss jetzt, wie schwierig es ist, den Strom eines beliebigen Gases vollkommen trocken zu halten.

Durch die Anwendung eines Apparates, der so zusammengesetzt war, dass die Anwendung verbindender Korke, die dem
Gase Feuchtigkeit mittheilen, vermieden wurde, entstand durch
Berührung von Stickstoffoxyd und Sauerstoff, die beide mittelst
Kalilauge und wasserfreier Phosphorsäure getrocknet waren, ein
Körper, der bis 9° unter Null fest war und in durchsichtigen Prismen krystallisirte, dessen Auftreten statt der farblosen oder grünen von Dulong und Mitscherlich angegebenen Flüssigkeiten mich sehr überraschte. Dieser Körper, der allein durch
directe Verbindung von Stickstoffoxyd und Sauerstoff entsteht,
krystallisirt nicht, wenn nicht die Gase vollkommen trocken sind.
Bei unseren Versuchen fanden wir diese Bedingung der Trok-

^{*)} Vgl. Rose in dies. Journ. XX. 491.

506 Péligot, üb. d. salpet. Salpetersäure u. d. salpet. Säure.

kenheit nur bei den ersten Litern Gas erfüllt, die in den Trokkenapparat kamen, obgleich derselbe die Ausdehnung eines Meter hatte und wenigstens 1 Kilogr. frisch dargestellter Kalilauge enthielt.

Die Analyse dieses Körpers wurde mit rothglühendem Kupfer angestellt; ich fand, dass er 30,4 p.C. Stickstoff enthielt; er bildet folglich die *Untersalpetersäure* (salpetrige Salpetersäure).

Da aber die salpetrige Salpetersäure, die man durch Erbitzung des getrockneten salpetersauren Bleioxyds erhält und deren Zusammensetzung Dulong bestimmte, noch bei — 18° flüssig ist, musste ich die Ursachen dieses Unterschiedes in den physikalischen Eigenschaften der Säure aufsuchen. Indem ich nun salpetersaures Bleioxyd, das gut getrocknet schien, in einer Porcellanretorte erhitzte und die gebildeten Producte gesondert auffing, erhielt ich anfangs die flüssige Säure, weil das salpetersaure Bleioxyd noch etwas Wasser enthielt, und hernach dieselbe Säure wasserfrei krystallisirt.

In diesem Zustande der Reinheit siedet sie bei 22°, schmilzt bei -9°, aber einmal geschmolzen, war es unmöglich, sie auf's Neue selbst durch eine Kälte von 15 - 17° unter Null fest zu erhalten.

Was die grüne Flüssigkeit betrifft, die man betrachtet als sei sie salpetrige Säure, so habe ich gefunden, dass sie eine sehr verschiedene Zusammensetzung zeigt; diejenige aber, die durch Einwirkung der Salpetersäure auf Amidon entsteht, liefert, wenn man sie einer neuen Destillation unterwirft, anfangs eine grüne Flüssigkeit, die bei + 10° zu sieden anfängt und 30,8 p.C. Stickstoff enthält.

Destillirt man diese grüne Flüssigkeit, so ist der Theil, der sich zuerst entwickelt, blau. Dieser siedet bei — 2° und enthält 33 p.C. Stickstoff.

Da die salpetrige Säure 37 p.C. Stickstoff enthält, so scheinen diese Flüssigkeiten Gemenge von Untersalpetersäure und salpetriger Säure zu sein.

Dasselbe Gemenge findet sich in dem Producte, das man zuerst bei der Destillation der Untersalpetersäure erhält, der man eine kleine Quantität Wasser hinzugefügt hat; diese Säure wird augenblicklich grün und verwandelt sich, wie im Contact mit Basen, in Salpetersäure, die an das Wasser tritt, und wasserfreie salpetrige Säure. Bei dem Studium dieser Einwirkung
des Wassers auf die Untersalpetersäure kam auch ich zu den
Schlüssen, die Hr. Fritsche in einer Abhandlung niedergelegt
hat, von welcher ich erst nach Beendigung dieser Arbeit Kunde
erhielt.

Endlich bildet sich auch dasselbe Gemenge von Untersalpetersäure und salpetriger Säure durch Zusammenkommen vong gut getrocknetem Stickstoffoxyd mit Untersalpetersäure. Beide Körper verwandeln sich in salpetrige Säure, nur war es unmöglich, durch diese Kinwirkung reine salpetrige Säure zu erhalten, indem die Untersalpetersäure eine gewisse Beständigkeit anzunehmen scheint, wenn sie mit salpetriger Säure gemengt ist. Dasselbe Gemenge entsteht als secundäres Product aus der Einwirkung von 4 Vol. Stickstoffoxyd auf 1 Vol. Sauerstoff.

Nach diesen Versuchen ist wahrscheinlich, dass man die reine salpetrige Säure wird erhalten können, wenn man beträchtliche Quantitäten dieser Gemenge einer Destillation bei niedriger Temperatur unterwirft. Sammelt man das stüchtigste Product auf, so kann dieses durch neue Rectisicationen die salpetrige Säure im Zustande der Reinheit liesern.

LXX.

Chemische Notizen.

Von

Dr. VOGEL jun. in München.

1) Ueber die Unterscheidung der salpetersauren Verbindungen von chlorsauren in verdünnten Auflösungen.

Sehr oft hatte ich Gelegenheit, zu bemerken, dass es dem Anfänger schwer fällt, chlorsaure und salpetersaure Verbindungen, wenn sie in vielem Wasser aufgelöst sind, schnell und mit Sicherheit von einander zu unterscheiden, was um so weniger auffallend ist, da diese beiden Verbindungen in ihrem Verhalten zu Reagentien auf nassem Wege grosse Aehnlichkeit mit einander haben. Die Entfärbung der Indigotinctur z. B. wird bekanntlich durch eine Auflösung von chlorsaurem Kali, so wie

von salpetersaurem Kali, durch Zusatz von Schwefelsäure in gleicher Weise bewirkt, und es ist dabei nicht wohl möglich, zu entscheiden, ob die Entfärbung von einer chlorsauren oder salpetersauren Verbindung herrühre.

Als ein Unterscheidungsmerkmal beider Verbindungen wird die Entwickelung eines gelbgrünen Gases bei der Behandlung eines chlorsauren Salzes mit concentrirter Schweselsäure angegeben. Ist indessen die Auslösung des Salzes sehr verdünnt, so ist diese Erscheinung vorübergehend und schwer bemerkbar, daher von minder Geübten leicht zu übersehen. Ferner charakterisiren sich die chlorsauren Salze in sester Gestalt ausfallend durch die bestigen Verpusfungen ohne Temperaturerhöhung durch blosse Friction, wenn sie mit brennbaren Substanzen vermengt sind, wie z. B. wenn man chlorsaures Kali, Kohle oder Schwesel vermengt und aus dem Ambos mit dem Hammer schlägt.

Da jedoch bei praktischen Uebungen meistens mikrochemisch gearbeitet wird, so misslingt dieser Versuch sehr häufig, um so mehr, wenn die chlorsaure Verbindung nicht gehörig getrocknet oder von anderen Salzen noch nicht vollkommen getrennt war. Eben so ist das Entzünden eines Gemenges einer chlorsauren Verbindung mit Zucker durch Betupfen mittelst eines Tropfens Schwefelsäure aus denselben Gründen oft unsicher.

Es scheint mir daher für die Anfänger in analytischen Versuchen nicht unerwünscht zu sein, in einem einsachen und auch für nicht Geübte leicht auszuführenden Versuche, welchen ich hier mittheilen werde, ein Mittel an die Hand zu bekommen, die chlorsauren und salpetersauren Verbindungen sicher und schnell von einander zu unterscheiden.

Wenn, wie schon bemerkt, die Indigotinctur sowohl von den chlorsauren als salpetersauren Salzen auf Zusatz von Schwefelsäure völlig entfärbt wird, so verhält sich diess anders mit der Lakmustinctur.

Bringt man nämlich in eine Salpeterauflösung einige Tropfen Lakmustinctur, so dass die ganze Flüssigkeit gleichmässig
blau gefärbt ist, und setzt alsdann concentrirte Schwefelsäure
hinzu, so wird die Lakmustinctur, welche natürlich durch den
Zusatz der Schwefelsäure und das Freiwerden der Salpeteraäure
geröthet ist, keineswegs entfärbt.

Nimmt man aber statt der Salpeterlösung eine Auflösung

Lakmustinctur durch das gebildete und in Freiheit gesetzte Chlor augenblicklich bewirkt. Durch dieses Verhalten zur Lakmustinctur unterscheidet sich demnach das chlorsaure Kali wesentlich von dem salpetersauren. Ist man daher bei einer Auflösung, welche die Indigotinctur auf Zusatz von Schwefelsäure entfärbt, in Zweifel, ob diess von einer chlorsauren oder salpetersauren Verbindung herrühre, so hat man nicht nöthig, die zu untersuchende Auflösung abzurauchen, den Rückstand zu trocknen und, mit brennbaren Körpern vermengt, auf den Ambos zu bringen, da schon in der wässrigen Auflösung der angegebene einfache Versuch mit Gewissheit für die eine oder andere Verbindung entscheidet.

Um zu sehen, bei welchem Grade der Verdünnung diese Entfärbung der Lakmustinctur durch chlorsaures Kali noch statt-finde, verdünnte ich eine concentrirte Auflösung dieses Salzes, nämlich 1 Th. in 16 Th. Wasser, mit dem doppelten Gewichte Wasser. Die Entfärbung fand in diesem Falle noch eben so gut statt. Bei der Auflösung von 1 Th. chlorsaurem Kali in 64 Th. Wasser ging die Entfärbung etwas langsamer vor sich, und bei 80 Th. Wasser fand sie nicht mehr statt. Die Zersetzung der Indigotinctur dagegen wird bei einer weit grössern Verdünnung noch bewirkt. In der Auflösung eines Theils chlorsauren Kali's in 500 Theilen Wasser war sie noch deutlich wahrnehmbar.

Diese Methode, das chlorsaure Kali vom Salpeter, beide in ihren verdünnten Auflösungen, zu unterscheiden, hat noch den Vortheil, dass, wenn auch mit dem chlorsauren Kali fremde Salze vermengt sind, sie dennoch zu einem sichern Resultate führt. Ich vermengte mehrere Salze, besonders Chlorüre, mit einer Auflösung von chlorsaurem Kali, ohne dass die Entfärbung der Lakmustinctur dadurch gehindert worden wäre.

Durch eine verdünnte Salpeterauflösung erleidet die Lakmustinctur keine Entfärbung auf Zusatz von Schwefelsäure, auch nicht in dem Falle, wenn der Salpeter mit einigen Procenten Kochsalz oder anderen Chlorüren verunreinigt ist, was sehr häufig stattfindet. Nur wenn man eine sehr concentrirte Salpeterlösung mit einer gesättigten Kochsalzlösung vermengt, so wird aller-

dings die Lakmustinctur auf Zusatz von Schwefelsäure ebenfalls entfärbt.

2) Ueber das Verbrennen des Natriums auf Wasser.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass das Natrium, wenn es auf Wasser gebracht wird, den Sauerstoff desselben schaell absorbirt, ohne dass jedoch dabei, wie beim Kalium, eine Feuererscheinung wahrgenommen wird. Ich habe indessen beobachtet, dass das Verbrennen des Natriums auf Wasser ebenfalls unter Feuererscheinung vor sich geht, wenn man ein Stück Natrium, statt auf kaltes, auf kochendes Wasser bringt. Es brennt alsdann in rotirenden Bewegungen und unter starkem Funkensprühen mit gelber Flamme. Es ist nicht einmal nöthig, das Wasser auf den Siedepunct zu erheben, sondern bei 65°C. ist die Erscheinung noch eben so deutlich. In einem Wasser von 55°C. zeigen sich nur anfangs einzelne Funken und bei 50°C. findet das Sprühen nicht mehr statt.

Auf concentrirter Schwefelsäure brennt das Natrium nicht; setzt man aber einige Tropfen Wasser hinzu, so entsteht augenblicklich Entzündung mit lebhafter gelber Flamme in Folge der Temperaturerhöhung durch die Einwirkung der Schwefelsäure auf das Wasser. Aus demselben Grunde entzündet sich das Natrium und brennt mit Flamme, wenn es auf ein frisch bereitetes Gemenge von gleichen Raumtheilen Schwefelsäure und Wasser gebracht wird. Ein Theil der Säure wird hierbei vollkommen zersetzt. Es entwickelt sich hierbei auch Schwefelwasserstoffgas, welches deutlich an dem Schwarzwerden eines darüber gehaltenen Bleipapiers wahrzunehmen ist. Uebergiesst man das Gefäss, worin das Brennen des Natriums auf Schwefelsäure vor sich gegangen, mit Wasser und lässt es einige Zeit ruhig stehen, so setzt sich auf dem Boden ein gelbweisses Pulver ab, welches der reducirte Schwefel ist.

Um in Vorlesungen den Unterschied zwischen der Flamme des Kaliums und des Natriums nachzuweisen, kann dieser Versuch mit Vortheil benutzt werden, indem man vergleichsweise auf zwei neben einander stehende Schalen, die eine mit beissem, die andere mit kaltem Wasser gefüllt, das Natrium auf das heisse und das Kalium auf das kalte Wasser legt, so dass nun beide Metalle mit ihren eigenthümlichen Farben bronnen.

) Ueber das Verhalten der wasserfreien Schwefelsäure zu einigen brennbaren Körpern.

Ueber die wasserfreie Schweselsäure ist von Wach *) ine Reibe von Versuchen angestellt und mitgetheilt worden, velche ihr Verhalten zum Jod, zu Schweselblumen und einien anderen Substanzen nachweisen. Um zur vollständigern Kenntiss dieser Säure beizutragen, habe ich es unternommen, einige förper mit derselben in Berührung zu bringen, deren Verhalen zur wassersreien Schweselsäure meines Wissens bis jetzt och nicht bekannt war.

Um eine hinlängliche Quantität wasserfreier Schwefelsäure larzustellen, erhitzte ich deutsche Schwefelsäure in einer Reorte und liess die wasserfreie Säure in kleine Cylindergläier, amgeben mit einem Gemenge aus Eis und Kochsalz, streiihen. So oft die Wände des Glases mit weissen Flocken beleckt waren, wurde die Vorlage gewechselt und, hermetisch
rerschlossen, in Eis aufbewahrt.

Es war schon früher beobachtet worden, dass sich der Phosphor in wasserfreier Schwefelsäure von selbst entzündet und dass dadurch Schwefel aus der Säure abgeschieden wird. Bringt man aber ein kleines Stück Phosphor in eine grössere Juantität Säure, so setzt sich der Schwefel nicht gleich als gelbes Pulver, sondern es entsteht eine blaue Verbindung des Schwefels mit der Schwefelsäure, wie es mir scheint, dieselbe, welche wahrgenommen wird, wenn man Schweselblumen in die wasserfreie Säure bringt. Der durch den Phosphor abgeschielene Schwesel verbindet sich nämlich mit der im Ueberschusse vorhandenen, noch unzersetzten wasserfreien Schwefelsäure zu ler bekannten blauen Säure. Obgleich bier ein Theil der Schwe-'elsaure total zersetzt wird, so bildet sich dennoch eine Portion schwesligsauren Gases, welches durch den Geruch nicht zu verkennen ist. Setzt man noch mehr Phosphor hinzu, so verschwindet die blaue Verbindung und der abgeschiedene Schweel setzt sich an den Wänden an. Behandelt man den Rückstand der Verbrennung mit Wasser, so besindet sich in der

^{*)} S. Jahrb. der Chemie u. Pharm. XX. 1.

Auflösung Phosphorsäure und Schweselsäure. Der unlösliche Rückstand ist Schwesel mit Phosphor und rothem Phosphoroxyd.

verfreien Schwefelsäure eine eigenthümliche Verbindung eingeht, so vermuthete ich, dass das Brom in demselben Falle sein werde. Bringt man einige Tropfen Brom in wasserfreie Schwefelsäure, so verwandelt es sich schnell in Dämpfe, welche sich nach einigen Stunden wieder in dunkelbraunen Tropfen ansammeln. Das Brom scheint aber dabei keine dem Jod analoge Veränderung zu erleiden, denn beim Zutritte der Luft entweicht die wasserfreie Schwefelsäure in weissen Dämpfen und das Brom bleibt rein zurück.

Kreosot, mit wasserfreier Schweselsäure in Berührung gebracht, wird augenblicklich zersetzt. Die Kohle wird frei und legt sich als seines Pulver an den Wänden des Glases an.

Das Eupion wird durch Einwirkung der wasserfreien Schwefelsäure eben so wie das Kreosot zersetzt, nur geht die Zersetzung nicht so schnell vor sich, sondern es dauert einige Stunden, bis die Kohle vollständig ausgeschieden ist.

LXXI.

Literarische Nachweisungen.

Ann. der Physik u. Chemie. Von Poggend. 1841. No. 3.

Darlegung eines neuen Verfahrens, Abdrücke von Medaillen und - ähnlichen Gegenständen in metallischem Kupfer durch Druck kervorzubringen. Von G. Osann.

Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung des Feldspaths

und anderer verwandter Gattungen.


Veber die Zusammensetzung des Wolframs. Vom Grafen Franz Schaffgotsch. (Enthält Wolframoxyd, nicht Wolframsäure.)

Dieselben. 1841. No. 4.


Ueber die Zusammensetzung des Asbestes am Schwarzenstein im Zillerthale. Von Meitzendorff.

Ueber ferneres Vorkommen des Vanadins in den Kupferschieferschlacken etc. von den Mansfelder Hütten, von Sangerhausen in Thüringen u. der Friedrichskütte bei Reichelsdorf in Hessen-Von C. Kersten.


Guss und Druck von Friedrich Nies in Leipzig.




J.f.p.Ch. 1841 Bd . XXIII. H. 15.16.









•

•



